

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"

SERIE: MONOGRAFÍAS DE INVESTIGACIÓN

Nº 11

Estudio Epidemiológico de Salud Mental según Áreas poblacionales de Lima Metropolitana 2012

Informe General del Adulto

LIMA, PERÚ
2015
ISSN-1023-389X



Publicación del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”. Se dedica a la difusión y promoción de la salud mental desde una perspectiva multidisciplinaria.

Instituto Nacional de Salud Mental

Jr. Eloy Espinoza Saldaña No. 709, Urb. Palao.

San Martín de Porres. Lima 31, Perú

Teléfono: 614-9200; Fax: 614-9200, anexo1092

E-mail: insmhdhn@minsa.gob.pe – oeaide@yahoo.com

Se recomienda citar este documento como:

Instituto Nacional de Salud Mental. *Estudio Epidemiológico de Salud Mental según áreas poblacionales de Lima Metropolitana 2012*. Informe General del Adulto. Serie: Monografías de Investigación N°. 11. Lima, 2015.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 96-1524

ISSN -1023-389X

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL

“Honorio Delgado - Hideyo Noguchi”

Serie: Monografías de Investigación N° 11. Lima, 2015

COMITÉ EDITORIAL

EDITOR EN JEFE

Walter Humberto Castillo Martell

EDITOR ASOCIADO

Javier E. Saavedra Castillo

SECRETARIA DE EDICIÓN

Flor Alburquerque Jaramillo

SECRETARIO DE REDACCIÓN

Santiago Stucchi Portocarrero

MIEMBROS

Manuel Arellano Kanashiro

Vilma Chuchón Calle

Yuri Cutipé Cárdenas

Santos González Farfán

María Mendoza Vilca

Rolando Pomalima Rodríguez

Yolanda Robles Arana

J. César Sotillo Zevallos

Emir Valencia Romero



COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL

Delicia Ferrando

Pablo Macera

Agustín Montoya

María Antonieta Silva

Moisés Lemlij

Wilfredo Mormontoy

COMITÉ ASESOR INTERNACIONAL

Renato Alarcón (Minnesota, EE.UU.)

Juan E. Mezzich (Nueva York, EE.UU.)

Germán Berrios (Cambridge, Inglaterra)

Juan C. Negrete (Montreal, Canadá)

Eugene B. Brody (Maryland, EE.UU.)

Pierre Pichot (París, Francia)

Raquel Cohen (Miami, EE.UU.)

Moisés Gaviria (Chicago, EE.UU.)

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

PERCY LUIS MINAYA LEÓN
Viceministro de Salud Pública

PEDRO FIDEL GRILLO ROJAS
Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

AUTORIDADES DEL INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

ROBERTO ANTONIO ESPINOZA ATARAMA
Jefe Institucional

PEDRO ARNALDO MASCARO SÁNCHEZ
Jefe Adjunto

DIRECTORIO DEL INSM

WALTER HUMBERTO CASTILLO MARTELL
Director General del INSM

HORACIO VARGAS MURGA
Sub-Director General del INSM

MIGUEL ÁNGEL SALAS VINCES
Director Ejecutivo de Administración del INSM

JULIO FRANCISCO RÍOS PEÑA
Director Ejecutivo de la Oficina de
Planeamiento Estratégico del INSM

JAVIER E. SAAVEDRA CASTILLO
Director Ejecutivo de la Oficina de Apoyo a la
Investigación y Docencia Especializada

MARIA MENDOZA VILCA
Directora de la Oficina de Epidemiología

Tuvieron participación en la elaboración de este informe: Javier E. Saavedra, Yolanda Robles, Santiago Stucchi, Vilma Paz, Ybeth Luna, Víctor Cruz.

Se agradece la colaboración mecanográfica de Milagros Ramírez, Shella Pérez, Flor Ortiz, Liliana La Rosa y Guillermo Gonzales.

INVESTIGADORES DEL ESTUDIO RELACIONADOS CON EL PRESENTE INFORME

AUTOR PRINCIPAL

Javier E. Saavedra Castillo

COAUTORES

Yolanda Robles Arana

Santiago Stucchi Portocarrero

Vilma Paz Schaeffer

Ybeth Luna Solis

Víctor Cruz Campos

EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA ENCUESTA

CONSULTOR DEL ESTUDIO - DISEÑO DE LA MUESTRA

Alberto Padilla Trejo

CONSULTOR DE PROCESOS INFORMÁTICOS - CONTROL DE CALIDAD

Otto Arieta Ríos

INGRESO DE DATOS

Milagros Ramírez Figueroa

Jessica Pozo Lévano

Flor Ortiz Sánchez

Shella Pérez Dávila

Liliana La Rosa Rosado

Guillermo Gonzales Lozano

Marco Martínez Huamán

JEFE DE OPERACIÓN DE CAMPO

Herón Salazar Olivares

COORDINADOR DE CAMPO

Diana Noemí Pérez Hilario

Maricela Mayo Carrera

SUPERVISORES DE CAMPO

Edgar Saúl Gómez Ordóñez

Fernando Pool Vergel Porras

Janet Karin Borja Quispe

Heidy Salvatierra Tupiño

Liz Valentín Robles

Claudia Campos Hernani

Mónica Vera Vela

Nancy López Huamán

ENCUESTADORES

Janet Lovatón Laime

Wilson Solano Zulueta

Judith Loayza Cárdenas

Elizabeth Hurtado Contreras

Deyvi Baca Romero

Sandra Gallegos Riveros

Cintia Carbajal Mucching

Karina Yraula Cruces

Grecia Valdiviezo Pérez

Adelina Lozano Chávez

Carol Cruz Valerio

Marco Bustamante Omala

Karin Cárdenas Ñahuis

Elizabeth Pillaca Lapa

María Santana Montañez

Kira Serguienko De Arca

Floriza Sandoval Ccance

Albizabeth López Pariona

Ana Miranda Hernández

Johanna Caro Córdova

Miriam Baldeón Laureano

Lita Ramírez Ancco

Emma Santillana Castillo

Nohely Armas Tacuri

Yovana Chancasanan Gaspar

Chriss García Atuncar

Alicia Gómez Marín

Ana Ríos Carranza

Ana Chávez Ormeño

Elizabeth Márquez Jara

Carolina López Buiza

Amparo Pérez Santiago

Martin Ballona López

PRESENTACIÓN

Desde el año 2002 el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado - Hideyo Noguchi” inició una serie de investigaciones epidemiológicas basadas en encuestas de hogares, con el objetivo de realizar el diagnóstico de la salud mental en todo el país habiéndose cubierto la mayor parte del territorio nacional tanto en sus distintas zonas geográficas como en el área urbana y rural. Esta experiencia ha develado la importancia de la investigación a través de estudios en población para establecer el diagnóstico directo de las necesidades que tiene el país en esta área de la salud. Sin embargo, su importancia estriba no sólo reconocer la magnitud de los principales trastornos mentales, sino también en conocer aspectos relacionados al bienestar de las personas como su calidad de vida, su satisfacción con la vida, su autoestima o su resiliencia. De esta manera se ha identificado como los principales problemas de salud mental en el país la depresión, el alcoholismo y la violencia doméstica, y se ha podido precisar las regiones con el mayor número de problemas. Sin embargo, durante los últimos años se han producido cambios sustanciales en la estructura socioeconómica de nuestro país y por ende cambios potenciales en su salud mental. Por tal motivo en el 2012, con la intención de evaluar las tendencias de los distintos indicadores de la salud mental después de 10 años, se realizó la replicación del Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Lima Metropolitana y Callao recabándose información de 5340 hogares, entrevistándose a 1490 adolescentes, 4190 mujeres unidas, 4445 adultos y 1 482 adultos mayores. Esta investigación reveló los problemas actuales con respecto a la salud mental de la capital del país. Sin embargo, Lima es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica y alberga cerca de los 10 millones de habitantes, una tercera parte de la población del país y por distintos motivos los diferentes distritos de la ciudad, han demostrado diferentes niveles de desarrollo socioeconómico y distintos problemas de salud. Por este motivo este estudio ha planteado un análisis poblacional por sectores, lo cual facilitaría las decisiones en torno a las estrategias, temáticas, asignación de recursos y necesidades de atención.

Siguiendo las divisiones tradicionales de las direcciones de salud se ha dividido a la población en cinco áreas: Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Callao, de tal manera que los decisores puedan tener un alcance de la realidad jurisdiccional de la salud mental en la gran ciudad.

Además, la presente publicación se enmarca en el compromiso asumido por la Institución a través del “Acuerdo de Cooperación entre las Instituciones de Servicios de Salud de la DISA V Lima Ciudad para el Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental” firmado con las distintas autoridades de establecimientos del sector, y tiene como objetivo brindar información específica sectorizada de los principales indicadores de salud mental de Lima Metropolitana y Callao. Para ello se ha dividido en análisis comparativo en 5 sectores o áreas poblacionales de Lima. Asimismo, resulta importante, en el marco del Aseguramiento Universal promovido por el Sector, contar con información que ayude a precisar las necesidades de recursos y la asignación financiera necesaria para lograr estos objetivos.

Esperamos que este nuevo aporte al conocimiento de los problemas de salud mental en el país contribuya eventualmente a la mejoría de la calidad de vida de la población nacional y de la ciudad de Lima Metropolitana y Callao.

Dr. Walter Humberto Castillo Martell

Director General del Instituto Nacional de Salud Mental

“Honorio Delgado-Hideyo Noguchi”



AGRADECIMIENTOS

Durante los últimos diez años el Instituto Nacional de Salud Mental ha desarrollado estudios epidemiológicos en diversas regiones del país. Esta experiencia ha servido para comprender la importancia de la participación de cada una de las unidades orgánicas de la Institución y del trabajo en equipo para lograr los objetivos institucionales. En la medida que vamos transfiriendo la información y que ésta se convierte en instrumento de sensibilización y de intervenciones potenciales en bien de la comunidad, vamos completando el mapa de la salud mental del país. Esta tarea ha podido ser lograda gracias a la colaboración cálida y tesonera de los profesionales de las diversas disciplinas, de los digitadores, programadores, del equipo de operación en campo (jefe de operación de campo, encuestadores, coordinadores y supervisores) y en especial, de las personas entrevistadas que accedieron a compartir sus experiencias en bien de la comunidad.

Agradecemos también a los miembros del Comité Ejecutivo de Investigación y de las áreas especializadas, por su dedicación en planificar y sobre todo estimular la formulación de protocolos de investigación, que nos han permitido conocer la realidad de la salud mental en nuestro país.

Nuestra gratitud, por el apoyo logístico y técnico, al equipo administrativo institucional conformado por: Lupo Nilo Vargas G., Juan Vera M., Roberto García G., Mabel Pisco E., Adler Aguilar Y., Julio Ríos P., Enrique Ticona H., Kelly Méndez Polo y el personal de comunicaciones. Asimismo, al equipo de operación de campo: coordinadores, supervisores, encuestadores y al personal de digitación y programación, por su dedicación a un trabajo que sólo con tesón y calidez pudo culminarse.

Debemos gratitud por las largas horas dedicadas, comprometiendo incluso sus momentos familiares, al personal de secretaría conformado por Olga Rivas y Gloria Dávila; igualmente a Milagros Ramírez, Jessica Pozo, Flor Ortiz, Shella Pérez, Liliana La Rosa, Marco Martínez y Guillermo Gonzales por su valiosa participación en la digitación cuidadosa y la transcripción de la información para la elaboración del presente informe.

Deseamos hacer extensivo nuestro reconocimiento, por sus observaciones y críticas, a los colegas de la Institución, a los que trabajan desde fuera de ella y a nuestros asesores externos porque nos han permitido mejorar la calidad de nuestro trabajo.

LOS AUTORES



ÍNDICE GENERAL

AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE SALUD	5
DIRECTORIO DEL INSM	5
INVESTIGADORES DEL ESTUDIO RELACIONADOS CON EL PRESENTE INFORME.....	7
EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA ENCUESTA.....	8
PRESENTACIÓN.....	9
AGRADECIMIENTOS.....	11
ÍNDICE GENERAL	13
LIMA METROPOLITANA.....	17
RESUMEN EJECUTIVO	19
INFORME GENERAL DEL ADULTO	27

I. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES 29

1. JUSTIFICACIÓN.....30

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA SALUD MENTAL.....31

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA SALUD MENTAL	31
2.2. LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD, DEPRESIVOS Y OTROS TRASTORNOS	33
2.3. ADICCIONES	34
2.4. INDICADORES SUICIDAS	34
2.5. CALIDAD DE VIDA Y SALUD MENTAL	35
2.6. TRASTORNOS MENTALES Y DISCAPACIDAD	35
2.7. ACCESO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL	36
2.8. POBREZA Y SALUD MENTAL	37
2.9. EVENTOS DE VIDA Y SALUD MENTAL	38
2.10. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SALUD MENTAL	38
2.11. DISCRIMINACIÓN Y SALUD MENTAL	39
2.12. ESTIGMA CONTRA LOS TRASTORNOS MENTALES	40
2.13. SALUD MENTAL POSITIVA	41
2.14. PROBLEMAS DEL SUEÑO.....	41
2.15. VIOLENCIA POLÍTICA.....	42

3. OBJETIVOS.....43

4. METODOLOGÍA.....44

4.1. TIPO DE DISEÑO Y DE ESTUDIO	44
4.2. DISEÑO MUESTRAL	44
4.2.1. POBLACIÓN ADULTA.....	44
4.2.2. NIVELES DE INFERENCIA	44
4.2.3. MARCO MUESTRAL Y UNIDADES DE MUESTREO	44
4.2.4. ESTRATIFICACIÓN Y DOMINIOS DE ESTUDIO	44
4.2.5. TIPO DE MUESTRA	45
4.2.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA.....	45
4.2.7. UNIDADES DE ANÁLISIS	46
4.2.8. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE ADULTOS	46
4.2.9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS ADULTOS QUE RESPONDIERON A LA ENCUESTA	47

5. DEFINICIÓN DE VARIABLES.....47

5.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS.....	47
5.2. ASPECTOS GENERALES DE SALUD MENTAL	48
5.3. TRASTORNOS CLÍNICOS (MENTALES).....	51
5.4. DISCAPACIDAD E INHABILIDAD.....	51

5.5. MÓDULO DE ACCESO A SERVICIOS.....	51
5.6. RELACIONES INTRAFAMILIARES.....	52
5.7. SÍNDROMES SOCIOCULTURALES Y SALUD MENTAL	52
5.8. OTRAS MANIFESTACIONES DEL FOLKLOR MÉDICO.....	53
6. INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE CONSTRUYÓ EL CUESTIONARIO	53
6.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA Y ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO SOBRE SALUD MENTAL	56
6.2. MÉTODO DE LA ENTREVISTA.....	58
6.3. PROCESOS DE VALIDACIÓN Y CALIDAD	58
6.4. OBTENCIÓN DE INDICADORES DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD A PARTIR DE LOS PROPIOS DATOS DE ESTUDIO	59
6.5. ENTRENAMIENTO EN EL USO DE INSTRUMENTOS	59
6.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS.....	59
7. PROCEDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DE CAMPO.....	60
8. RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DE CAMPO EN LA UNIDAD DE ANÁLISIS DEL ADULTO	61
9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	61
II. RESULTADOS GENERALES DEL ESTUDIO SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012	63
DATOS GENERALES DE LA MUESTRA	65
DATOS GENERALES DE LA MUESTRA	67
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS	69
EDAD	71
ESCOLARIDAD.....	72
ESTADO CIVIL	73
SITUACIÓN LABORAL.....	73
INGRESOS ECONÓMICOS.....	74
SALUD MENTAL DEL ADULTO.....	75
ASPECTOS GENERALES DE SALUD MENTAL	77
ENTORNO GENERAL	77
ESTRESORES PSICOSOCIALES	84
DISCRIMINACIÓN	89
ESTADOS ANÍMICOS PREVALENTES.....	97
ASPECTOS DE SALUD MENTAL POSITIVA.....	101
AUTOESTIMA	102
SATISFACCIÓN CON LA VIDA.....	103
AUTOEFICACIA	104
RESILIENCIA.....	105
SATISFACCIÓN PERSONAL	106
SATISFACCIÓN LABORAL.....	109
CALIDAD DE SUEÑO	111
CALIDAD DE VIDA.....	114
DISCAPACIDAD E INHABILIDAD	120
ASPECTOS PSICOPÁTICOS	123
INDICADORES SUICIDAS	124
TENDENCIA HACIA LA VIOLENCIA.....	130
FACTORES PROTECTORES.....	131
TRASTORNOS CLÍNICOS.....	135
USO DE SUSTANCIAS NOCIVAS	146

TRASTORNOS CLÍNICOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS	155
POBREZA Y SALUD MENTAL	156
TRASTORNOS MENTALES SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES.....	160
EFFECTOS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA	161
ESTILOS DE CRIANZA Y EVENTOS DE VIDA	164
ACCESO A SERVICIOS	171
SÍNDROMES SOCIOCULTURALES Y SALUD MENTAL	176
ESTIGMA HACIA LOS TRASTORNOS MENTALES	179

IV. HALLAZGOS GENERALES DEL ESTUDIO SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA	181

ADULTOS.....	183

ANEXO: ERRORES MUESTRALES Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN	187

BIBLIOGRAFIA	337



LIMA METROPOLITANA

Lima es la ciudad capital de la República del Perú. Se encuentra situada en la costa central del país, a orillas del océano Pacífico, conformando una extensa y populosa área urbana conocida como Lima Metropolitana, flanqueada por el desierto costero y extendida sobre los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. En el año 2012, Lima Metropolitana contaba con una población de cerca de 8,5 millones de habitantes, el 28% de la población peruana, cifras que la convierten en la ciudad más poblada del país.

El 18 de enero de 1535 se fundó Lima con el nombre de “Ciudad de los Reyes” en la región agrícola conocida por los indígenas como Lima, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más grande e importante ciudad de América del Sur durante el régimen español. Después de la Independencia pasó a ser la capital de la República.

En la actualidad se le considera como el centro político, cultural, financiero y comercial del país. A nivel internacional, la ciudad ocupa el quinto lugar dentro de las ciudades más pobladas de América Latina y el Caribe y es una de las treinta aglomeraciones urbanas más pobladas del mundo. Por su importancia geoestratégica, ha sido definida como una ciudad global de «clase beta».

Jurisdiccionalmente, la metrópoli se extiende mayormente dentro de la provincia de Lima y en una menor proporción, hacia el oeste, dentro de la provincia constitucional del Callao donde se encuentran el puerto marítimo y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ambas provincias cuentan con autonomía regional desde el año 2002.

El área de Lima Metropolitana se compone de cinco áreas poblacionales. Estas áreas poblacionales son las siguientes:

- Lima Centro, que comprende los distritos de: Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel y Surquillo.
- Lima Norte, que comprende los distritos de: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porras y Santa Rosa.
- Lima Este, que comprende los distritos de: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho (Chosica), San Juan de Lurigancho y Santa Anita.
- Lima Sur, que comprende los distritos de: Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María del Mar, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Villa el Salvador, y Villa María del Triunfo.
- El Callao, que comprende los distritos de: Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla.

La capital peruana es el principal centro industrial y financiero del país. Es uno de los centros financieros más importantes de Latinoamérica. Los principales rubros económicos son la industria manufacturera, el comercio, los servicios y el turismo. Lima es responsable de más de los dos tercios de la producción industrial del Perú y la mayoría de su sector terciario.

Como principal punto de entrada al país, Lima ha desarrollado una importante industria del turismo. Resaltan su centro histórico, sus zonas arqueológicas, su vida nocturna, los museos, las galerías de arte, las festividades y las tradiciones populares.

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es el principal terminal aéreo de la ciudad. Está ubicado en la provincia constitucional del Callao.

La arquitectura capitalina se caracteriza por poseer una mezcla de estilos como se refleja en las tendencias a lo largo de la historia de la ciudad. Ejemplos de la arquitectura colonial incluyen la Basílica y Convento de San Francisco, la Catedral de Lima y el Palacio de Torre Tagle.

La gastronomía limeña es producto de la fusión de la tradición culinaria del antiguo Perú con la cocina española fuertemente influenciada por la presencia morisca y con importantes aportes de las costumbres culinarias traídas por los esclavos de la costa atlántica del África Subsahariana. Posteriormente, recibió influencia de los chefs franceses que huyeron de la revolución en su país para radicarse, en buen número, en la capital del Virreinato del Perú.

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE SALUD MENTAL EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA

INFORME GENERAL DEL ADULTO

ANALES DE SALUD MENTAL. 2014; XXX NUM 1-2:S1-392

Javier E. Saavedra, Vilma Paz Schaeffer, Yolanda Robles Arana, Ybeth Luna Solís, Víctor Cruz Campos.

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN: Los estudios de carga global de enfermedad han demostrado que los trastornos mentales se encuentran entre los principales problemas de salud pública. Diversos esfuerzos viene realizando el Estado Peruano para mejorar el acceso y la atención de estos problemas a nivel nacional y en particular en Lima Metropolitana. De ahí la importancia de contar con información estadística y clínica que ayude a una mejor identificación de los problemas. La ciudad de Lima, con cerca de 10 millones de habitantes, ha crecido en forma importante de tal manera que un tercio de la población del país se encuentra concentrada en esta ciudad. A su vez por distintos motivos los diferentes distritos de la ciudad han demostrado diferentes niveles de desarrollo socioeconómico y distintos problemas de salud por lo que un análisis poblacional por sectores facilitaría las decisiones en torno a las estrategias, temáticas, asignación de recursos y necesidades de atención. En esta línea este estudio pretende evaluar la salud mental en la población adulta de Lima Metropolitana por áreas poblacionales. Se evaluó la prevalencia de los desórdenes mentales y del abuso de sustancias, el acceso a los servicios de salud mental y aspectos generales de salud mental como el grado de confianza en diversas autoridades, el grado de estrés generado por factores ambientales, la relación entre pobreza y salud mental, eventos de vida, estilos parentales de crianza, discriminación, los problemas de sueño, las tendencias psicopáticas y los indicadores suicidas. Además, se estudiaron aspectos de salud mental positiva como la autoestima, la resiliencia, la satisfacción con la vida, la autoeficacia, los sentimientos de protección percibidos por la población, el grado de satisfacción personal, soporte familiar y calidad de vida.

MÉTODOS: Se trata de un estudio epidemiológico en población, descriptivo, basado en encuesta cara a cara. La muestra fue seleccionada en forma probabilística en tres etapas. El estudio original incluyó cuatro unidades de análisis en cada vivienda: un adulto de 18 años o más, un adolescente entre 12 y 17 años de edad, un adulto mayor de 60 años de edad o más y una mujer unida en pareja (casada o conviviente) jefe de familia o unida al jefe de familia. La muestra final de la población adulta para este estudio estuvo constituida por 4,445 personas. Los instrumentos utilizados fueron: el Cuestionario de Salud Mental (modificado) elaborado originalmente en Colombia, la Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional basada en el ICD-10 Versión española (MINI CIE-10), el Índice de Calidad de Vida, algunas preguntas del EMBU (Propia memoria acerca de la crianza), el Cuestionario de Determinantes de Acceso a Servicios de Salud, la Escala de Autoestima de Rosenberg, la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener, la Escala de Autoeficacia de Schwarzer y Jerusalem, la Escala de Resiliencia de Block, y el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburg. La muestra se subdividió en cinco áreas poblacionales siguiendo las divisiones territoriales de las direcciones de salud de la ciudad de Lima: Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y El Callao. Lima Centro comprendió los distritos de Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel y Surquillo. Lima Norte comprendió los distritos de Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porras y Santa Rosa. Lima Este comprendió los distritos de Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho (Chosica), San Juan de Lurigancho y Santa Anita. A Lima Sur correspondieron los distritos de Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María del Mar, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Villa el Salvador, y Villa María del Triunfo. Finalmente El Callao comprendió al Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta y Ventanilla. Según estas áreas poblacionales se realizaron los análisis estadísticos que incluyeron comparaciones de frecuencias y medidas de tendencia central, análisis bivariados entre aspectos de

salud mental e indicadores sociodemográficos. Para evaluar la significancia de las variaciones entre las áreas poblacionales se utilizó la F corregida como una variante del estadístico de chi-cuadrado corregido de Rao-Scott de segundo orden. La significación se basó en la F corregida y sus grados de libertad. La información fue procesada con el SPSS Versión 20 para muestras complejas. La tasa de respuesta de las personas adultas fue de 88,5%.

RESULTADOS PRINCIPALES: En la ciudad de Lima, el área poblacional con menor pobreza, mayores ingresos y mayor nivel educativo correspondió a Lima Centro, no hubo diferencias significativas en la situación laboral. La prevalencia de vida en toda la población para cualquier trastorno mental (al menos un trastorno) clasificado en el ICD-10 fue de 26,1%, encontrándose entre 21,8% (Callao) y 27,6% (Lima Centro); la diferencia no fue estadísticamente significativa. En la prevalencia a doce meses se encontró una tendencia significativa a una mayor prevalencia de trastornos mentales en Lima Este con 14,4% versus 8,6% en el Callao ($p=0,058$), siendo el promedio de 11,8%. La prevalencia puntual de cualquier trastorno psiquiátrico fue significativamente menor en el Callao con 4,1% y mayor en Lima Este con 10,0% ($p=0,017$). Por problemas específicos, se mantienen diferencias estadísticamente significativas para los trastornos de ansiedad pero no para trastornos depresivos ni los problemas relacionados al abuso o dependencia al alcohol. Los trastornos mentales de mayor prevalencia de vida fueron el episodio depresivo, hallado entre 14,0% (Lima Norte) y 20,5% (Lima Centro) ($p=0,015$), los problemas relacionados con el uso de alcohol estuvieron entre 6,0% (Lima Centro) y 10,0% (Lima Este) ($p=0,038$) y el desorden de estrés postraumático ubicado entre 4,5% (Lima Sur) y 5,8% (Lima Centro) ($p=0,885$). La prevalencia anual de los distintos trastornos mentales muestra diferencias estadísticamente significativas para el episodio depresivo leve con una proporción mayor para Lima Este (2,2%) y una menor en Lima Norte (0,3%). Una tendencia significativa se observó en la prevalencia anual del consumo perjudicial o dependencia de alcohol con 4,0% para Lima Este versus 1,6% para Lima Centro ($p=0,054$), y fobia social con 1,7% Lima Este versus 0,3% para el Callao ($p=0,09$). Sin embargo, se encontraron diferencias significativas para la prevalencia anual de dependencia de alcohol, siendo más alta para Lima Este con el 1,8% y menor para Lima Norte con el 0,1%. Respecto a otros problemas de salud mental, la prevalencia de vida de pensamiento suicida ha sido significativamente más elevada en Lima Este con 11,1% y menor en Lima Centro con 5,7%; sin embargo, no se hallaron diferencias significativas entre las áreas poblacionales de Lima en relación a las prevalencias anuales de pensamiento o intento suicidas. En cuanto a la relación entre pobreza y salud mental, se encontró que la prevalencia de depresión (anual, a seis meses y actual) varía significativamente de acuerdo a los niveles de pobreza en todas las áreas poblacionales excepto para Lima Centro. En general, el 31% de las personas adultas que habían percibido algún problema de salud mental en el último año en Lima, habían recibido atención en algún establecimiento de salud, existiendo diferencias estadísticamente significativas entre las distintas áreas poblacionales. El acceso fue mayor en Lima Centro (51,8%) y menor en Lima Este (23,4%).

La prevalencia de vida del uso de sustancias ilegales fue 7,1% para toda la población, desde 5,7% en Lima Norte hasta 9,2% en Lima Sur, no alcanzando diferencias estadísticamente significativas. La marihuana fue la sustancia ilegal más frecuentemente consumida alguna vez alcanzando el 5,7% de la población adulta, desde 4,7% en Lima Norte hasta 6,9% en Lima Sur. La prevalencia anual de consumo de alcohol fue estadísticamente más elevada en Lima Sur con el 76,5% y menor en Lima Centro con el 67,0% ($p=0,012$). La prevalencia anual de consumo de tabaco, marihuana y cocaína no fue estadísticamente diferente entre las áreas poblacionales con un promedio de 19,9%, 0,9% y 0,3% respectivamente. Diferencias estadísticamente significativas se encontraron para la prevalencia del consumo anual de hoja de coca, siendo mayor para Lima Este (1,9%) y menor para Lima Centro (0,3%). Respecto a la violencia terrorista, mientras que una mayor proporción de personas fue víctima de algún atentado terrorista en Lima Centro (3,1%) en comparación con el Callao y Lima Norte (0,9%) ($p=0,004$); en Lima Sur, una mayor proporción de personas perdió algún familiar, ya sea por desaparición o fallecimiento, o tuvo que cambiar de residencia (9,7% y 4,5% respectivamente) en comparación con Lima Centro (4,2% y 1,0% respectivamente) ($p=0,038$ y $p=0,002$ respectivamente). En los adultos que habían sufrido la muerte o desaparición de algún miembro de su familia durante la época del terrorismo, las prevalencias de trastornos de ansiedad fueron significativamente mayores que los que no habían sufrido estas pérdidas. Respecto a los estilos de crianza, se encontraron diferencias significativas entre las áreas poblacionales con una mayor frecuencia de estilos de crianza negativos y eventos de vida negativos en Lima Este y Lima Sur. En todas las áreas poblacionales la presencia de estilos de crianza o eventos de vida negativos se asoció con la presencia de trastornos mentales. Se hallaron diferencias

significativas entre las áreas poblacionales en torno a la percepción de los principales problemas del país, mientras que en Lima Centro el principal problema percibido fue la corrupción, en Lima Norte y Lima Sur fue la pobreza, y en Lima Este y el Callao fue la delincuencia. La delincuencia fue percibida como el principal problema del país por aproximadamente la quinta parte de la población. Mientras tanto, el área poblacional como mayor desconfianza en las autoridades policiales fue Lima Este, y el área con la mayor desconfianza en líderes de la comunidad o alcalde, jueces y serenos correspondió a Lima Norte. Respecto a la prevalencia de vida de conductas violentas, la prevalencia más elevada estuvo en el Callao con 28,6% de la población y la más baja en Lima Centro con 18,8% ($p=0,023$). Los estresores ambientales (como ruido, falta de ventilación, malos olores, polvo o basura) se encontraron significativamente más elevados en Lima Sur.

Respecto a salud mental positiva, el 76,9% de la población adulta de Lima estaba satisfecho con su vida; en este sentido Lima Este mostró menos satisfacción con la vida en comparación con Lima Centro. Respecto a la percepción de felicidad, no se encontraron diferencias significativas entre las diferentes áreas poblacionales de Lima. En cuanto a satisfacción personal con el aspecto físico, la inteligencia, la condición socioeconómica, el nivel educativo y las relaciones sociales, Lima Centro mostró los indicadores más favorables, mientras que Lima Norte y Lima Este presentaron los indicadores más bajos. Coincidentemente en relación con la percepción de calidad de vida, las áreas con menor puntaje correspondieron a Lima Este y Lima Sur.

CONCLUSIONES: Nuestros hallazgos resaltan la importancia de los problemas de salud mental en la salud pública, especialmente por la alta prevalencia de depresión en adultos y los problemas relacionados al uso de alcohol. Sin embargo, existen otros aspectos a considerar en las políticas vinculadas a la salud mental como son los estilos de crianza, el impacto de la violencia política, la confianza en las autoridades, la conducta violenta y tópicos relacionados a la salud mental positiva cuya diferenciación entre los segmentos de la población de Lima ayudará a focalizar mejor la ayuda. En general encontramos mayores problemas de salud mental en el área poblacional de Lima Este, lo que se evidencia tanto por aspectos de salud mental negativa como positiva y por un menor acceso a la atención por problemas de salud mental, lo que debiera considerarse al orientar los recursos destinados a este sector.

PALABRAS CLAVES: Trastornos mentales, salud mental, depresión, uso perjudicial /dependencia de alcohol, salud positiva, satisfacción con la vida, Pobreza.



EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF MENTAL HEALTH IN AREAS POPULATION OF LIMA

ADULT GENERAL REPORT

ANALES DE SALUD MENTAL. 2014; XXX NUM 1-2:S1-392

Javier E. Saavedra, Vilma Paz Schaeffer, Yolanda Robles Arana, Ybeth Luna Solís, Víctor Cruz Campos.

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN: Studies on global burden of disease have shown that mental disorders are among the most important public health problems. The Peruvian Government has been conducted several efforts to improve access and care of these problems at the national level, in particular in metropolitan area of Lima. Hence the importance of clinical and statistical information that will help to better identified these problems. The city of Lima, with nearly 10 million inhabitants, has grown significantly in such a way that one-third of the country's population is concentrated in this city. At the same time for several reasons the districts of the city have shown different levels of socio-economic development and diverse health problems for which a population analysis by sectors would facilitate decisions around strategies, topics, the allocation of resources and care needs. In this line, this study is aimed to evaluate mental health in the adult population of Metropolitan Lima by population segments. The study will report on the prevalence of mental disorders and substance abuse, access to mental health services and general aspects of mental health such as the extent of trust in authorities, the amount of stress generated by environmental factors, the relationship between mental health and poverty, life events, and parental rearing styles. Other mental health topics were included such as discrimination, sleep problems, psychotic symptoms and suicide indicators, positive mental health issues like self-esteem, resilience, satisfaction with life, self-efficacy and perceived by the public feelings of protection, the degree of work satisfaction, family support and quality of life.

METHODS: This is an epidemiological study population, descriptive survey based on face to face. The original study consisted of a probabilistic sample selected in three stages with four analysis units in each household: an adult of 18 years or older, an adolescent between 12 and 17 years of age, one adult over 60 years of age or older, a united woman (married or cohabiting) household head or attached to the householder. The final sample of the adult population used for this study consisted of 4,445 people. The instruments used were: a modified Mental Health Questionnaire originally developed in Colombia, the MINI International Neuropsychiatric Interview Spanish ICD-10 Version, the Quality of Life Index, some questions of the EMBU (own memory about parenting), a questionnaire for the assessment of the determinants of access to health services, the Rosenberg Self-Esteem Scale, Life Satisfaction Scale of Diener, Schwarzer and Jerusalem Self-Efficacy Scale, the Ego-resilience scale of Block, and the Pittsburgh Sleep Quality Index. The sample was divided into five population areas, following the territorial divisions of the health directorates of the city of Lima: Central Lima, Northern Lima, Eastern Lima, Southern Lima and Callao. Central Lima comprised the districts of Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel and Surquillo. Northern Lima comprised the districts of Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porras and Santa Rosa. Eastern Lima corresponded to the districts of Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho (Chosica), San Juan de Lurigancho and Santa Anita. Southern Lima comprised the districts of Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, Santa María del Mar, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Villa el Salvador and Villa María del Triunfo. Finally, El Callao comprised the districts of Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta and Ventanilla. According to these population areas statistical analyses were conducted involving comparisons of frequencies and measures of central tendency, bivariate analysis between aspects of mental health and socio-demographic indicators. To evaluate the significance of variations between population areas, the corrected F was used as a variant of the Rao-Scott second-order corrected Chi-square statistic. The

significance was based on the corrected F and its degrees of freedom. The information was processed with SPSS Version 20 for complex samples. The response rate of adults was 88,5%.

MAIN RESULTS: In the city of Lima, the population area with less poverty, higher income and higher education corresponded to Central Lima; there was no significant difference in the employment status between areas. The life prevalence of any ICD-10 mental disorder in the city of Lima was 26,1%, ranging from 21,8% (Callao) to 27,6% (Central Lima) not reaching statistical significance. A significant trend to a higher twelve-month prevalence of mental disorders was found in Eastern Lima (14,4%) versus Callao (8,6%) ($p=0,058$), with an average of 11,8% for the whole sample. The point prevalence of any psychiatric disorder was significantly lower in El Callao (4,1%) and highest in Eastern Lima (10,0%) ($p=0,017$). For specific problems, significant differences remain for anxiety disorders but not for depressive disorders or problems related to alcohol dependence or abuse. Most frequent mental disorders were depressive episode with a life time prevalence between 14,0% (Northern Lima) and 20,5% (Central Lima) ($p=0,015$), problems related to alcohol use between 6,0% (Central Lima) and 10,0% (Eastern Lima) ($p=0,038$) and post-traumatic stress disorder between 4,5% (Southern Lima) and 5,8% (Central Lima) ($p=0,885$). Twelve-month prevalence of mental disorders shows statistically significant differences between population segments for mild depressive episode ranging from 2,2% in Eastern Lima to 0,3% in Northern Lima ($p=0,00012$). A significant trend for a difference between populations segments was also observed for the annual prevalence of alcohol use disorders (4,0% in Eastern Lima versus 1,6% in Central Lima) ($p=0,054$), and social phobia (1,7% in Eastern Lima versus 0,3% in El Callao) ($p=0,09$). However, significant differences were found for the annual prevalence of alcohol dependence, being highest for Eastern Lima with 1,8% and lowest for Northern Lima with 0,1%. In other mental health problems, the life prevalence of suicidal thinking was significantly higher in Eastern Lima with 11,1% and lowest in Central Lima with 5,7%; however, there were no significant differences between the population segments in regard to the annual prevalence of suicidal thoughts or suicide attempts. About the relationship between poverty and mental health, it was found that the prevalence of depression (annual, six month and current) varies significantly according to the levels of poverty in all population areas except for Central Lima. In general, 31% of adults who perceived any mental health problems in the last year in Lima had received clinical care in any health facility, with a statistically significant difference between population segments. Access was higher in Central Lima (51,8%) and lower in Eastern Lima (23,4%).

The lifetime prevalence of use of illegal substances was 7,1% for the entire population, from 5,7% in Northern Lima to 9,2% in Southern Lima, without statistically significant differences. In this regard marijuana lifetime use was found in 5,7% of the adult population, between 4,7% in Northern Lima to 6,9% in Southern Lima. The annual prevalence of alcohol consumption was significantly highest in Southern Lima with 76,5% and lowest in Central Lima with 67,0% ($p=0,012$). The annual prevalence of tobacco, marijuana and cocaine use did not show statistically significant differences among the population segments with an average of 19,9%, 0,9% and 0,3% respectively. Statistically significant differences were found in the prevalence of annual consumption of coca leaf, the highest was in Eastern Lima (1,9%) and lowest in Central Lima (0,3%). Regarding to terrorist violence while a higher proportion of people were victims of any terrorist attack in Central Lima (3,1%) in contrast to El Callao and Northern Lima (0,9%) ($p=0,004$), a higher proportion of people lost a family member either by death or disappearance or had to relocate in Southern Lima (9,7% and 4,5% respectively) compared with Central Lima (4,2% and 1,0%, respectively) ($p=0,038$ and $p=0,002$ respectively). In adults who had suffered the death or disappearance of some member of his family during the time of terrorism, the prevalence of anxiety disorders were significantly higher than in adults who had not suffered these losses. Regarding to parenting rearing style, there were significant differences between population segments with higher frequencies of negative parenting styles and life events in Eastern Lima and Southern Lima. In all population segments the presence of negative parenting styles or negative life events was associated with the presence of mental disorders. There were significant differences between the population segments around the perception of the country's main problems; in Central Lima the main perceived problem was corruption, in Northern Lima and Southern Lima was poverty, and in Eastern Lima and El Callao was crime. In general, crime was perceived as the main problem of the country by approximately one fifth of Lima's population. Meanwhile the population segment with

a greater distrust in police authorities was in Eastern Lima, while a greater mistrust in community leaders, judges and watchmen corresponded to Northern Lima. Regarding to the lifetime prevalence of violent behavior, the highest prevalence was found in Callao with 28,6% of the population and the lowest in Central Lima with 18,8% ($p=0,023$). Environmental stressors (such as noise, lack of ventilation, odors, dust or garbage) were significantly higher in Southern Lima.

In regard to positive mental health, 76,9% of the adult population of Lima was satisfied with his life; in this sense Eastern Lima show less satisfaction with life in comparison to Central Lima. Regarding to the perception of happiness, no significant differences were found between the different population segments of Lima. In terms of personal satisfaction with appearance, intelligence, socio-economic status, educational attainment and social relationships, Lima Central showed the most favorable indicators, while Northern Lima and Eastern Lima presented the worst indicators. In relation to the perception of quality of life the population segments with lower scores corresponded to Eastern Lima and Southern Lima.

CONCLUSIONS: Our findings highlight the importance of mental health problems for public health, especially owing to the high prevalence of depression and alcohol use problems in adults. However, there are other aspects to be considered in relation to mental health policies such as parental rearing styles, the impact of the political violence on mental health, the confidence in the authorities, violent behaviors and topics related to mental health positive whose differentiation between population segments could help to better focus the aid. In general this study has found that the segment population of Eastern Lima showed the worsts mental health indicators, which is evidenced both in negative mental health and in positive aspects, including less access to care for mental health problems. All of which should be considered when targeting the resources allocated to this sector.

KEY WORDS: Mental disorders, mental health, depression, alcohol harmful use/dependence, positive health, satisfaction with life, poverty.

**ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE SALUD MENTAL SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
METROPOLITANA 2012**

INFORME GENERAL DEL ADULTO



I. INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS GENERALES

Los problemas de salud mental son reconocidos como un componente importante de la salud pública del mundo, debido a su alta prevalencia y el importante impacto en el funcionamiento de la persona, en aspectos socioeconómicos, especialmente laborales¹, su integración social e independencia e inclusive en sus logros educacionales². Estos problemas son importantes, también, por estar vinculados a bienestar, calidad de vida, libertad de expresión y en particular a los derechos humanos. Cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo³, y en el año entre 10 y 20 millones intentan hacerlo, y a nivel mundial habría 70 millones de personas dependientes del alcohol⁴. En el Perú, una de tres personas ha padecido algún trastorno mental alguna vez en su vida y una de cada 5 personas los padecería en el último año⁵. En estudios recientes realizados en la ciudad de Lima reportan que cerca de una de cada 8 personas, ha tenido algún trastorno mental en el último año y que cada 22 minutos una persona adulta estaría intentando suicidarse⁶. La carga de morbilidad de estos trastornos ha sido pronosticada aún mayor para los países en desarrollo en los que la depresión mayor sería la primera causa de incapacidad en el año 2020^{7,8}. Hay evidencia de que la carga asociada a desórdenes psiquiátricos como la depresión y los trastornos de ansiedad es similar en todas las culturas⁹ y en el Perú los estudios de carga de morbilidad realizados por el MINSA han demostrado que la depresión y el alcoholismo constituyen los principales problemas de carga, inclusive entre otras patologías físicas¹⁰.

Asimismo, existe una perspectiva emergente en salud pública que concibe la atención orientada no sólo hacia la enfermedad, como los trastornos mentales, sino también hacia aspectos de salud positiva, que se acercan más a la experiencia del bienestar y calidad de vida de las personas y que tendría para la salud mental una importancia especial por sus connotaciones preventivo-promocionales y para el desarrollo de esquemas más integrales en la aproximación a la salud¹¹.

Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen estos problemas, la brecha de atención sigue siendo muy alta. En Latinoamérica se ha estimado que la brecha terapéutica de estos trastornos es muy amplia e iría desde 32,2% para las psicosis hasta 78,1% para el abuso o dependencia del alcohol¹². En el Perú, según los estudios epidemiológicos realizados en el Instituto Nacional de Salud Mental en las distintas regiones (INSM), las brechas de atención son importantes, especialmente al interior del país^{13,14}. El estudio epidemiológico de salud mental realizado en la ciudad de Lima reportó, que menos de un tercio de las personas que han percibido problemas de salud mental en el último año han recibido atención⁶, y de aquellos con trastornos mentales diagnosticables sólo el 16,9% recibió atención médica. En función a ello, la OMS ha emitido una serie de recomendaciones destinada a reducirla¹⁵, y en esta línea se requiere de toda la información disponible para lograr una mayor efectividad al momento de plantear las intervenciones.

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado- Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”) ha desarrollado desde el año 2002 hasta el 2013 una serie de estudios epidemiológicos de salud mental en la población urbana peruana con encuestas en las ciudades de Lima Metropolitana, Tumbes, Piura, Cajamarca, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Ica, Ayacucho, Arequipa, Bagua, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado, Puno, Tacna, Huancavelica, Huancayo, Cusco, Apurímac, Cerro de Pasco y Huánuco. Entre el año 2007 y el año 2009 el INSM “HD-HN” realizó estudios de salud mental a nivel poblacional en el área rural (Lima, sierra y selva), hecho sin precedentes en la historia de la psiquiatría peruana. Los resultados encontrados han revelado una serie de características y diferencias en la salud mental, sobre las cuales no existían referentes estadísticos. Mediante el diagnóstico de las condiciones de salud mental, el Estado estará en mejor posición de emprender intervenciones focalizadas y más adecuadas y proporcionales a dichas necesidades. Como se mencionó, los reportes internacionales y estudios realizados por el INSM “HD-HN” han puesto en evidencia que los sistemas de salud mental proveen atención sólo a una pequeña proporción de todos aquellos que lo necesitan tanto adultos, como niños y adolescentes¹⁶. Asimismo, estos estudios han resaltado que los recursos para la salud mental son escasos y están distribuidos en forma inequitativa e ineficiente. En el año 2012, después de una década en que se realizara el primer estudio epidemiológico en la ciudad de Lima y Callao, se realizó una replicación de esta encuesta dirigida a estimar las tendencias vinculadas a la salud mental en Lima Metropolitana y Callao. La necesidad de realizar replicaciones se sustentan en los cambios que ocurren en el tiempo como la aplicación de nuevas políticas relacionadas a la salud mental,

avances en la psicofarmacología y cambios importantes a nivel socioeconómico, avances en los medios de comunicación social¹⁷, los cuales no necesariamente garantizan una mejor salud mental¹⁸. Esta investigación develó importante información sobre el estado de la salud mental en la ciudad de Lima, sin embargo también se hizo evidente que por crecimiento poblacional y la diversidad socioeconómica al interior de la propia capital, la distribución de los problemas de salud mental son homogéneos por lo que era necesario un estudio a mayor profundidad para evaluar este aspecto⁶.

Por tal motivo el presente estudio se ha dirigido a profundizar el estudio de la situación de la salud mental de Lima Metropolitana a través del análisis por áreas poblacionales de Lima Metropolitana. La población del país, supera los 30 millones de habitantes correspondiendo el 31,5% a Lima Metropolitana¹⁹. Los diferentes distritos de la ciudad han demostrado diferentes niveles de desarrollo socioeconómico y distintos problemas de salud por lo que un análisis poblacional por sectores facilitaría las decisiones en torno a las estrategias, temáticas, asignación de recursos y necesidades de atención. Se reporta sobre los principales aspectos de la salud mental, como son los trastornos psiquiátricos más prevalentes, la violencia familiar y su vinculación con la salud mental, la salud mental del adulto mayor, así como problemas del adolescente y del adulto. Se incluyen aspectos vinculados a la salud mental positiva y negativa, como calidad de vida, autoestima, la autoeficacia, la resiliencia y la satisfacción con la vida, funcionamiento y discapacidad, eventos de vida y su relación con los problemas psiquiátricos, aspectos económicos, acceso a servicios, salud mental en general, discriminación, desarrollo humano, síndromes culturales y sueño.

1. JUSTIFICACIÓN

A partir del Estudio de Salud Mental en Lima Metropolitana de Lima y Callao, resulta importante evaluar la salud mental por segmentos o áreas poblacionales de la ciudad en el marco de las importantes diferencias psicosociales que existen entre los distintos distritos de la capital. No ha existido anteriormente información estadística en este sentido. Este enfoque permitirá, por un lado, actualizar el mapa de la salud mental en Lima Metropolitana en sus matices socioculturales y por otro lado, efectuar contrastes de resultados con la situación de las ciudades ya estudiadas. Asimismo, el INSM ha asumido un papel protagónico en promover una mejor provisión de servicios de salud mental tanto en algunas regiones del país a través del Proyecto Apurímac así como en Lima Metropolitana a través del "Acuerdo de Cooperación entre las Instituciones de Servicios de Salud de la DISA V Lima Ciudad para el Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental" firmada con las distintas autoridades de establecimientos del sector. Por lo tanto la presente publicación tiene como objetivo brindar información específica sectorizada de los principales indicadores de salud mental de Lima Metropolitana y Callao. De esta manera se pretende ofrecer información para una mejor toma de decisiones y asignación de recursos.

La importancia del presente estudio se basa en 1º propiciar la investigación sistemática en salud mental, estimando las tendencias relacionadas a la salud mental en el país; 2º propiciar líneas de desarrollo en las políticas intersectoriales vinculadas a la salud mental en la ciudad de Lima; 3º promover la generación de políticas que incluyan variables vinculadas a la salud mental que influyen en la pobreza; 4º fomentar la organización de acciones preventivas focalizándolas en grupos con riesgo a problemas y áreas específicos; 5º permitir el acceso de una mayor cantidad de personas a estos servicios, en especial de grupos vulnerables; 6º permitir una mejor evaluación de las necesidades futuras de la salud mental; y 7º, crear antecedentes en la región, en el país y en Latinoamérica.

Entre las preguntas que respondería el estudio se encuentran: ¿Cuál es la magnitud y los principales problemas de salud mental general en la población de Lima Metropolitana y Callao según áreas poblacionales?; ¿Cuál es la prevalencia y cuáles son los factores de riesgo y de protección de la conducta adictiva en estas zonas?; ¿Cuál es la magnitud de los indicadores suicidas en la población de Lima Metropolitana y Callao según áreas poblacionales?; ¿Cuál es la prevalencia de los principales trastornos psiquiátricos según áreas poblacionales?; ¿Cuál es la proporción exacta de personas que no logra ningún tipo de atención para sus problemas de salud mental en estas zonas?; ¿Qué factores de inequidad (nivel socioeconómico, género, nivel educativo), se relacionan con estos problemas?; ¿Cuál es la magnitud

de los problemas de salud mental en la población pobre, en comparación con la población no pobre de Lima Metropolitana y Callao según áreas poblacionales?; ¿Cuál es el nivel de discriminación percibida por estas poblaciones?; ¿Cuáles son las características de los síndromes culturales y cuál es su relación con los síndromes clínicos psiquiátricos?; ¿Qué relación tienen los eventos de vida adversos con el desarrollo de desórdenes mentales?

Desde el punto de vista de la gerencia social, los resultados del estudio se convertirían en: 1º instrumentos importantes para el desarrollo de proyectos de comunicación social; 2º punto de partida para la formulación de proyectos en una amplia gama de problemas de salud mental; 3º base para el estudio y desarrollo de infraestructura de servicios con enfoque social en el área; y 4º información para focalizar los recursos del Estado en áreas o aspectos sensibles.

En este sentido, el INSM “HD-HN” brinda información para que los programas de salud mental a nivel nacional puedan basar sus intervenciones en un diagnóstico previo. Los niveles de intervención en atención primaria de la salud requieren los índices de salud mental positiva así como de los problemas psicosociales y de salud mental más prevalentes para orientar los programas asistenciales, preventivos y promocionales de la salud integral. Asimismo, se pretende establecer indicadores de evaluación de los recursos humanos y financieros invertidos en el campo de la salud mental, siendo ello viable explorando como unidad de análisis a la familia.

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA SALUD MENTAL

Los estudios epidemiológicos de salud mental realizados en diversas regiones del país^{20,13,14,21,22}, han confirmado las observaciones internacionales respecto a la alta prevalencia de trastornos afectivos, así como de indicadores suicidas, problemas con el uso de alcohol y violencia intrafamiliar. Asimismo fue notoria una menor prevalencia de trastornos de ansiedad en las ciudades del interior del país y en las zonas rurales^{23,24}, frente a los hallazgos limeños del año 2002. Respecto a la asociación de aspectos socioeconómicos y trastornos mentales, si bien la asociación hallada en Lima, la selva y fronteras ha sido contundente, no ha sucedido lo mismo en la sierra y en el área rural. Esto pondría de manifiesto la influencia de los aspectos socioculturales en la interacción de la pobreza y la salud mental. El estudio realizado en la ciudad de Lima y Callao en el año 2012 ha servido para analizar nuevamente estas relaciones. Ahora revisaremos en detalle algunos hallazgos de los estudios epidemiológicos realizados por el INSM “HD-HN” en la sierra, selva, frontera, costa, Lima rural y sierra rural.

2.1. ASPECTOS GENERALES DE LA SALUD MENTAL

Bajo el concepto de salud mental consideramos tanto aspectos relacionados con los trastornos psiquiátricos específicos, como diversos problemas psicosociales que perturban la vida cotidiana, producen sufrimiento, menor calidad de vida y bienestar, lo cual con frecuencia afecta la productividad del individuo. Esto involucra “comportamientos desviados o desadaptados no necesariamente ubicables como categorías diagnósticas en las clasificaciones psiquiátricas vigentes”²⁵. Estudios internacionales han confirmado que sólo alrededor de la mitad de aquellos que buscan atención por problemas de salud mental tienen problemas psiquiátricos²⁶, y algunos autores han señalado que no necesariamente existe correspondencia entre la ausencia de patología y una buena salud mental²⁷. Asimismo, Corín señala que el punto de partida del estudio sobre los problemas de salud mental ya no se sitúa en el individuo solamente, sino en la interacción constante de la persona con su entorno, habiéndose identificado determinantes biológicos, psicológicos y sociales de la salud mental^{25,28,29}. La epidemiología social apoya la comprensión de la influencia de procesos sociales como la educación, el empleo y las condiciones de trabajo, el ingreso económico, la clase y la exclusión social (étnica, racial, de género, generacional, por discapacidad, por clase social o por sexualidad), el desarrollo del niño, los estilos de vida, las redes sociales y los entornos físicos entre otros, sobre la salud de las personas y las poblaciones^{30,31,32}. De esta manera, al incluir en las investigaciones epidemiológicas los aspectos vinculados a la salud mental positiva, se está propiciando el desarrollo de la promoción de la salud,

la cual lleva a la definición de metas saludables, en términos de condiciones de vida, oportunidad de disfrutar de más años con calidad de vida, la percepción y conciencia de los problemas, al igual que la posibilidad de la participación colectiva en la solución de los mismos. Asimismo, se impulsa la promoción de la salud mental como un derecho fundamental de todas las personas.

Desde esta perspectiva, los estudios epidemiológicos realizados por el INSM "HD-HN" en Lima Metropolitana y Callao en el 2002, la sierra urbana, la selva urbana, fronteras y costa urbana demostraron que el principal problema del país percibido por la población, tanto en hombres como en mujeres, es el "desempleo" (en alrededor del 50% de la población), seguido en menor proporción por la "pobreza". Asimismo, son consideradas la "corrupción", la "violencia" y la "inestabilidad política", pero en cantidades menores. En el área rural de Lima, el principal problema es la "pobreza", seguido por el "desempleo" y la "corrupción"²³. Igualmente, en áreas rurales de Ayacucho, Huaraz y Cajamarca el principal problema percibido es la "pobreza", seguido del "desempleo" y del "manejo económico"²⁴. Sin embargo, el estudio de salud mental realizado más recientemente en Lima en el año 2012 encontró a la delincuencia y a la corrupción como los problemas más importantes, poniendo en relieve aspecto vinculados a los valores⁶. Es generalizada en las ciudades y áreas rurales estudiadas la gran desconfianza hacia las autoridades políticas (alrededor del 90%). Esta falta de confianza ocurre igualmente con relación a las autoridades policiales -particularmente masculinas-(alrededor de 60% en Lima y en la selva urbana, 67,8% en fronteras, 65,1% en ciudades de la Costa, 61,7% en el área rural de Lima y 55,7% en el área rural de la sierra); particularmente llamativa es la poca o nula confianza en autoridades policiales masculinas en la sierra urbana (71,4%). Debemos notar que en general existe una mayor confianza hacia las mujeres policías en comparación con los varones. En general el sentimiento de desprotección por parte del Estado es alto, entre 72,4% y 79,9% en las distintas regiones estudiadas.

En relación al nivel de confianza hacia los vecinos, la mayoría de los entrevistados han señalado poca o nula confianza en ellos, especialmente en la selva urbana (63,1%) y la sierra urbana (60,9%). Esta poca o nula confianza en los vecinos en la costa urbana es de 48,2%, en fronteras de 50,2%, 56,2% en el área rural de Lima, y 52,2% en el área rural de la sierra. En Lima Metropolitana el 57,5% de la población adulta confía poco o nada de sus vecinos. Esta situación es crítica, si consideramos que la confianza es el eje del desarrollo de las comunidades andinas y selváticas. En el caso de Ayacucho, el nivel de desconfianza frente a los vecinos podría relacionarse con la situación política y la polarización entre los grupos en conflicto. Con respecto a los estados anímicos negativos prevalentes, Lima ha revelado el porcentaje más elevado en comparación con las otras ciudades y áreas rurales, siendo llamativos los estados de ansiedad y tensión.

Los estudios del INSM "HD-HN" han encontrado que las situaciones que generaban los niveles más altos de estrés (bastante o mucha tensión o problema), tanto en hombres como en mujeres, estaban relacionadas principalmente con la "delincuencia" para Lima Metropolitana y Callao, y la "salud" en la sierra urbana, la selva urbana, fronteras y costa urbana. En el caso del área rural de Lima, la situación estresante percibida como más importante fue la "delincuencia", seguida por la "salud" y el "terrorismo"; y en el caso del área rural de la sierra la situación estresante más importante resultó la "salud", seguida por el "dinero" y la "delincuencia". El estrés ambiental medido a través de la percepción de bastante o mucha molestia con relación al "ruido", "falta de ventilación", "falta de espacio" u "olor", se encontró alto en todas las ciudades, particularmente en la selva urbana (54,8%), 32,6% para Lima, 45% en Lima rural, 43,3% en la sierra urbana, 47,2% en fronteras (60,8% si se incluye el polvo) y 46,5% en la costa urbana (65,9% si se incluye el polvo). Un porcentaje mucho menor se encontró en la sierra rural (19,1%). En general, estos resultados han sido más elevados que los encontrados en los estudios en adolescentes realizados por Perales y colaboradores en 1996²⁵.

Respecto a la satisfacción personal con diversos aspectos de la vida, ha sido importante la proporción de personas poco o nada satisfechas con el nivel educativo alcanzado en la sierra rural (58,3%), mientras que 23,6% fue para Lima Metropolitana y Callao, 33,4% para la sierra urbana, 34,5% para la selva urbana, 28,3% para fronteras, 26,9% para la costa urbana y 34,8% para Lima rural. Con relación al área laboral, la insatisfacción (poco o nada satisfecho) con la remuneración fue importante especialmente en la sierra urbana y rural (43,5% y 46,9% respectivamente), pero también significativa en la selva urbana (35,4%), fronteras (35,7%), Lima rural (36,8%) y en menor proporción en la costa urbana (23,8%) y en Lima Metropolitana y Callao (18,7%). La poca o nada satisfacción con el reconocimiento o trato que recibía de sus jefes llegó a 9,6% en Lima, 16,7% en la sierra, 13,0% en la selva, 15,7% en fronteras, 11,8%

en la costa, 16,6% en Lima rural y 14,4% en la sierra rural. Respecto a los factores protectores de la salud mental en Lima, la sierra urbana, la selva urbana, fronteras, la costa urbana y en el área rural de Lima, la familia ha sido la principal fuente de soporte psicosocial (alrededor del 70,0%). También se observó que, para la población peruana en general, la religión constituye un recurso importante para enfrentar los problemas cotidianos.

2.2. LOS TRASTORNOS DE ANSIEDAD, DEPRESIVOS Y OTROS TRASTORNOS

El primer estudio epidemiológico psiquiátrico peruano se realizó mediante 2 901 encuestas en el distrito de Lince (Lima) en 1969; se encontró una prevalencia de trastornos psiquiátricos del 18,75%; el 5,48% correspondió a psiconeurosis y el 1,76% al alcoholismo. El trastorno más frecuente fue la neurosis de angustia con el 1,79%, la reacción ansiosa con el 1,45% y la reacción depresiva con el 0,97%³³.

Luego, en 1983, en el distrito de Independencia (Lima), Minobe y colaboradores, en 814 individuos, utilizando el DIS/DSM-III³⁴, encontraron una prevalencia de vida y a seis meses de algún desorden psiquiátrico del 32,1% y 22,9%, respectivamente^{35,36}. Después de los problemas con el uso de alcohol, le seguían en frecuencia los trastornos afectivos (depresión mayor y menor) con una prevalencia de vida de 13,2% y una prevalencia a seis meses de 8,6% (2,2% varones y 6,4% mujeres); y los trastornos de ansiedad con una prevalencia de vida de 11,1% y una prevalencia a seis meses de 8,1%. Además, este estudio encontró prevalencias para el trastorno de personalidad antisocial del 3,1%, para deterioro cognitivo severo del 1,5%, y para esquizofrenia y trastorno esquizofreniforme del 0,6%. Después no se realizaron más investigaciones de esta naturaleza sino hasta el año 2002.

En 1993, Colareta realizó una investigación sobre prevalencia de enfermedades psiquiátricas en una comunidad rural (Santa Lucía de Pacaraos-Huaral) y encontró una prevalencia global puntual de enfermedades psiquiátricas del 32%. En el primer lugar estaban los trastornos de ansiedad (9,1% descontando síndrome de abstinencia), seguido por los trastornos depresivos (8,0% de la muestra descontando duelo no complicado y el trastorno de adaptación), y el alcoholismo (8,6% de la muestra). De los trastornos de ansiedad, el más frecuente fue el trastorno de ansiedad no especificado en otra parte (4,6% de la muestra), el trastorno de ansiedad generalizada (2,9% de la muestra), el trastorno de pánico (0,6% de la muestra) y la fobia social (0,6% de la muestra). De los trastornos depresivos, el trastorno depresivo no especificado en otra parte fue el más frecuente (3,4% de la muestra), seguido por la depresión mayor (2,3% de la muestra) y la distimia (2,3% de la muestra)³⁷.

El Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental 2012⁶, realizado por el INSM “HD-HN” en 43 distritos de Lima y Callao, en una población de 4445 personas adultas, encontró una prevalencia anual y una prevalencia de vida de cualquier trastorno psiquiátrico de 11,8% y 26,1%, respectivamente; el 17,2% correspondió a prevalencia de vida de episodio depresivo, 3,0% al trastorno de ansiedad generalizada, 2,2% a la fobia social, 5,1% al trastorno de estrés postraumático, 0,5% al trastorno de pánico, 1,2% a la agorafobia sin trastorno de pánico, 0,2% al trastorno obsesivo-compulsivo, 0,6% a la distimia, 1,5% al síndrome psicótico y 0,2% al trastorno bipolar. Estos hallazgos fueron mucho menores a los encontrados en el año 2002²⁰.

Los estudios epidemiológicos de salud mental en la sierra urbana (2003), la selva urbana (2004) y fronteras (2005) encontraron una prevalencia de vida de cualquier trastorno psiquiátrico de 37,3%, 39,3% y 34,7%, respectivamente. Sin embargo, estos trastornos se hallaron en el 50,0% de la población de Ayacucho y 48,0% en Puerto Maldonado y ciudades incluídas. El trastorno mental más frecuente en la sierra urbana, la selva urbana y ciudades fronterizas ha sido el episodio depresivo moderado a severo con 16,2%, 21,4% y 17,1%, respectivamente, seguido del trastorno de estrés postraumático con el 12,8%, 8,9% y 6,7%, respectivamente.

El estudio epidemiológico de salud mental realizado en ciudades de la costa en el 2006 encontró una prevalencia de vida de 27,4%. Los trastornos mentales más frecuentes fueron el episodio depresivo (14,1%), seguido por el trastorno de ansiedad generalizada (4,2%) y el trastorno de estrés postraumático (3,7%). En el estudio epidemiológico de salud mental en el área rural de la provincia de Lima, la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental fue de 29,6%; el episodio depresivo moderado a severo fue el más frecuente (15,8%), seguido del trastorno de estrés postraumático (9,1%), el trastorno de ansiedad generalizada (6,6%) y la fobia social (3,0%). En la sierra rural se encontró una prevalencia

de vida del 28,1% (incluida la prevalencia anual de abuso y dependencia al alcohol) y una prevalencia anual de 9,1%; la prevalencia de vida de cualquier trastorno de ansiedad fue de 16,9% y, la prevalencia anual, de 3,3%. Con relación al episodio depresivo moderado a severo la prevalencia de vida fue del 14,6% y, la prevalencia anual, del 3,3%.

El presente estudio evaluó la prevalencia de vida, a doce meses, a seis meses y actual de los principales trastornos clínicos según los criterios de investigación de la Décima Edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)³⁸, según áreas poblacionales de Lima.

2.3. ADICCIONES

Las adicciones generan graves problemas sociales, afectan a una gran parte de la población y son altamente costosos. Los costos humanos y económicos relacionados con la morbilidad y mortalidad ocasionadas por las drogas neutralizan cualquier ganancia monetaria que los gobiernos puedan obtener mediante impuestos y otras medidas económicas en ese campo³⁹. El Informe sobre la Salud en el Mundo 2002 señaló que el 8,9% de la carga total de morbilidad se debía al consumo de sustancias psicoactivas⁴⁰. El estudio de carga de morbilidad realizado en el Perú encontró en el alcoholismo la primera causa de carga de morbilidad en los varones. Las adicciones incluyen no solo el consumo de sustancias psicoactivas, sino también las conductas que producen una gratificación inmediata y que obligan al sujeto a repetirlas, restringiendo sus áreas de interés y el cumplimiento de sus obligaciones y afectando su salud física, mental y su entorno.

El problema de las adicciones se viene arrastrando desde hace décadas. El estudio del distrito de Independencia, realizado hace 20 años, encontró que el problema más importante era el relacionado al abuso y dependencia del alcohol, especialmente en el género masculino, con una prevalencia de vida en la población del 18,6% y una prevalencia a seis meses del 6,9%^{35,36}.

En 2012, el Estudio Epidemiológico Metropolitano de Salud Mental reveló una prevalencia de vida del consumo de sustancias no alcohólicas legales del 64,4%, mientras que con las sustancias no alcohólicas ilegales se encontraba en 7,1%. La sustancia no alcohólica legal más consumida alguna vez era el tabaco (62,6%), mientras que la ilegal más consumida alguna vez era la marihuana (5,7%), seguida de la cocaína con el 3,2%. El consumo actual (en la última semana) de sustancias no alcohólicas legales e ilegales estuvo en 13,7% y 0,4%, respectivamente. La prevalencia anual de uso perjudicial o dependencia al alcohol se encontró en 2,5%⁶. Según la II Encuesta Nacional Sobre la Prevención y Consumo de Drogas 2002, realizada por DEVIDA, la prevalencia de vida de alcohol y tabaco era de 94,2% y 68% respectivamente, por lo que se concluía que más de once millones de peruanos habían probado alcohol y más de ocho habían consumido tabaco⁴¹. Los estudios epidemiológicos de la sierra urbana (2003), la selva urbana (2004) y fronteras (2005) realizados por el INSM "HD-HN", respecto a los trastornos por el uso de alcohol, encontraron cifras muy preocupantes. La prevalencia anual de consumo perjudicial o dependencia de alcohol fue de 10,5% en las ciudades de la sierra; 8,8% en ciudades de la selva; 9,0% en fronteras y 9,4% en ciudades de la costa^{13,14,21,22}. En Ayacucho dicha prevalencia fue del 15,0% en general y del 27,8% en los varones⁴². En Tumbes y Puerto Maldonado la prevalencia a 12 meses fue de 14,3% y 14,1% respectivamente. En Arequipa, Chimbote y Piura fue de 10,4%, 10,1% y 10,0% respectivamente. En el área rural de Lima, la prevalencia anual de consumo perjudicial/dependencia del alcohol fue de 4,5%; el 8,9% correspondió a los varones, y la prevalencia de vida fue de 11,5%. La prevalencia de consumo perjudicial/dependencia del alcohol en la sierra rural fue menor a la esperada, con una prevalencia de vida de 8,4% y anual de 1,7%.

2.4. INDICADORES SUICIDAS

Los estudios realizados por Perales y colaboradores en 1995 y 1996 en el Rímac³⁶ y Magdalena⁴³ mostraban cifras preocupantes en comparación con los hallazgos en Lima Metropolitana y Callao sobre indicadores suicidas. No sólo los confirmaron sino que mostraron una tendencia generacional a incrementarse. Las prevalencias de vida de deseos de morir en el adulto, el adolescente y el adulto mayor se encontraron en un 30,3%, 29,1% y 27,8%, respectivamente, lo que sugiere que, si en la actualidad la

prevalencia de vida del adolescente es similar a la del adulto y superior a la del adulto mayor, hay una tendencia a que ésta aumente conforme se avanza en edad. La prevalencia anual de deseos de morir fue más alta en los adolescentes (15,3%) en comparación con los adultos (8,5%) y los adultos mayores (12,2%). Los adolescentes que habían presentado deseos de morir en el último año acusaron como motivo principal los problemas con los padres, mientras que los adultos los relacionan principalmente a problemas con la pareja.

Estos hallazgos son coherentes con las prevalencias puntuales del episodio depresivo moderado a severo que en el adolescente asciende a 8,6%, mientras que en el adulto se sitúa en el 6,6%. En el caso de la sierra urbana, la selva urbana y ciudades fronterizas las cifras de deseos de morir alguna vez en la vida en adultos fueron de 34,2%, 32,5% y 33,7%, respectivamente; en el caso del adulto mayor fue 33,3%, 24,3% y 33,0%; mientras que para el adolescente se halló en 29,6%, 25,4% y 25,6%, respectivamente. En el caso de las ciudades de la costa la prevalencia de vida de deseos de morir en el adulto fue de 30,1%; en el adolescente 25,2% y en el adulto mayor 25,1%. La prevalencia de vida de intentos suicidas en Lima Metropolitana y Callao fue de 2,8%, en la sierra urbana 2,9%, en la selva urbana 3,6%, en fronteras 3,2% y ciudades de la costa 2,5%. En el caso del área rural las cifras son menores, con una prevalencia de vida de deseos de morir en Lima y la sierra de 26,8% y 23,7%, respectivamente. El intento suicida hallado fue de 1,2% para Lima y 0,6% para la sierra rural.

2.5. CALIDAD DE VIDA Y SALUD MENTAL

El conocimiento de la calidad de vida y su evaluación, en el ámbito individual y grupal, son factores importantes para identificar las necesidades de las personas y sus niveles de satisfacción, comprender las causas y consecuencias de las diferencias observadas, evaluar el impacto de las condiciones sociales y ambientales, evaluar la eficiencia y eficacia de intervenciones y servicios y mejorar las decisiones políticas. Se han utilizado diferentes indicadores para evaluar la calidad de vida, entre ellos la calidad de vida relacionada con la salud, que se refiere a la percepción de los efectos de las enfermedades y tratamientos y a la percepción de los aspectos positivos de la salud en el sentido de bienestar⁴⁴. Utilizando el Índice de Calidad de Vida de Mezzich y colaboradores⁴⁵, que evalúa diez áreas, empleando una escala de 10 puntos, la media para el grupo adulto fue de 7,92 en el 2012 en Lima Metropolitana, 7,80 en la Sierra, 7,6 en la Selva, 7,3 en Fronteras y 7,4 en la Costa. En el Estudio Epidemiológico de Salud Mental de Lima Metropolitana se encontró una valoración consistentemente más alta en el funcionamiento ocupacional y, más baja, en el apoyo comunitario. Asimismo, se encontró una relación directa y significativa entre la valoración de la calidad de vida y el nivel educativo. Las relaciones también fueron significativas al considerar el sexo, el estado civil, la edad y el nivel de pobreza.

2.6. TRASTORNOS MENTALES Y DISCAPACIDAD

Los desórdenes psiquiátricos constituyen 5 de las 10 principales causas de discapacidad y 47,2% de todos los años de vida asociados a discapacidad (AVAD) en países desarrollados⁴⁶. Se estima que los porcentajes de pérdida de AVAD por problemas de salud mental ascienden al 8,1% con relación al total de las enfermedades⁴⁷.

Según la OMS, la discapacidad psiquiátrica ocurre por encima de los dos quintos de toda la discapacidad en el mundo, afecta especialmente a la población joven, mostrando el más bajo porcentaje en la recuperación de la total capacidad social y del trabajo⁴⁸. Según esta misma información, la población discapacitada en el Perú se encuentra entre el millón y medio a los dos millones de personas, de las cuales aproximadamente 500 000 a 600 000 serían niños y adolescentes. Esta población suele ser discriminada y excluida de determinadas esferas sociales, generando dificultades en su desarrollo personal e integración social.

En salud mental, observamos la tendencia de los trastornos hacia la cronicidad y a producir secuelas, a pesar de los avances en el tratamiento. Por razones diversas, el avance en la rehabilitación de estos trastornos no se ha desarrollado paralelamente al tratamiento biológico⁴⁹.

Los estudios epidemiológicos de salud mental realizados por el INSM "HD-HN" han medido el grado de discapacidad en base a preguntas que indagaban sobre la pérdida de la capacidad de funcionamiento de la persona en su cuidado personal, en su medio social, familiar, ocupacional y en su autodirección. En Lima Metropolitana y Callao (2012), la presencia de algún grado de discapacidad o inhabilidad en el adulto fue de 10,5%, mientras que en la sierra urbana fue de 21,2%. En la selva urbana, ciudades fronterizas y ciudades de la costa, la presencia de algún grado de discapacidad o inhabilidad fue de 8,5%, 11,1% y 10,7%, respectivamente. Por otro lado, el porcentaje de al menos alguna discapacidad en las áreas rurales de Lima y de la sierra fueron de 12,3% y 8,3%, respectivamente.

2.7. ACCESO A SERVICIOS DE SALUD MENTAL

Los estudios internacionales sobre acceso a los servicios de salud mental sostienen que este se ve afectado principalmente en personas de menores recursos económicos, culturales y lingüísticamente diferenciados y con niveles educativos bajos⁵⁰. En el Perú la variedad sociocultural y su interrelación con el nivel educativo son especialmente importantes en problemas de salud, porque los mitos y prejuicios están muy extendidos y la medicina folklórica podría jugar un importante papel. El estudio sobre Determinantes del Acceso a los Servicios de Salud en el Perú, realizado a partir de la Encuesta Nacional de Hogares 2000 (INEI), encontró que las poblaciones con menores ingresos, rurales, con necesidades básicas insatisfechas, eran las que accedían menos; sin embargo, esta encuesta estuvo dirigida sólo a problemas físicos y no había incluido ninguna pregunta acerca de la salud mental⁵¹. La Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Niveles de Vida (ENNIV-2000) encontró que la atención en salud (general) era similar en hombres y mujeres, mayor en la zona urbana que en la rural, tendiendo a aumentar con el nivel de ingresos⁵². Como veremos, en el caso de la salud mental intervendrían otras variables socioculturales.

En Lima en el año 2012, del total de la población que reconoció haber padecido problemas de salud mental, el 31,0% accedió a los servicios de salud. Un estudio sobre acceso a servicios de salud mental en Lima y Callao confirmó la importancia de los aspectos culturales para el acceso a los servicios de salud mental, siendo aún más importantes que los aspectos económicos⁵³. Los aspectos que se encontraron relacionados a acceso fueron: la edad, el estado civil, la comunicación familiar, compromiso religioso, la pertenencia a un sistema de seguro. Los motivos que adujeron los informantes para no buscar atención fueron en orden de frecuencia: "lo debía superar solo" en el 59,4%, el 43,4% "no tenía dinero", el 36,9% adujo "falta de confianza", "duda del manejo del problema por los médicos" el 30,8%, entre otros, los cuales remarcan la influencia de los factores culturales y en cierta medida económicos. En este estudio, el factor pobreza no se encontró asociado estadísticamente al acceso, lo cual hace suponer que priman los aspectos culturales.

En el caso de la sierra urbana y la selva urbana, el nivel de acceso a servicios por problemas de salud mental fue significativamente menor al encontrado en Lima. Así, del total de la población que reconocía haber padecido un problema de salud mental, sólo el 13,9% de la sierra urbana y el 14,3% de la selva urbana accedió a servicios de salud. Al igual que en Lima Metropolitana y Callao, la mayoría aludía como motivo de no acceso el que "lo debería superar solo" (50,2%). En ciudades de fronteras, el 12,8% de aquellos que reconocieron haber padecido un problema de salud mental en el último año accedió a servicios de salud; aquellos que no recibieron atención asumieron que "deberían superarlo solos" en el 52,9% de los casos.

En las ciudades de la costa, el 19,8% de aquellos que reconocieron haber padecido un problema de salud mental en el último año accedió a servicios de salud. De esta población que no buscó ayuda, a pesar de percibir problemas de salud mental, un 68,4% no lo hizo porque "lo debía superar sólo", un 34,1% porque no tenía dinero, y un 29,0% por falta de confianza. En el caso del área rural de Lima sólo el 10,1% recibió alguna atención, similar al de la sierra rural donde se encontró el 10,4%.

El acceso a servicios de salud mental ha sido medido tanto a través de la morbilidad sentida (es decir, aquellos que han percibido en sí mismos problemas de salud mental) y la demanda expresada en los distintos servicios de salud del Estado y privados, así como en los casos detectados e implícitamente no identificados por la persona como problemas de salud mental.

2.8. POBREZA Y SALUD MENTAL

El círculo vicioso entre la salud mental y los aspectos socioeconómicos convierte a la primera en agenda necesaria de países que buscan su desarrollo⁵⁴. La OMS, en su informe anual de salud del año 2001, enfatizó la relación entre la pobreza y la salud mental, en especial con el episodio depresivo. La relación entre la pobreza y la salud mental crea un círculo vicioso: la pobreza y sus condiciones afectan la salud mental de las personas, y estas a su vez influyen en la economía de las familias –costos y producción⁴. En América Latina, un estudio sobre prevalencia de trastornos mentales, realizado en Santiago de Chile, confirmó una mayor prevalencia de trastornos entre las personas de un nivel social bajo⁵⁵. Un re-análisis de estudios comunitarios de varias ciudades americanas demostró que el estado socioeconómico bajo duplicaba los riesgos para la depresión en niños. Esta investigación también halló una gran variabilidad en la asociación entre pobreza y la presencia de disturbios emocionales severos, lo que confirma la necesidad de realizar estudios por regiones.

Desde el inicio de las investigaciones del INSM “HD-HN” se ha puesto énfasis en un enfoque psicosocial en el estudio de los problemas de salud mental, particularmente en los aspectos socioeconómicos. Dos hallazgos de estos estudios son pertinentes en relación al estudio actual. Por un lado, se ha identificado que la prevalencia de un conjunto de problemas de salud mental está asociada con los niveles de pobreza y condiciones de vida de la población, confirmando observaciones que sugieren que, ambientes de esta naturaleza son propicios para incrementar los problemas de salud mental⁵⁶. En el Perú existen muchas diferencias en la tasas de incidencia de la pobreza entre las distintas regiones, siendo más altas para la sierra y la selva en comparación con la costa o Lima Metropolitana⁵⁷.

En general, en la última década el Perú ha mostrado un descenso de la pobreza; sin embargo, no ha habido una modificación sustancial de la desigualdad en la distribución del ingreso (Tabla 1)⁵⁸. La Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de vida y pobreza (ENAHOG), realizada el IV trimestre de 2004, encontró que a nivel nacional la pobreza total era de 48,6% y la pobreza extrema de 17,4%; sin embargo estas cifras disminuyeron para el 2010 a un 34,8% y a un 9,8% respectivamente⁵⁷. Como se mencionó anteriormente, los niveles de pobreza en el ámbito rural son mucho más elevados que en las zonas urbanas (Tabla 1). En el caso de Lima Metropolitana la pobreza descendió desde 30,9% a 12,8%. Algunos estudios señalan que el desarrollo no necesariamente se acompaña de una mejoría de la salud mental, sugiriendo la existencia de marcadas desigualdades como posible explicación de ello¹⁸. Este estudio permitirá reevaluar esta asociación.

En nuestro medio, el Estudio Epidemiológico Metropolitano de Salud Mental, realizado en la ciudad de Lima y Callao en 2002, encontró una importante asociación entre indicadores de pobreza, tanto en la percepción de la capacidad de cobertura de las necesidades básicas con los ingresos familiares como con la medición a través de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y los trastornos ansiosos y depresivos. De esta manera la prevalencia a 6 meses de trastornos depresivos (episodio depresivo o distimia) se encontraba en 6,6% entre las personas que manifestaron que podían satisfacer sus necesidades básicas y otras necesidades con sus ingresos familiares, mientras que dicha prevalencia se encontraba en 19,5% entre las personas que no podían satisfacer sus necesidades básicas nutricionales (pobres extremos)²⁰. Estos hallazgos se confirmaron en el estudio de salud mental de Lima Metropolitana del 2012. En la sierra urbana esta asociación no ha sido tan clara, por lo menos para la percepción de la capacidad de cobertura de las necesidades básicas con los ingresos familiares¹³. Una explicación posible es que en la interacción entre la pobreza y la salud mental participen otras variables particulares sobre la experiencia de la pobreza en cada región, como un mayor estrés en la población de Lima. Asimismo, no se descartan problemas de adecuación de los indicadores a distintas regiones.

Similares hallazgos a los de la sierra se encontraron en el área rural de Lima, y el área rural de la sierra^{23,24}, sin hallarse diferencias significativas, según el nivel de pobreza. En el caso de la selva urbana, la relación entre la pobreza y la salud mental se presentó en forma similar a la de Lima. La prevalencia anual de cualquier trastorno psiquiátrico se encontraba en 41,8% en los más pobres, frente a 15,8% en los menos pobres¹⁴. En el caso de ciudades de fronteras, la prevalencia actual de cualquier trastorno psiquiátrico se encontró en el 33,6% de aquellas personas que no podían cubrir sus necesidades básicas de alimentación con sus ingresos familiares (pobres extremos), frente a una prevalencia de 19,6% entre

aquellos que podían satisfacer sus necesidades básicas y otras necesidades²¹. En el estudio en ciudades de la costa, se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la prevalencia actual de cualquier trastorno depresivo en aquellos que no cubrían sus necesidades básicas de alimentación o pobres extremos (4,2%), frente a aquellos cuyos ingresos familiares podían cubrir sus necesidades básicas y otras (0,2%)²².

En países pobres como el nuestro, se hace imprescindible continuar la exploración en escenarios distintos, con la finalidad de identificar las variables que inciden, ya sea en la salud mental o en la pobreza, de tal forma que puedan elaborarse medidas correctivas apropiadas a los distintos contextos y, por lo tanto, deriven en una intervención o prevención eficaz.

2.9. EVENTOS DE VIDA Y SALUD MENTAL

Diversos estudios clínicos y epidemiológicos, y especialmente los estudios clásicos de Bowlby (1969, 1973, 1980), han permitido relacionar los eventos de vida adversos con el desarrollo de enfermedad mental. Hay suficientes datos que demostrarían las hipótesis de que, por ejemplo, la separación de los padres, las amenazas de abandono de estos a sus niños, el excesivo control hacia el comportamiento de los niños y el descuido en la atención a los mismos, entre otras cosas, provocarían disturbios emocionales en la adultez. La finalidad de la presente investigación es conocer esta relación en nuestra población. Para ello, en la encuesta del estudio epidemiológico para la sierra peruana se incluyeron preguntas sobre los eventos de vida adversos, para luego confrontarlos con los datos obtenidos sobre la prevalencia de desórdenes mentales⁵⁹.

El estudio epidemiológico de salud mental en la sierra, en 2003, reveló una mayor prevalencia de estilos de crianza negativos en Ayacucho y de sobreprotección en Huaraz. Asimismo, se observó un incremento de la prevalencia de trastornos psiquiátricos, en las personas que habían recibido estilos de crianza negativos. El maltrato infantil, bajo el criterio de haber recibido más castigos de lo que se merecía, tiene el impacto más notable en todos los trastornos. Sin embargo, también resaltaba la falta de ternura entre la persona y sus padres, especialmente en los trastornos depresivos. El estudio en la costa peruana reveló diferencias significativas, entre las ciudades en algunos de los ítems, y una asociación con la presencia, alguna vez en la vida, de trastornos mentales²². Lo mismo se ha encontrado en el estudio realizado en el área rural de Lima y la sierra rural.

La finalidad de la presente investigación es ampliar el estudio de esta relación en Lima Metropolitana y Callao, incluyendo variables no consideradas en el estudio de 2002. Para ello se han incluido preguntas sobre los eventos de vida adversos y los estilos de crianza, para luego confrontarlos con los datos obtenidos sobre prevalencia de desórdenes mentales.

2.10. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SALUD MENTAL

En el Perú las necesidades de salud de nuestra población vienen siendo, desde antaño, satisfechas por 2 sistemas paralelos: el de la medicina oficial o académica y el de la medicina popular o tradicional⁶⁰. Los estudios de morbilidad en poblaciones abiertas y las experiencias acumuladas por distintos investigadores en el mundo señalan que una significativa mayoría (del 70% al 80%) de los episodios de enfermedad reportados, se manejan fuera de los sistemas de atención médica oficial, recurriendo a otros sistemas alternativos, como los que ofrece la medicina tradicional o popular⁶¹.

La bibliografía peruana es rica en esta área, gracias a los estudios realizados por científicos peruanos y extranjeros en los últimos 50 años⁶². Por otro lado, los estudios de orden social, médico y folklórico, sobre medicina tradicional o popular no han sido realizados con el rigor metodológico⁶³ que permita una sistematización de ellos; tampoco se ha realizado antes un estudio epidemiológico en el que se intente explorar, no solo los síndromes socioculturales, sino también los agentes que los resuelven, sus estrategias diagnósticas y de tratamiento. También se ha explorado, aunque en forma insuiente, sobre espiritualidad y religiosidad popular, pero como espacio de resistencia e identidad, a la vez que de integración y de solidaridad⁶⁴. Finalmente, aunque por ahora a modo de conclusiones hipotéticas, se presentan algunos resultados.

El estudio epidemiológico de salud mental en la sierra urbana 2003 encontró que los síndromes folklóricos, descritos desde antaño por los investigadores en medicina tradicional en el área de psiquiatría folklórica, tienen vigencia y son identificados y reconocidos por la población encuestada; son los más frecuentes el “susto” y el “aire”. Las personas que consultaron por alguno de estos síndromes en algún momento de su vida presentaron: un episodio depresivo, algún trastorno de ansiedad, o síntomas paranoides con mayor frecuencia que la población general, con excepción del “chucaque”¹³.

El estudio epidemiológico de salud mental en la Costa, realizado en 2006, reveló que los síndromes folklóricos continúan vigentes y son identificados y reconocidos por la población encuestada. Asimismo, la población reconoce como agentes de medicina folklórica, entre otros: al brujo – curandero, al santiguador o rezador, al curioso, al yerbero, al huesero o sobador y a la partera empírica o comadrona. El síndrome folklórico de mayor prevalencia fue el “chucaque”. Por cada persona que consultó por “daño”, 5,7 personas lo hicieron por “chucaque”. El estudio epidemiológico de salud mental realizado en el área rural encontró una asociación entre “daño” y la presencia de síntomas psicóticos (según el MINI), entre “susto” y la presencia de trastornos de ansiedad y depresión moderada a severa. Asimismo, se halló una asociación entre “aire” y “chucaque” y depresión moderada a severa.

Así como en los estudios anteriores, se pretende explorar en Lima Metropolitana y Callao los aspectos relacionados a la medicina tradicional y a la psiquiatría folklórica, investigando variables importantes como: los agentes de la medicina tradicional, los síndromes clínicos populares o folklóricos y sus métodos diagnósticos, los métodos terapéuticos y la correlación entre síntomas y signos clínicos y los de los síndromes populares o folklóricos. Estos aspectos no fueron considerados en el estudio anterior al realizado en 2002.

2.11. DISCRIMINACIÓN Y SALUD MENTAL

Según la Real Academia Española, la palabra discriminación se refiere a la acción y efecto de discriminar, y “discriminar” significa en su primera acepción separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra; y, en su segunda acepción, dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Ambas acepciones deben conjugarse para comprender el proceso de la discriminación. La capacidad de discriminar es un ingrediente fundamental para el desarrollo del ser humano y probablemente uno de los cimientos de su sobrevivencia como especie.

Muchos estudios internacionales respaldan la importancia de la relación entre discriminación y salud mental. La discriminación es considerada entre las situaciones estresantes secundarias más importantes, asociada a eventos estresantes mayores, como la pérdida del trabajo o la exposición a la violencia⁶⁵. Entre los motivos de discriminación relacionados con la salud mental, se encuentran el género, la orientación sexual⁶⁶, el racismo⁶⁷, el etnicismo⁶⁸, el status social⁶⁵ e incluso la condición de salud mental en sí misma⁶⁹, sin considerar formas más sutiles como la belleza física, la edad, etc.

Las variables de salud mental empleadas para medir los efectos de la discriminación han sido el estrés psicológico, la satisfacción de vida, el sentimiento de felicidad, síntomas de ansiedad o de depresión⁶⁸. Al parecer, la prevalencia de la discriminación sería alta. Según un estudio epidemiológico realizado en los EEUU, la gran mayoría de las personas ha experimentado algún tipo de discriminación mayor en su vida y un tercio considera experimentarla todavía⁶⁵. En el mismo estudio, el 48% de los encuestados percibe que en algún momento las personas actúan como si ellas fueran inferiores; un 40% percibe en algún momento un mal servicio en restaurantes o tiendas; un 43% percibe en algún momento que las personas actúan como si ellas no fueran inteligentes.

Tanto en el estudio epidemiológico de salud mental de la sierra urbana como en el de la selva urbana, ciudades de fronteras y la costa, y el área rural de Lima, se encontró que de las diez condiciones de discriminación exploradas (sexo, edad, peso, color de piel, forma de vestir, condición económica o social, nivel educativo, religión, amistades y lugar de nacimiento) la condición económica o social fue la más frecuente, con una prevalencia de vida del 11,5%, 11,8%, 16,1%, 11,0% y 11,6%, respectivamente. El segundo tipo de discriminación más frecuente en la sierra urbana, la selva urbana y el área rural de Lima fue el nivel educativo, mientras que en fronteras fue por el sexo. En la sierra rural fue primero el nivel educativo y muy de cerca el nivel socioeconómico. En la sierra urbana según sexos, las principales

áreas de discriminación en el sexo femenino fueron: sexo (11,7%), nivel educativo (11,3%) y condición económica o social (10,9%); en la población masculina las áreas más importantes fueron la condición económica o social (12,1%), el nivel educativo (7,9%) y la edad (6,3%). En la selva urbana, las áreas más importantes de discriminación en la población femenina fueron condición socioeconómica (11,7%), nivel educativo (10,1%) y sexo (8,2%); en la población masculina las áreas de discriminación más importantes fueron la condición económica o social (12,0%), el nivel educativo (9,6%) y la edad (9,5%)^{13,14}.

En las ciudades de fronteras, según género, las principales áreas de discriminación en el sexo femenino fueron el sexo (19,0%), la condición económica o social (17,5%) y el nivel educativo (14,9%), mientras que en la población masculina fueron la condición económica o social (14,6%), la edad (9,9%) y el nivel educativo (8,8%)²¹. En la costa se encontró una prevalencia de vida de discriminación en la condición socioeconómica del 11,0%, seguido por la edad con un 8,8%²². En Lima rural la prevalencia de vida de discriminación más frecuente en las mujeres se dio con respecto al sexo (13,2%), seguido por la condición económica o social (12,4%); en el caso de los varones, la discriminación más frecuente fue por la condición económica o social (10,9%) y por el nivel educativo (9,2%)²³. En el área de la sierra rural, para el sexo femenino las principales fuentes de discriminación han sido el nivel educativo (16,0%) seguido por la condición económica o social (11,7%), y en el varón la condición económica o social (12,5%) y el nivel educativo (10,2%)²⁴.

2.12. ESTIGMA CONTRA LOS TRASTORNOS MENTALES

A pesar de los programas que luchan contra el estigma hacia las personas con problemas de salud mental y las conductas discriminatorias asociadas, hay evidencia de que estos, en la práctica, son todavía insuficientes^{70,71}. El estigma afecta tanto a las personas con trastornos mentales como a sus familiares. El entendimiento de cómo afecta a los miembros de la familia, en términos de su respuesta psicológica a la persona enferma y su contacto con los servicios psiquiátricos, podría mejorar las intervenciones dirigidas a los familiares. Los resultados del presente estudio deben servir para sentar las bases de proyectos de intervención que reduzcan los efectos negativos del estigma hacia personas con problemas mentales y sus familiares^{72,73}.

Como ya se dijo, el estigma en esquizofrenia va dirigido no solo a los pacientes, sino también a sus familiares, a los profesionales de la salud, a los hospitales psiquiátricos, a los medicamentos antipsicóticos y terapias. El estigma contra las personas con esquizofrenia se sustenta en las creencias y mitos de que: son violentas y peligrosas, pueden contagiar a otros su enfermedad, no pueden tomar decisiones, son impredecibles, no pueden trabajar, deben permanecer hospitalizadas o presas, no tienen esperanza de recuperación, e incluso logran adjudicárseles brujería o maleficio. Las consecuencias del estigma podemos resumirlas en: aislamiento social, desesperanza, temor hacia los pacientes con esquizofrenia, desprecio y rechazo, menores oportunidades de empleo y tratamientos inadecuados.

El estigma se combate con el incremento de la calidad de vida, a través de las siguientes medidas: tratamiento farmacológico oportuno, mejorando la competencia social del individuo, incrementando el soporte familiar y social en las áreas de empleo, labores hogareñas, socialización y recreación, y reduciendo las consecuencias adversas de la patología⁷⁴.

Respecto al estudio epidemiológico realizado por el INSM HD-HN en la sierra urbana (EESMSP 2003), llama la atención que un 43% de la población no considerara la depresión como un trastorno mental, pasando inadvertida, y que solo el 3% de la población considerara los problemas de personalidad como patología psiquiátrica. Los resultados nos muestran que un 70% de la población reacciona no aceptando a las personas con enfermedades mentales, pero en contraste están dispuestos a brindarles algún tipo de ayuda en un 47%. En el mismo sentido, tratándose de familiares con enfermedades mentales, se tiende a no aceptar la enfermedad en ellos en un 80% aproximadamente. Por otro lado, un 93% de la población general piensa que, en el caso de sufrir una enfermedad mental, no sería aceptado en su comunidad. Sin embargo, es sorprendente la expectativa de la población general de la sierra peruana, pues un 81% piensa que las personas con enfermedades mentales pueden ser rehabilitadas y reintegradas a su comunidad.

La replicación de la encuesta de salud mental en Lima Metropolitana y Callao aportará información sobre los problemas de salud mental particulares en la zona, sus magnitudes, y sus tendencias, con la cual el Instituto, las autoridades de salud de las regiones, gobiernos locales y del nivel nacional estarán en condiciones de adoptar políticas y programas apropiados según sus realidades.

2.13. SALUD MENTAL POSITIVA

La combinación de aspectos positivos y negativos implica un concepto más amplio de salud vinculado y dirigido a la totalidad de la persona; de esta manera, la actividad y atención clínica se convierten en un diagnóstico de salud⁷⁵. Bajo este punto de vista el foco de atención no es solo la enfermedad sino la salud en su concepto más amplio, con implicancias en aspectos promocionales y preventivos⁷⁶. Este tipo de aproximación está siendo incluido en los estudios epidemiológicos de cuarta generación al lado de los indicadores de salud mental negativa^{77,78}. Esta aproximación hace posible anticipar la conducción de investigación empírica rigurosa hacia la formulación de una ciencia del bienestar (Cloninger, 2002)⁷⁹ y avanzar hacia una promoción de la salud a nivel más elevado tanto en el ambiente clínico como en el de la salud pública⁸⁰. La salud positiva se relaciona con conceptos como satisfacción con la vida, funcionamiento, bienestar, resiliencia, recursos personales, calidad de vida o sentimientos de felicidad o de alegría que son relevantes tanto para la salud mental como para la salud en general⁸¹. Algunos han postulado que las emociones positivas como la felicidad, el sentirse contento o el disfrute amplían el repertorio de pensamiento-acción de las personas en un momento dado y, por lo tanto, constituyen recursos personales más duraderos y servirían para prevenir y tratar problemas enraizados en emociones negativas, como la ansiedad, depresión u otros relacionados con el estrés⁸². Otros autores postulan que el crecimiento económico no necesariamente se correlaciona directamente con el sentimiento de felicidad de una población¹⁸.

Con relación a la resiliencia, Rutter (1990) citado por Kotliarenko y colaboradores⁸³ ha remarcado que existen diversos mecanismos que median los procesos protectores ante circunstancias difíciles, que podrían modificar el comportamiento de la enfermedad mental frente a un factor de riesgo. Uno de esos mecanismos se refiere al que promueve el establecimiento y mantenimiento de la autoestima y la autoeficacia relacionadas a vínculos afectivos seguros y armónicos y al éxito en tareas que son importantes para las personas. La inclusión de estos procesos protectores en la formulación diagnóstica redundaría en forma significativa en aspectos, no solo necesariamente para recuperarse del trastorno sino en la forma como se enfrenta, lo que va a tener un efecto directo en la calidad de vida de la persona. El estudio epidemiológico de salud mental realizado en el área rural de Lima encontró puntajes ligeramente menores en las mujeres, en escalas de autoestima, satisfacción con la vida, autoeficacia y resiliencia. Lo mismo podría decirse de los hallazgos en satisfacción personal con el aspecto físico, inteligencia, nivel socioeconómico, profesión estudiada y nivel educativo alcanzado, donde las mujeres muestran mayor insatisfacción que los varones²³. El estudio epidemiológico de salud mental realizado en áreas rurales de la sierra en el 2008 encontró hallazgos similares²⁴.

2.14. PROBLEMAS DEL SUEÑO

Los problemas del sueño se manifiestan como dificultad para conciliarlo, para mantenerlo o bien como sueño poco reparador; estas quejas se presentan varias veces a la semana y usualmente se acompañan de dificultades en las actividades diurnas. La CIE 10 considera entre los trastornos del sueño: el insomnio e hipersomnia no orgánicos, los trastornos del ciclo sueño-vigilia, el sonambulismo, los terrores nocturnos y las pesadillas⁸⁴. El DSM-IV-TR incluye, además, trastornos del sueño relacionados con la respiración⁸⁵. Los problemas del sueño no sólo son manifestaciones de problemas psiquiátricos sino que también son síntomas frecuentes en la población general.

Los estudios internacionales en países desarrollados han encontrado que entre un cuarto y un tercio de la población general presenta problemas de sueño^{86,87,88,89}. En este sentido, un estudio internacional con muestras poblacionales encontró una prevalencia de problemas de sueño de 56% en EEUU, 31% en países de Europa del Oeste y 23% en Japón. La mayoría de las personas de este estudio consideró que estos problemas de sueño tuvieron impacto en su funcionamiento diario que había afectado

su vida familiar, sus actividades personales y profesionales⁸⁷. Sin embargo, las comparaciones son difíciles debido a las distintas metodologías utilizadas en las mediciones. Se han realizado pocos estudios en países en desarrollo; por ejemplo, prevalencias menores de problemas de sueño han sido encontradas en un estudio en Nigeria, donde 11,8% de la población reportó problemas de insomnio al menos dos semanas en el último año. En el Perú, en el año 2007, el INSM "HD-HN" realizó un estudio epidemiológico en una muestra de 2 536 adultos utilizando la Escala de Calidad de Sueño de Pittsburgh y encontró cifras similares a las encontradas en otras latitudes, con la diferencia que se trataba de una muestra rural. En más del 24% de los entrevistados se encontraron problemas que ameritaban la atención del médico. Un 18,8% requirió más de 30 minutos en conciliar el sueño, mientras que un 38,2% de la población estudiada durmió menos de 7 horas diarias. Cifras similares han sido encontradas en una muestra proveniente de áreas rurales de la sierra peruana, en donde 23,4% presentaba problemas que ameritaban la atención médica, 15,7% requirió más de 30 minutos para conciliar el sueño y 33,4% durmió menos de 7 horas diarias²⁴.

Los problemas del sueño también han sido relacionados con accidentes automovilísticos; especialmente los asociados al trabajo por turnos rotativos⁹⁰. Un estudio brasileño encontró en una muestra de choferes de autobuses que el 42% y 38% reunía criterios para somnolencia (latencia del sueño menor a 5 minutos) según el test múltiple de latencia del sueño cuando la prueba se realizó durante el día o la noche, respectivamente⁹¹. Otros estudios han encontrado asociados los problemas del sueño con pobre bienestar psicológico⁸⁸, con menor calidad de vida⁸⁶ y con disminución en el rendimiento laboral⁹². Asimismo, los problemas del sueño se han vinculado con una mayor utilización de servicios médicos generales y con problemas médicos crónicos⁹³. Hay pocos estudios poblacionales realizados en Latinoamérica, y su estudio es importante en vista de su repercusión sobre la salud general de las personas y configura un problema de salud pública⁹².

2.15. VIOLENCIA POLÍTICA

La violencia política que afectó al Perú en el periodo 1980–2000 dejó un saldo doloroso de víctimas fatales, particularmente en los sectores menos favorecidos*. Un estudio de salud mental realizado en poblaciones alto andinas de Huanta, en Ayacucho, que evaluó el impacto de la violencia política en la población, encontró una prevalencia general de trastornos mentales del 73%, mientras que el 24,8% de la población mayor de 14 años había sufrido estrés post traumático⁹⁴. Las situaciones estresantes relacionadas con estos resultados no solo se derivan de la exposición diferencial a la violencia política, sino de la estructura de la sociedad, como la desigualdad social y la exclusión, la extrema pobreza y la discriminación racial y étnica. Los estudios epidemiológicos de salud mental del INSM "HD-HN" realizados en la sierra en el 2003 y en la selva en el 2004 encontraron que las poblaciones con porcentajes más altos de haber perdido algún familiar en situaciones directamente relacionadas con la violencia política, ya sea por fallecimiento o por desaparición, estaban en las ciudades de Ayacucho con el 52,8%, Pucallpa con el 20,6% y Tarapoto con el 18,0%. En el caso de Huaraz, Iquitos y Cajamarca, esta cifra de pérdidas personales fue de 12,2%, 8,8% y 7,1% respectivamente. En las ciudades de fronteras se encontró 7,9% para la ciudad de Bagua Grande, 8,3% para Puerto Maldonado, 5,3% para Puno, 4,3% para Tacna y 4,4% para Tumbes. En el caso de la Costa los hallazgos fueron en Ica 13,7%, Trujillo 10,7%, 7,7% en Chimbote, 7,1% en Arequipa, y 5,6% en Piura. En el área rural de Lima fue de 18,1%. Estas experiencias se han asociado con un incremento en la morbilidad psiquiátrica en estas personas, particularmente con relación a trastornos de ansiedad que en algunos casos continúan hasta la actualidad^{13,14,21,22,23}. En el área rural de la sierra se encontró que el 20,8% de la población había sufrido al menos una situación de pérdida personal; sin embargo, en Ayacucho, esta situación la vivió el 69% de su población. Esta cifra ha sido hasta el momento la más alta encontrada.

* La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha estimado que la cifra más probable de víctimas fatales de la violencia ha sido de 69280 personas. Estas cifras superan el número de pérdidas humanas sufridas en el Perú por todas las guerras externas y civiles ocurridas en sus 182 años de vida independiente.

3. OBJETIVOS

El objetivo general de la encuesta epidemiológica de salud mental en áreas poblacionales de Lima Metropolitana 2012 es identificar los principales problemas de salud mental, sus magnitudes, las particularidades sociales de las personas que los sufren y los factores limitantes para el acceso a servicios de salud adecuados de las diferentes áreas poblacionales de Lima metropolitana.

- Conocer la magnitud de los indicadores, aspectos positivos y negativos de la salud mental por áreas poblacionales de Lima metropolitana, como por ejemplo: funcionamiento y discapacidad, autoestima, autoeficacia, resiliencia, satisfacción con la vida, satisfacción laboral, confianza en autoridades, conductas sociopáticas, sentimientos prevalentes negativos y positivos, sentimientos de felicidad, nivel de cohesión y soporte familiar, manifestaciones de distrés emocional y estrés ambiental de la población de Lima Metropolitana en el año 2012.
- Determinar la prevalencia de indicadores suicidas en los adultos, en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.
- Determinar la prevalencia, aspectos clínicos, factores de riesgo y de protección relacionados con las adicciones en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.
- Estimar la prevalencia de los trastornos de ansiedad (agorafobia, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático), así como estimar su relación con la influencia de los estilos parentales en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.
- Estimar la prevalencia de los trastornos depresivos (distimia, episodio depresivo), así como aspectos relacionados con la influencia de los estilos parentales en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.
- Determinar la magnitud y la relación entre el nivel socioeconómico, expresado en la presencia o no de pobreza y los problemas de salud mental en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.
- Explorar aspectos sobre medicina tradicional como los agentes de la medicina tradicional, los síndromes clínicos populares o folklóricos, los métodos diagnósticos, los métodos terapéuticos y la correlación entre síntomas y signos clínicos de los síndromes populares o folklóricos con los síndromes clínicos psiquiátricos en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.
- Determinar la magnitud de la inhabilidad y de la discapacidad en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.
- Identificar las actitudes de estigma hacia las personas con trastornos mentales en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.
- Explorar la relación entre los eventos de vida infanto-juveniles y la salud mental en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.
- Estimar la prevalencia de discriminación en sus distintas formas y su relación con la salud mental en las diferentes áreas poblacionales de Lima Metropolitana en el 2012.

4. METODOLOGÍA

El *Estudio Epidemiológico de Salud Mental en áreas poblacionales de Lima Metropolitana 2012* consta de más de 20 capítulos o temas de estudio. En esta sección se incluyen el muestreo, variables e instrumentos.

4.1. TIPO DE DISEÑO Y DE ESTUDIO

Tipo descriptivo epidemiológico de corte transversal.

4.2. DISEÑO MUESTRAL

4.2.1. POBLACIÓN ADULTA

La población adulta a investigar incluyó a las personas a partir de los 18 años de edad, residentes en viviendas particulares de las provincias de Lima Metropolitana y Callao; se excluyeron los distritos de los balnearios del sur -Punta Negra, Punta Hermosa, Pucusana, San Bartolo, y Santa María del Mar- por su escasa población.

4.2.2. NIVELES DE INFERENCIA

La muestra estuvo diseñada para dar resultados confiables para Lima Metropolitana y las áreas poblacionales de Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Callao, acordes con la organización por Direcciones de Salud (DISA) del Ministerio de Salud. Para los fines de este estudio, la DISA Lima Ciudad ha sido dividida en Lima Centro y Lima Norte.

4.2.3. MARCO MUESTRAL Y UNIDADES DE MUESTREO

Para los fines de esta investigación, el marco muestral comprendió las siguientes unidades de muestreo:

UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO (UPM) O CONGLOMERADOS DE VIVIENDAS. Conglomerados de aproximadamente 100 viviendas contiguas. Fueron definidos a partir del marco de muestreo del Instituto Nacional de Estadística e Informática elaborado sobre la base del Pre-Censo del 2007.

UNIDADES SECUNDARIAS DE MUESTREO (USM) O VIVIENDAS. Viviendas de cada uno de los conglomerados. El marco de muestreo en este caso estuvo constituido por el registro de viviendas efectuado por el propio personal de campo de la encuesta.

UNIDADES FINALES DE MUESTREO (UFM) O PERSONAS. Adultos que satisfacían los criterios de inclusión en la vivienda seleccionada. El marco de muestro para las personas fue el registro de miembros del hogar elaborado en el momento de abordar la vivienda.

4.2.4. ESTRATIFICACIÓN Y DOMINIOS DE ESTUDIO

Toda la ciudad constituye un único estrato. Constituyen dominios de estudio cada una de las áreas poblacionales: Lima Centro, Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Callao.

4.2.5. TIPO DE MUESTRA

La muestra fue diseñada para estudiar en simultáneo cuatro grupos de análisis: adultos, adultos mayores, mujeres unidas y adolescentes.

La muestra es de tipo complejo, probabilística, en tres etapas, con selección de conglomerados en la primera, con probabilidad proporcional al número de viviendas; selección de segmentos compactos de viviendas en la segunda etapa, con arranque aleatorio. En estas viviendas se seleccionó de manera independiente cada uno de los grupos de análisis entre quienes satisfacían los criterios de inclusión (tercera etapa), con probabilidad igual. La muestra es ponderada con el fin de reproducir la estructura demográfica de la población en estudio.

4.2.6. TAMAÑO DE LA MUESTRA

Este estudio tiene el propósito fundamental de medir la prevalencia de un conjunto de problemas de salud mental, por lo que desde el punto de vista epidemiológico se trata de un análisis de precisión y busca un tamaño de muestra que permita un intervalo de confianza de las estimaciones de la menor amplitud posible.

El tamaño de muestra fue determinado para el grupo de análisis de adultos, porque la probabilidad de encontrar por lo menos uno de ellos en los hogares es cercana al 100%, pues los otros grupos, sobre todo los adultos mayores, tienen una probabilidad menor. Tomando en cuenta la proporción de adultos existentes en el estudio de Lima del 2002 (0.95 por hogar), se determinó la cantidad de viviendas a ser visitadas. Se definió que se iba a entrevistar sólo a los hogares principales en aquellas viviendas que albergaran a más de una, por lo que la muestra fue determinada en término de viviendas.

Se emplearon los siguientes criterios para la determinación del tamaño de la muestra:

- Parámetro de referencia (p): Prevalencia actual de trastornos de ansiedad en adultos, 15% en el Estudio de Lima Metropolitana del 2002.
- Tasa de no-respuesta esperada (tnr): 15%
- Efecto de diseño (deff): Se ha considerado 1,8 en general.
- Error relativo (e): Se ha considerado 9% en torno del valor esperado del parámetro de referencia, lo que da un margen de error de +/- 1.35 puntos porcentuales.
- Nivel de confianza: 95% (Z=1.96)
- Personas del grupo objetivo por vivienda (hv): 0,95 (para adultos, tomando en cuenta el mismo estudio de Lima del 2002)

La fórmula empleada ha sido la siguiente:

$$n_0 = \left(\frac{z}{e} \right)^2 \left(\frac{1-p}{p} \right) \left(\frac{deff}{hv(1-tnr)} \right)$$

Se ha asumido el concepto de población infinita por cuanto la cantidad de habitantes de cada grupo es bastante grande.

Con tal fórmula se obtiene una muestra teórica de 5990 viviendas, la misma que ajustada para los fines de la operación de campo da una muestra programada de 6180 viviendas.

Para los dominios de estudio se considera un promedio de 1780 viviendas por área poblacional de la ciudad. Esta muestra permitirá obtener las estimaciones del parámetro de referencia con un margen de error de ± 2.48 puntos porcentuales.

Se debe señalar que la muestra es de carácter multipropósito pues hay muchos temas y variables en estudio, por lo que los márgenes de error finales dependen de la magnitud o prevalencia que tome cada una de tales variables y de la cantidad de casos reales que se entrevisten.

4.2.7. UNIDADES DE ANÁLISIS

- Adulto de 18 o más años.

4.2.8. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA DE ADULTOS

La muestra de personas fue seleccionada en tres etapas y de manera independiente en cada área poblacional.

4.2.8.1. Selección de unidades primarias de muestreo (UPM). Las UPMs fueron los conglomerados. Se seleccionaron 700 conglomerados para el Área Metropolitana de Lima, con el método de muestreo sistemático con arranque aleatorio, con probabilidad proporcional al número de viviendas de cada conglomerado. Esta selección se hizo en una sola fase, considerando el total de conglomerados del área geográfica considerada. La distribución de conglomerados seleccionados por área poblacional aparece en la tabla 1.

4.2.8.2. Selección de unidades secundarias de muestreo (USM) o viviendas. En cada UPM seleccionada se tomaron segmentos compactos de viviendas, a razón de 6 por conglomerado en Lima Centro y Lima Norte, 11 en Lima Este y Lima Sur y 8 en Callao. Estas cantidades fueron reajustadas en el proceso debido a que se empezaron a presentar altas tasas de rechazo. El total de conglomerados y viviendas programadas se presenta en la siguiente tabla 1.

TABLA 1
DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE CONGLOMERADOS Y VIVIENDAS SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES

ÁREAS POBLACIONALES	Nº DE CONGLOMERADOS	TOTAL DE VIVIENDAS SELECCIONADAS
LIMA CENTRO	134	841
LIMA NORTE	175	1050
LIMA ESTE	168	1894
LIMA SUR	149	1697
CALLAO	74	698
TOTAL	700	6180

La selección se basó en un listado de viviendas ocupadas numeradas de manera consecutiva, proveniente del registro de viviendas que el propio personal de campo del INSM debe efectuar en cada UPM. No se reemplazó ninguna de las viviendas seleccionadas.

Se construyeron tablas de selección de viviendas con el punto de inicio generado de manera aleatoria de acuerdo a una distribución uniforme de probabilidades.

4.2.8.3. Selección de las unidades finales de muestreo (UFM) de adultos. En cada una de las viviendas establecidas se seleccionó de manera aleatoria una persona adulta entre todas las que cumplieran los criterios de inclusión, empleando la tabla de Kish modificada. Para este fin el personal de campo realizó un registro de los miembros del hogar seleccionado e identificó a los adultos elegibles.

En las viviendas donde había más de un hogar, se consideró sólo a las personas integrantes del hogar principal, debido a que era muy pequeña la proporción de viviendas con más de un hogar. No se reemplazó a ninguno de los adultos seleccionados.

4.2.9. CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LOS ADULTOS QUE RESPONDIERON LA ENCUESTA

- Personas adultas de 18 años de edad o más, sin problemas que impidieran la comunicación.

En el caso de existencia de problemas mentales moderados o severos que impidieron la comunicación directa con algún adulto, se procedió a realizar una entrevista indirecta con el jefe del hogar.

5. DEFINICIÓN DE VARIABLES

Para el presente estudio se han acordado las siguientes definiciones operacionales, utilizándose en muchos casos el juicio del equipo multidisciplinario de investigadores del INSM “HD-HN”, conformado por profesionales de las diversas áreas de investigación de la institución (psiquiatras, psicólogos, enfermeras y asistentes sociales).

5.1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

Edad.- Fue registrada como variable cuantitativa continua según unidades de análisis.

Estado civil.- Soltero, casado, conviviente, separado, viudo o divorciado. Escala nominal.

Nivel de instrucción.- Se registran las categorías: sin instrucción, inicial/preescolar, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, bachillerato, superior no universitario, superior universitario, postgrado. Se presentan como alternativas múltiples y se miden como escala ordinal. Para efectos del número de años de instrucción se ha considerado el inicial/preescolar como un año.

Nivel socioeconómico.- El método utilizado fue el nivel de ingresos, el cual fue establecido en base al promedio mensual de los últimos 3 meses (incluyendo horas extra, bonificaciones, pagos por concepto de refrigerios, movilidad o pensiones). Luego, se agrupó arbitrariamente en función de los siguientes estratos según el ingreso promedio mensual (en dólares americanos al tipo de cambio): estrato A, ingresos mayores a \$ 340 mensuales; estrato B, ingresos entre \$ 171 y \$ 340 mensuales; estrato C, ingresos entre \$ 86 y \$ 170 mensuales; y estrato D, ingresos iguales o menores a \$ 85 mensuales. Se decidió esta cifra límite inferior, a pesar de que el sueldo mínimo para setiembre del 2002 era S/. 415 (o 118 dólares americanos), pues según los resultados del estudio, la mediana se encontraba en esta cifra. El dato de los ingresos mensuales tiene sus limitaciones, pues muchas personas no lo van a dar

por temor a ser fiscalizadas, o no están trabajando, o se ocupan de negocios familiares no remunerados y, por lo tanto, no ingresan en el análisis. En este sentido, estas limitaciones dan ventaja a los otros métodos de medición de la pobreza.

Necesidades básicas.- Involucran las necesidades primarias como la alimentación, salud, vestido, vivienda y educación. Es medida en escala nominal.

Nivel de pobreza según autopercepción de capacidad de satisfacción de necesidades básicas con ingresos familiares.- Es una evaluación subjetiva, utilizada para definir pobreza, que involucra una aproximación subjetiva en base a la pregunta formulada a la esposa del jefe del hogar, sobre la capacidad de cobertura de las necesidades básicas en base a los ingresos familiares. Las familias que no podían cubrir las necesidades de alimentación eran consideradas pobres extremas; las familias que cubrían sólo las necesidades básicas de alimentación, pero no otras básicas como salud, educación, vivienda, etc., se calificaban como pobres básicos; las familias que podían cubrir sus necesidades básicas, pero no otras necesidades (como diversión, distracciones, educación diferenciada) eran consideradas no pobres básicos; y aquellas que podían cubrir sus necesidades básicas y otras eran consideradas no pobres. Es medida con escala nominal.

Nivel de pobreza según NBI.- Se refiere a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El método se basa en la definición de necesidades que se incluyen en la medición y el establecimiento de umbrales de satisfacción, o sea, los niveles mínimos que se consideran apropiados. Para considerar a un hogar pobre por NBI, el criterio metodológico utilizado es el no satisfacer al menos una de las necesidades definidas como básicas. En caso de que el hogar tenga dos o más NBI, se le califica como pobre extremo. Si el hogar no tiene ninguna NBI, se lo califica como no pobre. Dentro de las múltiples necesidades básicas insatisfechas que pueden ser utilizadas como indicadores, las utilizadas con más frecuencia han sido: a) hacinamiento; b) vivienda inadecuada; c) abastecimiento inadecuado de agua; d) carencia o inconveniencia de servicios sanitarios para el desecho de excretas; e) inasistencia a escuelas primarias de los menores en edad escolar (pregunta que fue formulada a la esposa del jefe del hogar sobre la existencia de niños menores en edad escolar que no asisten a la escuela por problemas económicos). Estos indicadores fueron utilizados para el presente estudio.

Población económicamente activa.- Comprende a todas las personas de 14 años o más que en la semana de referencia se encontraban trabajando, tenían trabajo pero no se encontraban trabajando y las que se encontraban buscando trabajo.

Sexo.- Masculino y femenino. Escala nominal.

5.2. ASPECTOS GENERALES DE SALUD MENTAL

Autoeficacia.- Creencia de ser capaz de conducir un curso vital autodeterminado y activo, controlando las demandas ambientales mediante acciones adaptativas. Medida en escala ordinal.

Autoestima.- Conciencia subjetiva de sí mismo que condiciona un estado afectivo y una valoración en relación a las expectativas e ideales. Medida en escala ordinal.

Calidad de vida.- Estado de bienestar físico, emocional, social y espiritual de la persona. Es medida con la escala de Índice de Calidad de Vida de Mezzich, en una escala de intervalo.

Calidad del sueño.- Conjunto de características del acto de dormir que permiten juzgar su valor como "bastante bueno", "bueno", "malo" y "bastante malo". Igualmente valora la latencia, duración y eficiencia del sueño; así como la existencia de perturbaciones del sueño, la necesidad de tomar medicación para dormir y la presencia de disfunción diurna. Se mide en una escala ordinal.

Cohesión familiar.- Se refiere a la fuerza de los lazos que unen a los miembros de una familia, y se traduce en conductas y sentimientos, tales como respeto y apoyo mutuo, orgullo familiar, compartir actividades, principios y valores o participación en el progreso familiar. Se mide en una escala ordinal.

Compartir pensamientos y sentimientos.- Apoyo interpersonal expresado como grado en que se comparten pensamientos y sentimientos con personas del entorno. Escala ordinal.

Conducta suicida.- Acción realizada para quitarse la vida, que puede culminar en el acto suicida. En el espectro suicida se exploran desde los deseos de morir, los pensamientos y planeamientos suicidas hasta el intento suicida.

Confianza en autoridades.- Apreciación subjetiva sobre el grado de confianza en diversas autoridades y líderes del entorno. Escala ordinal.

Consideraciones heteroagresivas.- Pensamientos o ideas de provocar daño a alguien, incluyendo ideas homicidas. Escala nominal.

Discriminación.- Actitudes teñidas de una valoración negativa hacia un objeto; implica el no reconocimiento de iguales derechos con los discriminados y conlleva conductas que van desde el rechazo hasta la violencia. Es considerada un estresor psicosocial. Escala nominal y ordinal.

Ejercicio físico.- Conjunto de movimientos corporales realizados para mantener o mejorar el estado físico. Escala nominal.

Estados anímicos prevalentes.- Estados del humor o anímicos constantes, presentes la mayor parte del tiempo. Escala ordinal.

Estrés.- Es el conjunto de reacciones físicas, bioquímicas o emocionales que ocurren en una persona como respuesta a una situación determinada que implica demanda, exigencia, privación o abuso. Puede producir enfermedad física o trastorno de salud mental; por ejemplo, ansiedad y depresión, entre otras. Es medido en una escala nominal.

Estrés ambiental.- Es el estrés producido por estímulos del entorno físico en el que se desenvuelve la persona, como por ejemplo, ruidos, mal olor, pobre ventilación, espacios reducidos, etc. Se evalúa a través del grado de malestar que causa, a través de una escala ordinal.

Estresores cotidianos.- Eventos o condiciones a los que se enfrenta toda persona en el área personal, familiar, laboral, social y comunitario o en los contextos político, económico y cultural. Escala ordinal.

Estresores familiares.- Eventos o condiciones traumáticas en la familia que implican estados de tensión. Escala nominal.

Estresor psicosocial.- Es un evento existente en el ambiente familiar, el trabajo, las relaciones sociales y comunitarias, o en los contextos económico, político y cultural, que producen estrés en la persona entrevistada. Es medido en una escala ordinal.

Estresores por violencia terrorista.- Experiencias traumáticas por haber sufrido o sido testigo de algún acontecimiento en que han muerto o desaparecido personas, algún familiar fue detenido o estuvo en prisión, alguna pérdida de bienes o cambio de residencia originados por la violencia en la época del terrorismo. Escala nominal.

Eventos vitales negativos antes de los 18 años.- Experiencias negativas o traumáticas de separación de los padres, haber sido objeto de abuso físico o sexual, abandono; haber sufrido algún miembro de la familia situaciones de riesgo o amenazas a su integridad física; pérdida o separación de algún familiar cercano ocurridas antes de los 18 años de edad. Escala nominal.

Indicadores suicidas.- Diferentes aspectos del espectro suicida: deseos de morir, pensamientos o ideación suicida, planeamiento del suicidio o intento suicida. Escala nominal.

Opinión sobre los problemas del país.- Es la apreciación subjetiva de la persona entrevistada acerca de cuáles son los principales problemas del país. Se mide en escala nominal.

Percepción de apoyo.- Valoración subjetiva del grado de apoyo en general recibido de las personas del entorno. Escala ordinal.

Permisividad frente a la psicopatía.- Se ha medido a través de preguntas a ciertas conductas, como si ven a una persona robando en una tienda o en un mercado y no hacen nada, o declararon que, ante determinadas circunstancias difíciles, es permitido robar. Se mide en escala nominal.

Problemas percibidos en el país.- Apreciación subjetiva acerca de cuáles son los principales problemas que aquejan al país. Escala nominal.

Recursos comunitarios.- Infraestructura deportiva, cultural y social de la comunidad donde se vive. Escala nominal.

Resiliencia.- Capacidad personal para seguir proyectándose hacia el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas a veces graves. Medida en escala ordinal.

Satisfacción laboral.- Es la evaluación subjetiva acerca del cumplimiento de sus necesidades y expectativas en el ambiente laboral en áreas como: funciones ejercidas, remuneración percibida, ambiente físico, compañeros de trabajo, carga laboral, trato y reconocimiento de parte de los jefes. Es medida en una escala ordinal.

Satisfacción personal.- Es una autoevaluación acerca del cumplimiento de sus necesidades, deseos y expectativas personales con relación a su aspecto físico, inteligencia, estudios, relaciones sociales y economía. Es evaluada en una escala de tipo ordinal.

Satisfacción con la vida.- Mide el grado subjetivo de satisfacción global con la vida, respecto a diversos aspectos personales como: color de la piel, aspecto físico, inteligencia, nivel económico, profesión u oficio, nivel educativo alcanzado, religión que profesa, relaciones sociales y lugar de residencia. Escala ordinal.

Sentimientos frente a los problemas nacionales.- Estados afectivos frente a los principales problemas percibidos en el país.

Sentimientos de protección.- Sensación de seguridad generada por diversas instituciones y organizaciones del entorno social y cultural. Escala ordinal.

Tendencias psicopáticas en el adulto.- Son consideradas con estas características las personas que ocasionalmente han adquirido objetos de muy dudosa procedencia o robados, o han participado en un robo alguna vez, o mienten mucho desde que son adultos u ocasionalmente han ganado dinero vendiendo cosas de dudosa procedencia o robadas. Se mide en escala nominal.

Tendencias religiosas.- Incluyen la afiliación y/o participación de la persona en una religión, lo que se manifiesta en sus cogniciones, sentimientos y prácticas. Se mide en una escala nominal.

Tendencias violentas en el adulto.- Se pregunta si, desde que son adultas (≥ 18 años), alguna vez han agredido a un niño y le han dejado moretones, o han estado en más de una pelea que haya acabado a golpes, o alguna vez en una pelea han usado armas como piedras, palos, cuchillos (navajas) o pistolas. Se mide en escala nominal.

Uso de sustancias.- Patrones de consumo de alguna sustancia psicoactiva que puede generar consumo perjudicial o dependencia. Este aspecto se mide con los criterios de investigación de la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición (CIE-10), en una escala nominal.

Uso del tiempo libre.- Administración del tiempo en que se desarrollan actividades recreativas o sociales. No incluye el utilizado en trabajo o estudios. Se mide en escala nominal.

5.3. TRASTORNOS CLÍNICOS (MENTALES)

Trastornos adictivos.- Problemas de consumo (uso perjudicial o dependencia) de alcohol, tabaco u otras sustancias legales o ilegales. Son medidos con un instrumento (MINI) que deriva en diagnósticos psiquiátricos con criterios de investigación de la CIE-10, en una escala nominal.

Trastornos afectivos.- Se refieren al episodio depresivo moderado a severo, distimia y episodio maníaco. Son medidos con un instrumento (MINI) que deriva en diagnósticos psiquiátricos en base a criterios de investigación de la CIE-10, en una escala nominal.

Trastornos de ansiedad.- Corresponden a todos los trastornos de ansiedad clínicamente diagnosticables, como el de ansiedad generalizada, la fobia social, la agorafobia, el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés post-traumático. Son medidos con un instrumento (MINI) que deriva en diagnósticos psiquiátricos con criterios de investigación de la CIE-10, en una escala nominal.

Trastornos de la alimentación.- Corresponden a la bulimia y a la anorexia nerviosas. Son medidos con un instrumento (MINI) que deriva en diagnósticos psiquiátricos con criterios de investigación de la CIE-10, en una escala nominal. A su vez, se ha utilizado el cuestionario de EDI-2.

Trastornos psicóticos.- No es una categoría diagnóstica en sí. Son medidos con el MINI que incluye una lista de síntomas psicóticos como delusiones a fenómenos alucinatorios medidos en una escala nominal. Se ha considerado positiva cuando al menos existe un síntoma referido en el MINI con convencimiento pleno del mismo y al menos un mes de duración.

5.4. DISCAPACIDAD E INHABILIDAD

Inhabilidad.- Condición en la cual el individuo, sin tener un trastorno mental, no ha desarrollado las habilidades suficientes para funcionar como persona en el medio social y de trabajo. Se mide con una escala ordinal.

Discapacidad psiquiátrica.- Disminución o pérdida de la capacidad para funcionar como persona en el medio familiar, social y del trabajo a consecuencia de un trastorno mental. Se mide con una escala ordinal.

Discapacidad física.- Limitación para desempeñarse como individuo en el medio social y del trabajo a consecuencia de una lesión de tejido, alteración funcional o fisiológica, generada por un traumatismo o enfermedad orgánica. Se mide con una escala nominal.

5.5. MÓDULO DE ACCESO A SERVICIOS

Acceso a servicios de salud mental.- Se refiere a la utilización de servicios de salud, basándose en la percepción de problemas de salud mental (morbilidad sentida) por parte del entrevistado y en la exploración de las características de la búsqueda de ayuda. Se consideró presente si el entrevistado respondía afirmativamente a haber recibido atención (morbilidad sentida expresada) en cualquier establecimiento de salud, es decir, posta, centro de salud, policlínico, hospital general o centro especializado. Es medida a través de una escala nominal.

Barreras en el proceso de búsqueda de atención.- Respuesta a preguntas sobre motivos que influyeron en el no-acceso o acceso tardío a la atención. Es medida con escala nominal.

Morbilidad sentida.- Se refiere a aquel grupo de personas que han percibido problemas emocionales o de nervios, como excesiva depresión, pena o tristeza, ataques de nervios, excesivo miedo,

tensión o ansiedad, dificultad para relacionarse socialmente, problemas con alcohol o drogas, etc., independientemente de si consideran que requieren o no atención. Se mide con una escala nominal.

Morbilidad sentida expresada.- Se refiere a aquellas personas que -habiendo percibido problemas emocionales o de los nervios como depresión, excesiva pena o tristeza, ataques de nervios, excesivo miedo, tensión o ansiedad, dificultad para relacionarse socialmente, problemas con alcohol o drogas, etc.- han acudido en busca de atención. Se mide con una escala nominal.

Prejuicios sobre la salud mental.- Son aquellos mitos, conceptos populares y suposiciones que se encuentran en el ámbito de las representaciones sociales y que influyen en la percepción y conductas de los individuos. En la confección y elección de estas preguntas participó el equipo multidisciplinario de investigadores del INSM "HD-HN", conformado por profesionales de las diversas áreas de investigación de la institución (psiquiatras, psicólogos, enfermeras, tecnólogos médicos y asistentes sociales), y dichas preguntas fueron ajustadas de acuerdo al ensayo piloto antes referido. Se mide con una escala nominal.

5.6. RELACIONES INTRAFAMILIARES

Estilos de crianza.- Son aquellas formas y actitudes que demuestran los padres con sus hijos y que devienen en formas de crianza que pueden o no generar problemas emocionales futuros. Se mide con una escala nominal.

Maltrato.- Conducta o conjunto de conductas que ocasiona (n), causa (n) o provoca (n) en una o más personas perjuicio, daño, sufrimiento, malestar y/o perturbación. Existen dos tipos fundamentales de maltrato, los cuales deben considerarse íntimamente relacionados: maltrato físico y maltrato psíquico.

Violencia.- La violencia es un comportamiento deliberado que ocasiona daños físicos, psicológicos o emocionales a través de amenazas, ofensas o agresiones físicas. Por norma general, se considera violenta a la persona irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a quien pese y caiga quien caiga.

Violencia física.- Es la acción de dar golpes, puñetes o empujones. Es evaluada en una escala ordinal que mide la frecuencia del acto. Se mide con una escala nominal.

Violencia por abandono.- Se refiere a situaciones en que a la persona no le han procurado medicinas, ropa adecuada, atención médica o la satisfacción de otras necesidades básicas. Es asumida como sinónimo de maltrato por abandono. Se mide con una escala nominal.

Violencia psicológica.- Son insultos, agresiones verbales, ofensas, chantajes, manipulaciones o humillaciones. Se mide con una escala nominal.

5.7. SÍNDROMES SOCIOCULTURALES Y SALUD MENTAL

Daño, brujería.- Síndrome folklórico muy común en las tres regiones del Perú, de variada sintomatología y evolución crónica. El resultado del daño puede incluir sintomatología física y psicológica. El tratamiento propuesto es a base de rituales mágico-religiosos asociados a rezos, oraciones y cantos. Se mide con una escala nominal.

Susto.- Se produce, según la creencia popular, cuando en la persona el espíritu abandona su cuerpo debido a una fuerte impresión, experiencia o accidente grave que producen miedo o susto súbitos e intensos. Se mide con una escala nominal.

Mal de ojo, ojeo.- Frecuente en los niños. Se produce según la creencia popular por la acción mágica de la mirada fuerte de una persona sobre otra. Incluye síntomas físicos y psicológicos. Se mide con una escala nominal.

Aire.- En el folklor médico peruano, el “aire” es el supuesto agente etiológico más frecuente de un sinnúmero de enfermedades. Estas enfermedades presentan síntomas físicos y psicológicos. Se mide con una escala nominal.

Chucaque.- Se presenta frente a una situación de vergüenza. Sus síntomas principales son cefaleas y trastornos digestivos. Se mide con una escala nominal.

5.8. OTRAS MANIFESTACIONES DEL FOLKLOR MÉDICO

Estas manifestaciones, sin llegar a constituir verdaderos síndromes folklóricos, incluyen componentes físicos y psicológicos atendidos generalmente por agentes del modelo folklórico.

Ataque / mal del corazón.- Se le llama así a la presencia de convulsiones asociadas a síntomas psicológicos. Localizan el mal en el corazón. Ha sido estudiado ampliamente en los pueblos del Callejón de Huaylas.

Ataque de nervios.- En cada región del Perú tiene sintomatología y significación diferente.

Abuso de consumo de bebidas alcohólicas.- Constituye una manifestación de mala salud mental, recién en los últimos años, según la perspectiva de muchos pobladores peruanos.

6. INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE CONSTRUYÓ EL CUESTIONARIO

Se utilizaron instrumentos empleados en anteriores estudios epidemiológicos del INSM HD-HN. Estos instrumentos están compuestos por un grupo de escalas, las cuales han sido evaluadas a través de estudios pilotos y focus groups, especificados más adelante, y adaptadas a partir de la experticia de los equipos especializados en las distintas áreas. Para las propiedades psicométricas del instrumento, se remite al lector al estudio de confiabilidad y validez de los cuestionarios publicados y que se comentan en la presentación de los instrumentos⁹⁵. Los cuestionarios utilizados fueron elaborados a partir de los siguientes instrumentos:

Cuestionario de Salud Mental.- Elaborado originalmente en Colombia y utilizado y adaptado en estudios anteriores en la institución tanto en adultos, como en adolescentes⁴³. La adaptación original y utilización de este instrumento tuvo el propósito de contar con una herramienta práctica que permitiera evaluar el nivel de salud mental de una población. Es aplicable a poblaciones grandes o pequeñas; nacionales, regionales, departamentales, provinciales o distritales, resaltándose su adecuación cultural. Su aplicación resulta sencilla y no requiere de experiencia clínica experta. Sus secciones recogen información sobre uso de sustancias, conductas antisociales, síntomas de estrés emocional, conductas de auto y heteroagresividad, soporte social, estresores psicosociales, etc. Con el objetivo de ampliar la exploración de la salud mental se incorporaron preguntas y escalas para profundizar los temas o examinar otros, como conductas suicidas, discapacidad o inhabilidad, eventos vitales antes de los dieciocho años, actitudes hacia los problemas emocionales, discriminación, estresores por violencia terrorista, estados de ánimo prevalentes y conducta religiosa. El coeficiente de confiabilidad de alpha de Cronbach encontrado para algunos de sus componentes es: confianza en autoridades: 0,751; estresores cotidianos: 0,757; estado anímicos prevalentes: 0,826; satisfacción personal: 0,688; satisfacción laboral: 0,813; SRQ modificado: 0,861; cohesión familiar: 0,794; estresores ambientales: 0,817; funcionamiento adaptativo: 0,732; soporte familiar: 0,887; discriminación: 0,67; estresores por la violencia terrorista: 0,635.

Escala de Discapacidad e Inhabilidad.- elaborado por los investigadores del INSM, evalúa cuestiones relacionadas con el funcionamiento o discapacidad, tomando las cuatro áreas sugeridas por WHO DAS-S⁹⁶ y el IGDA⁹⁷; auto-cuidado, funcionamiento ocupacional, funcionamiento familiar y funcionamiento social. Se añadió un quinto elemento relacionado a la autodirección. Cada ítem tiene

una calificación en una escala de 5 puntos - ninguno, mínima, moderada, grave, total o absoluta. La consistencia interna de esta escala fue 0,909, según el coeficiente alfa de Chronbach; las preguntas se agruparon en una única dimensión.

Índice de Calidad de Vida.- Elaborado y validado por Mezzich y colaboradores en una versión española⁹⁸. Es un cuestionario compuesto de 10 ítems que recogen los aspectos de la calidad de vida más frecuentemente utilizados para evaluar este constructo, como: bienestar físico, bienestar psicológico, autocuidado y funcionamiento independientes, ocupacional, interpersonal, apoyo social-emocional, apoyo comunitario, sentimientos de plenitud, así como una valoración global. El instrumento fue adaptado en una versión para la población peruana, validado en el estudio de Lima. En Lima el instrumento demostró un alpha de chronbach de 0,867.

EMBU (Egna Minnen av Bardoms Uppfostran) (Propia memoria acerca de la crianza).- Creado por Perris y cols. en 1980 para evaluar catorce aspectos o cualidades de la conducta parental, a partir del recuerdo de la conducta de crianza de los padres. El instrumento original se compone de 81 ítems más dos ítems para ver la consistencia y estrictez de la conducta parental, un ítem para explorar si el sujeto adoptaría las conductas de crianza de sus padres y un ítem para evaluar el método de los padres. Para el Estudio Epidemiológico Metropolitano de Salud Mental realizado en Lima y Callao en el año 2002 por el INSM, se seleccionaron 13 ítems que tuvieron una carga más alta en cada uno de los factores identificados por Someya y colaboradores⁹⁹, y se agregó un nuevo ítem referente al control sin afecto basado en observaciones de Henderson¹⁰⁰, formándose la escala con 14 ítems en total, con respuestas dicotómicas. Posteriormente, para el Estudio Epidemiológico de la Sierra Peruana en el año 2003, con el aporte de los investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental se retiró un ítem por considerársele redundante y se agregaron cinco ítems considerando otras conductas de crianza, como actitudes machistas de crianza, respeto y autonomía, y ampliando la sobreprotección, quedando finalmente la escala con 18 ítems. Para la población del estudio epidemiológico de la Selva se realizó el análisis de consistencia interna con el alpha de Cronbach se encontró en 0,741, identificándose tres dimensiones: la primera relativa a la afectividad, tanto positiva como negativa; la segunda referida a la sobreprotección y favoritismo con respecto a los hermanos; y la tercera a sobreprotección y exigencias. Durante la validación lingüística de los instrumentos utilizados en los estudios epidemiológicos realizados por el INSM en las diversas regiones del país, se incluyó el afinamiento de estas preguntas.

MINI: Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional versión española CIE-10^{4,101}.- Elaborado por Sheehan, Lecrubier y colaboradores. Es un instrumento basado en los Criterios de Investigación de la CIE 10, y obtiene información estandarizada sobre los principales trastornos psiquiátricos. Ha sido validado por sus autores y ha mostrado una adecuada concordancia con instrumentos de evaluación importantes¹⁰², con la ventaja de ser de fácil aplicación (15 minutos en promedio) y no requerir entrenamiento tan intenso como otros instrumentos. Para el Estudio Epidemiológico Metropolitano de Lima fue adaptado lingüísticamente a través del ensayo piloto en personas residentes de cien viviendas provenientes de cada cono de Lima Metropolitana y Callao. El instrumento fue adaptado para obtener prevalencia de vida, prevalencia a seis meses, además de la prevalencia actual de los principales desórdenes psiquiátricos. En la Sierra y en la Selva fue nuevamente validado lingüísticamente a través de pruebas en campo y *focus groups*. En el caso del episodio depresivo, la versión utilizada en español del MINI CIE-10, coincidente con la versión en español de los Criterios de Investigación de la CIE-10 editada por MEDITOR y J.J. López Ibor¹⁰³, considera solo el episodio depresivo moderado a severo. En el caso del episodio psicótico, siguiendo la sugerencia del MINI, se ha considerado la presencia de al menos un síntoma psicótico. En todo caso se consideró positivo el síntoma psicótico siempre y cuando existiera un completo convencimiento del síntoma y el síntoma hubiera estado presente al menos un mes. El análisis psicométrico de los síntomas de cada uno de los trastornos estudiados fue el siguiente en términos del alpha de chronbach: agorafobia 0,794; trastorno de pánico 0,835; fobia social 0,874; trastorno de ansiedad generalizada 0,888; trastorno de estrés post-traumático 0,842; episodio depresivo 0,665; distimia 0,874; episodio psicótico 0,735; dependencia al alcohol 0,748.

Cuestionario sobre determinantes del acceso a los servicios de salud en el Perú.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática introdujo preguntas sobre acceso a servicios de salud para la Encuesta Nacional de Hogares 1998⁵¹. Algunas de estas preguntas fueron adaptadas para el modelo

de la salud mental y se agregaron otras más en base a la revisión de la literatura. La identificación del grupo de estudio se realizó a través de la pregunta: “¿Alguna vez en su vida ha tenido algún problema con sus nervios o de tipo emocional, como por ejemplo excesiva ansiedad, depresión o preocupación, dificultad para relacionarse socialmente o para controlar sus pensamientos o problemas relacionados con el consumo de alcohol o drogas?”. Si la respuesta era positiva se ubicaba el último periodo en el que se había padecido el problema para establecer el tiempo de referencia de 12 meses e indagar sólo en ellos, sobre la temática del acceso y sus características. A través de esta pregunta de autopercepción se evalúa la demanda tal y como se comporta naturalmente.

Escala de autoestima de Rosenberg.- Elaborada por Rosenberg¹⁰⁴ en 1965 y adaptada al medio por Pequeña¹⁰⁵ en 1999. Es una escala de amplio uso y probada validez y confiabilidad. Consta de diez ítems para la evaluación de autoestima, divididos equitativamente en positivos y negativos, que se contestan en una escala de 4 alternativas que van desde “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo”. El puntaje se establece entre 10 y 40. La validación de la versión española realizada en estudiantes universitarios obtuvo una distribución similar a la normal con una correlación ítem-total entre 0,44 y 0,77, y un alfa de Cronbach de 0,85 y una correlación test-retest de 0,84¹⁰⁶. En nuestro medio un estudio realizado en adolescentes en Lima Metropolitana encontró un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,80 y correlaciones ítem-total entre 0,33 y 0,59 y un promedio de 32,59 en varones y 31,12 en mujeres¹⁰⁷. El promedio general observado en un estudio realizado en estudiantes universitarios de 53 naciones fue de 30,85, desde 25,50 en Japón hasta 33,59 en Serbia¹⁰⁸. Un estudio en una muestra chilena en la ciudad de Santiago encontró una media de 32,47¹⁰⁹.

Escala de satisfacción con la vida de Diener^{110,111}.- Elaborada en 1985 por Diener y colaboradores. Se trata de una escala de 5 ítems en cuya presentación original el autor encontró un alpha de 0,87, correlación test-retest de 0,82 a los dos meses y correlaciones ítem-test entre 0,57 y 0,75. El análisis factorial extrajo un único factor que explicaba el 66% de la varianza. Posteriormente también ha demostrado propiedades psicométricas adecuadas en otras muestras^{112,113,114} y ha sido adaptada al medio por Ly¹¹⁵ en el 2004 utilizando 5 puntos en vez de 7 como en el original. Esta escala de 5 fue la utilizada para este estudio por ser de más fácil uso. En líneas generales el puntaje neutral en la escala de satisfacción con la vida se ha considerado 15, por lo que un puntaje de 16 a 20 se considera como satisfecho; de 14 a 10, insatisfecho; 21 a 25, muy satisfecho; 5 a 9, muy insatisfecho.

Escala de autoeficacia de Schwarzer y Jerusalem¹¹⁶.- Construida en 1979 y adaptada en 1998 al medio por Alcalde¹¹⁷. Consta de diez ítems. Es una escala que mide la autoeficacia general y fue desarrollada en 1979 por Schwarzer y Jerusalem en Alemania. Mide la percepción que tiene la persona respecto de sus capacidades para manejar en su vida diaria diferentes situaciones estresantes. Más tarde, en 1981, se redujo esta versión alemana de 20 a 10 reactivos¹¹⁸, en una nueva versión que es la que hemos utilizado en este estudio. Esta versión ha sido validada en la población chilena¹¹⁹, española¹²⁰ y peruana¹¹⁸. El estudio de validación en Chile fue realizado en una muestra de 360 sujetos comprendidos entre las edades de 15 y 65 años, encontrando un puntaje promedio de 34,18, una moda de 40 y una mediana de 35. El estudio de validación peruano se realizó en estudiantes universitarios y se encontró un puntaje promedio de 33.

Escala de resiliencia del Yo de Block y cols.¹²¹.- Data de 1989, y se adaptó lingüísticamente en el INSM “HD-HN”. Consta de catorce ítems, con 4 puntos (nada cierto, poco cierto, regularmente cierto, muy cierto). A mayor puntaje, mayor resiliencia. El puntaje va desde 14 hasta 56. Una investigación, realizada en muestras de sujetos en Italia, España y Estados Unidos demostró que la escala tenía propiedades psicométricas estables entre distintos contextos culturales y de idiomas¹²². Estudios en universitarios norteamericanos han encontrado un puntaje promedio de 41,13¹²³; otro estudio en estudiantes universitarios en Kuwait encontró un promedio de 40,59. Los varones obtuvieron los puntajes promedio más altos¹²⁴.

Índice de calidad de sueño de Pittsburgh¹²⁵.- Esta escala fue desarrollada por Buysse y colaboradores para evaluar la calidad del sueño durante el mes previo y para distinguir las personas que duermen bien de las que duermen mal. Esta escala ha sido validada en diversos países y traducida a muchos idiomas incluyendo el español. La calidad de sueño es un fenómeno complejo que involucra varias

dimensiones. El instrumento consta de 19 preguntas de autoevaluación que incluyen 5 preguntas dirigidas al compañero de habitación. Estas preguntas derivan en 7 componentes: calidad de sueño, latencia, duración, eficiencia, perturbaciones del sueño, uso de medicación para dormir y disfunción diurna. Buysse y colaboradores encontraron en el estudio original una consistencia interna elevada para los 19 ítems (alpha de Cronbach: 0,83). La suma de las puntuaciones de estos componentes da una puntuación que va desde 5 hasta 21. Una puntuación menor de 5 se considera "sin problemas de sueño". Una puntuación de 5 a 7 como "merece atención médica", una puntuación de 8 a 14 como "merece atención y tratamiento médico" y, una puntuación de 15 a más, "se trata de un problema de sueño grave". Se ha utilizado el instrumento de la validación colombiana¹²⁶, la cual ha sido adaptada lingüísticamente durante el *focus group* realizado como parte del estudio piloto en este estudio. En nuestro medio este instrumento ha sido utilizado en estudios de población universitaria mostrando una confiabilidad por encima de 0.50 con respecto al alpha de Cronbach¹²⁷ y una correlación significativa con Escala de Somnolencia Epworth¹²⁸. Para el análisis se utilizaron las respuestas que contenían todos los componentes completos expandido 0,45 pto.

6.1. DISEÑO DE LA ENCUESTA Y ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO SOBRE SALUD MENTAL

La presente descripción del cuestionario incluye todos los capítulos del Estudio Epidemiológico de Salud Mental en áreas poblacionales de Lima Metropolitana 2012, unidad de análisis del adulto.

6.1.1. TIPO DE ENCUESTA

La encuesta es de derecho, es decir, la población de estudio está constituida por todos los residentes habituales de los hogares adultos.

6.1.2. COBERTURA DE LA ENCUESTA

Cobertura geográfica.- La encuesta se realizó a nivel urbano en las cinco áreas poblacionales de Lima Metropolitana.

Cobertura temporal.- La encuesta se desarrolló de mayo a diciembre de 2012.

Cobertura temática y periodos de referencia.- La cobertura temática de la investigación comprende:

- a. Variables demográficas y socioeconómicas.
 - i. Características de la vivienda (día de la entrevista).
 - ii. Educación (día de la entrevista).
 - iii. Empleo e ingreso familiar (3 últimos meses).
 - iv. Gasto familiar (mes anterior).
- b. Aspectos de salud mental general.
 - i. Autoestima (últimos 3 meses).
 - ii. Rasgos psicopáticos (día de entrevista, últimos 12 meses, de vida).
 - iii. Problemas de la conducta alimentaria (últimos 12 meses).
 - iv. Confianza (día de la entrevista).
 - v. Cohesión familiar (últimos 12 meses).
 - vi. Sensación de soporte social (día de la entrevista).
 - vii. Sensación de seguridad ciudadana (día de la entrevista).
 - viii. Calidad de vida (último mes).
 - ix. Funcionamiento personal, laboral, social, familiar (último mes).
 - x. Nivel de conocimiento sobre aspectos de salud mental (día de la entrevista).
 - xi. Problemas relacionados con el género (día de la entrevista).
 - xii. Discriminación (de vida, últimos 12 meses).

- xiii. Eventos de vida.
 - xiv. Estigma hacia la salud mental (actual).
 - xv. Problemas de sueño (últimas 4 semanas).
 - xvi. Confianza en autoridades (actual).
 - xvii. Estrésores psicosociales (actual).
 - xviii. Sentimientos anímicos prevalentes (actual).
 - xix. Satisfacción personal (actual).
 - xx. Satisfacción laboral (actual).
 - xxi. Indicadores suicidas (actual, 6 meses, año, vida).
 - xxii. Estilos de crianza (vida).
 - xxiii. Acontecimientos familiares (anual).
 - xxiv. Experiencias vinculadas al terrorismo (vida).
 - xxv. Uso del tiempo libre (actual).
 - xxvi. Actividades religiosas (actual).
 - xxvii. Estrés ambiental (actual).
 - xxviii. Recursos recreativos comunitarios (actual).
 - xxix. Satisfacción con la vida (actual).
 - xxx. Autoeficacia (actual).
 - xxxi. Resiliencia (actual).
- c. Trastornos clínicos psiquiátricos según la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición (CIE-10).
- i. Trastornos de ansiedad (de vida, 12 meses, 6 meses, actual; acceso a servicios, 12 meses).
 - 1. Agorafobia.
 - 2. Trastorno de pánico.
 - 3. Fobia social.
 - 4. Trastorno obsesivo-compulsivo.
 - 5. Trastorno de ansiedad generalizada.
 - 6. Trastorno de estrés post-traumático.
 - ii. Trastornos afectivos (de vida, 12 meses, 6 meses, actual; acceso a servicios, 12 meses).
 - 1. Episodio depresivo moderado o severo.
 - 2. Distimia.
 - 3. Episodio maníaco.
 - iii. Trastornos de la conducta alimentaria (actual).
 - 1. Bulimia nerviosa.
 - 2. Anorexia nerviosa.
 - iv. Trastornos adictivos (últimos 12 meses).
 - 1. Alcohol (dependencia/consumo perjudicial).
 - 2. Otras drogas (dependencia/consumo perjudicial).
 - v. Trastornos psicóticos (de vida, anual, 6 meses, actual).
- d. Acceso general a la atención en servicios de salud mental (últimos 12 meses).
- e. Aspectos socioculturales.

6.1.3. ESTRUCTURA DE LOS CUESTIONARIOS

Los cuestionarios utilizados, elaborados a partir de los instrumentos anteriormente señalados y de la creación de nuevos reactivos por los investigadores de las diferentes áreas, y estructurados en seis módulos, fueron los siguientes:

- 01.B Módulo de datos generales adulto
- 02. Módulo de salud integral del adulto

- 04 Módulo de síndromes clínicos A
- 05 Módulo de síndromes clínicos B
- 06 Módulo de acceso a servicios
- 10 Módulo de síndromes culturales

6.2. MÉTODO DE LA ENTREVISTA

Se empleó el método de entrevista directa, con personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin y que visitó las viviendas seleccionadas durante el período de recolección de información.

6.3. PROCESOS DE VALIDACIÓN Y CALIDAD

En la fase inicial de construcción de los cuestionarios para los estudios epidemiológicos del INSM "HD-HN" se revisaron y seleccionaron diversos instrumentos que sirvieron de base para su elaboración. Asimismo, se crearon reactivos para cubrir otros temas de investigación. Las preguntas fueron sometidas a diversos procesos: adaptación, validación de contenido y pruebas piloto, culminándose con la definición de los cuestionarios utilizados para el primer estudio epidemiológico realizado en Lima el 2002²⁰. En los años 2003 y 2004 en que se realizaron los estudios de la Sierra¹³ y Selva¹⁴ los cuestionarios fueron mejorados, se reajustaron preguntas y opciones de respuesta y se crearon otras; en este proceso el juicio de los investigadores como expertos en los diferentes temas fue central en la validación. Desde entonces se han mantenido con variaciones menores en los estudios posteriores de Fronteras, Costa, Lima rural, Sierra rural y Selva rural.

Inicialmente se realizó la validez de contenido de los reactivos con la participación de los expertos e investigadores del INSM "HD-HN". Luego fueron sometidos a una prueba de campo con 10 pacientes y diez personas supuestamente sanas. Ya reajustados, se procedió a realizar un ensayo a través de entrevistas a residentes de 100 viviendas de Lima. Luego de los análisis se obtuvo la versión que se utilizó en el estudio de Lima. En base a la experiencia de campo en ese primer estudio y a los reportes estadísticos preliminares, se analizaron exhaustivamente los reactivos y se crearon otros, realizando el análisis del contenido y la adaptación para asegurar su comprensión a través de un estudio piloto, definiéndose así los cuestionarios a emplearse en el estudio epidemiológico de la Sierra. Similar método se siguió en la revisión de los cuestionarios para el estudio epidemiológico de la Selva, agregándose el método de focus group con cada una de las unidades de análisis en la ciudad de Pucallpa. Posteriormente se introdujeron otros reactivos, respondiendo a la necesidad de explorar otros aspectos de la salud mental. Se ha seguido el mismo procedimiento en los estudios epidemiológicos posteriores.

Asimismo, se efectuó un estudio para determinar la concordancia del registro de los datos por pares de entrevistadores en cincuenta unidades de análisis del mismo número de viviendas que durante el estudio epidemiológico de la Sierra. Se hallaron entonces valores del índice kappa entre 0,899 y 0,973 y coeficientes de correlación de Spearman entre 0,807 y 0,964.

Actividades de la supervisión y control de calidad

La supervisión fue constante, tanto durante el recojo de la información como en la calidad de la información, a través de seguimientos presenciales, análisis de gabinete y análisis cuantitativos. Hubo controles en campo a través de supervisores locales y nacionales. La supervisión incluyó: comprobación de actualización cartográfica, verificación de registro de viviendas y establecimientos, verificación de selección de viviendas e informantes, observaciones directas de entrevistas, control de avance con relación a tasa de no respuesta, verificación de distribución de la muestra por sexo y edad, re-entrevistas y control de concordancias, análisis de gabinete de la información recolectada, etc. Se realizó una doble digitación de los datos y un procesamiento de control de calidad y consistencia de la información recolectada.

6.4. OBTENCIÓN DE INDICADORES DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD A PARTIR DE LOS PROPIOS DATOS DE ESTUDIO

Como parte del proceso de validación de los reactivos de los cuestionarios, con los datos obtenidos en los estudios epidemiológicos de Lima y de la Selva, se llevó a cabo el análisis estadístico de la confiabilidad a través del Alpha de Cronbach y de la validez mediante el análisis factorial de correspondencias múltiples y del análisis de componentes principales categóricos, como ya se ha informado⁹⁴. En líneas generales, el análisis estadístico de la confiabilidad a través del Alpha de Chronbach mostró resultados favorables (alpha de Chronbach $> 0,70$) en la mayoría de las áreas evaluadas, tanto en aspectos de salud mental general como en relación a los síntomas o criterios de los distintos trastornos, mostrando por lo tanto una elevada consistencia interna. La mayoría de reactivos analizados mostró una sola dimensión -por lo tanto, favorable- con relación a la validez interna del instrumento en general.

Los análisis estadísticos sobre confiabilidad y validez aludidos previamente se efectuaron sobre reactivos individuales y sobre escalas o instrumentos completos incorporados en los módulos. Los valores que indicaban confiabilidad de los reactivos fueron en general adecuados, y las dimensiones y factores aislados permitieron confirmar la validez del constructo y sugerir posibilidades de interpretación de los resultados⁹⁴.

6.5. ENTRENAMIENTO EN EL USO DE INSTRUMENTOS

Actividades de capacitación

Un componente importante del estudio epidemiológico fue el entrenamiento de los encuestadores y supervisores locales, a través de capacitaciones brindadas por los autores.

La capacitación técnica de los supervisores locales y encuestadores fue responsabilidad de los investigadores del INSM "HD-HN". El objetivo era desarrollar un conocimiento profundo de la problemática a estudiar, orientado a los temas de salud mental y a los posibles problemas a encontrar en la exploración de este tipo de temas. Asimismo, se puso énfasis en la técnica de la entrevista y los cuidados en ella. La capacitación incluyó revisión de temas de salud mental relacionados con el estudio, la revisión detenida del diligenciamiento de los cuestionarios y la realización de ensayos en campo. La capacitación tomó 70 horas distribuidas en 9 días; en los dos primeros días se revisaron aspectos conceptuales y definiciones relacionadas con el tema de estudio; el 3er. y 4to. día fueron dedicados al manejo de los cuestionarios; en el 5to., 6to. y 7mo. día se realizaron ensayos en campo y, finalmente, el 8vo. día se dedicó a estandarizar los procedimientos y a discutir los aspectos operativos. Se tomaron tres evaluaciones teóricas y una evaluación permanente de las prácticas en campo. Además, los encuestadores y supervisores pasaron por una exhaustiva evaluación psicológica para verificar su idoneidad en el trabajo de campo.

Actividades de la prueba piloto

La prueba piloto con los encuestadores en adiestramiento permitió afinar aún más las técnicas de apertura de vivienda y de entrevista con miras a obtener información válida y confiable.

6.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS

El protocolo del estudio fue aprobado tanto por el Comité de Investigación como por el Comité de Ética Institucional. Se solicitó un consentimiento informado antes del inicio de la encuesta. Las fuentes de financiamiento del estudio han provenido de recursos ordinarios y recursos directamente recaudados del INSM "HD-HN".

7. PROCEDIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DE CAMPO

- Los instrumentos utilizados en el recojo de información fueron los mismos que se utilizaron en los estudios del año 2011 en las ciudades de Huancayo y Cusco. Se hizo una minuciosa revisión de los 6 módulos que conforman el instrumento y se realizaron las correcciones necesarias. Este trabajo estuvo a cargo de un médico psiquiatra y varios profesionales de la salud.
- Se revisó y adaptó el Manual del Entrevistador, donde se especificaron las características de los cuestionarios, la organización del trabajo de campo, las funciones de los entrevistadores, la identificación y selección de viviendas, instrucciones generales y específicas para el llenado de los cuestionarios. Asimismo, se elaboró una Guía del Supervisor local donde se especificaron sus funciones.
- Los coordinadores de campo fueron seleccionados dentro de un grupo de supervisores locales con experiencia en conducción de equipos de trabajo en campo y tuvo la responsabilidad de la conducción técnica y administrativa de la Encuesta y de velar por el estricto control de calidad en el recojo de información, mediante el monitoreo y supervisión del trabajo de campo, en coordinación con el jefe de operaciones.
- Los entrevistadores seleccionados fueron profesionales psicólogos, egresados o bachilleres de las facultades de psicología o trabajadores de alguna área de la salud con experiencia en realizar trabajos de campo en hogares, de preferencia con experiencia en temas de salud mental. Todo el personal que participo en la operación de campo fue seleccionado en la ciudad de Lima. Los supervisores locales seleccionados fueron profesionales psicólogos, egresados de psicología o trabajadores de áreas de salud con experiencia en realizar trabajos de campo en hogares. Los supervisores locales tuvieron la responsabilidad de la conducción técnica, de la Encuesta y velaron por el estricto control de calidad de la información. Los supervisores locales fueron seleccionados en un proceso aparte de los entrevistadores.
- Se requirieron 33 entrevistadores, 8 supervisores locales y 2 coordinadores de campo, además de un jefe de operaciones en la sede central.
- La capacitación técnica de los supervisores y entrevistadores estuvo a cargo de los investigadores del INSM "HD-HN". El programa se desarrolló en quince días e incluía: aspectos conceptuales, manejo de los cuestionarios, actualización del marco muestral, registro de viviendas y prácticas de campo. Se puso énfasis en la técnica de entrevista y en la resolución de posibles problemas a encontrar en el trabajo de campo. Los participantes fueron evaluados permanentemente.
- Los entrevistadores visitaron un promedio de 2 viviendas por día en un ciclo de 7 días: 5 días de trabajo efectivo, uno de recuperación y uno de descanso.
- Durante la ejecución de la operación de campo se realizaron visitas de supervisión por parte de los investigadores del Instituto y del jefe de operación de campo para supervisar el trabajo durante el recojo de información.
- Antes del inicio de la encuesta se hizo la actualización cartográfica del marco muestral suministrado por el INEI y luego se realizó el registro de viviendas, de las cuales se consideraron todas las viviendas ocupadas para la selección de las 6, 8 y 11 viviendas en el conglomerado, según las áreas poblacionales a las que pertenecían. Se empleó el método de la entrevista directa. Se definió el número de hogares por vivienda; en donde existía más de un hogar, se entrevistó el hogar principal. Se hizo un registro de todos los miembros del hogar para identificar a las personas elegibles de acuerdo a los criterios de inclusión de unidades de análisis: una mujer unida, un adulto, un adolescente y un adulto mayor, mediante la Tabla de Kish.

- La operación de campo se organizó a nivel de las 05 áreas poblacionales existentes en Lima Metropolitana, los 44 distritos que entraron en la muestra se distribuyeron de la siguiente manera: Lima centro, agrupa a 13 distritos de la zona centro de Lima, Lima Norte agrupa a 9 distritos de la zona norte, Lima Este que agrupa a 8 distritos de la zona este, Lima sur que agrupa a 8 distritos de la zona sur de Lima y finalmente el Callao que agrupa a los 06 distritos de la zona nor-oeste de Lima.
- Se estructuró un programa (CSPRO) para la entrada, consistencia y control de calidad de los datos a ingresar en la Base de Datos, codificando los resultados. Los datos fueron ingresados por 6 digitadores desde la segunda semana de iniciada la encuesta. Se realizaron los análisis estadísticos mediante el programa estadístico de SPSS versión 20. Se hizo una re-digitación del 100% de los cuestionarios para eliminar los errores de digitación.
- La primera consistencia de los datos se realizó en campo a través de los supervisores locales, tanto por observación directa como por re entrevistas estructuradas en cuestionarios especiales. Después de la digitación se procedió a una consistencia mecanizada a través del programa referido, el cual detectó omisiones, inconsistencias lógicas, validación de variables, así como la identificación de valores extremos para su posterior verificación. Asimismo, se realizó la evaluación de la calidad de información de cada entrevistador.

8. RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DE CAMPO EN LA UNIDAD DE ANÁLISIS DEL ADULTO

La muestra seleccionada en las 5 áreas poblacionales fue de 6 180 viviendas en total.

De las 6 180 viviendas se logró entrevistar 5 340 viviendas completas obteniéndose una tasa de respuesta del 86,4%. La tasa de no respuesta fue 13,6%, constituida por 541 viviendas que rechazaron la entrevista, 278 viviendas con ocupantes ausentes y 21 viviendas por otras razones.

La muestra esperada de la unidad de análisis del Adulto fue de 5 332. De los cuales se logró entrevistar a 4 445, lo que corresponde a una tasa de respuesta del 83,4%. La tasa de no respuesta de este grupo fue de 16,6%. Constituido por 555 casos de rechazos (10,4%), 273 casos de ausencias (5,1%), 55 casos de discapacidad para responder la entrevista (1,0%) y 4 casos de otros (0,1%).

9. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

La data fue ponderada para ajustar las probabilidades diferenciadas de la selección de los entrevistados en las viviendas y las diferencias de no respuestas en los conglomerados, así como para ajustar las diferencias residuales de variables demográficas entre la muestra y la población registrada. Para efectos del análisis la muestra se dividió en 5 áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao (Tabla 2).

Para efectos de facilitar la lectura de algunos resultados, muchas preguntas del Cuestionario de Salud Mental de Colombia que tenían respuestas politómicas (por ejemplo, nada, poco, regular, mucho o bastante) fueron reagrupadas en tres niveles. En otros casos, los ítems relacionados con un mismo tema fueron analizados como grupos sumando los puntajes de cada ítem y presentándolos en el sistema vigesimal. Este ha sido el caso para el análisis de cohesión familiar, satisfacción personal o satisfacción laboral.

Para los análisis generales, primero se analizaron las características generales de la muestra: edad promedio, grupos etarios, distribución por sexo, ocupación, educación, nivel socioeconómico según

ingresos y nivel de pobreza. Para ello se realizaron análisis estadísticos descriptivos, como frecuencias y medidas de tendencia central y se estimaron proporciones.

A continuación se procedió a realizar análisis bivariados con la intención de identificar asociaciones entre aspectos de salud mental y variables como pobreza, edad, sexo, lugar de residencia. Si la variable independiente era nominal se realizaron pruebas χ^2 convertidas al estadístico F para considerar el diseño de la encuesta (a través del paquete estadístico SPSS V20 para muestras complejas), considerando un nivel de significancia de $<0,05$. Si la variable independiente era continua se utilizó el modelo lineal general.

II. RESULTADOS GENERALES DEL ESTUDIO SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012 INFORME GENERAL DEL ADULTO





DATOS GENERALES DE LA MUESTRA



DATOS GENERALES DE LA MUESTRA

El objetivo de la encuesta fue ingresar a 6 180 viviendas, habiéndose logrado información completa en 5 340 viviendas. En lo que respecta a la unidad de análisis del adulto, se esperaba entrevistar a 5 332 adultos, pero finalmente se logró entrevistar a 4 445; la diferencia de 887 adultos corresponde a rechazos, ausencias, no entrevistas por discapacidad y otros. En la Tabla 2 se presenta el número total de adultos encuestados en las 5 áreas poblacionales de Lima Metropolitana.

TABLA 2
TOTAL DE ADULTOS ENCUESTADOS, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ÁREAS POBLACIONALES	N	%
ADULTOS	4 445	100,0
LIMA CENTRO	581	13,1
LIMA NORTE	806	18,1
LIMA ESTE	1 444	32,5
LIMA SUR	1 078	24,3
CALLAO	536	12,1

Lima Centro: Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Surquillo.
 Lima Norte: Ancón, Carabaylo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres y Santa Rosa.
 Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.
 Lima Sur: Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
 Callao: Callao, Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta y Ventanilla.

La muestra se distribuyó tomando en cuenta el tamaño de las poblaciones de los distritos que conforman las 5 áreas poblacionales de Lima Metropolitana, asegurándose que la representación considerara los niveles socioeconómicos de las poblaciones encuestadas. En la Tabla 3 se presenta la población, según áreas poblacionales, sobre la cual se han realizado las estimaciones.

TABLA 3
POBLACIÓN TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA PONDERADA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES (POBLACIÓN ADULTA) DE LIMA METROPOLITANA 2012

ÁREAS POBLACIONALES	POBLACIÓN PONDERADA	
	PONDERADO	%
LIMA CENTRO	1 020 291	17,3
LIMA NORTE	1 573 677	26,7
LIMA ESTE	1 448 029	24,5
LIMA SUR	1 221 764	20,7
CALLAO	635 344	10,8
TOTAL	5 899 105	100,0

Lima Centro: Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Surquillo.
 Lima Norte: Ancón, Carabaylo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres y Santa Rosa.
 Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.
 Lima Sur: Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
 Callao: Callao, Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta y Ventanilla.

Con respecto a la situación socioeconómica, se decidió evaluar los niveles de pobreza a través del método de necesidades básicas insatisfechas (NBI), de modo similar al utilizado por el INEI, y un estimado subjetivo de la percepción de capacidad de cobertura de las necesidades básicas. En este sentido, se realizó una pregunta directa a la jefa del hogar o la esposa del jefe del hogar sobre si sus ingresos cubrían determinadas necesidades básicas.

En la Tabla 4A observamos que, la presencia de NBI en el total general, según áreas poblacionales de Lima Metropolitana, el 17,1% de los hogares encuestados es pobre (presencia de 1 o más NBI) y el 4,7% es pobre extremo (presencia de 2 o más NBI) y, en la (Tabla 4B), según la autopercepción de cobertura de las necesidades básicas con los ingresos familiares, tenemos que el total general por áreas poblacionales el 25,3% de los hogares es pobre, mientras que el 2,2% es pobre extremo.

TABLA 4A
NIVELES DE POBREZA SEGÚN NÚMERO DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS* (NBI)
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

NIVELES DE POBREZA SEGÚN PRESENCIA DE NBI		LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)
POBRES EXTREMOS	DOS O MÁS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS	0,5 (0,1; 1,7)	5,0 (3,1; 7,9)	6,5 (4,8; 8,9)	4,8 (2,8; 8,0)	6,0 (3,5; 10,2)	4,7 (3,7; 5,8)
POBRES	UNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA	8,6 (5,8; 12,6)	19,0 (15,9; 22,4)	19,7 (16,9; 22,8)	16,8 (13,6; 20,5)	20,6 (15,4; 27,0)	17,1 (15,6; 18,7)
NO POBRES	NINGUNA NECESIDAD BÁSICA INSATISFECHA	90,8 (86,8; 93,7)	76,0 (71,5; 80,1)	73,8 (69,4; 77,7)	78,4 (73,7; 82,5)	73,3 (65,1; 80,2)	78,3 (76,1; 80,2)

* NBI: Presencia de hacinamiento; vivienda inadecuada (paredes o techos); deficiencias en servicios higiénicos, abastecimiento de agua, electricidad, agua potable; hogares con niños que no asisten a la escuela.

Lima Centro: Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Surquillo.

Lima Norte: Ancón, Carabaylo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rimac, San Martín de Porres y Santa Rosa.

Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

Lima Sur: Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Callao: Callao, Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta y Ventanilla.

TABLA 4B
NIVELES DE POBREZA SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN DE COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

NIVELES DE POBREZA SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN DE CONSUMO		LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)
POBRES EXTREMOS	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	1,2 (0,5; 2,8)	3,2 (2,0; 5,1)	2,1 (1,4; 3,1)	2,4 (1,5; 3,9)	1,3 (0,6; 2,6)	2,2 (1,7; 2,9)
POBRES	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	19,4 (15,0; 24,9)	24,4 (20,9; 28,3)	30,8 (27,2; 34,6)	26,2 (22,1; 30,7)	22,4 (18,1; 27,5)	25,3 (23,4; 27,2)
NO POBRES BÁSICO	CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN Y VESTIDO, ETC.	47,9 (42,0; 53,9)	55,5 (51,4; 59,5)	50,1 (46,7; 53,5)	55,1 (50,2; 59,8)	59,7 (54,1; 65,1)	53,2 (51,1; 55,3)
NO POBRES	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS NECESIDADES	31,4 (25,5; 38,1)	16,9 (13,8; 20,5)	17,0 (14,5; 19,9)	16,3 (12,8; 20,7)	16,5 (12,0; 22,3)	19,3 (17,5; 21,2)

Lima Centro: Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Magdalena Vieja, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Surquillo.

Lima Norte: Ancón, Carabaylo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rimac, San Martín de Porres y Santa Rosa.

Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de Lurigancho y Santa Anita.

Lima Sur: Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Callao: Callao, Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta y Ventanilla.

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS





CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS

La población adulta encuestada en Lima Metropolitana fueron de 4445 personas (42,7% varones y 57,3% mujeres), cifras que, acorde al diseño técnico de muestreo, otorga una inferencia de 5 899 105 habitantes en total. Según áreas poblacionales, corresponde 581 personas (44,4% varones y 55,6% mujeres) en Lima Centro, 806 personas (36,8% varones y 63,2% mujeres) en Lima Norte, 1 444 personas (43,4% varones y 56,6% mujeres) en Lima Este, 1 078 personas (42,9% varones y 57,1% mujeres) en Lima Sur y 536 personas (47,0% varones y 53,0% mujeres) en Callao.

Los resultados se presentan en base a la población expandida y balanceada con relación al género y según áreas poblacionales. (Tabla 5)

TABLA 5
NÚMERO TOTAL DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ENCUESTADOS	LIMA CENTRO	LIMA NORTE	LIMA ESTE	LIMA SUR	CALLAO	TOTAL
MUESTRA TOTAL (SIN PONDERAR)						
FRECUENCIA	581	806	1 444	1 078	536	4 445
MASCULINO	44,4	36,8	43,4	42,9	47,0	42,7
FEMENINO	55,6	63,2	56,6	57,1	53,0	57,3
EXPANDIDO						
FRECUENCIA	1 020 291	1 573 677	1 448 029	1 221 764	635 344	5 899 105
MASCULINO	48,7	42,4	49,5	50,3	52,9	48,0
FEMENINO	51,3	57,6	50,5	49,7	47,1	52,0

EDAD

La edad promedio ponderada del total de los adultos encuestados fue de 42,56 años, comprendida desde los 18 hasta los 94 años de edad. Se observa un incremento en la edad promedio de lo hallado en el estudio epidemiológico del año 2002, que se situaba en 38,3 años. Probable tendencia hacia el envejecimiento poblacional mostrada en varios países. De acuerdo a los grupos etarios y según áreas poblacionales, se aprecia que la muestra conformó una asimetría positiva, siendo el mayor porcentaje el grupo etario de 25 a 44 años de Lima Este (Tabla 6).

TABLA 6
EDAD DE LOS ADULTOS ENCUESTADOS, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

EDAD PROMEDIO	LIMA CENTRO	LIMA NORTE	LIMA ESTE	LIMA SUR	CALLAO	TOTAL
PONDERADA						
MEDIA	47,64	41,04	40,01	41,92	45,23	42,56
ERROR ESTÁNDAR	1,103	0,760	0,561	0,723	1,193	0,372
GRUPO ETARIO PONDERADO						
18 A 24 AÑOS	13,2%	19,7%	20,2%	19,6%	15,3%	18,2%
25 A 44 AÑOS	32,5%	43,8%	44,6%	39,6%	37,9%	40,6%
45 A 64 AÑOS	32,2%	24,3%	25,7%	28,1%	30,3%	27,5%
65 O MÁS	22,1%	12,2%	9,5%	12,7%	16,5%	13,8%
GRUPO ETARIO SIN PONDERAR						
18 A 24 AÑOS	11,5%	15,8%	17,5%	16,8%	14,0%	15,8%
25 A 44 AÑOS	33,4%	48,1%	49,0%	43,0%	40,3%	44,3%
45 A 64 AÑOS	32,5%	23,7%	23,7%	27,4%	28,7%	26,3%
65 O MÁS	22,5%	12,4%	9,8%	12,8%	17,0%	13,5%

ESCOLARIDAD

En relación a los adultos que no saben leer ni escribir representan el 3,1% del total de los adultos encuestados, cifra superior a lo encontrado hace 10 años con un 2,3% de grado de analfabetismo. Según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, existen tendencias de analfabetismo mayor en mujeres que en varones. La población analfabeta femenina representa el 3,9% en Lima Centro, 4,0% en Lima Norte, 5,3% en Lima Este, 5,2% en Lima Sur y 8,0% en Callao. En tanto que la población analfabeta masculina representa el 0% en Lima Centro, 1,2% en Lima Norte, 2,0% en Lima Este, 0,7% en Lima Sur y 1,2% en Callao (Tabla 7).

TABLA 7
ADULTOS QUE NO SABEN LEER NI ESCRIBIR, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ANALFABETISMO	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
TOTAL	2,0(0,9-4,3)	2,8(1,9-4,3)	3,7(2,7-5,1)	3,0(1,9-4,7)	4,4(2,7-7,0)	3,1(2,5-3,8)	$F=1,152$; $df1=3,727$; $df2=2586,399$; $p=0,329$
MASCULINO	-	1,2(0,5-3,4)	2,0(0,9-4,3)	0,7(0,3-1,9)	1,2(0,4-4,0)	1,1(0,7-1,8)	
FEMENINO	3,9(1,8-8,4)	4,0(2,5-6,3)	5,3(3,8-7,5)	5,2(3,2-8,5)	8,0(4,7-13,3)	4,9(3,9-6,1)	

Sobre el nivel de educación de Lima Metropolitana y Callao, para educación secundaria corresponde al 44,8% de los adultos encuestados, y según áreas poblacionales representan el 30,7% en Lima Centro, 48,0% en Lima Norte, 49,7% en Lima Este, 44,2% en Lima Sur y 49,4% en Callao. Para los adultos sin nivel educativo o nunca asistieron a la escuela representan en Lima Centro 0,1%, Lima Norte 1,2%, Lima Este 1,9%, Lima Sur 2,5% y Callao 1,7%, correspondiendo el 1,5% del total de adultos encuestados. Así mismo, los adultos con niveles educativos superior universitario y no universitario suman en Lima Centro 58,5%, Lima Norte 36,1%, Lima Este 30,3%, Lima Sur 38,3%, y Callao 31,2%, siendo un total de 38,5% de los adultos encuestados, cifra menor a la observada en el 2002, dónde los adultos con niveles educativos superior universitario y no universitario alcanzaban un 44,1% del total. (Tabla 8).

TABLA 8
NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

NIVEL EDUCATIVO	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
SIN NIVEL / NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA							
TOTAL	0,1(0,0-0,6)	1,2(0,7-2,2)	1,9(1,2-3,1)	2,5(1,6-3,8)	1,7(0,7-3,7)	1,5(1,1-2,0)	
MASCULINO	-	0,2(0,0-1,5)	0,9(0,2-3,9)	0,1(0,0-0,4)	0,3(0,1-1,1)	0,3(0,1-1,0)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,3)	1,9(1,0-3,6)	2,9(1,8-4,7)	4,9(3,1-7,5)	3,2(1,3-7,7)	2,6(2,0-3,4)	
INICIAL / PREESCOLAR							
TOTAL	0,1(0,0-0,5)	0,2(0,1-1,0)	0,0(0,0-0,3)	-	0,3(0,1-1,4)	0,1(0,1-0,3)	
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	0,1(0,0-1,0)	0,4(0,1-1,7)	0,1(0,0-0,6)	-	0,7(0,2-2,8)	0,2(0,1-0,6)	
PRIMARIA							
TOTAL	7,4(4,8-11,4)	13,8(11,4-16,6)	16,4(14,3-18,7)	13,5(11,0-16,4)	16,4(13,0-20,4)	13,5(12,3-14,8)	
MASCULINO	5,2(2,4-11,0)	10,7(7,5-15,0)	12,2(9,5-15,6)	9,5(6,4-14,0)	14,9(10,2-21,4)	10,4(8,8-12,2)	
FEMENINO	9,5(6,2-14,4)	16,0(12,6-20,2)	20,4(17,4-23,9)	17,5(14,3-21,1)	18,1(13,8-23,3)	16,5(14,8-18,3)	
SECUNDARIA							
TOTAL	30,7(25,8-36,1)	48,0(43,6-52,3)	49,7(46,4-53,0)	44,2(40,1-48,4)	49,4(44,1-54,7)	44,8(42,8-46,8)	
MASCULINO	26,8(20,1-34,7)	55,5(48,7-62,2)	56,0(51,2-60,7)	49,4(43,4-55,4)	51,7(44,8-58,6)	48,8(45,9-51,8)	
FEMENINO	34,3(27,9-41,3)	42,4(37,4-47,6)	43,5(39,6-47,6)	39,0(34,3-44,0)	46,8(39,0-54,8)	41,0(38,6-43,5)	
BACHILLERATO							
TOTAL	-	-	-	-	0,1(0,0-1,0)	0,0(0,0-0,1)	
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	-	-	-	0,3(0,0-2,0)	0,0(0,0-0,2)	
SUPERIOR NO UNIVERSITARIO							
TOTAL	21,7(18,0-26,0)	21,1(17,8-24,9)	16,2(13,9-18,7)	22,2(19,4-25,4)	18,7(15,8-22,0)	20,0(18,5-21,5)	
MASCULINO	18,0(13,4-23,6)	16,9(12,5-22,5)	15,5(12,3-19,3)	21,3(17,4-25,8)	17,8(13,3-23,4)	17,8(15,8-19,9)	
FEMENINO	25,3(20,0-31,4)	24,2(19,9-29,2)	16,9(13,9-20,2)	23,2(19,4-27,5)	19,8(14,6-26,1)	22,0(20,0-24,2)	
SUPERIOR UNIVERSITARIO							
TOTAL	36,8(31,6-42,3)	15,0(12,1-18,5)	14,1(11,9-16,6)	16,1(13,1-19,7)	12,5(9,1-16,9)	18,5(16,9-20,2)	
MASCULINO	45,6(38,5-52,8)	15,5(11,2-21,0)	13,1(10,3-16,5)	17,5(14,0-21,7)	13,9(9,2-20,6)	20,4(18,2-22,8)	
FEMENINO	28,4(22,7-35,0)	14,6(11,2-18,9)	15,1(12,2-18,5)	14,7(10,8-19,7)	10,8(7,2-16,0)	16,7(14,8-18,8)	
POSTGRADO							
TOTAL	3,2(2,1-5,0)	0,7(0,3-1,9)	1,7(1,0-2,8)	1,5(0,8-2,8)	0,8(0,2-3,3)	1,5(1,2-2,1)	
MASCULINO	4,4(2,5-7,6)	1,2(0,4-3,8)	2,3(1,2-4,2)	2,2(1,0-4,7)	1,3(0,3-5,6)	2,3(1,6-3,2)	
FEMENINO	2,1(1,0-4,2)	0,3(0,0-2,4)	1,1(0,5-2,2)	0,7(0,3-1,4)	0,3(0,0-1,8)	0,9(0,6-1,4)	

$F=6,912$; $df1=19,978$;
 $df2=13864,930$;
 $p=<0,00001$

ESTADO CIVIL

Respecto al estado civil, el 56,6% de los adultos encuestados de Lima Metropolitana se encuentra en una relación, sea de conviviente o casado. Según áreas poblacionales, encontramos que el 53,6% están en Lima Centro, 54,6% en Lima Norte, 59,2% en Lima Este, 56,4% en Lima Sur y 61,6% en Callao. En tanto que el 11,4% se encuentran separados o divorciados y, según áreas poblacionales, el 12,2% se encuentran en Lima Centro, el 12,9% Lima Norte, 10,9% Lima Este, 10,4% Lima Sur y 10,1% en Callao. Respecto al estado de viudez este es del 5% del total de adultos encuestados. La población soltera representa el 26,9% de los adultos siendo el género masculino (Lima Centro 30,2%, Lima Norte 35,1%, Lima Este 30,6%, Lima Sur 33,0% y Callao 28,6%) mayor que el femenino (Lima Centro 25,8%, Lima Norte 21,6%, Lima Este 22,2%, Lima Sur 23,9%, y Callao 15,0%). (Tabla 9). Cabe destacar la diferencia del estado civil casado hallado en el año 2002 (39,1%), con lo encontrado en el 2012 correspondiendo al 31,4% de los adultos encuestados. Mientras que los adultos convivientes pasaron de un 19,4% en el 2002, al 25,2% en el 2012.

TABLA 9
ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESTADO CIVIL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA	
CONVIVIENTE								
TOTAL	13,7(10,3-17,9)	27,0(23,2-31,2)	32,0(28,9-35,2)	24,8(21,5-28,4)	24,8(21,0-29,0)	25,2(23,6-27,0)	F=4,624; df1=17,042; df2=11826,825; p=<0,00001	
MASCULINO	13,2(8,0-21,0)	25,5(19,9-32,1)	31,7(27,3-36,4)	24,4(20,1-29,3)	23,1(18,0-29,1)	24,4(22,0-27,0)		
FEMENINO	14,1(10,0-19,6)	28,1(23,7-33,0)	32,3(28,2-36,6)	25,2(21,4-29,3)	26,7(20,9-33,4)	26,0(23,9-28,2)		
SEPARADO								
TOTAL	10,5(8,2-13,3)	12,2(10,0-14,8)	10,4(8,7-12,3)	9,0(7,4-11,0)	9,6(7,3-12,5)	10,5(9,5-11,6)		
MASCULINO	5,9(3,8-9,2)	7,6(5,0-11,5)	7,3(5,1-10,3)	5,6(3,8-8,3)	7,1(4,2-11,8)	6,7(5,6-8,1)		
FEMENINO	14,8(11,3-19,1)	15,5(12,5-19,2)	13,4(10,8-16,4)	12,5(9,9-15,5)	12,5(9,2-16,7)	14,0(12,5-15,6)		
DIVORCIADO								
TOTAL	1,7(1,0-3,0)	0,7(0,3-1,6)	0,5(0,3-0,9)	1,4(0,8-2,3)	0,5(0,2-1,3)	0,9(0,7-1,3)		
MASCULINO	1,9(0,8-4,2)	0,7(0,2-2,7)	0,2(0,1-0,6)	0,4(0,2-1,1)	0,4(0,1-1,3)	0,7(0,4-1,2)		
FEMENINO	1,5(0,7-3,3)	0,8(0,3-2,1)	0,8(0,4-1,5)	2,3(1,3-4,0)	0,7(0,2-2,2)	1,2(0,8-1,7)		
VIUDO								
TOTAL	6,4(4,6-8,8)	5,2(3,8-7,0)	3,7(2,7-4,9)	4,8(3,5-6,4)	6,3(4,5-8,8)	5,0(4,4-5,8)		
MASCULINO	2,7(1,2-5,7)	1,4(0,6-3,3)	1,5(0,8-2,8)	2,2(0,9-4,9)	4,5(2,4-8,1)	2,2(1,6-3,0)		
FEMENINO	9,9(6,8-14,2)	7,9(5,6-11,1)	5,8(4,0-8,2)	7,4(5,4-10,1)	8,4(5,4-12,8)	7,7(6,5-9,1)		
CASADO								
TOTAL	39,9(34,6-45,3)	27,6(24,2-31,2)	27,2(24,3-30,2)	31,6(28,2-35,2)	36,8(31,7-41,6)	31,4(29,6-33,2)		
MASCULINO	46,1(38,1-54,4)	29,7(23,7-36,4)	28,7(24,3-33,6)	34,4(29,8-39,3)	36,4(29,1-44,4)	34,1(31,4-37,0)		
FEMENINO	33,9(28,1-40,2)	26,0(22,0-30,4)	25,6(21,9-29,7)	28,8(24,6-33,3)	36,7(30,9-43,0)	28,9(26,7-31,1)		
SOLTERO								
TOTAL	27,9(23,2-33,2)	27,4(23,5-31,6)	26,4(23,7-29,2)	28,5(25,5-31,7)	22,2(18,1-27,0)	26,9(25,2-28,7)		
MASCULINO	30,2(23,6-37,7)	35,1(29,1-41,7)	30,6(25,9-35,8)	33,0(28,4-37,9)	28,6(21,2-37,5)	31,9(29,2-34,7)		
FEMENINO	25,8(19,8-32,9)	21,6(17,1-26,9)	22,2(19,1-25,7)	23,9(20,2-28,0)	15,0(10,9-20,2)	22,3(20,2-24,5)		

SITUACIÓN LABORAL

Considerando estar trabajando hasta la semana anterior, tenemos que el total de los varones encuestados estuvieron laborando en un 76,9%, mientras que las mujeres sólo el 51,4% del total. Esta diferencia se mantiene, según áreas poblacionales, así en Lima Centro los varones representaban el 71,2% y las mujeres el 53,1%, en Lima Norte, los varones el 80,2% y las mujeres 50,1%, en Lima Este, varones el 80,7% y mujeres el 49,2%, en Lima Sur varones el 76,5% y mujeres el 57,5%, y en Callao varones el 71,7% y mujeres el 45,6% (Tabla 10). En relación al porcentaje de desempleo, los adultos encuestados, según áreas poblacionales, se encuentran en Lima Centro en un 1,3%, Lima Norte en un 3,0%, Lima Este en un 1,7%, Lima Sur en un 2,7%, y Callao en un 2,5%. El total de personas en búsqueda de trabajo, en el momento del estudio, representan el 2,3%, de los adultos de Lima Metropolitana y Callao, siendo mayor el porcentaje para las mujeres. Este panorama laboral dista de lo observado hace 10 años, donde el porcentaje de personas que habían trabajado hasta la semana previa al estudio era de 53 %, en comparación al 63,7% del 2012. Situación similar se observa al analizar el porcentaje de desempleo, que en el 2002 fue de 7,2%, mientras que en el 2012 solo el 2,3% de adultos encuestados se encontraban buscando trabajo.

TABLA 10
SITUACIÓN LABORAL DE LOS ADULTOS, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SITUACIÓN LABORAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
TRABAJÓ LA SEMANA ANTERIOR							
TOTAL	61,9(56,6-67,0)	62,9(59,1-66,5)	64,8(61,8-67,6)	67,0(63,4-70,5)	59,4(54,2-64,5)	63,7(61,9-65,4)	F=1,606; df1=3,792; df2=2631,925; p=0,173
MASCULINO	71,2(63,5-77,8)	80,2(74,0-85,1)	80,7(76,4-84,3)	76,5(71,3-80,9)	71,7(63,9-78,4)	76,9(74,3-79,3)	
FEMENINO	53,1(46,8-59,4)	50,1(46,0-54,3)	49,2(45,6-52,8)	57,5(52,5-62,4)	45,6(39,4-51,9)	51,4(49,2-53,6)	
ESTÁ BUSCANDO TRABAJO							
TOTAL	1,3(0,7-2,6)	3,0(1,9-4,6)	1,7(1,0-2,7)	2,7(1,7-4,2)	2,5(1,3-5,0)	2,3(1,8-2,9)	F=1,585; df1=3,927; df2=2725,023; p=0,177
MASCULINO	0,9(0,3-2,7)	1,6(0,6-4,1)	1,6(0,7-3,8)	3,2(1,8-5,8)	1,5(0,4-6,0)	1,8(1,2-2,7)	
FEMENINO	1,7(0,8-3,9)	4,1(2,5-6,6)	1,7(1,0-2,8)	2,1(1,1-3,9)	3,7(1,6-8,2)	2,7(2,0-3,6)	

INGRESOS ECONÓMICOS

Se observa que, según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, perciben ingresos menores a 300 nuevos soles en Lima Centro el 4,8%, mientras que en Lima Norte se encuentran en un 12,3%, Lima Este en un 12,4%, Lima Sur en un 13,9% y Callao en un 10,9% y corresponde al 11,2% de los adultos encuestados. Es importante mencionar que la medición de pobreza se define cuando el gasto es menor al valor de la canasta básica de consumo, que se estima en 284 nuevos soles. Según sexo, las mujeres perciben este tipo de ingresos en mayor porcentaje que los varones 18,2% y 5,5%, respectivamente (Tabla 11).

Se evidencia que el 70,7% del total de adultos de Lima Metropolitana percibe un ingreso mayor de 600 nuevos soles (Tabla 11). Si comparamos con el resultado del Estudio Epidemiológico Lima Metropolitana 2002, en que solo el 41,6% del total de adultos percibían más de 600 soles, se refleja una mejora de ingresos en los 10 años últimos; sin embargo sigue persistiendo mayor ingreso mensual en el hombre en relación a la mujer que trabaja.

TABLA 11
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL PERSONAL (NUEVOS SOLES) EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

INGRESOS (NUEVOS SOLES)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
< DE 300							
TOTAL	4,8(2,8-8,2)	12,3(9,4-16,0)	12,4(10,3-14,9)	13,9(11,3-16,9)	10,9(7,5-15,7)	11,2(9,9-12,6)	F=8,273; df1=10,462; df2=7260,281; p=<0,00001
MASCULINO	0,2(0,0-1,2)	5,0(2,5-9,9)	6,9(4,5-10,5)	7,9(5,3-11,8)	7,9(4,2-14,3)	5,5(4,3-7,2)	
FEMENINO	10,3(6,1-16,9)	20,1(15,2-26,0)	20,2(16,5-24,4)	21,5(17,1-26,8)	16,2(10,4-24,5)	18,2(16,0-20,8)	
301 A 600							
TOTAL	16,4(12,3-21,4)	19,9(16,5-23,9)	20,7(18,0-23,6)	15,0(12,5-17,8)	16,4(12,4-21,4)	18,1(16,5-19,8)	
MASCULINO	10,7(5,9-18,7)	16,8(12,5-22,4)	14,3(11,3-18,0)	10,4(7,3-14,5)	12,7(7,9-19,9)	13,3(11,3-15,6)	
FEMENINO	22,9(16,8-30,6)	23,2(18,6-28,6)	29,6(25,6-34,0)	20,9(17,0-25,5)	22,8(15,1-32,8)	24,0(21,6-26,6)	
601 A 1 200							
TOTAL	32,6(26,6-39,3)	46,8(41,8-51,9)	47,7(44,3-51,1)	45,8(41,3-50,4)	45,8(38,8-53,0)	44,1(41,8-46,5)	
MASCULINO	31,0(23,4-39,8)	51,6(44,2-59,0)	54,6(49,8-59,3)	48,5(42,4-54,7)	45,2(36,3-54,4)	47,4(44,2-50,5)	
FEMENINO	34,5(26,8-43,1)	41,7(35,6-48,1)	37,8(32,9-43,0)	42,4(36,8-48,1)	46,9(36,6-57,6)	40,0(37,0-43,1)	
> DE 1 200							
TOTAL	46,2(39,0-53,5)	21,0(17,2-25,4)	19,3(16,2-22,8)	25,3(21,0-30,2)	26,8(20,8-33,9)	26,6(24,5-29,0)	
MASCULINO	58,1(48,7-67,0)	26,5(20,7-33,2)	24,1(20,3-28,4)	33,2(27,3-39,6)	34,3(25,6-44,1)	33,8(30,7-36,9)	
FEMENINO	32,3(24,9-40,6)	15,1(11,3-19,7)	12,4(9,1-16,6)	15,2(10,6-21,2)	14,0(7,6-24,6)	17,7(15,4-20,3)	

SALUD MENTAL DEL ADULTO



SALUD MENTAL SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA

ASPECTOS GENERALES DE SALUD MENTAL

La salud mental engloba un estado de bienestar personal en el que está involucrada una red de personas del entorno del individuo, en una interacción dinámica y plural. Todo aquello que acontece al ser humano tiene influencia en su estado anímico, en sus expectativas y proyectos hacia el futuro. Por ello se ha planteado una serie de preguntas que cubren diversos aspectos contextuales de la vida de la persona, tanto a nivel macro, como a nivel de su desenvolvimiento social próximo.

ENTORNO GENERAL

Dentro de los principales problemas percibidos en el país por la población adulta, tenemos que, la delincuencia con un 20,6% del total de adultos encuestados, se ubica en el primer lugar. Y según áreas poblacionales, para Lima Centro con un 17,2%, Lima Norte con un 18,3%, Lima Este con un 26,1%, Lima Sur con un 16,3% y Callao con un 27,4% consideran lo mismo. La corrupción, para Lima Centro con un 24,5%, Lima Norte con un 16,7%, Lima Este con un 17,8%, Lima Sur con un 14,5% y Callao con un 13,3%, la consideran en segundo lugar. Mientras que el desempleo se ubica en el tercer lugar con un 16,0% del total de adultos encuestados, seguido de la pobreza con un 15,7%, la violencia con un 11,6%, la falta de valores con un 7,6%, entre otros. Aunque este último punto no es considerado prioritario, es de conocimiento que da sostenimiento a la delincuencia, la corrupción y la violencia. (Tabla 12). En el 2002 se encontró que el principal problema percibido por la población era el desempleo, con un 56,7% del total de adultos encuestados, seguido de la pobreza con 16,3%, la corrupción con 5,1 %, la violencia con 2,8%, la inestabilidad política con 2,5%, la falta de confianza y liderazgo con 2,1% y otros con 14,3%.

En relación a la percepción de la pobreza, según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, tenemos que solo el 13,8% en Lima Centro, el 18,7% en Lima Norte, el 11,4% en Lima Este, el 20,4% en Lima Sur y el 11,5% en Callao, la consideran como un principal problema, teniendo como explicación que desde el año 2000 la tasa de pobreza en el país ha ido disminuyendo por mayor asignación de recursos públicos. Sin embargo, es importante señalar que la percepción de la pobreza se mantiene en los ámbitos rurales con un 29% del total de la población adulta encuestada, según el estudio epidemiológico Lima Rural 2007.

Frente a estos problemas, el 59,4% en total de los encuestados manifiesta sentimientos de preocupación, pena, tristeza o depresión, cólera e impotencia. Según áreas poblacionales, el 55,5% en Lima Centro, el 55,3% en Lima Norte, el 66% en Lima Este, el 61,2% en Lima Sur y el 57% en Callao, de los adultos encuestados expresan dichos sentimientos. En el 2002, los sentimientos preponderantes frente a los problemas percibidos fueron de desilusión con un 26,6%, amargura y rabia con un 25,8%, resignación con un 5,3%, indiferencia con un 3,3%, entre otros. En tanto que la expresión de sentimientos de pena, tristeza o depresión es predominante en el sexo femenino (Lima Centro 16,9%, Lima Norte 20,9%, Lima Este 22,5%, Lima Sur 23,9% y Callao 21,9%), la expresión de Cólera e Indignación predomina en el sexo masculino (Tabla 13).

TABLA 12
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL PAÍS POR LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

PROBLEMAS PERCIBIDOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
POBREZA	13,8(10,8-17,5)	18,7(15,8-21,9)	11,4(9,5-13,7)	20,4(17,1-24,2)	11,5(8,3-15,8)	15,7(14,3-17,1)	$F=2,856$; $df1=47,389$; $df2=32887,882$; $p=<0,00001$
MASCULINO	9,0(5,8-13,5)	17,9(13,5-23,2)	8,7(6,6-11,4)	21,1(16,7-26,3)	12,0(7,6-18,3)	14,0(12,1-16,1)	
FEMENINO	18,4(14,0-23,8)	19,2(15,5-23,6)	14,1(11,5-17,2)	19,7(15,8-24,3)	11,0(6,8-17,4)	17,2(15,4-19,2)	
DESEMPLEO	10,6(7,4-15,1)	18,2(15,5-21,2)	17,1(15,1-19,3)	16,1(13,4-19,2)	16,3(13,0-20,2)	16,0(14,7-17,4)	
MASCULINO	10,4(6,2-16,8)	17,8(13,9-22,5)	18,6(15,5-22,2)	13,3(10,1-17,3)	18,2(13,4-24,3)	15,8(14,0-17,8)	
FEMENINO	10,9(7,1-16,3)	18,4(14,7-22,8)	15,6(13,1-18,5)	19,0(15,0-23,8)	14,1(10,3-19,0)	16,1(14,4-18,1)	
CORRUPCIÓN	24,5(20,6-28,9)	16,7(13,9-20,1)	17,8(15,5-20,4)	14,5(12,0-17,5)	13,3(10,2-17,1)	17,5(16,1-19,0)	
MASCULINO	30,3(23,9-37,5)	22,6(17,7-28,5)	21,7(18,0-25,8)	20,1(15,9-25,1)	18,7(13,9-24,6)	22,7(20,5-25,1)	
FEMENINO	19,0(15,0-23,7)	12,4(9,2-16,5)	14,0(11,3-17,2)	8,9(6,7-11,6)	7,3(4,6-11,4)	12,7(11,2-14,4)	
VIOLENCIA	11,5(9,1-14,4)	11,2(9,0-13,9)	12,5(10,7-14,5)	11,3(9,1-13,9)	11,7(9,0-15,0)	11,6(10,6-12,8)	
MASCULINO	10,1(6,5-15,4)	8,7(5,7-12,9)	8,8(6,6-11,5)	7,3(5,0-10,7)	5,8(3,5-9,3)	8,3(7,0-9,9)	
FEMENINO	12,7(9,4-17,0)	13,1(10,1-16,8)	16,1(13,4-19,3)	15,3(11,8-19,5)	18,3(13,9-23,6)	14,7(13,1-16,4)	
DELINCUENCIA	17,2(13,7-21,3)	18,3(15,6-21,5)	26,1(23,2-29,3)	16,3(13,9-19,1)	27,4(22,9-32,4)	20,6(19,2-22,1)	
MASCULINO	16,5(12,3-21,8)	16,4(12,5-21,2)	25,6(21,4-30,2)	17,1(13,7-21,1)	26,3(20,5-33,1)	20,1(18,1-22,2)	
FEMENINO	17,8(13,7-22,8)	19,7(16,2-23,8)	26,6(23,0-30,7)	15,5(12,7-18,8)	28,7(23,2-34,8)	21,1(19,3-23,0)	
NARCOTRÁFICO	0,8(0,3-1,8)	0,3(0,1-0,7)	0,4(0,2-0,9)	0,4(0,2-1,0)	1,1(0,5-2,3)	0,5(0,3-0,7)	
MASCULINO	0,9(0,3-2,7)	0,2(0,0-1,1)	0,5(0,2-1,6)	0,1(0,0-0,9)	0,5(0,2-1,7)	0,4(0,2-0,8)	
FEMENINO	0,6(0,1-2,5)	0,3(0,1-1,1)	0,2(0,0-1,0)	0,7(0,3-1,8)	1,7(0,7-4,2)	0,6(0,3-0,9)	
TERRORISMO	1,3(0,7-2,5)	0,7(0,3-1,6)	0,6(0,3-1,2)	1,8(1,1-3,0)	1,0(0,3-2,8)	1,0(0,8-1,4)	
MASCULINO	0,4(0,1-1,7)	0,1(0,0-0,8)	0,5(0,2-1,3)	1,0(0,4-2,5)	1,5(0,4-4,9)	0,6(0,3-1,1)	
FEMENINO	2,1(1,0-4,4)	1,2(0,5-2,7)	0,7(0,3-1,8)	2,6(1,4-4,8)	0,4(0,1-2,7)	1,4(1,0-2,1)	
MANEJO ECONÓMICO	1,8(1,0-3,5)	2,4(1,5-3,9)	2,2(1,4-3,4)	1,9(1,1-3,3)	3,4(1,9-5,9)	2,3 (1,8-2,9)	
MASCULINO	2,5(1,0-5,9)	3,0(1,5-6,0)	2,4(1,2-4,8)	1,2(0,4-3,5)	3,7(1,6-8,5)	2,5(1,7-3,5)	
FEMENINO	1,2(0,5-2,8)	2,0(1,1-3,7)	2,0(1,2-3,3)	2,5(1,2-5,1)	3,1(1,6-5,8)	2,1(1,5-2,8)	
FALTA DE VALORES	9,4(6,9-12,6)	6,5(4,6-9,0)	6,5(5,1-8,4)	9,1(7,1-11,6)	7,5(5,3-10,4)	7,6(6,7-8,7)	
MASCULINO	8,4(5,2-13,2)	7,0(4,2-11,2)	5,7(4,0-8,1)	8,9(6,5-12,1)	6,8(4,2-10,7)	7,3(6,0-8,8)	
FEMENINO	10,3(6,9-15,1)	6,1(3,9-9,5)	7,4(5,5-9,8)	9,3(6,4-13,1)	8,3(5,4-12,6)	8,0(6,7-9,5)	
INESTABILIDAD POLÍTICA	2,7(1,4-5,1)	1,6(0,9-2,8)	1,6(0,9-2,7)	2,4(1,6-3,6)	1,4(0,7-2,9)	1,9(1,5-2,5)	
MASCULINO	3,0(1,4-6,1)	1,3(0,5-3,2)	2,1(1,0-4,3)	2,9(1,7-5,0)	2,0(0,8-4,9)	2,2(1,6-3,1)	
FEMENINO	2,5(0,8-7,5)	1,8(0,9-3,8)	1,0(0,5-2,2)	1,8(1,0-3,3)	0,7(0,2-2,3)	1,6(1,1-2,5)	
FALTA DE CONFIANZA	0,8(0,3-2,0)	2,5(1,5-4,0)	0,9(0,5-1,8)	1,3(0,8-2,2)	0,6(0,2-1,6)	1,4(1,0-1,8)	
MASCULINO	0,9(0,3-3,0)	2,7(1,2-5,7)	1,2(0,5-3,0)	0,8(0,3-2,3)	0,1(0,0-1,0)	1,3(0,8-2,1)	
FEMENINO	0,7(0,2-2,8)	2,3(1,2-4,3)	0,7(0,3-1,4)	1,8(1,0-3,2)	1,0(0,3-3,2)	1,4(1,0-2,1)	
FALTA DE LIDERAZGO	1,3(0,6-2,8)	0,8(0,4-2,0)	0,3(0,1-0,7)	0,5(0,2-1,3)	1,3(0,6-2,6)	0,8(0,5-1,1)	
MASCULINO	1,9(0,8-4,9)	0,3(0,1-1,5)	0,4(0,2-1,2)	0,5(0,1-1,7)	1,5(0,6-4,0)	0,8(0,5-1,4)	
FEMENINO	0,7(0,2-2,4)	1,2(0,4-3,2)	0,1(0,0-0,7)	0,5(0,1-2,4)	1,0(0,4-2,6)	0,7(0,4-1,3)	
OTROS	4,0(2,4-6,6)	1,4(0,8-2,6)	1,9(1,2-3,0)	3,5(2,4-5,2)	2,8(1,5-5,0)	2,6(2,1-3,2)	
MASCULINO	5,6(3,0-10,5)	1,4(0,5-3,9)	2,8(1,6-4,8)	5,5(3,5-8,4)	2,4(1,1-5,4)	3,5(2,6-4,7)	
FEMENINO	2,4(1,2-4,9)	1,4(0,6-3,1)	1,0(0,5-2,1)	1,6(0,8-3,2)	3,2(1,6-6,2)	1,7(1,2-2,4)	

TABLA 13
SENTIMIENTOS FRENTE A LOS PROBLEMAS NACIONALES EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESTADOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PENA, TRISTEZA O DEPRESIÓN	11,8(9,1-15,0)	15,8(13,2-18,8)	18,8(16,4-21,4)	19,6(16,0-23,7)	15,4(12,2-19,4)	16,6 (15,2-18,0)	F=2,418; df1=46,739; df2=32436,840; p=<0,00001
MASCULINO	6,4(3,9-10,3)	8,9(5,8-13,5)	15,0(11,9-18,7)	15,4(11,3-20,7)	9,7(6,6-14,1)	11,5(9,9-13,4)	
FEMENINO	16,9(12,8-22,1)	20,9(17,2-25,2)	22,5(19,1-26,2)	23,9(19,1-29,4)	21,9(16,5-28,6)	21,3(19,3-23,4)	
CÓLERA	10,0(7,4-13,4)	10,6(8,3-13,4)	18,8(16,4-21,5)	11,8(9,7-14,4)	13,5(10,4-17,3)	13,1(11,9-14,4)	
MASCULINO	11,2(7,2-17,1)	13,0(9,1-18,2)	18,5(15,1-22,6)	15,1(11,9-19,0)	15,3(10,5-21,7)	14,8(13,0-16,9)	
FEMENINO	8,9(6,1-12,8)	8,8(6,5-12,0)	19,1(16,1-22,5)	8,5(6,4-11,2)	11,4(8,2-15,5)	11,5(10,1-12,9)	
AMARGURA	8,7(5,9-12,7)	5,7(4,1-7,7)	4,6(3,5-6,2)	6,4(4,8-8,5)	6,9(4,5-10,3)	6,2(5,3-7,2)	
MASCULINO	9,9(5,9-16,0)	7,6(4,7-12,2)	5,8(3,9-8,3)	5,9(3,9-8,9)	7,3(4,3-12,0)	7,1(5,8-8,8)	
FEMENINO	7,6(4,2-13,5)	4,2(2,9-6,0)	3,5(2,4-5,2)	6,9(4,9-9,6)	6,4(3,6-11,0)	5,4(4,4-6,6)	
DESILUSIÓN	8,7(6,4-11,6)	9,1(7,0-11,7)	5,4 (4,2-7,0)	8,1(6,3-10,4)	8,8(5,9-12,9)	7,9(6,9-9,0)	
MASCULINO	6,5(3,7-11,1)	9,4(6,3-13,7)	6,8(4,8-9,6)	8,2(5,8-11,5)	9,6(5,3-16,7)	8,0(6,6-9,7)	
FEMENINO	10,8(7,6-15,1)	8,9(6,4-12,2)	4,1(2,8-6,0)	8,1(5,9-11,0)	8,0(4,9-12,7)	7,8(6,6-9,2)	
INDIFERENCIA	1,3(0,7-2,5)	4,0(2,6-5,9)	3,2(2,3-4,5)	2,4(1,6-3,6)	0,9(0,4-2,1)	2,7(2,2-3,3)	
MASCULINO	1,3(0,5-3,7)	5,2(2,8-9,2)	4,2(2,8-6,3)	2,4(1,3-4,5)	0,9(0,3-2,7)	3,1(2,3-4,2)	
FEMENINO	1,2(0,5-2,9)	3,1(1,8-5,2)	2,3(1,4-3,7)	2,4(1,4-4,2)	1,0(0,3-3,1)	2,2(1,7-3,0)	
RABIA	6,3(4,3-9,1)	5,3(3,7-7,5)	5,3(4,1-6,9)	4,4(3,1-6,2)	5,2(3,6-7,4)	5,3(4,5-6,1)	
MASCULINO	7,4(4,3-12,3)	6,7(4,0-11,0)	6,2(4,2-9,1)	4,5(2,5-7,8)	6,5(4,2-9,8)	6,2(4,9-7,7)	
FEMENINO	5,2(3,1-8,6)	4,2(2,6-6,7)	4,4(3,1-6,2)	4,3(2,8-6,5)	3,7(1,8-7,6)	4,4(3,5-5,4)	
RESIGNACIÓN	2,2(1,2-4,0)	0,8(0,4-1,5)	1,8(1,2-2,8)	1,3(0,7-2,4)	1,9(1,0-3,5)	1,5(1,2-2,0)	
MASCULINO	2,3(0,9-5,5)	0,9(0,3-2,3)	2,6(1,5-4,5)	1,4(0,6-3,3)	2,6(1,2-5,6)	1,9(1,3-2,6)	
FEMENINO	2,1(0,9-4,9)	0,8(0,3-1,8)	1,0(0,5-2,1)	1,2(0,5-2,8)	1,1(0,3-3,7)	1,2(0,8-1,8)	
DESESPERACIÓN O ANGUSTIA	0,3(0,1-1,7)	0,6(0,2-1,5)	0,6(0,3-1,5)	1,0(0,6-1,9)	0,4(0,1-1,1)	0,6(0,4-0,9)	
MASCULINO	0,1(0,0-0,7)	-	0,5(0,1-1,9)	0,3(0,1-1,0)	-	0,2(0,1-0,5)	
FEMENINO	0,5(0,1-3,7)	1,0(0,4-2,6)	0,8(0,3-2,3)	1,8(0,9-3,5)	0,8(0,3-2,3)	1,0(0,6-1,6)	
INDIGNACIÓN	8,6(6,2-11,7)	10,5(8,2-13,2)	6,4(5,0-8,2)	8,0(6,3-10,1)	8,4(5,9-11,8)	8,4(7,4-9,5)	
MASCULINO	13,1(8,8-19,1)	13,2(9,3-18,3)	7,3(5,0-10,6)	7,6(5,2-10,8)	9,5(5,8-15,4)	10,0(8,4-11,9)	
FEMENINO	4,2(2,4-7,1)	8,5(6,0-11,8)	5,6(4,1-7,6)	8,5(6,0-11,8)	7,1(4,4-11,4)	6,9(5,8-8,2)	
IMPOTENCIA	10,7(8,0-14,2)	9,9(7,8-12,6)	10,1(8,4-12,1)	9,8(8,0-11,9)	10,0(7,5-13,2)	10,1(9,1-11,2)	
MASCULINO	10,8(7,1-16,2)	10,5(7,4-14,7)	9,9(7,4-13,0)	10,0(7,5-13,2)	10,5(7,1-15,3)	10,3(8,8-12,0)	
FEMENINO	10,6(7,2-15,4)	9,5(6,9-13,0)	10,4(8,1-13,1)	9,5(7,1-12,7)	9,4(6,3-13,8)	9,9(8,5-11,4)	
FRUSTRACIÓN	3,4(2,1-5,4)	2,3(1,4-3,8)	2,6(1,8-3,7)	3,3(2,3-4,8)	3,0(1,7-5,3)	2,9(2,4-3,5)	
MASCULINO	3,7(1,9-7,4)	2,3(1,1-4,9)	2,4(1,4-4,0)	4,1(2,4-6,8)	3,7(1,7-7,9)	3,1(2,3-4,2)	
FEMENINO	3,1(1,7-5,6)	2,4(1,2-4,5)	2,8(1,7-4,5)	2,6(1,6-4,3)	2,3(1,1-4,7)	2,6(2,0-3,4)	
PREOCUPACIÓN	23,0(19,4-27,1)	19,0(16,0-22,3)	18,3(16,0-21,0)	20,0(17,2-23,1)	18,1(14,6-22,3)	19,6(18,2-21,1)	
MASCULINO	21,3(15,2-29,1)	17,6(13,1-23,9)	17,3(14,2-21,0)	22,1(18,0-26,9)	16,7(12,4-22,1)	19,1(16,9-21,4)	
FEMENINO	24,6(19,2-31,0)	20,0(16,6-24,0)	19,3(16,2-22,9)	17,8(14,6-21,5)	19,8(15,1-25,4)	20,2(18,3-22,1)	
MIEDO O TEMOR	3,4(2,0-5,9)	6,0(4,4-8,2)	2,5(1,8-3,5)	2,0(1,3-3,2)	5,9(3,8-8,9)	3,9(3,2-4,7)	
MASCULINO	2,9(1,3-6,6)	3,9(2,2-6,8)	1,0(0,4-2,5)	0,7(0,2-1,9)	5,4(2,4-11,7)	2,5(1,7-3,6)	
FEMENINO	3,9(1,7-8,5)	7,6(5,3-10,9)	4,0(2,7-5,8)	3,4(2,1-5,6)	6,4(4,0-10,0)	5,2(4,1-6,4)	
OTROS	0,2(0,0-0,8)	0,5(0,1-2,2)	0,4(0,1-1,3)	1,0(0,5-1,8)	1,0(0,4-2,9)	0,6(0,4-0,9)	
MASCULINO	0,4(0,1-1,6)	1,0(0,2-5,2)	0,9(0,3-2,6)	1,0(0,4-2,5)	1,3(0,4-4,0)	0,9(0,5-1,6)	
FEMENINO	-	0,1(0,0-0,5)	-	1,0(0,4-2,3)	0,7(0,1-3,8)	0,3(0,1-0,6)	

Hace 22 años -en medio de la crisis flagrante de inflación, apagones y terrorismo que azotaba al Perú- se diagnosticaba que uno de los grandes problemas en nuestro país era la desconfianza entre unos y otros, así como con las autoridades e instituciones. En la actualidad, ante una mejoría económica y visibles mejoras materiales, seguimos manifestando desconfianza en nuestra sociedad¹²⁹.

La falta de capital monetario y de sistemas de crédito financiero resalta la importancia de fortalecer el capital social, el mismo que se basa en la confianza. El grado en que confían las personas en sus

autoridades y en otras personas de su entorno da una estimación del grado de confianza de las personas en el sistema. En tal sentido, se encuentra que en las áreas poblacionales de Lima Centro con un 91,6%, Lima Norte con un 90,1%, Lima Este con un 90,7%, Lima Sur con un 88,9% y Callao con un 91,2% de la población adulta encuestada desconfían de las autoridades políticas. La falta de confianza, también se manifestó hacia los jueces con un 72,6% de los adultos encuestados, autoridades policiales varones con un 40,7%, líderes de la comunidad/alcalde con un 65,7%, serenos con un 62,8%, autoridades militares con un 61,2% periodistas con un 60,7% y maestros con un 26,5%. Resultado similar se percibió en Lima Rural en el 2007, y también en el estudio de Lima Metropolitana del 2002. En contraste, se encuentra que son los médicos con un 43,1%, los jefes en el trabajo con un 37,1% y los religiosos con un 31,8%, en quienes más se deposita la confianza (Tabla 14). Resalta el hecho de que más de la mitad de la población adulta encuestada tiene ninguna o poca confianza en el vecino.

TABLA 14
CONFIANZA EN AUTORIDADES Y PERSONAS DEL ENTORNO EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO 2012

CONFIANZA EN	LIMA CENTRO % (IC 95%)	LIMA NORTE % (IC 95%)	LIMA ESTE % (IC 95%)	LIMA SUR % (IC 95%)	CALLAO % (IC 95%)	TOTAL % (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
AUTORIDADES POLICIALES FEMENINAS							F=4,403; df1=7,482; df2=5192,611; p=0,00004
NADA O POCO	36,5(31,1-42,2)	44,2(40,2-48,2)	46,1(42,9-49,3)	33,2(29,7-36,9)	40,8(35,6-46,3)	40,7(38,8-42,6)	
MASCULINO	39,2(32,2-46,7)	45,8(39,1-52,7)	41,8(37,0-46,7)	31,4(26,3-36,9)	43,0(35,6-50,6)	40,2(37,3-43,1)	
FEMENINO	33,8(27,5-40,8)	43,0(38,2-47,9)	50,3(46,2-54,4)	35,2(31,0-39,6)	38,4(32,6-44,6)	41,2(38,9-43,5)	
REGULAR	43,3(38,0-48,8)	34,5(30,9-38,3)	35,3(32,3-38,5)	38,5(35,0-42,2)	36,6(31,3-42,3)	37,3(35,5-39,1)	
MASCULINO	42,4(35,2-49,8)	34,1(28,6-40,1)	36,9(32,4-41,6)	39,1(33,5-45,1)	29,4(22,3-37,6)	36,8(34,1-39,5)	
FEMENINO	44,3(37,7-51,1)	34,8(30,3-39,6)	33,8(30,0-37,9)	37,9(33,5-42,5)	45,0(38,3-51,7)	37,8(35,5-40,1)	
BASTANTE O MUCHO	20,2(16,2-24,8)	21,3(17,9-25,2)	18,6(16,4-21,1)	28,2(25,0-31,7)	22,5(17,6-28,3)	22,0(20,4-23,7)	
MASCULINO	18,4(13,1-25,3)	20,1(14,9-26,6)	21,4(17,7-25,5)	29,5(24,6-34,9)	27,6(20,5-36,0)	23,1(20,7-25,7)	
FEMENINO	21,9(17,1-27,5)	22,2(18,2-26,8)	15,9(13,1-19,2)	27,0(22,9-31,5)	16,7(12,2-22,4)	21,0(19,1-23,1)	
AUTORIDADES POLICIALES VARONES							F=2,560; df1=7,033; df2=4880,869; p=0,012
NADA O POCO	64,6(59,5-69,4)	67,9(64,0-71,5)	74,0(71,1-76,8)	67,2(63,7-70,5)	67,5(63,2-71,6)	68,6(66,9-70,3)	
MASCULINO	66,5(59,9-72,5)	65,0(58,7-70,8)	72,6(68,3-76,6)	62,7(57,7-67,4)	68,2(62,4-73,4)	67,1(64,6-69,5)	
FEMENINO	62,8(56,0-69,2)	70,0(64,9-74,7)	75,4(71,4-79,1)	71,7(67,2-75,8)	66,8(61,4-71,8)	70,1(67,8-72,3)	
REGULAR	29,6(25,2-34,4)	23,5(20,1-27,3)	20,2(17,7-22,9)	24,5(21,6-27,6)	24,6(20,8-28,9)	24,1(22,5-25,7)	
MASCULINO	28,9(23,2-35,2)	26,7(21,3-32,9)	21,6(18,1-25,6)	28,9(24,4-33,8)	22,0(17,1-27,8)	25,7(23,4-28,1)	
FEMENINO	30,2(24,5-36,7)	21,2(17,2-25,7)	18,7(15,4-22,6)	20,0(16,6-23,9)	27,6(22,8-33,0)	22,5(20,6-24,6)	
BASTANTE O MUCHO	5,8(3,5-9,6)	8,6(6,5-11,3)	5,8(4,5-7,5)	8,4(6,6-10,6)	7,8(5,6-10,8)	7,3(6,4-8,4)	
MASCULINO	4,6(1,9-10,9)	8,3(5,5-12,3)	5,8(3,8-8,6)	8,4(5,8-12,0)	9,8(6,4-14,8)	7,2(5,9-8,8)	
FEMENINO	6,9(4,3-11,0)	8,8(6,1-12,6)	5,8(4,2-8,1)	8,3(6,1-11,3)	5,6(3,5-8,9)	7,4(6,2-8,8)	
AUTORIDADES MILITARES							F=3,422; df1=7,632; df2=5296,851; p=0,001
NADA O POCO	60,4(55,4-65,1)	61,8(57,9-65,5)	64,0(60,6-67,3)	57,2(53,5-60,8)	62,5(57,3-67,5)	61,2(59,4-63,0)	
MASCULINO	62,9(56,0-69,4)	59,5(53,0-65,6)	56,8(51,9-61,5)	47,3(42,2-52,6)	59,6(51,7-67,0)	56,8(54,0-59,5)	
FEMENINO	57,9(51,5-64,1)	63,5(58,4-68,3)	71,2(67,1-75,1)	67,2(62,5-71,5)	65,8(59,3-71,7)	65,3(63,0-67,6)	
REGULAR	31,0(26,5-35,8)	27,8(24,4-31,5)	26,7(23,8-29,8)	26,0(23,1-29,2)	27,3(22,9-32,2)	27,7(26,0-29,3)	
MASCULINO	29,1(23,1-35,9)	27,6(22,2-33,7)	29,9(25,7-34,5)	29,7(25,2-34,8)	26,9(20,8-34,0)	28,8(26,4-31,4)	
FEMENINO	32,8(27,1-39,0)	27,9(23,9-32,4)	23,5(20,0-27,3)	22,3(18,6-26,5)	27,8(22,2-34,1)	26,6(24,5-28,7)	
BASTANTE O MUCHO	8,6(6,1-12,1)	10,4(8,1-13,3)	9,3(7,7-11,2)	16,8(14,0-19,9)	10,2(7,5-13,7)	11,1(10,0-12,4)	
MASCULINO	7,9(4,9-12,6)	12,9(9,1-18,1)	13,3(10,4-16,9)	22,9(18,4-28,3)	13,5(9,5-18,9)	14,4(12,6-16,5)	
FEMENINO	9,3(6,1-14,0)	8,6(6,0-12,0)	5,3(3,8-7,4)	10,6(7,8-14,2)	6,4(3,8-10,7)	8,1(6,8-9,6)	
RELIGIOSOS							F=2,593; df1=7,653; df2=5311,077; p=0,009
NADA O POCO	34,0(29,6-38,6)	35,3(31,8-39,0)	39,3(36,1-42,6)	33,2(29,7-36,8)	35,3(29,6-41,4)	35,6(33,8-37,4)	
MASCULINO	39,2(31,9-46,9)	37,8(32,8-43,1)	40,8(36,6-45,3)	34,9(30,1-40,0)	37,5(30,4-45,2)	38,1(35,6-40,7)	
FEMENINO	29,2(24,1-34,9)	33,4(28,7-38,4)	37,8(33,6-42,2)	31,4(27,0-36,2)	32,8(26,0-40,5)	33,3(31,0-35,6)	
REGULAR	36,5(31,5-41,8)	32,1(29,0-35,5)	32,5(29,8-35,4)	28,6(25,3-32,2)	35,2(29,5-41,3)	32,6(30,9-34,3)	
MASCULINO	40,3(33,1-48,0)	36,7(31,6-42,1)	33,2(29,1-37,6)	32,0(26,9-37,6)	32,9(25,8-41,0)	35,0(32,4-37,6)	
FEMENINO	33,0(26,5-40,1)	28,7(24,8-33,0)	31,9(28,2-35,8)	25,3(21,3-29,7)	37,7(30,8-45,2)	30,4(28,2-32,7)	
BASTANTE O MUCHO	29,5(24,9-34,7)	32,6(29,1-36,3)	28,2(25,0-31,5)	38,2(34,8-41,7)	29,5(24,7-34,8)	31,8(30,1-33,6)	
MASCULINO	20,5(15,1-27,2)	25,5(20,4-31,3)	25,9(21,7-30,6)	33,2(28,9-37,7)	29,6(22,6-37,7)	26,9(24,5-29,4)	
FEMENINO	37,8(31,3-44,8)	37,9(32,9-43,1)	30,3(26,5-34,4)	43,3(38,4-48,3)	29,4(23,4-36,3)	36,3(33,9-38,8)	

CONFIANZA EN	LIMA CENTRO % (IC 95%)	LIMA NORTE % (IC 95%)	LIMA ESTE % (IC 95%)	LIMA SUR % (IC 95%)	CALLAO % (IC 95%)	TOTAL % (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
MAESTROS							$F=5,247$; $df1=7,325$; $df2=5083,722$; $p=<0,000001$
NADA O POCO	25,2(21,3-29,6)	27,5(24,1-31,1)	28,5(26,0-31,2)	24,3(21,1-27,9)	25,7(22,1-29,7)	26,5(24,9-28,1)	
MASCULINO	27,5(21,7-34,1)	29,7(24,0-36,2)	27,1(23,0-31,6)	22,5(17,7-28,1)	28,1(23,0-33,7)	26,9(24,5-29,5)	
FEMENINO	23,1(18,5-28,4)	25,8(21,7-30,5)	29,9(26,4-33,8)	26,1(22,1-30,7)	23,1(17,7-29,5)	26,1(24,1-28,2)	
REGULAR	54,2(48,8-59,5)	39,3(35,4-43,3)	47,4(44,3-50,6)	44,9(41,5-48,2)	45,9(41,3-50,7)	45,7(43,9-47,5)	
MASCULINO	56,4(49,2-63,2)	41,0(34,5-47,8)	48,4(43,6-53,1)	46,2(41,0-51,5)	39,9(34,0-46,0)	46,5(43,8-49,3)	
FEMENINO	52,1(45,2-58,9)	38,0(33,5-42,7)	46,5(42,5-50,6)	43,5(39,3-47,9)	52,7(46,7-58,7)	45,0(42,7-47,3)	
BASTANTE O MUCHO	20,6(16,9-24,9)	33,2(29,1-37,7)	24,1(21,5-26,8)	30,8(27,7-34,1)	28,4(23,8-33,4)	27,8(26,1-29,5)	
MASCULINO	16,2(11,8-21,7)	29,3(22,8-36,6)	24,6(21,2-28,3)	31,3(26,8-36,3)	32,1(25,6-39,3)	26,6(24,2-29,1)	
FEMENINO	24,8(19,3-31,3)	36,2(31,0-41,7)	23,6(20,1-27,4)	30,3(26,3-34,7)	24,2(18,8-30,5)	28,9(26,6-31,3)	
MÉDICOS							$F=2,555$; $df1=7,531$; $df2=5226,344$; $p=0,010$
NADA O POCO	14,9(11,9-18,6)	18,5(15,6-21,8)	16,3(14,1-18,7)	15,4(12,8-18,4)	17,1(13,7-21,1)	16,5(15,2-17,9)	
MASCULINO	15,5(11,2-21,0)	19,9(15,5-25,1)	15,9(12,8-19,6)	17,2(13,2-22,2)	18,2(13,8-23,5)	17,3(15,4-19,4)	
FEMENINO	14,4(10,6-19,2)	17,5(14,0-21,7)	16,6(13,7-19,9)	13,5(10,7-16,9)	15,9(11,3-21,9)	15,8(14,2-17,6)	
REGULAR	45,8(40,7-50,9)	36,5(32,5-40,7)	43,8(40,8-46,8)	36,6(33,0-40,5)	40,9(36,0-46,0)	40,4(38,6-42,3)	
MASCULINO	46,7(39,6-53,9)	38,4(31,8-45,4)	44,5(40,0-49,1)	33,9(28,5-39,8)	38,4(32,5-44,6)	40,4(37,7-43,2)	
FEMENINO	44,9(39,0-51,0)	35,2(30,5-40,1)	43,1(38,9-47,3)	39,4(35,0-44,0)	43,9(37,1-50,9)	40,4(38,1-42,7)	
BASTANTE O MUCHO	39,3(34,1-44,8)	44,9(40,8-49,2)	40,0(36,8-43,2)	48,0(44,1-51,9)	41,9(36,9-47,2)	43,1(41,1-45,0)	
MASCULINO	37,8(30,9-45,3)	41,8(35,0-48,8)	39,5(35,0-44,3)	48,8(43,2-54,5)	43,5(37,1-50,1)	42,3(39,5-45,1)	
FEMENINO	40,7(34,5-47,2)	47,3(42,0-52,7)	40,4(36,2-44,7)	47,1(42,4-51,9)	40,2(33,5-47,3)	43,8(41,3-46,3)	
AUTORIDADES POLÍTICAS							$F=1,569$; $df1=7,348$; $df2=5099,357$; $p=0,136$
NADA O POCO	91,6(88,6-93,9)	90,1(87,3-92,3)	90,7(88,5-92,6)	88,9(86,5-91,0)	91,2(87,8-93,7)	90,4(89,2-91,4)	
MASCULINO	91,0(86,0-94,3)	89,9(85,4-93,1)	89,6(86,0-92,4)	88,0(84,1-91,0)	89,9(84,2-93,8)	89,6(87,8-91,2)	
FEMENINO	92,2(88,8-94,7)	90,3(86,4-93,1)	91,8(89,3-93,7)	89,9(86,5-92,5)	92,6(88,3-95,4)	91,1(89,6-92,4)	
REGULAR	7,1(4,9-10,0)	7,6(5,8-9,8)	8,6(6,9-10,7)	9,7(7,9-11,9)	8,2(5,8-11,5)	8,2(7,3-9,3)	
MASCULINO	7,2(4,3-11,8)	7,5(4,9-11,4)	9,8(7,3-13,2)	10,7(7,9-14,2)	9,8(6,0-15,6)	9,0(7,6-10,6)	
FEMENINO	6,9(4,6-10,4)	7,6(5,4-10,7)	7,3(5,5-9,7)	8,7(6,5-11,8)	6,4(3,8-10,6)	7,5(6,4-8,8)	
BASTANTE O MUCHO	1,3(0,6-3,0)	2,3(1,2-4,4)	0,7(0,3-1,5)	1,4(0,7-2,5)	0,6(0,2-1,7)	1,4(1,0-2,0)	
MASCULINO	1,9(0,6-5,4)	2,6(1,1-5,8)	0,5(0,1-1,8)	1,3(0,6-3,1)	0,3(0,0-1,9)	1,4(0,9-2,3)	
FEMENINO	0,8(0,3-2,5)	2,1(0,8-5,2)	0,9(0,3-2,2)	1,4(0,6-3,3)	1,0(0,3-2,8)	1,3(0,8-2,2)	
LÍDERES DE SINDICATOS							$F=1,267$; $df1=7,381$; $df2=5122,603$; $p=0,260$
NADA O POCO	27,5(6,5-67,5)	60,8(37,7-80,0)	57,8(41,6-72,4)	51,0(35,6-66,3)	65,0(40,9-83,2)	56,5(46,8-65,8)	
MASCULINO	13,6(1,7-58,4)	64,7(38,3-84,4)	51,4(32,5-69,9)	44,5(26,4-64,2)	64,8(39,1-84,1)	53,6(42,3-64,5)	
FEMENINO	100,0	51,7(15,0-86,7)	73,8(50,1-88,8)	65,0(40,0-83,8)	66,2(14,5-95,8)	64,9(45,4-80,5)	
REGULAR	63,3(26,5-89,2)	33,3(15,4-57,7)	22,7(12,0-38,8)	24,8(12,4-43,3)	17,0(6,9-36,1)	27,4(19,4-37,1)	
MASCULINO	75,4(34,9-94,6)	31,8(13,2-58,9)	24,0(11,5-43,3)	26,7(11,1-51,6)	15,3(5,6-35,4)	28,1(19,2-39,2)	
FEMENINO	-	36,6(7,1-81,5)	19,6(7,5-42,2)	20,5(6,9-47,4)	33,8(4,2-85,5)	25,3(11,4-47,1)	
BASTANTE O MUCHO	9,2(1,2-46,3)	5,9(1,7-18,3)	19,5(9,6-35,4)	24,2(12,0-42,7)	18,1(5,7-44,5)	16,1(10,5-23,8)	
MASCULINO	10,9(1,4-52,1)	3,5(0,5-21,6)	24,6(11,7-44,5)	28,7(13,1-51,7)	19,9(6,2-48,2)	18,3(11,4-27,9)	
FEMENINO	-	11,7(2,2-43,2)	6,6(0,9-35,6)	14,5(5,1-34,7)	-	9,8(4,2-21,0)	
LÍDERES DE LA COMUNIDAD / ALCALDE							$F=10,718$; $df1=6,993$; $df2=4853,066$; $p=<0,000001$
NADA O POCO	58,1(51,9-64,1)	75,0(71,1-78,1)	69,2(66,1-72,2)	62,9(58,1-67,4)	52,2(47,0-57,4)	65,7(63,6-67,7)	
MASCULINO	57,8(50,5-64,8)	76,6(70,8-81,6)	69,2(64,6-73,5)	61,9(56,0-67,4)	52,2(45,2-59,1)	65,4(62,6-68,0)	
FEMENINO	58,4(50,6-65,9)	73,8(68,2-78,8)	69,2(65,0-73,1)	64,0(58,0-69,5)	52,3(45,4-59,1)	66,0(63,3-68,7)	
REGULAR	30,9(26,2-36,1)	19,5(16,2-23,1)	25,9(23,2-28,8)	22,7(19,7-26,0)	36,0(31,5-40,7)	25,5(23,8-27,2)	
MASCULINO	31,4(24,8-38,8)	19,0(14,5-24,5)	26,4(22,4-30,9)	21,5(17,5-26,1)	36,8(31,0-43,0)	25,7(23,4-28,1)	
FEMENINO	30,5(24,8-36,9)	19,8(15,7-24,7)	25,4(21,8-29,4)	23,9(19,7-28,6)	35,1(29,0-41,7)	25,3(23,1-27,5)	
BASTANTE O MUCHO	10,9(7,4-15,8)	5,5(4,0-7,6)	4,9(3,6-6,5)	14,5(11,1-18,5)	11,7(8,8-15,5)	8,8(7,6-10,2)	
MASCULINO	10,8(6,7-17,1)	4,4(2,5-7,7)	4,4(2,8-6,7)	16,7(12,0-22,6)	11,0(7,3-16,3)	9,0(7,4-10,9)	
FEMENINO	11,0(7,3-16,4)	6,4(4,1-9,7)	5,4(3,6-7,9)	12,2(8,7-16,8)	12,6(8,7-18,0)	8,7(7,3-10,3)	

CONFIANZA EN	LIMA CENTRO % (IC 95%)	LIMA NORTE % (IC 95%)	LIMA ESTE % (IC 95%)	LIMA SUR % (IC 95%)	CALLAO % (IC 95%)	TOTAL % (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
SU JEFE EN EL TRABAJO							$F=3,849$; $df1=7,337$; $df2=5091,669$; $p=0,00027$
NADA O POCO	21,3(15,7-28,1)	30,9(24,9-37,6)	22,0(18,8-25,6)	19,5(15,4-24,2)	27,8(21,3-35,3)	24,2(21,8-26,8)	
MASCULINO	22,9(15,4-32,5)	33,1(25,1-42,3)	22,9(18,5-28,1)	19,6(14,1-26,6)	30,3(21,7-40,5)	25,6(22,4-29,1)	
FEMENINO	19,6(13,0-28,4)	28,0(19,7-38,3)	20,5(15,8-26,0)	19,2(14,5-25,1)	23,1(14,2-35,4)	22,3(19,0-26,0)	
REGULAR	41,4(33,5-49,7)	37,5(30,8-44,6)	44,3(40,1-48,6)	31,5(26,9-36,6)	39,5(32,4-47,0)	38,7(36,0-41,5)	
MASCULINO	44,8(34,9-55,1)	38,1(29,5-47,5)	45,9(40,5-51,5)	34,6(28,2-41,7)	33,5(24,2-44,3)	39,9(36,3-43,6)	
FEMENINO	37,7(26,1-50,9)	36,7(27,1-47,5)	41,5(34,9-48,4)	27,6(21,8-34,2)	50,5(37,9-63,0)	37,0(32,8-41,5)	
BASTANTE O MUCHO	37,3(29,1-46,3)	31,6(25,7-38,2)	33,7(29,4-38,3)	49,0(43,3-54,7)	32,7(25,5-40,9)	37,1(34,3-40,0)	
MASCULINO	32,4(22,7-43,9)	28,8(21,6-37,3)	31,1(25,9-36,8)	45,7(37,6-54,1)	36,2(26,7-46,9)	34,5(31,0-38,2)	
FEMENINO	42,8(30,6-55,9)	35,3(26,5-45,1)	38,0(31,3-45,3)	53,2(46,1-60,1)	26,4(17,0-38,6)	40,7(36,4-45,0)	
VECINOS							$F=2,244$; $df1=7,407$; $df2=5140,662$; $p=0,025$
NADA O POCO	54,8(49,5-59,9)	59,7(55,2-63,9)	59,0(55,7-62,2)	54,8(51,0-58,5)	58,1(53,1-63,0)	57,5(55,5-59,4)	
MASCULINO	52,2(43,9-60,4)	58,6(51,1-65,7)	55,4(50,7-60,0)	50,3(44,7-55,9)	52,2(44,7-59,5)	54,1(51,1-57,0)	
FEMENINO	57,2(51,3-62,9)	60,4(55,4-65,3)	62,5(58,3-66,5)	59,4(54,4-64,1)	64,9(58,4-70,8)	60,6(58,2-62,9)	
REGULAR	32,0(27,5-36,9)	31,4(27,5-35,5)	32,1(29,3-35,1)	31,7(28,5-35,0)	34,4(29,8-39,3)	32,0(30,3-33,8)	
MASCULINO	31,9(25,3-39,3)	32,3(26,3-38,9)	34,9(30,7-39,4)	33,9(29,0-39,2)	39,2(32,8-46,0)	34,1(31,5-36,7)	
FEMENINO	32,2(26,7-38,1)	30,7(26,2-35,7)	29,3(25,9-32,9)	29,3(25,0-34,1)	29,0(23,1-35,7)	30,2(28,0-32,4)	
BASTANTE O MUCHO	13,2(10,1-17,2)	9,0(7,0-11,4)	8,9(7,4-10,8)	13,6(11,3-16,2)	7,5(5,4-10,3)	10,5(9,4-11,7)	
MASCULINO	15,9(10,8-22,9)	9,1(6,2-13,4)	9,7(7,5-12,4)	15,8(12,3-20,0)	8,7(5,5-13,3)	11,9(10,2-13,8)	
FEMENINO	10,6(7,5-14,9)	8,9(6,4-12,2)	8,2(6,2-10,8)	11,3(8,8-14,4)	6,1(3,7-9,9)	9,2(8,0-10,7)	
PERIODISTAS							$F=2,234$; $df1=7,473$; $df2=5186,074$; $p=0,026$
NADA O POCO	57,7(52,4-62,8)	66,7(62,3-70,9)	57,6(54,2-60,9)	59,7(55,9-63,5)	59,3(53,9-64,4)	60,7(58,7-62,6)	
MASCULINO	58,0(50,2-65,5)	72,6(65,7-78,6)	54,3(49,2-59,3)	59,7(54,1-65,1)	57,1(51,0-63,0)	60,8(57,9-63,6)	
FEMENINO	57,4(51,2-63,3)	62,3(57,1-67,3)	60,9(56,7-65,0)	59,8(54,4-64,9)	61,8(52,9-69,9)	60,6(58,1-63,0)	
REGULAR	35,3(30,6-40,3)	26,4(22,9-30,2)	35,3(31,9-38,8)	33,1(29,7-36,7)	32,6(27,9-37,6)	32,2(30,4-34,0)	
MASCULINO	36,9(29,7-44,7)	21,6(16,5-27,6)	38,4(33,2-43,9)	32,8(28,0-37,9)	34,2(28,6-40,2)	32,4(29,8-35,2)	
FEMENINO	33,8(28,6-39,4)	30,0(25,7-34,7)	32,2(28,4-36,3)	33,4(28,6-38,7)	30,7(23,6-38,9)	31,9(29,7-34,2)	
BASTANTE O MUCHO	7,0(4,9-10,0)	6,9(5,0-9,4)	7,1(5,6-8,8)	7,2(5,7-9,0)	8,1(5,6-11,6)	7,1(6,2-8,2)	
MASCULINO	5,1(2,7-9,2)	5,8(3,3-10,0)	7,3(5,3-10,1)	7,5(5,2-10,6)	8,8(5,4-14,0)	6,8(5,6-8,3)	
FEMENINO	8,9(5,6-13,8)	7,6(5,2-11,1)	6,8(5,1-9,1)	6,8(5,0-9,3)	7,4(4,6-11,8)	7,5(6,3-8,9)	
JUECES							$F=3,533$; $df1=7,373$; $df2=5117,174$; $p=0,001$
NADA O POCO	68,0(62,9-72,6)	77,2(73,7-80,4)	71,8(68,6-74,8)	72,9(69,5-76,2)	70,0(65,1-74,5)	72,6(70,9-74,3)	
MASCULINO	71,3(63,9-77,6)	80,1(74,5-84,7)	68,2(63,5-72,6)	72,8(68,0-77,1)	68,2(61,5-74,2)	72,5(70,0-74,9)	
FEMENINO	64,8(58,4-70,7)	75,1(70,4-79,3)	75,4(71,1-79,3)	73,1(68,4-77,3)	72,0(65,7-77,5)	72,7(70,4-74,9)	
REGULAR	28,2(24,1-32,8)	18,9(15,8-22,5)	26,3(23,5-29,4)	22,2(19,4-25,3)	25,9(21,8-30,6)	23,8(22,2-25,4)	
MASCULINO	24,5(18,5-31,8)	16,1(11,8-21,5)	29,3(25,1-33,8)	21,4(17,6-25,9)	27,7(22,1-34,1)	23,4(21,2-25,8)	
FEMENINO	31,7(26,4-37,6)	21,1(17,1-25,6)	23,4(19,7-27,5)	23,0(19,0-27,5)	24,0(18,4-30,6)	24,1(22,1-26,3)	
BASTANTE O MUCHO	3,8(2,3-6,4)	3,8(2,5-5,8)	1,8(1,2-2,9)	4,9(3,7-6,4)	4,1(2,6-6,4)	3,6(3,0-4,3)	
MASCULINO	4,2(2,1-8,3)	3,8(2,0-7,3)	2,5(1,4-4,6)	5,8(3,9-8,5)	4,1(2,0-8,2)	4,0(3,1-5,2)	
FEMENINO	3,5(1,5-7,9)	3,9(2,2-6,7)	1,2(0,6-2,3)	3,9(2,5-5,9)	4,0(2,1-7,5)	3,2(2,4-4,3)	
SERENOS							$F=2,859$; $df1=7,231$; $df2=5018,416$; $p=0,005$
NADA O POCO	56,4(50,8-61,9)	67,2(62,6-71,5)	61,4(58,1-64,5)	65,0(60,5-69,3)	61,7(56,4-66,8)	62,8(60,8-64,9)	
MASCULINO	57,3(49,5-64,7)	71,3(64,2-77,5)	58,3(53,2-63,3)	62,8(56,8-68,5)	59,3(51,8-66,3)	62,3(59,3-65,2)	
FEMENINO	55,6(49,9-62,0)	64,2(58,5-69,4)	64,4(60,2-68,4)	67,3(61,5-72,6)	64,4(58,2-70,2)	63,4(60,8-65,9)	
REGULAR	35,5(30,2-41,0)	24,7(20,8-29,0)	32,2(29,3-35,2)	26,5(23,1-30,3)	32,6(28,2-37,3)	29,6(27,8-31,5)	
MASCULINO	34,6(28,0-41,9)	20,6(15,3-27,0)	34,6(29,7-39,9)	27,0(22,4-32,2)	34,7(28,8-41,0)	29,7(27,1-32,4)	
FEMENINO	36,3(29,9-43,2)	27,7(22,7-33,5)	29,7(26,1-33,6)	26,1(21,2-31,6)	30,2(24,8-36,2)	29,6(27,2-32,1)	
BASTANTE O MUCHO	8,1(5,7-11,5)	8,1(6,0-10,9)	6,5(5,0-8,3)	8,4(6,6-10,7)	5,7(3,8-8,5)	7,5(6,5-8,6)	
MASCULINO	8,1(4,6-13,8)	8,1(5,1-12,7)	7,0(5,1-9,7)	10,1(7,5-13,6)	6,1(3,6-10,1)	8,0(6,6-9,7)	
FEMENINO	8,2(5,1-12,8)	8,1(5,4-11,9)	5,9(4,2-8,3)	6,6(4,8-9,1)	5,4(3,0-9,3)	7,0(5,8-8,5)	

La inseguridad ciudadana se ha convertido en un tema central y en una de las principales preocupaciones en el país. El problema se agudizó a partir de los años 90 con el incremento de la violencia, sobre todo en las grandes ciudades de América Latina. La mayoría de la población adulta según áreas poblacionales de Lima Metropolitana se muestra insatisfecha o descontenta con el trabajo de los policías y militares, los cuales carecen casi por completo de su confianza (Tabla 14). Resulta evidente que la sociedad no puede tener mucha confianza en la eficiencia de una administración de justicia que deja impune aproximadamente el 90% de los delitos registrados¹²⁹.

Los importantes cambios políticos y sociales ocurridos durante las últimas décadas en los países de la región deben generar nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad civil, que promuevan la participación de las poblaciones más vulnerables tradicionalmente excluidas de la gestión pública.

Con respecto a la seguridad que las personas perciben de su entorno, declaran no sentirse protegidos por el Estado un 72,4% de los adultos encuestados, y según áreas poblacionales se observa que en Lima Centro un 72,4%, en Lima Norte un 69,8%, en Lima Este un 74,7%, en Lima Sur un 74,4% y en Callao un 69,6% manifiestan que nada o poco los protege el estado. En contraposición, la percepción de sentimientos de protección de la familia es mayor con un 81,2% de los adultos encuestados. Así, según áreas poblacionales, tenemos que Lima Centro con un 85,0%, Lima Norte con un 79,1%, Lima Este con un 80,4%, Lima Sur con un 80,7% y Callao con un 82,9%, respaldan dicha percepción. El sentimiento de protección más alto referido por los encuestados es sobre Dios con un 92,2%, esto según áreas poblacionales se distribuye de la siguiente manera, para Lima Centro un 89,4%, Lima Norte un 93,1%, Lima Este un 92,2%, Lima Sur un 92,7% y Callao con un 93,3%. Estos datos contrastan relativamente con los encontrados en el 2002, cuando el 76,9% declaraba no sentir ninguna protección por parte del Estado y solo el 70% declaraba sentirse protegido por la familia (Tabla 15).

A estos fenómenos se agrega la vulnerabilidad social como consecuencia específica de la forma que ha adoptado el capitalismo en los últimos años: economía de libre mercado, abierta al mundo y con un “estado mínimo”. Ante esta vulnerabilidad la sociedad responde confiando en la familia, primer sistema social donde se inicia la transmisión de valores, roles, creencias, mitos, conocimientos y prácticas. En este proceso, la familia representa el grupo más poderoso para su desarrollo social y emocional.

TABLA 15

SENTIMIENTOS DE PROTECCIÓN EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SENTIMIENTOS DE PROTECCIÓN	LIMA CENTRO % (IC 95%)	LIMA NORTE % (IC 95%)	LIMA ESTE % (IC 95%)	LIMA SUR % (IC 95%)	CALLAO % (IC 95%)	TOTAL % (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
DEL ESTADO							$F=2,049$; $df1=6,951$; $df2=4823,758$; $p=0,046$
NADA O POCO	72,4(67,6-76,7)	69,8(65,4-74,0)	74,7(71,8-77,4)	74,4(71,0-77,4)	69,6(63,8-74,8)	72,4(70,5-74,2)	
MASCULINO	73,5(66,6-79,4)	70,0(64,1-75,3)	74,8(70,3-78,9)	76,0(71,9-79,6)	68,6(59,7-76,3)	72,9(70,4-75,3)	
FEMENINO	71,4(65,2-76,9)	69,7(63,3-75,4)	74,6(71,1-77,9)	72,7(68,2-76,8)	70,8(64,6-76,3)	71,9(69,4-74,2)	
REGULAR	23,0(18,8-27,8)	24,3(21,1-27,9)	22,9(20,2-25,8)	21,4(18,6-24,5)	23,6(19,4-28,4)	23,1(21,5-24,7)	
MASCULINO	23,1(17,5-29,9)	25,9(20,9-31,5)	22,6(18,8-26,9)	18,7(15,5-22,3)	24,6(18,4-32,1)	22,9(20,7-25,2)	
FEMENINO	22,8(17,8-28,8)	23,2(19,1-28,0)	23,2(20,0-26,7)	24,1(20,2-28,6)	22,5(17,9-28,0)	23,3(21,3-25,4)	
BASTANTE O MUCHO	4,6(3,1-6,9)	5,8(3,9-8,6)	2,4(1,7-3,3)	4,3(3,1-5,8)	6,8(4,7-9,5)	4,6(3,8-5,5)	
MASCULINO	3,4(1,9-6,0)	4,1(2,2-7,7)	2,6(1,6-4,3)	5,4(3,5-8,1)	6,8(4,0-11,5)	4,2(3,3-5,4)	
FEMENINO	5,8(3,3-10,1)	7,1(4,5-11,0)	2,2(1,4-3,4)	3,1(1,9-5,2)	6,7(4,3-10,4)	4,9(3,8-6,3)	
DE LA FAMILIA							$F=2,399$; $df1=7,435$; $df2=5159,638$; $p=0,017$
NADA O POCO	7,4(5,3-10,3)	6,7(5,0-8,9)	6,6(5,2-8,3)	8,6(6,9-10,8)	5,1(3,4-7,4)	7,0(6,2-8,0)	
MASCULINO	6,7(4,2-10,6)	8,2(5,5-12,3)	6,7(4,8-9,2)	7,6(5,2-11,0)	5,0(2,9-8,5)	7,0(5,8-8,5)	
FEMENINO	8,1(5,2-12,5)	5,6(3,7-8,3)	6,5(4,9-8,7)	9,7(7,5-12,5)	5,2(3,0-8,9)	7,0(5,9-8,3)	
REGULAR	7,6(5,4-10,4)	14,2(11,6-17,2)	13,0(11,3-15,0)	10,6(8,2-13,7)	12,0(8,8-16,1)	11,8(10,6-13,0)	
MASCULINO	6,6(3,9-11,0)	15,1(11,1-20,2)	11,9(9,4-15,0)	10,1(6,6-15,1)	11,4(7,6-16,8)	11,3(9,6-13,2)	
FEMENINO	8,4(5,7-12,4)	13,5(10,5-17,2)	14,1(11,6-17,0)	11,2(8,7-14,3)	12,6(8,5-18,3)	12,2(10,8-13,8)	
BASTANTE O MUCHO	85,0(81,1-88,3)	79,1(75,5-82,3)	80,4(77,7-82,8)	80,7(76,9-84,1)	82,9(78,4-86,7)	81,2(79,6-82,7)	
MASCULINO	86,7(81,4-90,6)	76,6(71,0-81,5)	81,4(77,4-84,8)	82,3(76,3-87,1)	83,6(77,2-88,4)	81,7(79,3-83,8)	
FEMENINO	83,4(77,7-87,9)	80,9(76,4-84,8)	79,4(75,9-82,4)	79,1(75,0-82,7)	82,2(75,7-87,3)	80,7(78,7-82,6)	

SENTIMIENTOS DE PROTECCIÓN	LIMA CENTRO % (IC 95%)	LIMA NORTE % (IC 95%)	LIMA ESTE % (IC 95%)	LIMA SUR % (IC 95%)	CALLAO % (IC 95%)	TOTAL % (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
DEL SINDICATO							$F=2,230$; $df1=7,495$; $df2=5201,449$; $p=0,026$
NADA O POCO	63,0(26,3-89,1)	64,5(44,0-80,8)	42,3(29,5-56,3)	41,6(26,3-58,6)	63,2(39,4-81,9)	52,6(43,4-61,6)	
MASCULINO	56,0(19,0-87,3)	66,7(41,5-85,0)	38,7(23,6-56,3)	50,8(29,1-72,2)	60,5(35,8-80,8)	53,8(42,8-64,6)	
FEMENINO	100,0	60,4(26,6-86,5)	50,9(31,1-70,4)	26,3(13,0-45,9)	100,0	49,7(34,2-65,3)	
REGULAR	-	27,6(13,3-48,6)	41,7(29,0-55,6)	31,6(17,7-49,7)	4,0(0,5-24,5)	28,2(20,7-37,1)	
MASCULINO	-	25,4(9,9-51,3)	48,3(31,5-65,5)	17,4(4,5-48,3)	4,3(0,6-26,1)	25,1(16,6-36,2)	
FEMENINO	-	31,7(9,1-68,3)	26,1(13,2-44,9)	55,2(34,7-74,0)	-	35,4(22,1-51,3)	
BASTANTE O MUCHO	37,0(10,9-73,7)	7,9(2,6-21,4)	16,0(8,3-28,7)	26,9(14,2-45,0)	32,8(15,4-56,8)	19,2(13,5-26,7)	
MASCULINO	44,0(12,7-81,0)	7,9(1,8-28,5)	13,0(4,9-30,1)	31,8(15,1-55,1)	35,2(16,4-60,2)	21,0(13,9-30,5)	
FEMENINO	-	7,9(1,6-30,7)	23,0(9,3-46,6)	18,6(7,1-40,5)	-	14,9(8,0-26,2)	
DE DIOS							$F=1,763$; $df1=7,323$; $df2=5082,074$; $p=0,086$
NADA O POCO	5,0(3,0-8,2)	1,8(1,0-3,3)	2,8(1,9-4,0)	2,7(1,8-4,2)	1,7(0,6-3,2)	2,8(2,2-3,5)	
MASCULINO	7,8(4,2-14,1)	3,1(1,4-6,7)	4,7(3,1-7,2)	3,3(1,9-5,7)	1,2(0,4-3,2)	4,1(3,1-5,5)	
FEMENINO	2,4(1,1-5,3)	0,8(0,3-2,0)	0,8(0,4-1,9)	2,1(1,1-4,0)	2,2(0,9-5,5)	1,5(1,0-2,1)	
REGULAR	5,6(3,8-8,2)	5,1(3,6-7,3)	5,1(3,8-6,6)	4,6(3,3-6,4)	5,0(3,2-7,8)	5,1(4,3-5,9)	
MASCULINO	8,1(4,9-12,9)	7,1(4,3-11,3)	7,9(5,8-10,6)	6,7(4,5-9,9)	6,7(3,9-11,3)	7,3(6,0-8,9)	
FEMENINO	3,3(1,8-5,9)	3,8(2,3-6,2)	2,3(1,4-3,7)	2,5(1,4-4,3)	3,2(1,2-8,1)	3,0(2,3-3,9)	
BASTANTE O MUCHO	89,4(85,4-92,4)	93,1(90,6-94,9)	92,2(90,3-93,7)	92,7(90,5-94,4)	93,3(90,6-95,2)	92,2(91,1-93,1)	
MASCULINO	84,2(76,8-89,5)	89,8(85,2-93,1)	87,4(83,9-90,1)	90,0(86,3-92,7)	92,1(87,7-95,0)	88,5(86,6-90,2)	
FEMENINO	94,2(90,3-96,6)	95,4(92,8-97,1)	96,9(95,4-98,0)	95,4(93,0-97,0)	94,6(89,8-97,2)	95,5(94,4-96,4)	
DE LA COMUNIDAD							$F=1,250$; $df1=7,273$; $df2=5047,410$; $p=0,270$
NADA O POCO	44,7(39,9-49,6)	52,1(47,7-56,5)	51,2(47,9-54,5)	48,8(44,7-52,9)	48,3(43,9-52,7)	49,5(47,6-51,4)	
MASCULINO	46,9(39,3-54,7)	53,6(46,5-60,6)	48,1(43,5-52,8)	49,2(43,6-54,8)	42,2(36,0-48,6)	48,8(45,9-51,6)	
FEMENINO	42,7(36,8-48,7)	51,0(45,4-56,6)	54,2(49,8-58,6)	48,3(43,3-53,3)	55,1(49,0-61,0)	50,2(47,7-52,7)	
REGULAR	37,2(32,3-42,3)	33,6(29,8-37,6)	35,8(32,8-39,0)	35,1(31,5-38,8)	35,7(31,1-40,5)	35,3(33,5-37,1)	
MASCULINO	37,5(30,2-45,4)	32,6(26,8-39,0)	37,7(33,3-42,3)	34,6(29,4-40,0)	40,0(32,3-48,3)	36,0(33,3-38,8)	
FEMENINO	36,9(30,5-43,8)	34,3(29,6-39,4)	33,9(29,9-38,2)	35,5(31,0-40,3)	30,8(25,5-36,6)	34,6(32,2-37,0)	
BASTANTE O MUCHO	18,1(13,9-23,3)	14,3(11,4-17,7)	13,0(11,0-15,4)	16,2(13,5-19,2)	16,1(12,6-20,2)	15,2(13,8-16,8)	
MASCULINO	15,6(10,7-22,1)	13,8(9,6-19,4)	14,2(11,3-17,7)	16,2(12,5-20,8)	17,8(12,9-24,1)	15,2(13,3-17,4)	
FEMENINO	20,5(15,1-27,1)	14,7(11,1-19,1)	11,8(9,6-14,6)	16,1(12,7-20,4)	14,1(10,1-19,3)	15,2(13,4-17,2)	
OTROS							$F=2,205$; $df1=7,435$; $df2=5160,146$; $p=0,028$
NADA O POCO	-	6,6(1,6-24,1)	20,1(9,3-38,1)	32,9(15,8-56,3)	-	15,1(9,2-23,7)	
MASCULINO	-	5,1(0,7-30,7)	23,9(9,3-49,0)	33,2(13,7-61,0)	-	16,9(9,2-28,8)	
FEMENINO	-	7,6(1,2-36,2)	11,0(3,9-27,3)	32,5(10,9-65,5)	-	12,5(5,8-25,1)	
REGULAR	34,7(12,8-65,8)	9,0(2,7-26,5)	26,2(15,2-41,3)	6,1(0,8-33,4)	10,1(2,0-37,7)	16,4(10,4-25,0)	
MASCULINO	24,3(7,5-55,9)	4,0(0,5-25,3)	27,3(14,5-45,4)	-	-	14,1(7,8-24,2)	
FEMENINO	68,9(12,0-97,3)	12,3(2,9-39,2)	23,6(7,3-54,6)	15,3(2,2-59,4)	25,1(5,1-67,8)	19,7(9,6-36,1)	
BASTANTE O MUCHO	65,3(34,2-87,2)	84,3(66,2-93,7)	53,8(35,8-70,8)	60,9(37,8-80,0)	89,9(62,3-98,0)	68,5(58,4-77,1)	
MASCULINO	75,7(44,1-92,5)	90,9(66,9-98,0)	48,8(26,3-71,9)	66,8(39,0-86,3)	100,0(100,0-100,0)	69,0(55,9-79,6)	
FEMENINO	31,1(2,7-88,0)	80,1(54,4-93,2)	65,5(40,8-83,9)	52,2(22,2-80,8)	74,9(32,2-94,9)	67,8(52,2-80,2)	

ESTRESORES PSICOSOCIALES

Los estresores psicosociales, y la magnitud de la tensión que éstos generan podrían estar relacionados directamente con el desarrollo de problemas o trastornos en la salud mental y también con diversos problemas físicos. La evaluación y medición de los mismos expresan en cierta medida las condiciones sociales y económicas del país. De las cifras que aquí se muestran se concluye que una parte importante de la población presenta una alta tensión ante diversas situaciones, siendo mayor la relacionada con la

delincuencia que representa un 59,9% del total de adultos encuestados, distribuyéndose, según áreas poblacionales, en Lima Centro con un 46,9%, Lima Norte con un 56,8%, Lima Este con un 61,1%, Lima Sur con un 71,0% y Callao con un 63,8%. En segundo lugar, tenemos al narcotráfico con un 47,9% de los adultos encuestados, y según áreas poblacionales, Lima Centro con un 41,0%, Lima Norte con un 47,9%, Lima Este con un 38,9%, Lima Sur con un 62,2% y Callao con un 51,7%. Es el terrorismo, el tercer factor generador de estrés con un 41,8%, siendo su distribución en Lima Centro un 38,1%, Lima Norte un 39,2%, Lima Este un 33,2%, Lima Sur un 57,2% y Callao 44,3%. La salud, se ubica en cuarto lugar con un 34,9%, mostrándose en Lima Centro un 28,2%, Lima Norte un 36,9%, Lima Este un 31,7%, Lima Sur un 40,5% y Callao un 37,5%. El dinero genera en un 28,3% de los adultos encuestados estrés psicosocial, distribuyéndose esta percepción en Lima Centro en un 21,6%, Lima Norte en un 30,8%, Lima Este en un 26,2%, Lima Sur en un 32,7% y Callao en un 29,0%. Esta situación contrasta con la observada hace 10 años, cuando el principal estresor reportado era el dinero con un 39,7%, seguido de la salud con un 34,9%, el trabajo o estudio y los hijos y parientes con un 25,9% cada uno. Ante los diferentes tipos de indicadores psicosociales, son las mujeres, quienes muestran más altos niveles de estrés en relación a los hombres (Tabla 16).

TABLA 16
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TIPO DE ESTRESOR PSICOSOCIAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
TRABAJO							$F=2,356$; $df1=7,463$; $df2=5179,303$; $p=0,018$
NADA O POCO	46,7(40,9-52,5)	53,9(48,8-58,9)	53,6(50,0-57,2)	52,5(48,1-57,0)	60,7(53,8-67,2)	53,0(50,8-55,3)	
MASCULINO	42,9(35,3-50,9)	51,2(43,8-58,4)	49,9(45,2-54,6)	53,6(47,1-59,9)	58,2(49,6-66,2)	50,8(47,8-53,9)	
FEMENINO	51,5(43,8-59,1)	56,9(50,1-63,4)	59,2(53,8-64,4)	51,2(45,0-57,4)	65,2(55,8-73,6)	56,0(52,9-59,1)	
REGULAR	37,7(32,1-43,7)	28,6(24,5-33,2)	32,4(29,2-35,7)	28,4(24,7-32,3)	25,3(20,1-31,3)	30,6(28,7-32,7)	
MASCULINO	40,1(32,8-47,7)	29,2(23,3-35,8)	35,0(30,6-39,7)	29,0(23,9-34,7)	28,3(20,9-37,1)	32,3(29,6-35,1)	
FEMENINO	34,7(27,3-42,9)	28,0(22,5-34,3)	28,4(23,9-33,5)	27,5(22,5-33,1)	19,9(13,4-28,5)	28,4(25,7-31,3)	
BASTANTE O MUCHO	15,6(11,4-21,0)	17,5(13,9-21,8)	14,0(11,9-16,5)	19,1(15,9-22,7)	14,0(10,3-18,8)	16,3(14,7-18,1)	
MASCULINO	17,1(11,3-25,0)	19,6(14,9-25,4)	15,1(12,1-18,6)	17,4(13,1-22,8)	13,5(9,1-19,5)	16,9(14,7-19,2)	
FEMENINO	13,8(8,9-20,9)	15,1(10,8-20,8)	12,4(9,5-16,0)	21,4(17,1-26,3)	14,9(9,5-22,6)	15,6(13,5-18,0)	
ESTUDIO							$F=0,577$; $df1=7,398$; $df2=5134,363$; $p=0,785$
NADA O POCO	34,7(22,6-49,2)	37,7(27,4-49,1)	41,6(33,8-49,9)	37,0(27,8-47,2)	48,7(31,2-66,5)	38,8(33,9-43,9)	
MASCULINO	34,3(18,0-55,5)	27,9(15,7-44,4)	44,7(33,9-56,0)	28,9(17,8-43,2)	42,6(22,2-65,9)	35,1(28,6-42,2)	
FEMENINO	35,1(18,4-56,5)	48,5(33,0-64,2)	38,0(27,3-50,0)	45,8(33,5-58,7)	62,7(30,9-86,3)	43,0(35,7-50,6)	
REGULAR	41,8(28,7-56,3)	36,7(25,1-50,2)	37,2(29,4-45,7)	30,9(22,6-40,6)	34,4(17,8-55,9)	36,4(31,2-41,9)	
MASCULINO	45,2(26,5-65,4)	37,1(22,5-54,5)	32,7(22,5-44,8)	32,0(21,1-45,4)	33,1(12,9-62,2)	35,8(28,9-43,4)	
FEMENINO	38,6(21,4-59,1)	36,3(19,2-57,7)	42,5(30,9-55,0)	29,7(18,7-43,7)	37,3(13,7-69,1)	37,1(29,3-45,6)	
BASTANTE O MUCHO	23,5(13,7-37,1)	25,6(16,0-38,5)	21,2(14,8-29,3)	32,1(23,8-41,7)	17,0(5,4-42,0)	24,8(20,4-29,9)	
MASCULINO	20,5(8,2-42,7)	35,1(19,4-54,9)	22,6(13,1-36,0)	39,1(26,9-52,8)	24,4(8,3-53,5)	29,1(22,3-37,0)	
FEMENINO	26,3(13,7-44,7)	15,2(6,1-33,2)	19,5(12,3-29,6)	24,5(15,1-37,3)	-	19,9(14,7-26,4)	
HIJOS Y PARIENTES							$F=1,231$; $df1=7,305$; $df2=5069,810$; $p=0,280$
NADA O POCO	59,7(53,8-65,4)	59,4(55,1-63,6)	63,4(60,6-66,1)	61,3(57,4-65,1)	65,5(60,0-70,7)	61,5(59,6-63,4)	
MASCULINO	64,2(56,0-71,6)	62,7(55,3-69,6)	67,5(63,5-71,3)	68,4(63,0-73,4)	70,2(62,9-76,7)	66,3(63,5-69,0)	
FEMENINO	55,5(47,1-63,6)	57,1(52,0-62,0)	59,4(55,5-63,2)	54,4(49,1-59,5)	60,3(52,6-67,5)	57,1(54,6-59,7)	
REGULAR	26,8(22,2-31,9)	26,4(22,7-30,5)	22,7(20,4-25,3)	22,1(19,1-25,5)	22,4(17,6-28,1)	24,3(22,6-26,0)	
MASCULINO	25,6(19,5-32,9)	23,9(18,4-30,5)	21,5(18,1-25,5)	19,4(15,4-24,2)	24,5(18,6-31,6)	22,7(20,4-25,2)	
FEMENINO	27,9(22,2-34,4)	28,2(23,9-33,0)	23,9(20,5-27,7)	24,7(20,2-29,9)	20,2(14,2-27,8)	25,7(23,5-27,9)	
BASTANTE O MUCHO	13,5(10,4-17,2)	14,2(11,7-17,1)	13,9(12,0-16,0)	16,6(13,8-19,7)	12,0(9,3-15,4)	14,2(13,0-15,5)	
MASCULINO	10,2(6,3-16,2)	13,4(9,6-18,4)	10,9(8,4-14,1)	12,2(9,1-16,0)	5,3(2,9-9,4)	11,0(9,3-12,8)	
FEMENINO	16,6(12,2-22,0)	14,7(11,7-18,4)	16,7(13,9-19,9)	20,9(17,1-25,4)	19,5(14,6-25,7)	17,2(15,5-19,0)	

TIPO DE ESTRESOR PSICOSOCIAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PAREJA							$F=1,467$; $df1=7,339$; $df2=5093,505$; $p=0,170$
NADA O POCO	68,6(61,7-74,8)	69,6(65,0-73,9)	70,9(67,9-73,8)	69,9(65,6-74,0)	74,0(68,0-79,2)	70,3(68,2-72,3)	
MASCULINO	74,5(65,9-81,5)	73,6(65,9-80,1)	77,1(72,5-81,1)	77,2(71,9-81,8)	78,3(71,0-84,1)	76,0(73,2-78,7)	
FEMENINO	61,4(52,5-69,6)	66,5(60,4-72,1)	64,4(60,0-68,6)	61,7(55,5-67,6)	69,1(60,3-76,6)	64,5(61,7-67,3)	
REGULAR	21,6(16,2-28,1)	20,3(16,8-24,3)	18,6(15,9-21,7)	15,7(12,9-18,9)	17,9(13,5-23,5)	18,8(17,1-20,7)	
MASCULINO	20,0(13,6-28,4)	17,4(11,9-24,7)	14,8(11,6-18,8)	12,2(8,9-16,6)	18,1(12,4-25,7)	16,1(13,8-18,7)	
FEMENINO	23,5(17,2-31,3)	22,6(18,2-27,6)	22,6(18,6-27,2)	19,6(15,4-24,8)	17,7(12,4-24,6)	21,6(19,4-24,0)	
BASTANTE O MUCHO	9,9(6,7-14,3)	10,1(7,7-13,1)	10,4(8,6-12,6)	14,3(11,5-17,8)	8,1(5,5-11,9)	10,8(9,6-12,2)	
MASCULINO	5,6(2,8-10,7)	9,0(5,7-13,9)	8,1(5,5-11,7)	10,5(7,3-14,9)	3,6(1,7-7,3)	7,9(6,4-9,7)	
FEMENINO	15,1(9,6-22,8)	10,9(7,8-15,1)	13,0(10,4-16,0)	18,7(14,1-24,3)	13,2(8,3-20,5)	13,9(12,0-16,0)	
DINERO							$F=3,327$; $df1=7,389$; $df2=5128,072$; $p=0,001$
NADA O POCO	41,1(36,7-45,7)	32,9(29,2-36,8)	38,2(35,0-41,5)	37,8(33,9-41,8)	37,9(32,8-43,2)	37,2(35,4-39,0)	
MASCULINO	47,4(40,3-54,5)	34,0(28,5-40,1)	40,9(36,0-45,9)	40,6(35,0-46,5)	40,4(33,0-48,3)	40,3(37,6-43,1)	
FEMENINO	35,2(29,2-41,6)	32,0(27,2-37,2)	35,5(31,9-39,3)	34,9(30,8-39,3)	35,0(28,4-42,2)	34,3(32,0-36,6)	
REGULAR	37,3(33,0-41,7)	36,4(32,8-40,1)	35,6(32,6-38,7)	29,5(26,4-32,9)	33,2(29,0-37,6)	34,6(32,9-36,3)	
MASCULINO	36,1(29,5-43,3)	37,8(31,9-44,0)	37,7(33,1-42,5)	29,7(25,1-34,8)	31,7(25,0-39,1)	35,0(32,4-37,6)	
FEMENINO	38,3(32,8-44,1)	35,3(30,9-40,0)	33,5(29,9-37,4)	29,4(25,5-33,5)	34,8(29,1-41,1)	34,2(32,1-36,3)	
BASTANTE O MUCHO	21,6(17,4-26,6)	30,8(27,0-34,8)	26,2(23,7-28,9)	32,7(29,3-36,2)	29,0(23,7-34,9)	28,3(26,6-30,1)	
MASCULINO	16,5(11,7-22,8)	28,2(22,6-34,7)	21,4(18,1-25,2)	29,6(24,8-35,0)	27,9(21,1-35,9)	24,7(22,4-27,3)	
FEMENINO	26,5(20,8-33,1)	32,7(27,9-37,8)	30,9(27,5-34,6)	35,7(31,7-40,0)	30,2(23,6-37,7)	31,6(29,3-33,9)	
SALUD							$F=4,696$; $df1=7,069$; $df2=4905,687$; $p=0,00003$
NADA O POCO	47,7(41,5-54,0)	34,7(31,0-38,5)	39,4(36,3-42,6)	39,7(35,2-44,4)	39,0(33,6-44,6)	39,6(37,6-41,7)	
MASCULINO	55,2(46,9-63,2)	38,8(32,7-45,2)	45,6(41,0-50,2)	47,3(40,5-54,1)	40,2(32,7-48,2)	45,4(42,4-48,4)	
FEMENINO	40,7(33,2-48,5)	31,6(27,3-36,3)	33,4(29,6-37,4)	32,1(27,7-36,7)	37,6(31,5-44,1)	34,3(31,9-36,7)	
REGULAR	24,0(19,7-28,9)	28,4(25,1-32,1)	28,9(26,4-31,5)	19,7(17,0-22,8)	23,6(20,2-27,3)	25,5(23,9-27,0)	
MASCULINO	23,4(18,0-30,0)	29,9(23,9-36,6)	28,4(24,7-32,4)	17,8(14,2-22,0)	22,4(17,7-28,0)	24,9(22,6-27,3)	
FEMENINO	24,6(19,1-31,0)	27,4(23,5-31,7)	29,4(26,0-32,9)	21,7(18,0-26,1)	24,8(19,8-30,7)	26,0(24,0-28,1)	
BASTANTE O MUCHO	28,2(23,2-33,8)	36,9(33,0-40,9)	31,7(28,9-34,6)	40,5(36,3-44,9)	37,5(31,7-43,6)	34,9(33,1-36,9)	
MASCULINO	21,4(15,4-29,0)	31,3(25,9-37,3)	26,0(22,3-30,1)	35,0(29,0-41,4)	37,4(29,9-45,5)	29,8(27,2-32,5)	
FEMENINO	34,8(28,1-42,0)	41,0(36,3-45,9)	37,2(33,4-41,3)	46,2(41,2-51,3)	37,6(30,3-45,4)	39,7(37,3-42,2)	
ASUNTOS CON LA LEY							$F=3,404$; $df1=7,182$; $df2=4984,259$; $p=0,001$
NADA O POCO	87,0(82,6-90,4)	81,3(77,1-84,9)	88,3(85,8-90,4)	82,6(78,6-86,0)	82,1(76,2-86,8)	84,4(82,7-86,0)	
MASCULINO	90,9(84,9-94,6)	84,2(78,4-88,7)	87,6(84,2-90,3)	85,3(79,7-89,5)	82,7(75,5-88,2)	86,3(84,1-88,3)	
FEMENINO	83,3(76,4-88,6)	79,2(73,6-83,8)	89,0(85,9-91,6)	79,8(75,0-83,9)	81,4(73,1-87,6)	82,6(80,2-84,8)	
REGULAR	6,2(4,1-9,2)	7,0(5,2-9,5)	6,6(5,1-8,5)	8,8(6,8-11,3)	4,7(2,9-7,5)	6,9(5,9-7,9)	
MASCULINO	4,1(2,2-7,5)	5,3(3,1-8,8)	7,1(5,0-10,2)	8,0(5,3-12,0)	4,5(2,2-9,0)	6,0(4,8-7,5)	
FEMENINO	8,2(5,0-13,1)	8,3(5,7-12,0)	6,0(4,3-8,3)	9,6(6,8-13,4)	4,8(2,5-9,0)	7,6(6,3-9,2)	
BASTANTE O MUCHO	6,8(4,2-10,8)	11,6(9,0-15,0)	5,1(3,8-6,8)	8,6(6,4-11,5)	13,2(8,9-19,1)	8,7(7,5-10,1)	
MASCULINO	5,0(2,3-10,7)	10,5(6,9-15,7)	5,3(3,6-7,8)	6,7(4,3-10,4)	12,7(7,8-19,9)	7,6(6,1-9,5)	
FEMENINO	8,5(4,6-15,1)	12,5(9,1-16,9)	4,9(3,2-7,6)	10,6(7,5-14,8)	13,8(8,6-21,4)	9,7(8,0-11,7)	
TERRORISMO							$F=10,920$; $df1=7,437$; $df2=5160,950$; $p=<0,000001$
NADA O POCO	47,7(41,9-53,6)	43,7(39,3-48,3)	47,0(43,4-50,6)	29,9(26,4-33,8)	46,3(41,0-51,7)	42,6(40,6-44,7)	
MASCULINO	52,7(44,9-60,5)	50,3(43,8-56,7)	50,9(46,1-55,7)	34,6(29,8-39,7)	45,1(38,2-52,2)	46,8(44,1-49,6)	
FEMENINO	42,9(35,8-50,3)	38,9(33,4-44,8)	43,2(38,7-47,8)	25,2(20,9-30,1)	47,6(40,4-54,9)	38,8(36,2-41,4)	
REGULAR	14,2(11,1-18,0)	17,1(14,2-20,3)	19,8(17,2-22,7)	12,9(10,5-15,6)	9,4(6,7-12,9)	15,5(14,2-17,0)	
MASCULINO	14,6(10,4-20,1)	15,5(11,6-20,5)	19,1(15,6-23,2)	14,9(11,2-19,4)	10,7(6,8-16,4)	15,6(13,7-17,6)	
FEMENINO	13,8(9,9-18,9)	18,2(14,2-22,9)	20,5(17,3-24,2)	10,8(8,4-13,8)	7,9(4,7-13,0)	15,5(13,8-17,4)	
BASTANTE O MUCHO	38,1(32,5-44,0)	39,2(34,9-43,7)	33,2(30,1-36,3)	57,2(53,1-61,2)	44,3(39,2-49,6)	41,8(39,8-43,9)	
MASCULINO	32,6(26,0-40,0)	34,2(28,0-40,9)	30,0(26,1-34,2)	50,6(44,8-56,4)	44,2(37,2-51,5)	37,6(34,9-40,4)	
FEMENINO	43,3(35,9-51,1)	42,9(37,3-48,6)	36,3(32,2-40,5)	63,9(59,1-68,6)	44,5(37,6-51,6)	45,7(43,1-48,4)	

TIPO DE ESTRESOR PSICOSOCIAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
DELINCUENCIA							$F=8,594$; $df1=7,389$; $df2=5128,213$; $p=<0,000001$
NADA O POCO	38,3(32,3-44,7)	29,7(25,4-34,3)	22,8(19,6-26,4)	17,3(14,4-20,8)	26,0(21,0-31,6)	26,5(24,6-28,6)	
MASCULINO	44,6(36,2-53,2)	34,0(27,8-40,9)	26,8(22,3-31,8)	22,1(17,2-27,8)	25,6(20,0-32,2)	30,4(27,7-33,4)	
FEMENINO	32,4(26,0-39,6)	26,4(21,5-32,0)	18,9(15,4-22,8)	12,5(9,4-16,4)	26,4(19,3-34,9)	22,9(20,6-25,4)	
REGULAR	14,8(11,6-18,6)	13,5(10,8-16,7)	16,1(13,7-18,9)	11,6(9,5-14,2)	10,2(7,2-14,1)	13,6(12,4-15,0)	
MASCULINO	15,3(10,9-21,1)	14,4(10,9-18,9)	18,1(14,7-22,1)	12,5(9,4-16,5)	8,8(5,2-14,5)	14,4(12,7-16,4)	
FEMENINO	14,2(10,1-19,6)	12,8(9,2-17,7)	14,2(11,5-17,5)	10,8(8,3-13,8)	11,7(8,2-16,6)	12,9(11,2-14,8)	
BASTANTE O MUCHO	46,9(40,8-53,1)	56,8(52,0-61,5)	61,1(57,4-64,6)	71,0(66,9-74,8)	63,8(58,0-69,3)	59,9(57,7-62,0)	
MASCULINO	40,1(32,4-48,4)	51,6(44,9-58,1)	55,1(50,4-59,7)	65,4(59,1-71,3)	65,6(57,8-72,7)	55,1(52,2-58,0)	
FEMENINO	53,4(45,4-61,1)	60,7(54,7-66,5)	66,9(62,6-71,0)	76,7(72,2-80,7)	61,9(54,3-68,9)	64,2(61,5-66,9)	
NARCOTRÁFICO							$F=9,886$; $df1=7,365$; $df2=5111,054$; $p=<0,000001$
NADA O POCO	44,6(38,6-50,7)	37,0(32,5-41,7)	43,8(40,0-47,7)	24,6(21,3-28,1)	40,3(34,4-46,5)	37,7(35,6-39,9)	
MASCULINO	49,7(41,4-58,0)	43,3(36,7-50,2)	47,8(43,2-52,4)	29,5(24,4-35,1)	38,0(31,0-45,6)	41,9(39,1-44,8)	
FEMENINO	39,6(32,8-46,9)	32,3(27,0-38,1)	39,8(35,0-44,8)	19,5(15,8-23,9)	42,9(35,2-50,9)	33,8(31,3-36,5)	
REGULAR	14,4(11,4-18,0)	15,1(12,1-18,7)	17,3(14,9-20,2)	13,2(10,8-16,1)	8,0(5,6-11,2)	14,4(13,0-15,8)	
MASCULINO	14,0(9,9-19,5)	16,2(11,6-22,2)	16,4(13,2-20,3)	13,7(10,1-18,3)	8,5(5,1-13,7)	14,4(12,5-16,6)	
FEMENINO	14,8(10,9-19,7)	14,3(10,4-19,3)	18,2(15,1-21,8)	12,7(9,9-16,3)	7,5(4,5-12,1)	14,3(12,6-16,3)	
BASTANTE O MUCHO	41,0(35,5-46,8)	47,9(43,0-52,9)	38,9(35,6-42,3)	62,2(57,9-66,3)	51,7(45,6-57,7)	47,9(45,8-50,1)	
MASCULINO	36,3(29,2-44,0)	40,4(33,1-48,2)	35,8(31,8-40,0)	56,9(50,7-62,9)	53,5(45,6-61,3)	43,7(40,7-46,7)	
FEMENINO	45,6(37,9-53,5)	53,4(47,6-59,1)	42,0(37,5-46,5)	67,7(62,5-72,5)	49,6(42,1-57,2)	51,8(49,1-54,6)	
OTROS							$F=1,933$; $df1=6,636$; $df2=4605,368$; $p=0,064$
NADA O POCO	-	13,9(2,8-47,0)	15,6(5,3-37,9)	46,0(22,0-72,1)	6,9(0,9-38,0)	23,1(12,2-39,2)	
MASCULINO	-	8,3(0,9-47,0)	32,9(10,0-68,5)	52,0(21,7-80,9)	12,4(1,5-56,8)	29,1(13,8-51,3)	
FEMENINO	-	17,6(2,5-64,3)	6,8(0,9-37,4)	38,1(13,3-71,2)	-	17,5(7,1-37,0)	
REGULAR	-	-	4,2(0,6-25,3)	11,6(3,7-31,0)	3,5(0,4-23,3)	5,3(2,1-12,5)	
MASCULINO	-	-	12,5(1,7-54,1)	13,5(3,0-43,8)	-	6,9(2,1-20,6)	
FEMENINO	-	-	-	9,1(1,4-41,2)	8,0(0,9-46,7)	3,7(0,9-14,5)	
BASTANTE O MUCHO	100,0	86,1(53,0-97,2)	80,2(57,2-92,5)	42,4(21,0-67,0)	89,6(62,0-97,8)	71,7(56,0-83,4)	
MASCULINO	100,0	91,7(53,0-99,1)	54,6(22,5-83,3)	34,5(11,9-67,3)	87,6(43,2-98,5)	64,0(42,7-80,9)	
FEMENINO	-	82,4(35,7-97,5)	93,2(62,6-99,1)	52,8(25,3-78,8)	92,0(53,3-99,1)	78,8(60,1-90,2)	

El indicador de experiencias traumáticas está relacionado con haber sido testigo de acontecimientos en los cuales han muerto personas, o en los que el entrevistado ha visto gravemente amenazada su integridad física. En el caso de la población adulta el 31,1% manifestaba una experiencia traumática alguna vez en su vida. Así, según áreas poblacionales, tenemos que en Lima Centro un 28,7%, Lima Norte un 27,8%, Lima Este un 27,6%, Lima Sur un 39,5% y Callao con un 34,5% se habían visto en situaciones semejantes, siendo la proporción relativamente mayor para el sexo masculino. Esta situación se ha mantenido prácticamente invariable con relación a la reportada hace 10 años (Tabla 17).

TABLA 17
PREVALENCIA DE VIDA DE EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS	LIMA CENTRO % (IC 95%)	LIMA NORTE % (IC 95%)	LIMA ESTE % (IC 95%)	LIMA SUR % (IC 95%)	CALLAO % (IC 95%)	TOTAL % (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
TOTAL	28,7(24,8-33,1)	27,8(24,2-31,8)	27,6(24,6-30,8)	39,5(35,2-44,1)	34,5(29,7-39,7)	31,1(29,3-32,9)	$F=6,946$; $df1=3,887$; $df2=2697,310$; $p=0,00002$
MASCULINO	25,1(19,6-31,5)	30,4(24,3-37,3)	33,1(28,8-37,7)	41,4(35,6-47,5)	39,9(33,3-46,8)	33,7(31,0-36,4)	
FEMENINO	32,2(26,7-38,3)	25,9(21,7-30,5)	22,2(18,8-26,0)	37,6(32,1-43,4)	28,5(22,9-34,9)	28,7(26,4-31,0)	

Otras fuentes de estrés relativas a las características ambientales desfavorables donde viven las personas, como el ruido, la falta de ventilación, la falta de espacio y el mal olor, el 32,6% de adultos encuestados, manifestaron bastante o mucha molestia con alguna de las condiciones referidas. Si se incluye el polvo y la basura, este porcentaje se eleva al 48,5% (Tabla 18). El impacto de estas características ambientales, también se observó hace 10 años, manifestando el 45,7% de los adultos, molestias por sus condiciones del entorno. La basura, es el factor ambiental más importante como estresor para un 32,6% de los adultos, y según áreas poblacionales tenemos en Lima Centro un 20,1%, Lima Norte un 30,9%, Lima Este un 35,6%, Lima Sur un 44,1% y Callao un 27,6%.

TABLA 18
NIVELES DE ESTRÉS AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS
POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESTRESOR AMBIENTAL	LIMA CENTRO %(IC 95%)	LIMA NORTE %(IC 95%)	LIMA ESTE %(IC 95%)	LIMA SUR %(IC 95%)	CALLAO %(IC 95%)	TOTAL %(IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
RUIDO							$F=1,784; df1=7,125;$ $df2=4944,881; p=0,085$
NADA O POCO	69,8(63,3-75,5)	64,6(60,3-68,8)	65,4(61,8-68,8)	63,3(59,2-67,2)	58,5(51,9-64,7)	64,8(62,6-66,8)	
MASCULINO	77,1(70,1-82,9)	67,5(60,8-73,4)	67,1(62,2-71,7)	66,7(60,6-72,3)	55,4(45,5-64,9)	67,5(64,5-70,3)	
FEMENINO	62,8(55,1-70,0)	62,6(57,0-67,9)	63,6(59,4-67,6)	59,9(55,0-64,6)	62,0(54,8-68,7)	62,3(59,7-64,8)	
REGULAR	13,6(10,4-17,7)	17,0(14,1-20,4)	16,6(14,3-19,3)	14,4(12,3-16,8)	16,8(12,2-22,7)	15,8(14,4-17,3)	
MASCULINO	11,9(8,1-17,1)	14,9(10,9-20,0)	17,4(14,2-21,1)	14,2(10,8-18,3)	20,1(13,0-29,9)	15,5(13,5-17,6)	
FEMENINO	15,3(11,0-20,8)	18,6(14,9-23,0)	15,9(13,2-19,0)	14,6(12,0-17,8)	13,0(9,4-17,6)	16,1(14,4-17,9)	
BASTANTE O MUCHO	16,6(12,7-21,3)	18,3(15,4-21,6)	18,0(15,5-20,8)	22,3(19,4-25,5)	24,7(19,6-30,8)	19,5(18,0-21,1)	
MASCULINO	11,0(7,2-16,4)	17,7(13,5-22,9)	15,5(12,5-19,0)	19,1(15,3-23,7)	24,5(17,6-33,1)	17,1(15,1-19,3)	
FEMENINO	21,9(16,7-28,2)	18,8(14,9-23,4)	20,5(17,3-24,2)	25,5(21,2-30,3)	25,0(19,1-32,0)	21,7(19,6-23,9)	
FALTA DE VENTILACIÓN							$F=1,971; df1=7,113;$ $df2=4936,520; p=0,054$
NADA O POCO	82,4(77,5-86,5)	76,5(72,4-80,2)	81,5(78,7-83,9)	80,1(76,7-83,0)	80,0(74,8-84,3)	79,9(78,1-81,5)	
MASCULINO	88,3(83,7-91,7)	81,7(75,7-86,5)	81,3(77,2-84,8)	83,7(79,2-87,5)	81,3(73,8-87,1)	83,2(80,9-85,2)	
FEMENINO	76,8(69,5-82,8)	72,7(67,1-77,7)	81,6(78,1-84,7)	76,3(71,6-80,4)	78,4(71,9-83,8)	76,8(74,3-79,1)	
REGULAR	9,8(7,3-13,0)	14,3(11,4-17,8)	11,8(9,9-14,0)	9,3(7,6-11,3)	10,8(7,2-15,9)	11,5(10,3-12,8)	
MASCULINO	6,9(4,5-10,6)	12,1(8,1-17,8)	13,0(10,0-16,6)	8,2(5,9-11,1)	11,4(6,4-19,5)	10,5(8,8-12,4)	
FEMENINO	12,5(8,9-17,4)	15,9(12,1-20,7)	10,7(8,5-13,3)	10,4(7,9-13,7)	10,0(6,6-15,0)	12,4(10,8-14,3)	
BASTANTE O MUCHO	7,8(5,2-11,5)	9,2(7,3-11,5)	6,7(5,4-8,4)	10,7(8,5-13,4)	9,3(6,7-12,7)	8,7(7,7-9,8)	
MASCULINO	4,8(2,7-8,2)	6,1(3,9-9,4)	5,8(4,1-8,1)	8,1(5,1-12,6)	7,2(4,4-11,7)	6,4(5,2-7,8)	
FEMENINO	10,7(6,7-16,5)	11,4(8,7-14,8)	7,7(5,8-10,2)	13,3(10,5-16,6)	11,5(7,7-17,0)	10,8(9,3-12,4)	
FALTA DE ESPACIO							$F=2,683; df1=6,985;$ $df2=4847,520; p=0,009$
NADA O POCO	78,3(72,5-83,1)	68,7(64,2-72,9)	72,7(69,4-75,7)	72,1(68,3-75,6)	74,6(68,8-79,6)	72,7(70,7-74,6)	
MASCULINO	83,4(76,2-88,8)	71,6(64,2-78,0)	73,4(68,7-77,6)	76,9(71,9-81,3)	74,1(65,7-81,0)	75,6(72,8-78,1)	
FEMENINO	73,4(66,3-79,4)	66,6(61,1-71,6)	72,0(68,0-75,7)	67,2(62,2-71,9)	75,1(67,7-81,3)	70,0(67,5-72,4)	
REGULAR	10,1(7,4-13,6)	16,9(13,9-20,5)	15,9(13,8-18,4)	12,2(10,0-14,9)	14,2(10,4-19,2)	14,2(12,9-15,7)	
MASCULINO	9,6(6,0-15,0)	19,7(14,3-26,5)	17,3(14,0-21,3)	13,0(10,0-16,8)	16,1(10,5-23,9)	15,5(13,4-17,8)	
FEMENINO	10,5(7,2-15,0)	14,9(11,7-18,8)	14,6(12,0-17,7)	11,5(9,0-14,5)	12,0(7,9-17,8)	13,1(11,6-14,8)	
BASTANTE O MUCHO	11,7(8,5-15,8)	14,4(11,8-17,3)	11,4(9,6-13,5)	15,7(13,2-18,5)	11,2(8,4-14,9)	13,1(11,9-14,4)	
MASCULINO	7,0(4,2-11,4)	8,7(6,2-12,0)	9,3(7,0-12,3)	10,1(7,4-13,5)	9,8(6,4-14,8)	9,0(7,7-10,5)	
FEMENINO	16,2(11,4-22,4)	18,5(15,1-22,6)	13,4(10,9-16,5)	21,3(17,5-25,7)	12,8(8,7-18,5)	16,9(15,1-18,9)	

ESTRESOR AMBIENTAL	LIMA CENTRO %(IC 95%)	LIMA NORTE %(IC 95%)	LIMA ESTE %(IC 95%)	LIMA SUR %(IC 95%)	CALLAO %(IC 95%)	TOTAL %(IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
OLOR							$F=2,783; df1=7,099; df2=4927,031; p=0,007$
NADA O POCO	77,6(71,5-82,7)	67,5(62,8-71,9)	68,0(64,2-71,7)	63,9(59,9-67,7)	69,1(62,0-75,4)	68,8(66,6-70,9)	
MASCULINO	82,8(76,2-87,8)	70,2(63,3-76,3)	69,9(64,8-74,5)	69,7(64,8-74,3)	73,2(65,0-80,0)	72,6(69,9-75,1)	
FEMENINO	72,7(64,0-79,9)	65,5(59,5-71,0)	66,2(61,4-70,7)	58,0(52,7-63,1)	64,5(54,8-73,2)	65,3(62,4-68,1)	
REGULAR	9,1(6,3-13,0)	15,0(12,4-18,2)	13,6(11,5-16,0)	13,2(10,8-16,1)	13,6(10,2-17,8)	13,1(11,9-14,5)	
MASCULINO	9,8(6,0-15,5)	13,7(9,9-18,7)	13,2(10,3-16,8)	10,9(8,2-14,3)	14,0(9,3-20,7)	12,3(10,6-14,3)	
FEMENINO	8,5(5,3-13,2)	16,0(12,6-20,3)	14,0(11,3-17,2)	15,6(12,2-19,8)	13,0(8,9-18,7)	13,9(12,2-15,7)	
BASTANTE O MUCHO	13,3(9,4-18,4)	17,5(14,5-20,9)	18,3(15,6-21,5)	22,9(19,5-26,6)	17,3(12,6-23,3)	18,1(16,5-19,8)	
MASCULINO	7,5(4,6-11,9)	16,1(12,3-20,9)	16,9(13,5-21,1)	19,4(15,2-24,4)	12,8(8,3-19,3)	15,1(13,2-17,2)	
FEMENINO	18,8(12,7-27,0)	18,5(14,7-23,0)	19,7(16,2-23,9)	26,4(22,1-31,1)	22,5(16,2-30,4)	20,8(18,6-23,1)	
POLVO							$F=10,064; df1=7,073; df2=4909,002; p<0,000001$
NADA O POCO	70,8(64,4-76,6)	48,6(43,7-53,5)	42,1(38,0-46,3)	50,1(45,7-54,4)	56,7(48,6-64,4)	52,0(49,6-54,4)	
MASCULINO	75,5(68,2-81,6)	53,1(45,7-60,5)	46,1(41,2-51,0)	56,3(50,8-61,7)	61,4(52,0-70,0)	57,0(53,9-60,0)	
FEMENINO	66,4(57,9-73,9)	45,3(39,2-51,5)	38,2(33,3-43,4)	43,7(38,5-49,1)	51,4(42,0-60,6)	47,5(44,5-50,5)	
REGULAR	13,6(10,2-17,9)	20,9(17,6-24,6)	17,8(15,4-20,5)	14,6(12,1-17,6)	16,3(12,6-20,9)	17,1(15,7-18,6)	
MASCULINO	14,2(9,7-20,5)	21,1(15,7-27,7)	19,6(16,1-23,6)	15,3(11,9-19,5)	16,9(12,0-23,5)	17,7(15,6-20,1)	
FEMENINO	13,0(9,3-18,1)	20,8(16,9-25,3)	16,1(13,2-19,6)	13,9(11,0-17,5)	15,7(11,5-20,9)	16,5(14,7-18,4)	
BASTANTE O MUCHO	15,5(11,3-21,0)	30,5(26,1-35,2)	40,1(35,7-44,6)	35,3(31,3-39,6)	27,0(20,0-35,3)	30,9(28,7-33,1)	
MASCULINO	10,2(6,7-15,4)	25,8(20,4-32,1)	34,3(29,1-39,9)	28,4(23,4-34,0)	21,7(14,5-31,1)	25,3(22,7-28,0)	
FEMENINO	20,6(14,2-28,9)	33,9(28,3-40,0)	45,7(40,6-50,8)	42,3(37,1-47,7)	33,0(24,9-42,2)	36,0(33,2-38,9)	
BASURA							$F=10,052; df1=7,064; df2=4902,428; p<0,000001$
NADA O POCO	70,4(63,8-76,3)	51,9(46,6-57,1)	46,6(42,9-50,4)	40,5(35,9-45,4)	57,5(49,5-65,2)	52,1(49,6-54,5)	
MASCULINO	75,7(68,1-82,0)	57,2(49,8-64,2)	48,2(43,4-53,1)	45,9(39,6-52,3)	59,7(50,3-68,5)	56,0(52,9-59,1)	
FEMENINO	65,4(56,9-72,9)	47,9(41,5-54,5)	44,9(40,1-49,9)	35,1(30,0-40,6)	55,1(45,5-64,3)	48,4(45,3-51,4)	
REGULAR	9,5(6,8-13,1)	17,3(14,1-21,0)	17,8(15,3-20,6)	15,3(12,7-18,4)	14,8(11,4-19,1)	15,4(14,0-16,9)	
MASCULINO	8,0(5,0-12,5)	15,2(10,8-21,0)	17,7(14,2-22,0)	16,7(12,9-21,3)	15,4(10,6-22,0)	14,9(13,0-17,1)	
FEMENINO	10,9(7,4-15,9)	18,8(14,6-23,9)	17,9(14,9-21,3)	13,9(10,8-17,8)	14,2(10,0-19,7)	15,8(14,0-17,9)	
BASTANTE O MUCHO	20,1(15,2-26,1)	30,9(26,7-35,4)	35,6(32,1-39,5)	44,1(39,9-48,4)	27,6(21,0-35,4)	32,6(30,4-34,8)	
MASCULINO	16,3(11,2-23,1)	27,6(22,2-33,8)	34,1(29,5-38,9)	37,4(32,4-42,7)	24,8(17,8-33,5)	29,0(26,5-31,7)	
FEMENINO	23,7(17,0-32,1)	33,3(28,0-39,0)	37,2(32,4-42,2)	51,0(45,2-56,7)	30,8(23,1-39,6)	35,8(33,1-38,7)	
TOTAL (RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN O ESPACIO, MALOS OLORES) SIN POLVO O BASURA							
TOTAL	23,5(18,5-29,4)	31,9(28,1-35,9)	31,9(28,5-35,6)	40,4(36,4-44,7)	35,6(29,7-42,1)	32,6(30,7-34,6)	$F=6,503; df1=3,765; df2=2612,912; p=0,00005$
MASCULINO	15,7(10,8-22,2)	29,4(24,3-35,1)	27,3(23,1-32,0)	35,3(30,2-40,8)	32,7(25,1-41,2)	28,1(25,7-30,7)	
FEMENINO	31,0(24,3-38,6)	33,7(28,7-39,0)	36,5(32,0-41,1)	45,6(40,2-51,1)	39,0(32,0-46,4)	36,8(34,2-39,4)	
TOTAL (RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN O ESPACIO, MALOS OLORES) INCLUYENDO POLVO Y BASURA							
TOTAL	28,3(22,7-34,6)	45,6(41,0-50,3)	56,3(52,2-60,2)	60,8(56,3-65,2)	46,3(39,2-53,6)	48,5(46,1-50,8)	$F=20,776; df1=3,833; df2=2659,887; p<0,000001$
MASCULINO	22,2(16,0-29,8)	43,3(37,1-49,8)	51,4(46,3-56,5)	54,8(48,9-60,5)	42,8(34,2-51,9)	44,1(41,1-47,1)	
FEMENINO	34,1(27,1-41,9)	47,3(41,4-53,3)	61,0(56,1-65,7)	67,0(61,3-72,2)	50,2(42,0-58,4)	52,5(49,6-55,3)	

DISCRIMINACIÓN

La discriminación implica un trato diferencial basado en la pertenencia a algún grupo social (la posesión de una identidad determinada), no en su conducta. Cualquiera de los aspectos en los que construimos nuestras identidades puede ser un motivo de discriminación; por tanto, toda discriminación implica una vulneración de derechos humanos basada en una o varias de nuestras identidades. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones

sociales de las personas, organizaciones y estados; hacen esta diferencia por el color de la piel, la etnia, el sexo, la edad, la cultura, la religión o las ideologías.

Debajo de la euforia oficial sobre la acelerada marcha macroeconómica corren ríos profundos de frustración emanantes de una milenaria marginación. El Perú avanza económicamente, pero también permanece signado por fuertes patrones de discriminación¹⁶³.

Una fuente importante de estrés se relaciona con la discriminación, de modo que la medición de la misma podría dar información acerca de las representaciones sociales y la necesidad de plantear estrategias para modificarlas. Para este fin, se han intentado cubrir todas las fuentes de discriminación, tanto en la prevalencia de vida como en el período de referencia de un año. En la Tabla 19A - 19AA se pone en evidencia que la población percibe con mayor frecuencia la discriminación por la condición económica o social y por el nivel educativo, un resultado semejante al encontrado en Lima Rural en el 2007. No muy lejanas se encuentran la discriminación por edad y por peso. Además, las mujeres perciben la discriminación por nivel educativo en un porcentaje significativamente mayor que los hombres.

TABLA 19A
PREVALENCIA DE VIDA DE RECHAZO O DISCRIMINACIÓN SEGÚN TIPOS EN LA POBLACIÓN
ADULTA DE ÁREAS POBLACIONALES EN LIMA METROPOLITANA 2012

TIPO DE DISCRIMINACIÓN	PREVALENCIA DE VIDA					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
SEXO							
TOTAL	3,3(1,8-6,0)	4,2(2,9-6,1)	2,9(2,0-4,1)	3,8(2,7-5,4)	3,6(2,1-6,0)	3,6(3,0-4,3)	F=0,547; df1=3,639; df2=2525,700; p=0,685
MASCULINO	2,3(1,0-5,7)	1,6(0,6-4,3)	0,9(0,4-2,1)	1,4(0,6-3,1)	0,6(0,1-3,4)	1,4(0,9-2,2)	
FEMENINO	4,3(2,1-8,6)	6,2(4,2-9,0)	4,8(3,2-7,0)	6,3(4,5-8,7)	6,9(3,9-11,8)	5,6(4,6-6,8)	
EDAD							
TOTAL	4,5(3,0-6,6)	6,1(4,5-8,3)	5,2(3,7-7,2)	7,2(5,6-9,3)	7,3(5,0-10,7)	6,0(5,2-6,9)	F=1,366; df1=3,946; df2=2738,225; p=0,244
MASCULINO	4,3(2,4-7,8)	5,5(3,1-9,6)	4,3(2,7-6,9)	6,1(4,1-9,1)	6,9(3,9-12,1)	5,3(4,2-6,7)	
FEMENINO	4,6(2,8-7,6)	6,5(4,6-9,2)	6,0(4,0-9,0)	8,4(6,1-11,3)	7,8(4,5-13,2)	6,6(5,5-7,8)	
PESO							
TOTAL	4,9(3,0-7,8)	5,7(4,1-7,7)	4,5(3,4-6,1)	6,9(5,1-9,2)	3,3(1,8-6,0)	5,2(4,5-6,2)	F=1,520; df1=3,817; df2=2649,153; p=0,196
MASCULINO	1,7(0,7-3,9)	4,7(2,7-7,9)	4,0(2,5-6,4)	4,1(2,5-6,7)	2,9(1,1-7,2)	3,6(2,8-4,7)	
FEMENINO	7,9(4,8-12,7)	6,4(4,3-9,3)	5,0(3,5-7,2)	9,7(7,0-13,3)	3,8(1,6-8,5)	6,7(5,5-8,1)	
COLOR DE PIEL							
TOTAL	2,7(1,6-4,5)	2,1(1,2-3,5)	2,7(1,8-3,9)	3,5(2,5-5,0)	2,9(1,7-4,7)	2,7(2,2-3,3)	F=0,830; df1=3,801; df2=2637,991; p=0,501
MASCULINO	2,5(1,0-5,8)	1,8(0,8-4,3)	3,5(2,1-5,8)	3,8(2,3-6,2)	3,7(2,1-6,5)	3,0(2,3-4,0)	
FEMENINO	2,9(1,5-5,5)	2,3(1,1-4,5)	1,9(1,1-3,2)	3,2(1,9-5,4)	1,9(0,9-4,2)	2,4(1,8-3,3)	
FORMA DE VESTIR							
TOTAL	2,4(1,3-4,2)	3,6(2,4-5,4)	3,7(2,7-4,9)	4,8(3,6-6,4)	2,1(1,3-3,4)	3,5(2,9-4,2)	F=2,081; df1=3,581; df2=2484,912; p=0,089
MASCULINO	1,8(0,7-4,4)	2,7(1,1-6,5)	3,7(2,3-5,6)	3,3(2,0-5,4)	2,2(1,1-4,5)	2,9(2,1-3,8)	
FEMENINO	3,0(1,5-5,7)	4,3(2,7-6,7)	3,7(2,6-5,4)	6,3(4,3-9,0)	2,0(1,0-4,3)	4,1(3,3-5,1)	
CONDICIÓN ECONÓMICA O SOCIAL							
TOTAL	3,7(1,7-8,0)	8,2(6,3-10,7)	6,5(5,0-8,4)	8,2(6,2-10,6)	8,8(6,0-12,6)	7,1(6,1-8,2)	F=2,174; df1=3,087; df2=2142,062; p=0,087
MASCULINO	4,6(2,0-10,2)	6,7(4,2-10,6)	6,5(4,3-9,6)	6,8(4,7-9,8)	8,3(5,1-13,2)	6,5(5,2-8,0)	
FEMENINO	2,9(1,2-6,8)	9,4(6,7-13,0)	6,5(4,7-8,9)	9,5(6,9-13,0)	9,3(6,1-13,9)	7,6(6,3-9,1)	
NIVEL EDUCATIVO							
TOTAL	3,3(1,9-5,6)	8,4(6,4-10,9)	5,2(4,0-6,7)	6,4(4,6-8,7)	8,2(5,6-11,9)	6,3(5,4-7,3)	F=3,900; df1=3,876; df2=2690,188; p=0,004
MASCULINO	1,2(0,4-3,4)	8,5(5,5-12,9)	5,0(3,4-7,3)	5,3(3,3-8,2)	6,9(4,0-11,5)	5,4(4,3-6,8)	
FEMENINO	5,3(2,9-9,5)	8,3(6,0-11,4)	5,3(3,7-7,6)	7,5(5,1-11,0)	9,7(6,0-15,2)	7,1(5,9-8,4)	

TIPO DE DISCRIMINACIÓN	PREVALENCIA DE VIDA					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
RELIGIÓN							
TOTAL	2,1(1,0-4,1)	1,8(1,0-3,0)	1,8(1,1-2,9)	3,2(2,2-4,6)	2,3(1,3-3,9)	2,2(1,7-2,7)	$F=1,151$; $df1=3,731$; $df2=2589,459$; $p=0,330$
MASCULINO	2,7(1,0-7,1)	1,4(0,5-3,6)	1,7(0,8-3,3)	2,3(1,1-4,6)	2,1(0,9-4,8)	2,0(1,4-2,9)	
FEMENINO	1,4(0,6-3,5)	2,0(1,1-3,7)	1,9(1,1-3,1)	4,1(2,6-6,3)	2,4(1,1-5,3)	2,3(1,8-3,1)	
AMISTADES							
TOTAL	0,8(0,3-2,2)	2,9(1,8-4,6)	1,7(1,1-2,7)	2,2(1,4-3,5)	1,6(0,7-3,5)	2,0(1,5-2,5)	$F=2,087$; $df1=3,864$; $df2=2681,367$; $p=0,082$
MASCULINO	0,5(0,2-1,8)	3,5(1,7-7,2)	2,1(1,0-4,0)	2,7(1,4-5,2)	1,4(0,4-5,3)	2,2(1,5-3,2)	
FEMENINO	1,1(0,3-4,3)	2,5(1,5-4,1)	1,3(0,8-2,4)	1,6(0,8-3,1)	1,8(0,7-4,7)	1,7(1,2-2,4)	
LUGAR DE NACIMIENTO							
TOTAL	0,9(0,4-1,9)	2,6(1,5-4,2)	3,3(2,4-4,4)	2,5(1,5-3,9)	2,6(1,5-4,5)	2,4(2,0-3,0)	$F=2,180$; $df1=3,756$; $df2=2606,937$; $p=0,073$
MASCULINO	0,7(0,2-2,7)	2,4(1,0-5,9)	3,6(2,3-5,7)	2,0(1,0-4,1)	2,1(0,9-4,7)	2,3(1,6-3,2)	
FEMENINO	1,1(0,4-2,8)	2,6(1,4-4,8)	2,9(1,9-4,4)	2,9(1,7-5,0)	3,1(1,6-6,0)	2,6(1,9-3,3)	
TALLA							
TOTAL	1,5(0,7-3,1)	2,8(1,8-4,4)	3,1(2,2-4,2)	2,9(1,8-4,7)	1,9(1,1-3,4)	2,6(2,1-3,2)	$F=1,145$; $df1=3,719$; $df2=2581,154$; $p=0,333$
MASCULINO	1,6(0,6-4,4)	1,8(0,8-4,4)	3,2(2,0-4,9)	2,6(1,3-5,1)	1,2(0,5-2,9)	2,2(1,6-3,1)	
FEMENINO	1,3(0,5-3,7)	3,5(2,1-5,9)	3,0(1,9-4,6)	3,2(1,9-5,3)	2,7(1,3-5,6)	2,9(2,2-3,8)	
OTRA CONDICIÓN							
TOTAL	1,3(0,7-2,7)	1,5(0,8-2,7)	1,8(1,2-2,7)	2,6(1,6-4,0)	2,1(1,2-3,7)	1,8(1,4-2,3)	$F=0,991$; $df1=3,800$; $df2=2637,319$; $p=0,409$
MASCULINO	1,3(0,4-4,1)	0,8(0,2-2,9)	1,9(1,1-3,4)	2,2(1,0-5,0)	1,4(0,5-3,6)	1,5(1,0-2,3)	
FEMENINO	1,4(0,6-3,3)	2,0(1,0-3,9)	1,6(0,9-2,9)	2,9(1,8-4,8)	3,0(1,6-5,8)	2,1(1,6-2,8)	

TABLA 19AA
PREVALENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO DE RECHAZO O DISCRIMINACIÓN SEGÚN TIPOS EN LA POBLACIÓN ADULTA DE ÁREAS POBLACIONALES EN LIMA METROPOLITANA 2012

TIPO DE DISCRIMINACIÓN	FRECUENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
SEXO	F=0,405; df1=6,734; df2=4673,600; p=0,894						
NINGUNA VEZ	98,1(95,5-99,2)	98,4(97,0-99,1)	98,2(97,0-98,9)	98,5(97,5-99,1)	99,0(97,6-99,6)	98,4(97,8-98,8)	
MASCULINO	98,2(95,3-99,3)	99,2(96,7-99,8)	99,3(98,1-99,7)	99,7(98,6-99,9)	100,0	99,2(98,6-99,6)	
FEMENINO	97,9(93,3-99,4)	97,8(95,6-98,9)	97,1(94,9-98,4)	97,3(95,6-98,4)	97,9(95,0-99,1)	97,6(96,6-98,3)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,9(0,8-4,5)	1,4(0,7-2,8)	1,6(0,9-2,7)	1,4(0,8-2,3)	1,0(0,4-2,4)	1,5(1,1-2,0)	
MASCULINO	1,8(0,7-4,7)	0,4(0,1-2,6)	0,6(0,2-1,7)	0,3(0,1-1,4)	-	0,6(0,3-1,2)	
FEMENINO	2,1(0,6-6,7)	2,2(1,1-14,4)	2,6(1,4-4,8)	2,5(1,5-4,1)	2,1(0,9-5,0)	2,3(1,6-3,2)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	-	0,2(0,0-1,4)	0,2(0,1-0,8)	0,1(0,0-0,6)	-	0,1(0,0-0,4)	
MASCULINO	-	0,5(0,1-3,2)	0,2(0,0-1,2)	-	-	0,2(0,0-0,7)	
FEMENINO	-	-	0,3(0,1-1,5)	0,2(0,0-1,1)	-	0,1(0,0-0,4)	
EDAD	F=0,709; df1=6,802; df2=4720,520; p=0,660						
NINGUNA VEZ	97,3(95,6-98,4)	96,7(95,0-97,8)	96,5(94,6-97,7)	96,3(94,7-97,5)	96,8(94,1-98,2)	96,7(95,9-97,3)	
MASCULINO	98,1(95,7-99,1)	97,7(95,1-98,9)	97,1(94,8-98,4)	97,7(95,9-98,7)	97,2(92,4-99,0)	97,6(96,6-98,2)	
FEMENINO	96,6(93,8-98,2)	95,9(93,4-97,5)	95,8(92,9-97,6)	94,9(92,3-96,7)	96,3(92,0-98,3)	95,8(94,7-96,7)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,2(1,3-3,9)	3,2(2,1-4,9)	3,0(2,0-4,6)	3,3(2,3-4,9)	3,2(1,7-5,8)	3,0(2,5-3,7)	
MASCULINO	1,8(0,8-4,2)	2,2(1,0-4,8)	2,5(1,3-4,7)	2,1(1,1-3,9)	2,6(0,9-7,5)	2,2(1,6-3,1)	
FEMENINO	2,6(1,3-5,1)	4,0(2,4-6,5)	3,6(2,1-6,1)	4,7(3,0-7,2)	3,7(1,7-8,0)	3,8(2,9-4,8)	

TIPO DE DISCRIMINACIÓN	FRECUENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	0,5(0,1-1,6)	0,1(0,0-0,5)	0,5(0,3-1,1)	0,3(0,1-0,8)	0,1(0,0-0,6)	0,3(0,2-0,5)	
MASCULINO	0,1(0,0-0,8)	0,1(0,0-0,7)	0,4(0,1-1,4)	0,2(0,1-0,8)	0,2(0,0-1,1)	0,2(0,1-0,5)	
FEMENINO	0,8(0,2-3,0)	0,1(0,0-0,9)	0,6(0,2-1,5)	0,5(0,1-1,5)	-	0,4(0,2-0,8)	
PESO							F=1,175; df1=7,415; df2=5146,106; p=0,312
NINGUNA VEZ	97,9(96,3-98,8)	96,4(94,6-97,6)	97,1(95,8-98,1)	96,0(94,4-97,1)	98,1(95,9-99,1)	96,9(96,2-97,5)	
MASCULINO	99,7(98,1-100,0)	98,1(95,4-99,2)	97,4(95,1-98,7)	97,9(95,6-99,0)	97,3(93,1-99,0)	98,1(97,2-98,7)	
FEMENINO	96,1(93,2-97,7)	95,1(92,5-96,8)	96,8(95,2-97,9)	94,0(91,4-95,9)	98,9(96,2-99,7)	95,8(94,8-96,7)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,9(1,1-3,3)	3,4(2,2-5,0)	2,4(1,5-3,6)	3,8(2,7-5,3)	1,9(0,9-4,1)	2,8(2,3-3,4)	
MASCULINO	0,3(0,0-1,9)	1,8(0,7-4,4)	2,3(1,2-4,7)	2,1(1,0-4,4)	2,7(1,0-6,9)	1,8(1,2-2,7)	
FEMENINO	3,4(1,9-5,9)	4,5(2,9-6,9)	2,4(1,5-3,7)	5,5(3,8-7,9)	1,1(0,3-3,8)	3,7(2,9-4,6)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	0,3(0,0-1,9)	0,3(0,1-0,8)	0,5(0,2-1,2)	0,2(0,1-1,0)	-	0,3(0,2-0,5)	
MASCULINO	-	0,1(0,0-0,7)	0,2(0,0-1,6)	-	-	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	0,5(0,1-3,8)	0,4(0,1-1,3)	0,8(0,3-2,2)	0,5(0,1-1,9)	-	0,5(0,3-1,0)	
COLOR DE PIEL							F=0,863; df1=6,762; df2=4692,560; p=0,532
NINGUNA VEZ	99,0(97,8-99,6)	99,5(98,4-99,8)	98,8(98,1-99,3)	99,0(98,0-99,5)	99,7(99,1-99,9)	99,2(98,8-99,4)	
MASCULINO	98,9(96,9-99,6)	99,1(96,4-99,8)	98,6(97,3-99,3)	98,9(97,2-99,6)	99,8(99,0-99,9)	99,0(98,4-99,4)	
FEMENINO	99,2(97,0-99,8)	99,7(98,9-99,9)	99,1(97,9-99,6)	99,1(97,7-99,7)	99,7(98,1-100,0)	99,3(98,9-99,6)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,8(0,4-1,9)	0,5(0,2-1,6)	0,9(0,5-1,6)	1,0(0,5-2,0)	0,3(0,1-0,9)	0,8(0,5-1,1)	
MASCULINO	1,1(0,4-3,1)	0,9(0,2-3,6)	1,1(0,5-2,4)	1,1(0,4-2,8)	0,2(0,1-1,0)	1,0(0,6-1,6)	
FEMENINO	0,6(0,2-2,5)	0,3(0,1-1,1)	0,8(0,3-1,8)	0,9(0,3-2,3)	0,3(0,0-1,9)	0,6(0,3-1,0)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	0,1(0,0-0,8)	-	0,2(0,1-0,8)	-	-	0,1(0,0-0,2)	
MASCULINO	-	-	0,2(0,0-1,6)	-	-	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,6)	-	0,2(0,0-1,4)	-	-	0,1(0,0-0,3)	
FORMA DE VESTIR							F=2,240; df1=6,757; df2=4689,522; p=0,030
NINGUNA VEZ	99,1(97,8-99,6)	97,6(95,8-98,6)	97,8(96,7-98,5)	96,8(95,4-97,7)	99,3(98,4-99,7)	97,9(97,3-98,3)	
MASCULINO	98,7(96,0-99,6)	97,7(93,7-99,2)	97,9(96,3-98,8)	98,2(96,5-99,0)	99,0(97,3-99,7)	98,2(97,3-98,8)	
FEMENINO	99,4(98,1-99,8)	97,5(95,3-98,7)	97,6(96,2-98,5)	95,3(92,9-97,0)	99,6(98,4-99,9)	97,6(96,8-98,2)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,8(0,3-2,1)	2,4(1,3-4,1)	2,0(1,3-2,9)	2,9(2,0-4,2)	0,5(0,2-1,4)	1,9(1,5-2,4)	
MASCULINO	0,9(0,2-4,1)	2,3(0,8-6,3)	2,1(1,2-3,7)	1,6(0,8-3,3)	0,7(0,2-2,5)	1,7(1,1-2,6)	
FEMENINO	0,6(0,2-1,9)	2,4(1,2-4,6)	1,8(1,1-3,1)	4,1(2,6-6,5)	0,2(0,0-1,6)	2,1(1,5-2,8)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,7)	0,3(0,1-0,8)	0,4(0,1-1,0)	0,2(0,1-0,9)	0,2(0,1-0,4)	
MASCULINO	0,3(0,1-1,3)	-	-	0,2(0,4-1,0)	0,3(0,0-1,8)	0,1(0,1-0,3)	
FEMENINO	-	0,2(0,0-1,2)	0,5(0,2-1,5)	0,5(0,2-1,8)	0,2(0,0-1,3)	0,3(0,1-0,6)	
CONDICIÓN ECONÓMICA O SOCIAL							F=0,829; df1=4,742; df2=3290,682; p=0,523
NINGUNA VEZ	97,3(92,7-99,0)	95,9(93,8-97,3)	96,5(95,1-97,5)	95,0(93,1-96,4)	95,5(92,7-97,3)	96,1(95,1-96,8)	
MASCULINO	96,4(91,1-98,6)	96,2(92,3-98,1)	95,7(93,2-97,3)	95,7(93,2-97,3)	96,6(92,9-98,4)	96,0(94,7-97,0)	
FEMENINO	98,1(93,6-99,4)	95,7(92,9-97,4)	97,3(95,8-98,2)	94,3(91,7-96,1)	94,3(90,0-96,8)	96,1(95,0-96,9)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,1(0,9-5,1)	3,8(2,5-5,9)	3,2(2,2-4,5)	4,3(3,1-6,0)	4,3(2,7-7,0)	3,5(2,9-4,3)	
MASCULINO	3,5(1,3-8,8)	3,4(1,6-7,3)	4,0(2,4-6,5)	3,8(2,4-6,0)	3,1(1,5-6,4)	3,6(2,7-4,9)	
FEMENINO	0,8(0,3-2,6)	4,1(2,4-6,9)	2,3(1,4-3,7)	4,9(3,2-7,3)	5,7(3,2-10,0)	3,4(2,6-4,4)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	0,6(0,1-3,6)	0,3(0,1-1,1)	0,4(0,2-0,8)	0,7(0,3-1,7)	0,1(0,0-1,0)	0,4(0,2-0,8)	
MASCULINO	0,1(0,0-0,8)	0,4(0,1-2,9)	0,3(0,1-1,1)	0,5(0,1-3,0)	0,3(0,0-1,9)	0,3(0,1-0,8)	
FEMENINO	1,1(0,2-7,5)	0,2(0,0-0,8)	0,4(0,2-1,1)	0,9(0,3-2,1)	-	0,5(0,2-1,2)	

TIPO DE DISCRIMINACIÓN	FRECUENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
NIVEL EDUCATIVO							F=1,859; df1=7,116; df2=4938,190; p=0,071
NINGUNA VEZ	98,6(96,9-99,4)	95,3(93,3-96,8)	96,7(95,5-97,6)	96,1(94,3-97,4)	97,8(95,6-98,9)	96,7(95,9-97,3)	
MASCULINO	98,9(96,6-99,6)	95,4(91,3-97,6)	96,9(95,1-98,1)	97,4(95,1-98,6)	99,0(97,2-99,7)	97,3(96,2-98,0)	
FEMENINO	98,3(95,7-99,4)	95,3(92,7-96,9)	96,5(94,5-97,8)	94,9(91,7-96,9)	96,4(92,2-98,4)	96,1(95,0-97,0)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,4(0,6-3,1)	4,2(2,8-6,2)	2,9(2,0-4,1)	3,4(2,2-5,1)	2,0(1,0-4,2)	3,0(2,4-3,7)	
MASCULINO	1,1(0,4-3,4)	4,6(2,4-8,7)	2,6(1,5-4,3)	2,6(1,4-4,9)	1,0(0,3-2,8)	2,6(1,9-3,7)	
FEMENINO	1,7(0,6-4,3)	3,9(2,4-6,4)	3,2(2,0-5,2)	4,2(2,3-7,3)	3,2(1,4-7,4)	3,4(2,6-4,4)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	-	0,5(0,2-1,4)	0,4(0,2-0,9)	0,5(0,2-1,0)	0,2(0,0-1,3)	0,3(0,2-0,6)	
MASCULINO	-	-	0,5(0,2-1,5)	-	-	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	-	0,8(0,3-2,4)	0,3(0,1-0,9)	1,0(0,4-2,1)	0,4(0,1-2,8)	0,5(0,3-1,0)	
RELIGIÓN							F=1,241; df1=6,406; df2=4446,039; p=0,280
NINGUNA VEZ	99,3(98,3-99,7)	99,5(98,7-99,8)	98,9(97,8-99,4)	98,2(97,0-98,9)	98,7(97,6-99,3)	99,0(98,6-99,2)	
MASCULINO	98,8(96,8-99,6)	99,6(98,0-99,9)	99,1(97,6-99,6)	98,6(96,6-99,4)	98,8(96,9-99,6)	99,0(98,4-99,4)	
FEMENINO	99,7(98,2-100,0)	99,4(98,4-99,8)	98,7(97,6-99,3)	97,8(96,1-98,8)	98,6(96,8-99,4)	98,9(98,4-99,2)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,7(0,3-1,7)	0,5(0,2-1,3)	1,0(0,5-2,1)	1,7(1,0-2,8)	1,0(0,5-2,2)	1,0(0,7-1,3)	
MASCULINO	1,2(0,4-3,2)	0,4(0,1-2,0)	0,9(0,3-2,3)	1,4(0,6-3,4)	0,9(0,3-2,8)	0,9(0,6-1,5)	
FEMENINO	0,3(0,0-1,8)	0,6(0,2-1,6)	1,2(0,6-2,2)	1,9(1,0-3,6)	1,2(0,4-3,0)	1,0(0,7-1,4)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	-	-	0,1(0,0-0,4)	0,1(0,0-0,9)	0,2(0,1-0,9)	0,1(0,0-0,2)	
MASCULINO	-	-	0,1(0,0-0,7)	-	0,3(0,0-1,8)	0,1(0,0-0,2)	
FEMENINO	-	-	0,1(0,0-0,7)	0,3(0,0-1,8)	0,2(0,0-1,3)	0,1(0,0-0,3)	
AMISTADES							F=1,177; df1=6,720; df2=4663,685; p=0,313
NINGUNA VEZ	99,4(98,2-99,8)	98,4(97,0-99,1)	99,3(98,8-99,6)	98,4(97,3-99,1)	99,4(98,2-99,8)	98,9(98,5-99,2)	
MASCULINO	99,7(98,8-99,9)	98,3(94,8-99,5)	99,5(98,4-99,8)	97,9(95,7-99,0)	99,5(96,4-99,9)	98,9(98,1-99,4)	
FEMENINO	99,1(96,4-99,8)	98,4(97,0-99,2)	99,1(98,3-99,6)	99,0(97,9-99,5)	99,2(97,6-99,8)	98,9(98,4-99,3)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,6(0,2-1,8)	1,5(0,8-2,9)	0,6(0,3-1,1)	1,4(0,8-2,5)	0,5(0,2-1,3)	1,0(0,7-1,4)	
MASCULINO	0,3(0,1-1,2)	1,7(0,5-5,2)	0,4(0,1-1,4)	2,1(1,0-4,3)	0,3(0,0-1,8)	1,0(0,6-1,8)	
FEMENINO	0,9(0,2-3,6)	1,4(0,7-2,7)	0,8(0,4-1,6)	0,7(0,3-1,6)	0,8(0,2-2,4)	1,0(0,6-1,5)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	-	0,1(0,0-1,0)	0,1(0,0-0,4)	0,1(0,0-0,9)	0,1(0,0-0,9)	0,1(0,0-0,3)	
MASCULINO	-	-	0,1(0,0-1,0)	-	0,3(0,0-1,8)	0,1(0,0-0,3)	
FEMENINO	-	0,2(0,0-1,7)	0,1(0,0-0,4)	0,3(0,0-1,8)	-	0,1(0,0-0,5)	
LUGAR DE NACIMIENTO							F=1,284; df1=5,361; df2=3720,752; p=0,265
NINGUNA VEZ	99,9(99,2-100,0)	99,5(97,6-99,9)	98,8(98,1-99,3)	99,1(98,1-99,5)	98,4(96,8-99,2)	99,2(98,8-99,5)	
MASCULINO	100,0	99,1(94,0-99,9)	98,9(97,7-99,4)	99,0(97,5-99,6)	98,8(96,1-99,6)	99,1(98,4-99,5)	
FEMENINO	99,8(98,5-100,0)	99,9(99,0-100,0)	98,8(97,8-99,4)	99,2(98,0-99,7)	98,0(95,7-99,1)	99,3(98,9-99,5)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,1(0,0-0,8)	0,5(0,1-2,4)	1,0(0,6-1,7)	0,8(0,4-1,6)	1,2(0,6-2,6)	0,7(0,4-1,0)	
MASCULINO	-	0,9(0,1-6,0)	0,9(0,4-1,9)	1,0(0,4-2,5)	1,0(0,3-2,9)	0,8(0,4-1,5)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,5)	0,1(0,0-1,0)	1,1(0,5-2,1)	0,6(0,2-1,6)	1,5(0,6-3,6)	0,6(0,4-0,9)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	-	-	0,2(0,0-0,7)	0,1(0,0-0,7)	0,4(0,1-1,3)	0,1(0,0-0,2)	
MASCULINO	-	-	0,2(0,0-1,6)	-	0,3(0,0-1,8)	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	-	-	0,1(0,0-0,4)	0,3(0,1-1,3)	0,5(0,1-2,5)	0,1(0,1-0,3)	

TIPO DE DISCRIMINACIÓN	FRECUENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
TALLA							F=1,470; df1=6,551; df2=4546,227; p=0,178
NINGUNA VEZ	99,6(98,6-99,9)	98,6(97,6-99,2)	98,6(97,7-99,1)	98,2(96,8-99,0)	99,5(98,7-99,8)	98,8(98,4-99,1)	
MASCULINO	99,1(97,1-99,7)	99,5(97,9-99,9)	98,5(97,3-99,1)	98,8(97,2-99,5)	99,6(98,3-99,9)	99,0(98,5-99,4)	
FEMENINO	100,0	98,0(96,2-98,9)	98,7(97,3-99,4)	97,6(95,5-98,7)	99,3(97,7-99,8)	98,5(97,9-99,0)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,4(0,1-1,4)	1,3(0,7-2,3)	1,4(0,8-2,3)	1,7(1,0-3,0)	0,4(0,2-1,3)	1,2(0,9-1,6)	
MASCULINO	0,9(0,3-2,9)	0,5(0,1-2,1)	1,5(0,9-2,7)	1,2(0,5-2,8)	0,4(0,1-1,7)	1,0(0,6-1,5)	
FEMENINO	-	1,9(1,0-3,6)	1,2(0,6-2,6)	2,2(1,1-4,1)	0,5(0,1-2,1)	1,3(0,9-1,9)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	-	0,1(0,0-0,8)	0,0(0,0-0,2)	0,1(0,0-0,5)	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,2)	
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	0,2(0,0-1,3)	0,1(0,0-0,4)	0,3(0,1-1,0)	0,2(0,0-1,3)	0,1(0,1-0,4)	
OTRA CONDICIÓN							F=2,712; df1=6,641; df2=4609,039; p=0,010
NINGUNA VEZ	99,8(99,2-100,0)	99,3(98,4-99,7)	99,4(98,8-99,7)	98,4(97,0-99,2)	99,3(98,3-99,7)	99,2(98,9-99,5)	
MASCULINO	100,0	99,6(98,4-99,9)	99,5(98,5-99,8)	98,2(95,3-99,3)	99,6(97,4-100,0)	99,3(98,7-99,7)	
FEMENINO	99,7(98,4-99,9)	99,0(97,6-99,6)	99,3(98,3-99,7)	98,7(97,2-99,4)	98,9(97,1-99,6)	99,1(98,6-99,4)	
RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,2(0,0-0,8)	0,6(0,3-1,4)	0,5(0,2-1,1)	0,6(0,3-1,4)	0,4(0,1-1,4)	0,5(0,3-0,8)	
MASCULINO	-	0,4(0,1-1,6)	0,5(0,2-1,5)	0,4(0,1-1,4)	0,4(0,0-2,6)	0,4(0,2-0,7)	
FEMENINO	0,3(0,1-1,6)	0,8(0,3-2,2)	0,5(0,2-1,5)	0,9(0,4-2,3)	0,5(0,1-2,2)	0,6(0,4-1,1)	
FRECUENTE O MUY FRECUENTEMENTE	-	0,1(0,0-0,5)	0,1(0,0-0,5)	0,9(0,4-2,4)	0,3(0,1-1,0)	0,3(0,1-0,6)	
MASCULINO	-	-	-	1,4(0,4-4,6)	-	0,3(0,1-1,0)	
FEMENINO	-	0,2(0,0-0,8)	0,2(0,0-0,9)	0,4(0,1-1,1)	0,5(0,1-2,2)	0,2(0,1-0,5)	

Si bien la tabla 19B nos muestra que la mayoría de la población adulta se encuentra en desacuerdo con prejuicios raciales o étnicos, también evidencia que un preocupante porcentaje de la población sigue otorgando credibilidad a tales prejuicios. Además, casi un quinto de la población piensa que los homosexuales son “degenerados”, y cerca de un 10% adopta una postura discriminatoria en relación a la condición económica. Por otro lado, tanto la expresión libre de las ideas políticas como el acceso a puestos públicos para las mujeres cuentan con una mayor aceptación. En este último aspecto, según áreas poblacionales, tenemos que Lima Centro con un 95,1%, Lima Norte con 94,3%, Lima Este con 93,2%, Lima Sur con 92,8% y Callao con 95,4% se muestran de acuerdo con esta posición. Es alentador observar que el 91,4% de los adultos encuestados manifiestan estar en desacuerdo considerar que las personas mayores son una carga para la sociedad.

TABLA 19B
PREJUICIOS EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
CIERTAS RAZAS SON MEJORES QUE OTRAS							$F=1,482$; $df1=7,602$; $df2=5275,863$; $p=0,162$
DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	5,1(3,4-7,5)	4,0(2,9-5,6)	6,0(4,6-7,8)	5,5(4,1-7,4)	3,1(1,8-5,0)	4,9(4,2-5,7)	
MASCULINO	6,7(4,0-11,0)	3,4(1,8-6,3)	6,1(4,1-9,1)	6,4(4,3-9,5)	3,2(1,5-6,6)	5,3(4,2-6,6)	
FEMENINO	3,5(1,9-6,4)	4,5(3,0-6,5)	5,9(4,3-8,1)	4,6(2,8-7,4)	2,9(1,4-6,1)	4,5(3,7-5,5)	
INDIFERENTE	0,7(0,3-1,6)	1,8(0,9-3,2)	1,1(0,6-1,9)	1,0(0,5-2,1)	1,0(0,4-2,3)	1,2(0,8-1,6)	
MASCULINO	1,2(0,4-3,2)	1,9(0,6-5,3)	1,7(0,9-3,1)	1,4(0,6-3,3)	1,3(0,4-3,5)	1,5(1,0-2,4)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	1,7(0,8-3,4)	0,5(0,2-1,2)	0,6(0,2-2,4)	0,7(0,2-2,8)	0,8(0,5-1,4)	
EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	94,3(91,9-96,0)	94,2(92,2-95,8)	92,9(91,0-94,4)	93,4(91,3-95,1)	95,9(93,8-97,3)	93,9(93,0-94,7)	
MASCULINO	92,1(87,7-95,0)	94,7(90,7-97,1)	92,2(89,1-94,4)	92,1(88,6-94,6)	95,5(91,8-97,6)	93,2(91,7-94,4)	
FEMENINO	96,4(93,5-98,0)	93,9(91,3-95,7)	96,6(91,3-95,3)	94,7(91,8-96,7)	96,4(93,1-98,1)	94,6(93,5-95,6)	

	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
LA GENTE QUE HABLA CASTELLANO TIENE MAYOR NIVEL CULTURAL QUE LOS QUE HABLAN QUECHUA O AYMARA							$F=1,640$; $df1=6,901$; $df2=4788,977$; $p=0,120$
DE ACUERDO O TOTAL- MENTE DE ACUERDO	10,8(7,9-14,6)	7,5(5,6-10,1)	9,8(8,0-11,8)	9,9(7,8-12,5)	5,6(3,7-8,4)	8,9(7,9-10,1)	
MASCULINO	11,1(6,9-17,4)	4,2(2,4-7,3)	9,4(7,2-12,2)	10,1(7,4-13,5)	6,1(3,2-11,1)	8,2(6,8-9,8)	
FEMENINO	10,5(7,1-15,2)	10,0(7,1-13,9)	10,1(8,0-12,7)	9,8(7,2-13,2)	5,1(2,9-8,7)	9,6(8,2-11,2)	
INDIFERENTE	0,9(0,2-3,4)	1,2(0,6-2,5)	1,4(0,9-2,3)	2,0(1,2-3,3)	0,6(0,2-1,7)	1,3(1,0-1,8)	
MASCULINO	0,7(0,2-3,0)	1,6(0,6-4,2)	1,7(0,8-3,3)	1,8(0,8-3,7)	0,7(0,2-2,8)	1,4(0,9-2,1)	
FEMENINO	1,1(0,2-7,6)	1,0(0,3-2,8)	1,1(0,6-2,3)	2,2(1,2-4,3)	0,4(0,1-2,8)	1,2(0,8-2,0)	
EN DESACUERDO O TOTAL- MENTE EN DESACUERDO	88,3(84,4-91,4)	91,2(88,5-93,3)	88,8(86,5-90,8)	88,1(85,4-90,3)	93,8(91,0-95,8)	89,8(88,5-90,9)	
MASCULINO	88,2(81,5-92,7)	94,2(90,3-96,6)	88,9(85,6-91,6)	88,2(84,6-91,0)	93,2(88,0-96,3)	90,4(88,6-91,9)	
FEMENINO	88,4(83,2-92,2)	89,0(85,1-92,0)	88,7(86,0-91,0)	88,0(84,3-90,9)	94,5(90,8-96,8)	89,2(87,5-90,7)	
LAS PERSONAS DE HABLAR MOTOSO SON MENOS EDUCADAS							$F=1,834$; $df1=7,391$; $df2=5129,152$; $p=0,072$
DE ACUERDO O TOTAL- MENTE DE ACUERDO	8,2(5,7-11,5)	6,6(4,8-8,9)	8,3(6,6-10,4)	7,9(6,0-10,3)	6,3(4,3-9,2)	7,5(6,6-8,6)	
MASCULINO	9,3(5,6-15,1)	5,4(3,1-9,1)	9,5(6,8-13,1)	8,2(5,7-11,8)	6,9(4,2-11,2)	7,9(6,5-9,6)	
FEMENINO	7,1(4,4-11,2)	7,5(5,2-10,6)	7,1(5,4-9,3)	7,5(5,4-10,4)	5,6(3,0-10,1)	7,1(6,0-8,5)	
INDIFERENTE	0,7(0,3-1,9)	2,7(1,6-4,6)	1,8(1,1-3,0)	2,7(1,7-4,2)	0,5(0,2-1,6)	1,9(1,4-2,5)	
MASCULINO	0,3(0,0-2,0)	4,4(2,2-8,6)	1,7(0,9-3,4)	3,2(1,7-5,8)	0,7(0,2-2,6)	2,3(1,5-3,4)	
FEMENINO	1,1(0,5-2,7)	1,5(0,7-3,2)	1,9(1,1-3,4)	2,3(1,2-4,1)	0,3(0,0-2,2)	1,5(1,1-2,2)	
EN DESACUERDO O TOTAL- MENTE EN DESACUERDO	91,1(87,6-93,7)	90,7(87,8-93,0)	89,9(87,6-91,8)	89,4(86,7-91,6)	93,2(90,4-95,2)	90,6(89,4-91,7)	
MASCULINO	90,4(84,6-94,2)	90,3(84,8-93,9)	88,8(85,1-91,6)	88,6(84,6-91,7)	92,4(88,2-95,2)	89,8(87,9-91,5)	
FEMENINO	91,8(87,4-94,7)	91,1(87,8-93,6)	91,0(88,6-92,9)	90,2(86,9-92,7)	94,1(89,7-96,7)	91,3(89,9-92,6)	
LOS HOMOSEXUALES SON DEGENERADOS							$F=3,454$; $df1=7,684$; $df2=5333,026$; $p=0,001$
DE ACUERDO O TOTAL- MENTE DE ACUERDO	16,8(13,2-21,1)	16,2(13,3-19,7)	22,2(19,2-25,5)	19,5(16,5-22,8)	14,5(11,2-18,5)	18,3(16,8-19,9)	
MASCULINO	19,2(13,8-26,0)	19,8(14,9-25,8)	25,6(21,2-30,5)	24,6(20,0-29,9)	18,4(13,4-24,8)	22,0(19,7-24,5)	
FEMENINO	14,5(10,4-20,0)	13,6(10,4-17,4)	18,8(15,5-22,6)	14,2(11,2-17,8)	10,1(6,3-16,0)	14,7(13,1-16,6)	
INDIFERENTE	13,4(10,6-16,9)	19,0(15,9-22,4)	17,4(15,1-19,9)	11,9(9,6-14,7)	15,8(12,1-20,4)	15,8(14,5-17,2)	
MASCULINO	12,1(8,1-17,8)	23,4(18,2-29,6)	19,1(15,6-23,2)	13,3(10,0-17,5)	19,5(13,2-27,8)	17,7(15,6-20,0)	
FEMENINO	14,7(10,9-19,6)	15,6(12,4-19,5)	15,6(12,8-19,0)	10,4(7,7-14,0)	11,7(7,8-17,1)	14,1(12,5-15,8)	
EN DESACUERDO O TOTAL- MENTE EN DESACUERDO	69,7(64,9-74,2)	64,8(60,6-68,8)	60,4(56,9-63,8)	68,6(64,6-72,4)	69,7(64,9-74,1)	65,9(64,0-67,8)	
MASCULINO	68,7(61,8-74,8)	56,8(49,4-63,9)	55,3(50,1-60,3)	62,1(56,1-67,6)	62,1(54,6-69,1)	60,3(57,4-63,2)	
FEMENINO	70,7(64,3-76,4)	70,8(66,1-75,1)	65,6(61,4-69,6)	75,3(70,4-79,7)	78,2(71,5-83,7)	71,2(68,9-73,4)	
LAS PERSONAS DE MEJOR SITUACIÓN ECONÓMICA MERECE MEJOR TRATO							$F=2,712$; $df1=7,585$; $df2=5263,880$; $p=0,007$
DE ACUERDO O TOTAL- MENTE DE ACUERDO	4,7(3,1-7,3)	6,3(4,6-8,6)	10,2(8,1-12,9)	7,9(6,1-10,3)	5,0(3,3-7,6)	7,2(6,3-8,3)	
MASCULINO	6,5(3,6-11,5)	6,2(3,7-10,1)	10,1(7,3-13,8)	8,4(5,9-11,8)	3,2(1,7-5,9)	7,4(6,0-9,0)	
FEMENINO	3,1(1,7-5,4)	6,4(4,3-9,4)	10,3(8,0-13,2)	7,5(5,2-10,6)	7,0(4,2-11,5)	7,0(5,9-8,3)	
INDIFERENTE	1,3(0,7-2,5)	0,9(0,5-1,7)	1,5(0,9-2,6)	1,0(0,4-2,4)	0,7(0,2-2,1)	1,1(0,8-1,5)	
MASCULINO	2,0(0,9-4,3)	1,4(0,6-3,2)	1,6(0,8-3,4)	1,4(0,5-3,6)	0,9(0,2-3,9)	1,5(1,0-2,2)	
FEMENINO	0,6(0,2-2,0)	0,5(0,2-1,3)	1,4(0,7-3,0)	0,7(0,2-2,1)	0,4(0,1-1,8)	0,8(0,5-1,2)	
EN DESACUERDO O TOTAL- MENTE EN DESACUERDO	94,0(91,2-95,9)	92,8(90,5-94,6)	88,3(85,7-90,4)	91,0(88,5-93,1)	94,3(91,6-96,2)	91,7(90,6-92,7)	
MASCULINO	91,5(86,1-94,9)	94,4(88,4-95,1)	88,3(84,6-91,2)	90,2(86,7-92,9)	95,8(92,5-97,7)	91,1(89,4-92,6)	
FEMENINO	96,3(93,9-97,8)	93,2(90,1-95,3)	88,3(85,1-90,8)	91,9(88,6-94,3)	92,5(88,1-95,4)	92,2(90,9-93,4)	
ALGUNAS RELIGIONES SON MEJORES QUE OTRAS							$F=2,092$; $df1=7,311$; $df2=5074,005$; $p=0,038$
DE ACUERDO O TOTAL- MENTE DE ACUERDO	10,5(7,3-14,9)	8,9(6,9-11,5)	15,3(12,8-18,1)	13,4(10,8-16,5)	11,0(7,7-15,5)	11,9(10,6-13,3)	
MASCULINO	8,3(4,8-14,0)	7,1(4,6-10,7)	16,9(13,2-21,5)	13,9(10,4-18,4)	11,1(7,1-17,0)	11,7(10,0-13,7)	
FEMENINO	12,6(8,6-18,2)	10,3(7,4-14,2)	13,7(10,9-16,9)	12,8(9,7-16,8)	10,9(6,9-16,7)	12,0(10,4-13,8)	

	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
INDIFERENTE	10,1(7,5-13,5)	8,2(6,2-10,8)	8,7(7,0-10,7)	9,3(7,3-11,7)	7,4(5,4-10,1)	8,8(7,8-9,9)	
MASCULINO	11,3(7,5-16,5)	10,1(6,7-15,1)	8,8(6,5-11,8)	9,2(6,4-13,0)	9,3(6,4-13,5)	9,7(8,2-11,5)	
FEMENINO	9,0(5,9-13,6)	6,9(4,8-9,7)	8,6(6,5-11,4)	9,4(6,8-12,8)	5,3(3,2-8,7)	8,0(6,8-9,4)	
EN DESACUERDO O TOTAL- MENTE EN DESACUERDO	79,4(74,5-83,5)	82,8(79,5-85,7)	76,0(73,0-78,8)	77,3(73,3-80,9)	81,6(76,5-85,8)	79,3(77,6-80,9)	
MASCULINO	80,4(73,9-85,6)	82,8(77,1-87,3)	74,3(69,7-78,4)	76,9(71,1-81,8)	79,5(72,4-85,2)	78,6(76,1-80,9)	
FEMENINO	78,4(72,0-83,7)	82,8(78,6-86,4)	77,7(74,2-80,9)	77,8(72,8-82,1)	83,9(77,2-88,8)	80,0(77,9-81,9)	
TODAS LAS IDEAS POLÍTICAS DEBEN EXPRESARSE LIBREMENTE							F=1,016; df1=7,495; df2=5201,564; p=0,419
DE ACUERDO O TOTAL- MENTE DE ACUERDO	95,1(93,0-96,6)	94,3(92,3-95,8)	93,2(91,6-94,5)	92,8(90,8-94,4)	95,4(92,9-97,1)	94,0(93,1-94,7)	
MASCULINO	94,9(91,2-97,0)	94,9(91,5-97,0)	94,2(91,6-96,0)	92,8(89,6-95,0)	94,7(89,9-97,3)	94,2(92,9-95,3)	
FEMENINO	95,3(92,6-97,0)	93,8(91,1-95,7)	92,2(89,8-94,1)	92,8(90,3-94,8)	96,3(93,1-98,0)	93,7(92,6-94,7)	
INDIFERENTE	2,5(1,3-4,4)	2,4(1,6-3,7)	2,3(1,5-3,5)	2,5(1,6-3,8)	2,0(1,0-3,9)	2,4(1,9-2,9)	
MASCULINO	2,9(1,2-6,6)	2,1(0,9-4,6)	1,7(0,8-3,4)	2,3(1,2-4,5)	2,4(1,0-6,0)	2,2(1,6-3,1)	
FEMENINO	2,0(0,9-4,3)	2,7(1,6-4,3)	3,0(1,8-4,8)	2,7(1,6-4,4)	1,4(0,5-4,2)	2,5(1,9-3,2)	
EN DESACUERDO O TOTAL- MENTE EN DESACUERDO	2,5(1,5-4,0)	3,3(2,1-5,2)	4,5(3,4-5,9)	4,7(3,4-6,4)	2,6(1,5-4,4)	3,7(3,1-4,4)	
MASCULINO	2,2(1,1-4,6)	3,0(1,4-6,2)	4,2(2,6-6,5)	4,9(3,1-7,6)	2,9(1,3-6,0)	3,6(2,7-4,6)	
FEMENINO	2,7(1,5-4,8)	3,6(2,0-6,2)	4,8(3,4-6,9)	4,5(3,0-6,6)	2,3(1,0-5,0)	3,8(3,0-4,7)	
LAS MUJERES DEBIERAN ACCEDER A PUESTOS PÚBLICOS IMPORTANTES							F=0,954; df1=7,314; df2=5075,697; p=0,465
DE ACUERDO O TOTAL- MENTE DE ACUERDO	95,9(93,5-97,5)	94,8(93,0-96,2)	94,7(93,1-95,9)	94,7(92,9-96,0)	95,2(92,4-97,0)	95,0(94,2-95,7)	
MASCULINO	94,7(91,2-96,8)	93,4(90,0-95,7)	94,1(91,3-96,0)	93,6(90,5-95,7)	94,7(90,4-97,1)	94,0(92,7-95,1)	
FEMENINO	97,1(92,8-98,9)	95,9(93,5-97,4)	95,2(93,2-96,7)	95,8(93,7-97,2)	95,8(92,6-97,6)	95,9(94,9-96,8)	
INDIFERENTE	2,0(1,1-3,9)	3,0(2,0-4,7)	1,8(1,2-2,7)	2,2(1,3-3,7)	1,8(1,0-3,3)	2,3(1,8-2,9)	
MASCULINO	2,9(1,5-5,7)	3,8(2,1-7,0)	2,4(1,4-3,9)	3,4(1,9-6,2)	2,0(0,9-4,4)	3,0(2,2-4,0)	
FEMENINO	1,2(0,4-3,7)	2,5(1,3-4,5)	1,3(0,7-2,6)	0,9(0,4-2,0)	1,6(0,6-3,9)	1,6(1,1-2,3)	
EN DESACUERDO O TOTAL- MENTE EN DESACUERDO	2,1(1,0-4,3)	2,1(1,3-3,3)	3,5(2,4-5,1)	3,1(2,1-4,5)	3,0(1,8-5,1)	2,7(2,2-3,4)	
MASCULINO	2,4(1,0-5,5)	2,7(1,5-5,0)	3,5(1,9-6,3)	3,0(1,7-5,2)	3,4(1,6-6,9)	3,0(2,2-4,0)	
FEMENINO	1,7(0,4-6,6)	1,6(0,8-3,4)	3,5(2,2-5,3)	3,3(2,0-5,3)	2,6(1,3-5,4)	2,5(1,9-3,4)	
LAS PERSONAS MAYORES SON UNA CARGA PARA LA SOCIEDAD							F=0,687; df1=7,562; df2=5248,282; p=0,695
DE ACUERDO O TOTAL- MENTE DE ACUERDO	5,5(3,8-7,9)	7,2(5,5-9,5)	8,6(7,0-10,6)	6,9(5,3-9,0)	7,3(5,1-10,3)	7,2(6,3-8,2)	
MASCULINO	4,6(2,5-8,2)	6,2(3,9-9,7)	8,4(6,1-11,6)	6,9(4,7-10,1)	6,0(3,4-10,6)	6,6(5,4-8,0)	
FEMENINO	6,3(3,9-10,0)	8,0(5,8-11,0)	8,8(6,6-11,6)	7,0(5,1-9,5)	8,6(5,5-13,5)	7,8(6,6-9,1)	
INDIFERENTE	1,1(0,5-2,2)	1,6(0,8-3,1)	1,4(0,9-2,2)	1,5(0,7-3,0)	1,4(0,6-3,1)	1,4(1,0-1,9)	
MASCULINO	1,0(0,3-2,7)	2,2(0,8-5,7)	1,6(0,8-3,2)	0,9(0,3-2,5)	1,3(0,5-3,2)	1,4(0,9-2,3)	
FEMENINO	1,2(0,4-3,2)	1,1(0,5-2,4)	1,1(0,6-2,1)	2,0(0,9-4,4)	1,5(0,5-4,2)	1,3(0,9-2,0)	
EN DESACUERDO O TOTAL- MENTE EN DESACUERDO	93,5(90,9-95,3)	91,2(88,8-93,2)	90,0(88,0-91,8)	91,6(89,4-93,4)	91,3(88,0-93,8)	91,4(90,4-92,3)	
MASCULINO	94,4(90,6-96,7)	91,6(87,7-94,4)	90,0(86,8-92,4)	92,2(88,9-94,5)	92,7(88,2-95,6)	91,9(90,4-93,2)	
FEMENINO	92,5(88,7-95,1)	90,9(87,8-93,3)	90,1(87,1-92,5)	91,0(88,2-93,2)	89,8(84,7-93,4)	90,9(89,5-92,1)	
POLÍTICOS QUE NO CREEN EN DIOS NO ESTÁN APTOS PARA UN CARGO PÚBLICO							F=0,687; df1=7,562; df2=5248,282; p=0,695
DE ACUERDO O TOTAL- MENTE DE ACUERDO	26,7(21,9-32,1)	27,3(23,5-31,3)	39,4(35,8-43,2)	35,2(30,6-40,0)	33,1(28,0-38,7)	32,4(30,5-34,5)	
MASCULINO	24,3(18,0-31,9)	25,6(20,0-32,2)	38,1(33,3-43,1)	34,3(28,6-40,5)	33,4(26,6-41,1)	31,4(28,7-34,3)	
FEMENINO	29,0(23,0-35,9)	28,4(23,8-33,5)	40,8(35,9-45,8)	36,1(30,7-41,8)	32,8(25,8-40,7)	33,4(30,9-36,0)	
INDIFERENTE	17,6(13,9-22,0)	20,9(17,5-24,6)	13,8(11,6-16,4)	17,5(14,7-20,7)	11,9(8,3-16,8)	16,9(15,4-18,5)	
MASCULINO	16,9(12,2-23,0)	22,7(17,3-29,1)	13,3(10,2-17,2)	16,4(13,2-20,4)	13,5(8,2-21,4)	16,8(14,7-19,1)	
FEMENINO	18,2(13,6-24,1)	19,5(15,9-23,8)	14,2(11,4-17,6)	18,6(14,7-23,4)	10,2(6,3-16,1)	17,0(15,1-19,0)	
EN DESACUERDO O TOTAL- MENTE EN DESACUERDO	55,7(49,9-61,3)	51,9(47,6-56,2)	46,8(43,0-50,7)	47,3(42,5-52,1)	54,9(49,2-60,5)	50,7(48,5-52,8)	
MASCULINO	58,8(50,3-66,7)	51,7(44,6-58,7)	48,6(43,9-53,3)	49,3(42,9-55,6)	53,1(45,1-60,9)	51,8(48,7-54,8)	
FEMENINO	52,7(46,2-59,2)	52,0(46,9-57,1)	45,0(40,0-50,1)	45,3(39,8-50,9)	57,0(49,9-63,9)	49,6(47,0-52,3)	

ESTADOS ANÍMICOS PREVALENTES

Los estados anímicos comunes de las personas no son, de por sí, estados patológicos, pero pueden dar una idea rápida de las tendencias anímicas que pueden repercutir en su calidad de vida. Se ha indagado la frecuencia de tales estados en el momento actual de su vida, y se ha intentado utilizar términos comunes al lenguaje cotidiano. En la población general, entre el 7% y el 20% de las personas experimenta con mucha frecuencia estados anímicos negativos como tristeza, preocupación, tensión, aburrimiento, irritabilidad y angustia. Cabe resaltar que las mujeres experimentan estos estados en mayor proporción que los hombres, lo que está en relación directa con la presencia de trastornos depresivos o ansiosos. El estado anímico de mayor prevalencia es la alegría con un 77,3% de los adultos encuestados. Esto se distribuye, según áreas poblacionales, en Lima Centro con un 75,4%, Lima Norte con un 75,4%, Lima Este con un 78,1%, Lima Sur con un 77,6% y Callao con un 82,8%, seguida del estado anímico tranquilo con un 71,1% del total de los adultos, considerándose para Lima Centro en un 71,2%, Lima Norte en un 66,2%, Lima Este en un 74,4%, Lima Sur en un 71,4% y Callao en un 75,2%. Estos porcentajes son mayores a los encontrados en el estudio del año 2002, en que la alegría y tranquilidad eran prevalentes en alrededor del 60%. Por otro lado, los estados anímicos negativos de preocupación, tensión y tristeza han experimentado un descenso de casi 20 puntos porcentuales en comparación a los encontrados hace 10 años (Tabla 20A).

TABLA 20A
PREVALENCIA DE ESTADOS ANÍMICOS SEGÚN SEXO EN LA POBLACIÓN ADULTA,
DE ÁREAS POBLACIONALES EN LIMA METROPOLITANA 2012

ESTADOS ANÍMICOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
TRISTE							$F=6,581; df1=7,255;$ $df2=5035,168; p<0,00001$
NUNCA	21,9(17,1-27,6)	14,6(12,0-17,7)	9,9(8,0-12,2)	9,9(7,7-12,7)	20,1(15,9-25,0)	14,3(12,9-15,9)	
MASCULINO	33,4(26,1-41,7)	19,6(14,9-25,3)	14,4(11,4-18,1)	12,7(9,3-17,2)	22,3(16,7-29,2)	19,5(17,3-22,0)	
FEMENINO	11,0(7,1-16,6)	10,9(8,0-14,6)	5,5(3,9-7,7)	7,0(5,0-9,9)	17,5(12,3-24,2)	9,5(8,1-11,2)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	71,6(66,1-76,6)	76,0(72,7-79,0)	79,6(77,0-82,0)	80,0(76,8-82,9)	72,3(67,0-77,1)	76,5(74,9-78,1)	
MASCULINO	63,4(55,4-70,8)	72,9(67,0-78,1)	79,4(75,5-82,9)	82,5(78,1-86,2)	73,0(65,9-79,2)	75,0(72,4-77,4)	
FEMENINO	79,4(73,2-84,4)	78,2(74,1-81,9)	79,7(76,2-82,9)	77,5(72,6-81,7)	71,6(64,5-77,7)	78,0(75,9-79,9)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,5(4,6-9,0)	9,4(7,4-12,0)	10,5(8,9-12,4)	10,1(8,1-12,5)	7,6(5,3-10,7)	9,1(8,2-10,2)	
MASCULINO	3,1(1,6-6,0)	7,5(4,8-11,5)	6,2(4,2-8,9)	4,8(3,1-7,2)	4,6(2,3-9,1)	5,5(4,4-6,8)	
FEMENINO	9,6(6,4-14,3)	10,9(8,1-14,4)	14,8(12,2-17,7)	15,5(12,1-19,6)	11,0(7,6-15,5)	12,5(11,0-14,1)	
TENSO							$F=4,536; df1=7,412;$ $df2=5144,253; p=0,00003$
NUNCA	19,5(15,8-24,0)	20,8(17,8-24,3)	20,6(18,0-23,4)	19,3(16,5-22,5)	30,4(25,5-35,9)	21,3(19,8-22,9)	
MASCULINO	26,5(20,3-33,8)	20,0(15,6-25,2)	24,1(20,3-28,3)	22,7(18,2-28,0)	32,3(25,5-39,9)	24,2(21,9-26,7)	
FEMENINO	12,9(8,7-18,8)	21,5(17,4-26,1)	17,1(14,2-20,4)	15,8(12,7-19,5)	28,4(21,9-35,9)	18,5(16,6-20,6)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	70,7(66,4-74,7)	71,4(67,5-74,9)	67,8(64,7-70,8)	67,5(64,4-70,5)	63,8(58,6-68,7)	68,8(67,1-70,4)	
MASCULINO	68,7(61,3-75,2)	74,6(69,3-79,3)	69,0(64,3-73,3)	67,9(63,2-72,3)	63,1(55,6-70,0)	69,3(66,8-71,7)	
FEMENINO	72,6(66,2-78,3)	69,0(63,8-73,7)	66,7(63,0-70,1)	67,1(62,4-71,4)	64,7(57,8-70,9)	68,3(65,9-70,5)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	9,8(7,3-13,0)	7,8(6,0-10,0)	11,6(10,0-13,5)	13,2(11,1-15,7)	5,7(4,0-8,1)	10,0(9,0-11,0)	
MASCULINO	4,8(2,6-8,8)	5,4(3,3-8,7)	6,9(5,0-9,6)	9,4(7,0-12,5)	4,7(2,7-8,0)	6,5(5,4-7,8)	
FEMENINO	14,4(10,6-19,4)	9,6(7,0-12,9)	16,2(13,7-19,1)	17,1(13,9-20,9)	6,9(4,5-10,5)	13,2(11,8-14,8)	

ESTADOS ANÍMICOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
ANGUSTIADO							$F=3,160$; $df1=7,421$; $df2=5150,045$; $p=0,002$
NUNCA	45,58(40,2-51,0)	37,9(34,0-42,0)	37,3(33,9-40,8)	37,4(33,5-41,4)	49,7(44,1-55,3)	40,2(38,3-42,2)	
MASCULINO	53,6(45,7-61,3)	40,0(34,1-46,2)	42,8(38,3-47,5)	41,6(36,3-47,1)	51,0(44,2-57,8)	44,8(42,0-47,5)	
FEMENINO	37,9(31,5-44,7)	36,3(31,9-40,9)	31,8(28,1-35,8)	33,1(28,3-38,3)	48,2(40,9-55,5)	36,0(33,7-38,4)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	49,0(44,1-54,0)	55,6(51,6-59,5)	55,3(51,9-58,7)	55,4(51,4-59,4)	45,7(40,4-51,1)	53,3(51,4-55,2)	
MASCULINO	43,0(35,7-50,7)	54,7(48,8-60,5)	53,5(49,1-57,9)	54,5(49,1-59,9)	44,9(38,3-51,6)	51,2(48,5-53,8)	
FEMENINO	54,7(48,1-61,3)	56,3(51,6-60,8)	57,1(52,8-61,2)	56,3(50,9-61,6)	46,6(39,8-53,7)	55,3(52,9-57,7)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,4(3,7-8,0)	6,5(5,0-8,5)	7,4(6,0-9,1)	7,2(5,6-9,2)	4,6(3,1-6,8)	6,5(5,7-7,4)	
MASCULINO	3,4(1,8-6,2)	5,3(3,2-8,7)	3,7(2,4-5,7)	3,8(2,2-6,5)	4,1(2,2-7,6)	4,1(3,2-5,2)	
FEMENINO	7,4(4,6-11,7)	7,4(5,4-10,1)	11,1(8,9-13,8)	10,6(8,0-13,8)	5,2(3,0-8,8)	8,7(7,5-10,0)	
IRRITABLE							$F=2,174$; $df1=6,806$; $df2=4723,114$; $p=0,035$
NUNCA	40,9(34,8-47,3)	32,1(28,1-36,4)	33,6(30,5-36,8)	29,5(25,9-33,4)	37,3(30,7-44,5)	34,0(32,0-36,1)	
MASCULINO	46,4(38,1-54,9)	33,2(27,1-39,8)	35,4(31,2-39,9)	34,2(29,2-39,5)	38,4(30,5-46,9)	36,9(34,1-39,8)	
FEMENINO	35,7(29,0-43,0)	31,3(26,7-36,3)	31,7(28,0-35,7)	24,7(20,5-29,5)	36,1(28,2-44,9)	31,3(29,0-33,8)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	52,5(46,9-58,1)	59,8(55,4-64,1)	59,0(55,9-62,1)	61,6(57,8-65,3)	55,9(48,9-62,7)	58,3(56,3-60,3)	
MASCULINO	48,8(41,2-56,4)	59,3(52,4-65,9)	59,3(54,9-63,5)	60,2(54,9-65,2)	56,2(47,5-64,6)	57,3(54,4-60,1)	
FEMENINO	56,0(49,3-62,5)	60,2(55,3-65,0)	58,7(54,6-62,7)	63,1(58,5-67,5)	55,6(47,5-63,3)	59,3(56,9-61,6)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,6(4,7-9,2)	8,1(6,3-10,3)	7,4(6,0-9,2)	8,9(7,1-11,1)	6,8(4,9-9,3)	7,7(6,8-8,6)	
MASCULINO	4,8(2,8-8,2)	7,5(5,0-11,2)	5,3(3,6-7,7)	5,7(3,6-8,8)	5,4(3,1-9,2)	5,8(4,8-7,1)	
FEMENINO	8,2(5,3-12,5)	8,5(6,2-11,5)	9,5(7,5-12,0)	12,1(9,5-15,3)	8,3(5,7-12,0)	9,4(8,2-10,8)	
PREOCUPADO							$F=1,646$; $df1=7,591$; $df2=5267,957$; $p=0,111$
NUNCA	11,5(8,6-15,3)	10,0(7,7-12,8)	9,8(8,1-11,9)	11,3(9,2-13,7)	12,9(9,7-17,0)	10,8(9,7-12,0)	
MASCULINO	15,2(10,8-20,9)	10,8(7,4-15,6)	12,6(9,8-16,2)	12,9(10,0-16,6)	14,0(9,7-19,7)	12,9(11,2-14,8)	
FEMENINO	8,0(4,5-13,8)	9,3(6,6-13,1)	7,1(5,4-9,2)	9,6(7,3-12,5)	11,7(8,3-16,2)	8,8(7,5-10,4)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	72,0(67,2-76,4)	71,1(67,4-74,5)	67,5(64,4-70,5)	66,3(62,6-69,8)	68,5(64,0-72,8)	69,1(67,4-70,8)	
MASCULINO	72,2(65,8-77,8)	75,7(70,1-80,6)	70,0(65,7-74,0)	71,2(66,0-75,8)	66,7(60,4-72,4)	71,6(69,2-73,9)	
FEMENINO	71,8(65,2-77,6)	67,7(62,7-72,3)	65,0(60,7-69,0)	61,4(56,7-65,9)	70,6(63,9-76,5)	66,8(64,5-69,1)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	16,5(13,3-20,2)	18,9(16,1-22,0)	22,7(20,1-25,5)	22,4(19,4-25,7)	18,5(15,0-22,7)	20,1(18,7-21,6)	
MASCULINO	12,6(9,0-17,4)	13,5(9,9-18,0)	17,4(14,5-20,6)	15,9(12,5-20,0)	19,3(13,7-26,7)	15,5(13,8-17,4)	
FEMENINO	20,1(15,4-25,9)	22,9(19,0-27,4)	27,9(24,2-32,0)	29,1(24,8-33,7)	17,7(13,4-22,9)	24,3(22,3-26,5)	
TRANQUILO							$F=2,221$; $df1=7,713$; $df2=5352,912$; $p=0,025$
NUNCA	2,7(1,4-4,9)	2,1(1,3-3,4)	1,6(0,8-3,0)	1,8(1,1-2,9)	1,8(0,9-3,6)	2,0(1,5-2,6)	
MASCULINO	3,0(1,4-6,4)	3,1(1,6-5,7)	1,7(0,8-3,7)	2,0(1,0-4,3)	3,2(1,6-6,5)	2,5(1,8-3,5)	
FEMENINO	2,3(0,8-6,6)	1,4(0,6-3,0)	1,5(0,8-2,7)	1,5(0,8-3,0)	0,3(0,1-1,0)	1,5(1,0-2,2)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	26,1(22,5-30,1)	31,7(28,4-35,3)	24,0(21,4-26,9)	26,8(23,6-30,3)	23,0(18,8-27,9)	26,9(25,4-28,5)	
MASCULINO	19,5(15,1-24,7)	28,5(22,8-34,9)	19,5(16,4-23,1)	20,5(16,4-25,3)	20,8(15,7-27,0)	22,0(19,9-24,3)	
FEMENINO	32,4(26,9-38,5)	34,2(30,3-38,6)	28,5(24,9-32,3)	33,2(28,9-37,8)	25,5(19,7-32,4)	31,5(29,4-33,7)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	71,2(67,0-75,2)	66,2(62,6-69,6)	74,4(71,5-77,1)	71,4(67,8-74,8)	75,2(70,2-79,5)	71,1(69,5-72,7)	
MASCULINO	77,5(71,4-82,7)	68,4(61,9-74,3)	78,8(75,2-81,9)	77,5(72,5-81,8)	76,0(69,8-81,3)	75,5(73,1-77,7)	
FEMENINO	65,3(58,9-71,1)	64,5(60,1-68,7)	70,1(66,1-73,7)	65,3(60,6-69,6)	74,2(67,4-80,0)	67,0(64,8-69,2)	
ALEGRE							$F=1,368$; $df1=7,538$; $df2=5231,213$; $p=0,209$
NUNCA	0,6(0,2-1,8)	1,2(0,5-2,5)	1,3(0,6-2,7)	0,7(0,3-1,6)	0,7(0,2-2,6)	1,0(0,6-1,4)	
MASCULINO	1,1(0,4-3,4)	2,5(1,2-5,3)	1,4(0,5-3,4)	1,0(0,3-2,9)	1,2(0,3-4,7)	1,5(1,0-2,3)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,8)	0,2(0,0-1,1)	1,3(0,6-2,6)	0,4(0,1-1,2)	-	0,5(0,3-0,8)	

ESTADOS ANÍMICOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	24,0(20,2-28,3)	23,4(20,1-27,2)	20,5(18,3-23,0)	21,7(18,8-24,9)	16,5(13,2-20,5)	21,7(20,2-23,3)	
MASCULINO	17,9(12,5-25,0)	22,6(17,3-29,0)	17,4(14,4-20,9)	18,2(14,3-22,9)	17,4(12,4-23,8)	18,9(16,7-21,3)	
FEMENINO	29,9(24,8-35,5)	24,0(20,1-28,5)	23,6(20,5-27,1)	25,2(21,4-29,5)	15,6(11,4-21,0)	24,4(22,4-26,4)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	75,4(70,9-79,3)	75,4(71,6-78,8)	78,1(75,6-80,5)	77,6(74,3-80,6)	82,8(78,9-86,1)	77,3(75,7-78,8)	
MASCULINO	81,0(73,6-86,7)	74,9(68,4-80,4)	81,3(77,9-84,2)	80,8(75,9-84,9)	81,4(75,3-86,2)	79,6(77,2-81,9)	
FEMENINO	70,0(64,3-75,1)	75,8(71,3-79,8)	75,1(71,5-78,4)	74,4(70,1-78,2)	84,4(79,0-88,6)	75,2(73,1-77,1)	
ABURRIDO							F=3,986; df1=7,411; df2=5143,237; p=0,00017
NUNCA	43,6(38,3-49,0)	35,9(31,9-40,1)	32,4(29,3-35,7)	31,3(27,5-35,4)	44,0(38,3-49,8)	36,3(34,4-38,3)	
MASCULINO	49,5(42,1-57,0)	34,7(28,0-42,1)	36,1(31,3-41,1)	30,1(25,1-35,5)	45,1(37,0-53,4)	37,9(35,0-40,8)	
FEMENINO	37,9(31,9-44,3)	36,8(32,1-41,7)	28,8(25,3-32,6)	32,6(27,5-38,1)	42,7(35,7-50,0)	34,8(32,5-37,2)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	51,2(46,1-56,3)	56,7(52,7-60,6)	60,7(57,4-64,0)	59,9(56,0-63,6)	50,4(44,3-56,5)	56,7(54,8-58,6)	
MASCULINO	46,5(39,5-53,6)	59,2(52,3-65,7)	59,5(54,5-64,4)	60,5(54,9-65,8)	49,7(40,6-58,8)	56,2(53,3-59,1)	
FEMENINO	55,7(49,4-61,8)	54,9(50,0-59,7)	61,9(58,0-65,7)	59,3(53,7-64,6)	51,3(44,0-58,5)	57,2(54,8-59,6)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,2(3,4-8,0)	7,4(5,7-9,5)	6,9(5,5-8,6)	8,8(7,0-11,1)	5,6(3,9-8,0)	7,0(6,2-7,9)	
MASCULINO	4,0(1,8-8,5)	6,1(3,9-9,4)	4,4(2,9-6,8)	9,5(6,6-13,3)	5,2(2,9-9,2)	5,9(4,8-7,3)	
FEMENINO	6,4(3,6-11,0)	8,4(6,2-11,2)	9,3(7,2-11,8)	8,1(5,9-11,0)	6,0(3,8-9,5)	8,0(6,8-9,3)	
OTRO							F=1,658; df1=6,582; df2=4568,164; p=0,120
NUNCA	72,0(19,9-96,4)	60,1(31,7-83,0)	79,3(53,1-92,8)	89,0(76,3-95,3)	70,1(29,3-93,0)	78,2(66,6-86,6)	
MASCULINO	65,4(12,7-96,1)	100,0(100,0-100,0)	78,9(38,3-95,8)	89,4(72,3-96,4)	80,6(23,1-98,3)	84,7(69,1-93,2)	
FEMENINO	100,0(100,0-100,0)	55,5(27,2-80,7)	79,5(44,6-94,9)	88,2(62,2-97,2)	62,0(20,0-91,4)	71,7(54,5-84,3)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	28,0(3,6-80,1)	13,2(3,2-41,2)	5,4(0,7-30,7)	10,4(4,2-23,3)	-	10,7(5,3-20,2)	
MASCULINO	34,6(3,9-87,3)	-	15,1(2,0-60,8)	10,6(3,6-27,7)	-	13,1(5,2-29,1)	
FEMENINO	-	14,7(3,5-44,6)	-	9,8(1,9-38,0)	-	8,3(2,9-21,9)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	-	26,7(8,4-59,1)	15,3(4,4-41,5)	0,6(0,1-4,3)	29,9(7,0-70,7)	11,1(5,3-21,7)	
MASCULINO	-	-	6,0(0,7-35,6)	-	19,4(1,7-76,9)	2,2(0,5-9,5)	
FEMENINO	-	29,8(9,5-63,1)	20,5(5,1-55,4)	1,9(0,3-13,1)	38,0(8,6-80,0)	20,0(9,4-37,5)	
NERVIOSO(A)							F=7,555; df1=7,054; df2=4895,324; p=<0,000001
NUNCA	54,8(48,5-60,9)	44,8(40,8-48,9)	44,7(40,9-48,6)	41,5(37,8-45,4)	63,9(58,2-69,3)	47,9(45,8-50,0)	
MASCULINO	61,2(53,0-68,8)	50,7(44,3-57,0)	48,1(42,8-53,5)	46,1(40,6-51,6)	70,5(62,4-77,5)	53,2(50,3-56,2)	
FEMENINO	48,8(41,1-56,5)	40,5(35,7-45,4)	41,4(37,0-45,9)	37,0(32,4-41,7)	56,6(49,5-63,4)	43,0(40,5-45,5)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	40,0(34,2-46,0)	50,6(46,5-54,6)	51,2(47,5-54,8)	51,7(47,7-55,7)	33,4(28,1-39,2)	47,3(45,2-49,3)	
MASCULINO	35,8(28,6-43,8)	47,5(41,1-53,9)	49,4(44,1-54,7)	49,8(44,2-55,5)	28,4(21,5-36,6)	44,2(41,2-47,1)	
FEMENINO	43,9(36,9-51,2)	52,9(47,9-57,7)	52,9(48,6-57,1)	53,6(48,7-58,4)	39,1(32,5-46,0)	50,1(47,7-52,6)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,2(3,5-7,6)	4,6(3,3-6,5)	4,1(3,2-5,3)	6,8(5,3-8,7)	2,6(1,5-4,5)	4,8(4,2-5,6)	
MASCULINO	3,0(1,4-6,2)	1,9(0,8-4,5)	2,5(1,5-4,0)	4,1(2,2-7,4)	1,1(0,4-3,0)	2,6(1,9-3,6)	
FEMENINO	7,3(4,5-11,5)	6,7(4,7-9,5)	5,7(4,1-7,9)	9,4(7,1-12,4)	4,4(2,5-7,6)	6,9(5,8-8,1)	
SIN ESPERANZA							F=1,872; df1=7,240; df2=5024,448; p=0,067
NUNCA	83,5(79,4-86,9)	77,9(74,7-80,8)	79,0(76,1-81,6)	78,6(74,9-81,9)	85,5(80,4-89,4)	80,1(78,6-81,6)	
MASCULINO	90,0(85,2-93,4)	79,4(74,2-83,8)	80,7(76,5-84,4)	82,4(77,7-86,3)	84,0(76,3-89,6)	82,8(80,6-84,8)	
FEMENINO	77,3(71,4-82,2)	76,8(72,3-80,8)	77,4(73,9-80,5)	74,8(70,3-78,8)	87,1(81,4-91,2)	77,6(75,6-79,6)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	15,1(11,8-19,2)	19,1(16,4-22,2)	18,9(16,4-21,6)	19,0(16,1-22,2)	13,6(9,8-18,6)	17,7(16,4-19,2)	
MASCULINO	9,8(6,5-14,7)	19,1(14,7-24,4)	18,0(14,5-22,1)	15,7(12,0-20,1)	15,3(9,9-23,0)	16,0(14,0-18,1)	
FEMENINO	20,2(15,6-25,6)	19,2(15,6-23,3)	19,7(16,9-22,9)	22,3(18,7-26,3)	11,7(7,5-17,7)	19,4(17,6-21,3)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,4(0,5-3,5)	2,9(1,9-4,5)	2,1(1,4-3,1)	2,4(1,5-3,8)	0,9(0,4-2,1)	2,1(1,7-2,7)	
MASCULINO	0,2(0,0-1,2)	1,5(0,7-3,2)	1,3(0,6-2,7)	1,9(0,8-4,5)	0,7(0,1-3,0)	1,2(0,8-1,9)	
FEMENINO	2,6(0,9-6,7)	4,0(2,4-6,6)	2,9(1,9-4,4)	2,9(1,7-4,9)	1,3(0,5-3,2)	3,0(2,3-4,0)	

ESTADOS ANÍMICOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
INQUIETO(A) O INTRANQUIL(A)							$F=4,330$; $df1=7,353$; $df2=5103,040$; $p=0,00006$
NUNCA	60,0(53,8-66,0)	49,5(45,2-53,9)	54,5(50,6-58,4)	48,3(44,0-52,7)	66,3(60,2-72,0)	54,1(52,0-56,3)	
MASCULINO	64,0(55,7-71,6)	45,4(38,2-52,7)	53,4(48,1-58,6)	50,3(44,6-56,0)	63,4(55,1-70,9)	53,9(50,8-56,9)	
FEMENINO	56,2(48,3-63,8)	52,6(47,5-57,6)	55,7(51,1-60,1)	46,3(41,1-51,6)	69,7(63,0-75,7)	54,4(51,8-57,0)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	35,9(30,3-41,9)	44,6(40,6-48,7)	40,1(36,7-43,6)	46,6(42,5-50,8)	30,5(25,2-36,4)	40,9(38,9-42,9)	
MASCULINO	31,9(24,8-39,9)	48,5(41,6-55,5)	41,7(37,0-46,7)	46,4(40,8-52,1)	32,4(25,6-40,1)	41,5(38,6-44,4)	
FEMENINO	39,7(32,6-47,3)	41,7(36,6-47,0)	38,6(34,6-42,7)	46,9(41,8-52,0)	28,4(22,5-35,1)	40,3(37,8-42,9)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	4,1(2,6-6,2)	5,9(4,3-8,0)	5,3(4,2-6,8)	5,1(3,6-7,0)	3,1(1,5-6,5)	5,0(4,2-5,8)	
MASCULINO	4,1(2,3-7,3)	6,1(3,7-10,1)	4,9(3,3-7,3)	3,3(1,8-6,0)	4,2(1,7-9,8)	4,6(3,6-5,9)	
FEMENINO	4,1(2,0-7,9)	5,7(3,7-8,6)	5,8(4,2-7,8)	6,8(4,8-9,6)	1,9(0,8-4,7)	5,3(4,3-6,5)	
TAN DEPRIMIDO(A) QUE NADA PODÍA ANIMARLE							$F=1,568$; $df1=7,481$; $df2=5192,001$; $p=0,135$
NUNCA	81,5(77,6-84,8)	76,6(73,3-79,6)	78,3(75,5-80,9)	79,2(75,7-82,3)	84,8(80,2-88,4)	79,3(77,8-80,7)	
MASCULINO	87,5(82,3-91,3)	77,5(72,3-82,1)	81,1(77,0-84,6)	82,7(78,4-86,3)	87,1(82,3-90,8)	82,4(80,4-84,4)	
FEMENINO	75,8(70,1-80,7)	75,9(71,3-79,9)	75,6(71,7-79,2)	75,7(71,1-79,7)	82,1(75,4-87,3)	76,4(74,2-78,4)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	16,4(13,2-20,1)	21,1(18,2-24,3)	19,7(17,3-22,4)	18,4(15,5-21,7)	13,7(10,2-18,1)	18,6(17,2-20,0)	
MASCULINO	11,8(8,1-16,9)	19,6(15,3-24,8)	17,8(14,5-21,7)	16,2(12,7-20,5)	12,4(8,8-17,2)	16,2(14,3-18,2)	
FEMENINO	20,7(16,2-26,1)	22,2(18,3-26,6)	21,6(18,4-25,2)	20,6(16,9-24,9)	15,2(10,3-21,9)	20,8(18,9-22,8)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,2(1,1-4,1)	2,3(1,4-4,0)	1,9(1,2-3,0)	2,4(1,6-3,6)	1,5(0,8-2,8)	2,1(1,7-2,7)	
MASCULINO	0,7(0,2-2,3)	2,9(1,3-6,3)	1,1(0,5-2,5)	1,1(0,4-2,8)	0,5(0,1-1,9)	1,4(0,8-2,2)	
FEMENINO	3,5(1,6-7,5)	2,0(1,1-3,6)	2,7(1,7-4,4)	3,7(2,3-5,9)	2,7(1,3-5,4)	2,8(2,2-3,7)	
TODO LE SUPONÍA GRAN ESFUERZO							$F=5,164$; $df1=7,146$; $df2=4959,505$; $p=0,00001$
NUNCA	78,3(74,2-82,0)	70,7(66,9-74,3)	68,3(64,5-71,8)	69,4(64,3-74,1)	81,6(76,3-85,9)	72,3(70,4-74,2)	
MASCULINO	85,4(80,2-89,5)	69,5(63,6-74,9)	68,5(63,3-73,2)	72,1(65,6-77,8)	80,9(74,4-86,0)	74,0(71,3-76,4)	
FEMENINO	71,6(65,2-77,1)	71,6(66,6-76,2)	68,1(63,7-72,2)	66,7(60,6-72,2)	82,4(75,4-87,7)	70,8(68,4-73,2)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	20,0(16,4-24,1)	22,5(19,2-26,2)	24,0(21,3-27,0)	22,9(19,6-26,5)	14,4(10,9-18,8)	21,6(20,1-23,3)	
MASCULINO	13,7(9,7-18,8)	25,1(19,8-31,1)	23,8(19,9-28,2)	22,9(18,3-28,3)	15,2(11,0-20,7)	21,1(18,9-23,4)	
FEMENINO	25,9(20,5-32,2)	20,6(16,7-25,2)	24,3(21,0-27,9)	22,9(19,1-27,2)	13,4(9,1-19,5)	22,2(20,2-24,3)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,7(1,0-3,0)	6,8(5,0-9,1)	7,7(5,9-10,0)	7,7(5,7-10,4)	4,1(2,5-6,6)	6,0(5,1-7,0)	
MASCULINO	0,9(0,3-2,5)	5,4(3,0-9,6)	7,8(5,5-10,8)	5,0(3,1-7,9)	3,9(1,8-8,2)	4,9(3,9-6,3)	
FEMENINO	2,5(1,3-4,8)	7,7(5,5-10,8)	7,6(5,5-10,5)	10,4(7,3-14,7)	4,2(2,3-7,5)	7,0(5,8-8,4)	
INÚTIL							$F=1,736$; $df1=7,647$; $df2=5306,700$; $p=0,089$
NUNCA	85,8(81,9-89,0)	88,1(85,3-90,4)	85,1(82,6-87,3)	81,5(78,1-84,5)	87,3(82,6-90,9)	85,5(84,1-86,8)	
MASCULINO	90,2(85,0-93,8)	90,0(85,7-93,1)	87,9(84,4-90,6)	85,5(81,4-88,9)	88,6(82,0-93,0)	88,4(86,5-90,0)	
FEMENINO	81,6(75,3-86,6)	86,7(82,9-89,7)	82,3(78,5-85,6)	77,5(72,8-81,5)	85,8(79,5-90,5)	82,9(80,9-84,7)	
RARAS VECES U OCASIONALMENTE	11,9(8,9-15,8)	10,5(8,3-13,2)	13,2(11,1-15,6)	16,7(14,0-19,8)	11,1(7,6-15,8)	12,8(11,5-14,1)	
MASCULINO	8,7(5,3-13,8)	8,4(5,5-12,6)	11,7(9,0-15,0)	13,7(10,4-17,9)	9,3(5,3-15,8)	10,5(9,0-12,3)	
FEMENINO	15,0(10,5-21,1)	12,1(9,3-15,6)	14,7(11,7-18,3)	19,8(16,2-23,8)	13,1(8,8-19,2)	14,8(13,2-16,7)	
SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,2(1,2-4,3)	1,4(0,8-2,4)	1,7(1,1-2,8)	1,8(1,0-3,1)	1,6(0,7-3,6)	1,7(1,3-2,3)	
MASCULINO	1,1(0,4-3,0)	1,6(0,7-3,6)	0,4(0,1-1,5)	0,8(0,3-1,9)	2,1(0,7-6,3)	1,1(0,7-1,7)	
FEMENINO	3,4(1,5-7,5)	1,3(0,6-2,7)	3,0(1,8-4,9)	2,8(1,6-4,8)	1,0(0,4-2,9)	2,3(1,7-3,2)	

La tabla 20B muestra a una población que en su mayoría se declara feliz con un 72,9% o algo feliz con un 24,3% de los adultos encuestados. En contraposición, se consideran infeliz y con poco interés en la vida solo un 0,8%, encontrándose la siguiente distribución en Lima Centro un 1,0%, Lima Norte un 1,2%, Lima Este un 0,5%, Lima Sur un 1,0% y Callao un 0,3%. Los que se consideran tan infelices que la vida no tiene sentido fueron el 0,1% de los adultos encuestados.

TABLA 20B

SENTIMIENTO DE FELICIDAD EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SE DESCRIBIRÍA USTED MISMO COMO	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
FELIZ E INTERESADO POR LA VIDA							
TOTAL	77,3(72,8-81,3)	71,9(67,9-75,5)	72,4(69,3-75,3)	70,7(66,7-74,4)	73,8(68,6-78,4)	72,9(71,1-74,6)	
MASCULINO	81,4(75,7-86,0)	73,1(66,4-78,8)	75,2(71,0-79,0)	75,8(70,4-80,5)	77,8(70,0-84,0)	76,2(73,7-78,6)	
FEMENINO	73,4(67,1-78,9)	71,0(66,1-75,4)	69,5(65,4-73,4)	65,5(60,2-70,5)	69,3(62,1-75,7)	69,8(67,4-72,1)	
ALGO FELIZ							
TOTAL	19,5(16,0-23,6)	25,3(21,8-29,2)	24,9(22,2-27,8)	26,2(22,8-30,0)	24,0(19,6-29,0)	24,3(22,6-26,0)	
MASCULINO	16,7(12,4-22,2)	24,7(19,0-31,5)	22,8(19,2-26,7)	22,9(18,3-28,1)	19,0(13,4-26,4)	21,8(19,5-24,2)	
FEMENINO	22,1(17,3-27,8)	25,8(21,5-30,6)	27,0(23,3-31,0)	29,7(25,2-34,6)	29,6(23,5-36,5)	26,6(24,4-28,8)	
ALGO INFELIZ							
TOTAL	2,0(1,1-3,7)	1,5(0,9-2,7)	2,1(1,3-3,6)	1,9(1,1-3,2)	1,9(0,9-3,8)	1,9(1,4-2,4)	F=0,939; df1=13,947; df2=9678,884; p=0,514
MASCULINO	1,6(0,6-4,2)	1,7(0,7-4,1)	1,6(0,8-3,1)	-	2,6(1,1-6,3)	1,4(0,9-2,1)	
FEMENINO	2,4(1,0-5,3)	1,4(0,6-3,0)	2,7(1,4-5,0)	3,9(2,3-6,4)	1,1(0,4-3,0)	2,3(1,7-3,2)	
INFELIZ Y CON POCO INTERÉS EN LA VIDA							
TOTAL	1,0(0,3-3,2)	1,2(0,6-2,5)	0,5(0,3-1,0)	1,0(0,5-2,1)	0,3(0,0-2,0)	0,8(0,6-1,3)	
MASCULINO	-	0,5(0,1-1,8)	0,2(0,0-0,9)	1,3(0,5-3,5)	0,5(0,1-3,7)	0,5(0,3-1,0)	
FEMENINO	1,9(0,5-6,4)	1,7(0,7-4,1)	0,8(0,4-1,8)	0,7(0,2-2,0)	-	1,2(0,7-2,0)	
TAN INFELIZ QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO							
TOTAL	0,3(0,1-1,1)	0,1(0,0-0,3)	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,8)	-	0,1(0,0-0,3)	
MASCULINO	0,3(0,0-2,1)	-	0,2(0,0-1,3)	-	-	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,6)	0,1(0,0-0,6)	-	0,2(0,0-1,6)	-	0,1(0,0-0,3)	

ASPECTOS DE SALUD MENTAL POSITIVA

La perspectiva positiva intenta definir la salud mental a través de la salud, siendo su postulado básico “salud igual a algo más que ausencia de enfermedad”. Sobre esta base se trabaja en la curación, prevención o promoción. La OMS (1948) señala que “la salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social y no la mera ausencia de enfermedad o dolencia”. En este marco, la Federación Mundial para la Salud Mental (1962) define salud mental como “el mejor estado posible dentro de las condiciones existentes”. Finalmente, la OMS (2001) la define como “un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.

La perspectiva positiva concibe la salud mental como el estado de funcionamiento óptimo de la persona, por lo que promocionará las cualidades del ser humano, facilitando su máximo desarrollo potencial.

Jahoda estudia la salud mental positiva desde una perspectiva psicológica, pero acepta plenamente la influencia mutua entre los aspectos físicos y psicológicos del ser humano. Sin embargo, sugiere que tener una buena salud física es una condición necesaria pero no suficiente para tener una buena salud mental y que los tipos puros no existen; cada ser humano tiene simultáneamente aspectos sanos y enfermos, predominando unos u otros en función del momento o de la situación.

Por tanto, los estudios de salud mental de las poblaciones incluyen no solo factores de riesgo y factores protectores para el desarrollo de enfermedades y problemas psicosociales, sino los aspectos positivos de la salud, a efectos de ser considerados dentro de las estrategias de prevención y promoción. Se ha demostrado que constructos como autoestima, autoeficacia, resiliencia y satisfacción con la vida están correlacionados positivamente con la salud y bienestar, y negativamente con estados de estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud.

AUTOESTIMA

La autoestima se refiere a la conciencia subjetiva de uno mismo, que condiciona un estado afectivo y una valoración en relación a las expectativas e ideales personales. La autoestima se relaciona positivamente con el bienestar en general y de forma negativa con el estrés y depresión. En la Escala de Autoestima de Rosenberg, con un rango de 10 a 40 puntos en el que el mayor puntaje indica mayor autoestima, la media encontrada fue de 30,35%, y según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, tenemos para Lima Centro un 31,61, Lima Norte un 30,71, Lima Este un 29,37%, Lima Sur un 30,26 y Callao un 29,82%. Observamos, también que el nivel de autoestima es superior en los varones (Tabla 20CC).

TABLA 20C
AUTOESTIMA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (ESCALA DE 10 A 40)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MEDIA	31,61 (31,1-32,2)	30,71 (30,4-31,0)	29,37 (29,2-29,6)	30,26 (30,0-30,5)	29,82 (29,3-30,3)	30,35 (30,2-30,5)	df1=4,000; df2=691,000; Wald F=22,757; p=<0,00001

TABLA 20CC
AUTOESTIMA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN SEXO EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (ESCALA DE 10 A 40)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA CENTRO	31,61(31,1-32,2)	0,28	30,0	29,0	29,0	34,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=7,257; p=0,008
MASCULINO	32,19(31,4-31,8)	0,33	31,0	29,0	29,0	35,0	
FEMENINO	31,06(30,4-31,8)	0,35	30,0	29,0	29,0	33,0	
LIMA NORTE	30,71(30,4-31,0)	0,16	30,0	29,0	29,0	33,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=3,822; p=0,052
MASCULINO	31,00(30,5-31,5)	0,24	30,0	29,0	29,0	33,0	
FEMENINO	30,49(30,1-30,9)	0,18	30,0	29,0	29,0	32,0	
LIMA ESTE	29,37(29,2-29,6)	0,11	29,0	29,0	28,0	30,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=0,22; p=0,883
MASCULINO	29,36(29,1-29,6)	0,14	29,0	29,0	28,0	30,0	
FEMENINO	29,38(29,1-29,6)	0,13	29,0	29,0	28,0	30,0	
LIMA SUR	30,26(30,0-30,5)	0,15	29,0	29,0	29,0	32,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=2,639; p=0,106
MASCULINO	30,45(30,1-30,8)	0,20	30,0	29,0	29,0	32,0	
FEMENINO	30,07(29,7-30,4)	0,18	29,0	29,0	29,0	32,0	
CALLAO	29,82(29,3-30,3)	0,24	29,0	29,0	29,0	30,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,004; p=0,952
MASCULINO	29,83(29,3-30,4)	0,27	29,0	29,0	29,0	30,0	
FEMENINO	29,81(29,2-30,4)	0,32	29,0	29,0	28,0	30,0	
TOTAL	30,35(30,2-30,5)	0,08	29,0	29,0	29,0	32,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=7,770; p=0,005
MASCULINO	30,54(30,3-30,8)	0,11	29,0	29,0	29,0	32,0	
FEMENINO	30,17(30,0-30,4)	0,10	29,0	29,0	28,0	32,0	

SATISFACCIÓN CON LA VIDA

La satisfacción con la vida expresa la valoración global que de ella hacen las personas, sobre la base de su particular criterio, comparando las circunstancias vitales con los estándares personales. Incluye componentes de largo plazo como los rasgos personales y los eventos vitales, componentes mediatos como los eventos vitales actuales y los esquemas cognoscitivos, e inmediatos como las circunstancias vitales y el ánimo actual. Evaluada con la Escala de Satisfacción con la vida de Diener, con puntuaciones entre 5 y 25 puntos en la que a mayor puntaje corresponde mayor satisfacción, se obtiene una media de 17,73. Observándose en Lima Centro una media de 18,32, en Lima Norte 17,81, en Lima Este 17,30, en Lima Sur 17,60 y en Callao 17,77. (Tabla 20DD). Los resultados hallados, son similares a lo encontrado en Lima Rural en el 2007.

TABLA 20D

SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER (ESCALA DE 5 A 25)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MEDIA	18,32 (18,0-18,6)	17,81 (17,6-18,0)	17,30 (17,1-17,5)	17,60 (17,3-17,9)	17,77 (17,5-18,1)	17,73 (17,6-17,8)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; $Wald F=8,011$; $p=<0,00001$

TABLA 20DD

SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN SEXO EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER* (ESCALA DE 5 A 25)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA CENTRO	18,32(18,0-18,6)	0,14	19,0	20,0	17,0	20,0	$df1=1,000$; $df2=132,000$; $Wald F=1,486$; $p=0,225$
MASCULINO	18,51(18,1-18,9)	0,20	19,0	20,0	17,0	20,0	
FEMENINO	18,14(17,7-18,6)	0,21	18,0	20,0	17,0	20,0	
LIMA NORTE	17,81(17,6-18,0)	0,12	18,0	20,0	16,0	20,0	$df1=1,000$; $df2=174,000$; $Wald F=1,783$; $p=0,184$
MASCULINO	18,00(17,6-18,4)	0,19	18,0	20,0	16,0	20,0	
FEMENINO	17,67(17,4-18,0)	0,16	18,0	20,0	16,0	20,0	
LIMA ESTE	17,30(17,1-17,5)	0,11	18,0	20,0	15,0	20,0	$df1=1,000$; $df2=166,000$; $Wald F=6,354$; $p=0,013$
MASCULINO	17,51(17,3-17,8)	0,13	18,0	20,0	15,0	20,0	
FEMENINO	17,11(16,8-17,4)	0,14	17,0	20,0	15,0	20,0	
LIMA SUR	17,60(17,3-17,9)	0,13	18,0	20,0	16,0	20,0	$df1=1,000$; $df2=148,000$; $Wald F=0,190$; $p=0,664$
MASCULINO	17,65(17,3-18,0)	0,16	18,0	20,0	16,0	20,0	
FEMENINO	17,55(17,2-17,9)	0,18	18,0	20,0	16,0	20,0	
CALLAO	17,77(17,5-18,1)	0,15	18,0	20,0	16,0	20,0	$df1=1,000$; $df2=73,000$; $Wald F=0,945$; $p=0,334$
MASCULINO	17,89(17,5-18,3)	0,18	18,0	20,0	16,0	20,0	
FEMENINO	17,64(17,2-18,1)	0,21	18,0	20,0	15,0	20,0	
TOTAL	17,73(17,6-17,8)	0,06	18,0	20,0	16,0	20,0	$df1=1,000$; $df2=694,000$; $Wald F=7,155$; $p=0,008$
MASCULINO	17,88(17,7-18,0)	0,08	18,0	20,0	16,0	20,0	
FEMENINO	17,59(17,4-17,8)	0,08	18,0	20,0	15,0	20,0	

* El puntaje neutral en la escala de satisfacción con la vida se ha considerado 15; por lo tanto, un puntaje de 16 a 20 se considera como satisfecho; de 14 a 10, insatisfecho; 21 a 25, muy satisfecho; y el 5 a 9, muy insatisfecho.

La tabla 20E nos revela altas tasas de satisfacción con la vida en la población encuestada, encontrando que el 10,4% en Lima Centro, 14,2% en Lima Norte, 16,1% en Lima Este, 16,1% en Lima Sur y el 10,1% en Callao, se declara insatisfecho, predominando esta condición en el género femenino. Sin embargo el 66,7% de los adultos encuestados se declararon satisfechos y el 10,2% muy satisfecho con la vida.

TABLA 20E
ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER* (CATEGÓRICO)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
MUY INSATISFECHO							
TOTAL	0,2(0,0-1,3)	0,5(0,2-1,7)	0,5(0,2-1,2)	0,6(0,3-1,3)	0,1(0,0-0,6)	0,4(0,2-0,7)	
MASCULINO	-	0,3(0,0-1,9)	0,5(0,2-1,5)	-	0,1(0,0-1,1)	0,2(0,1-0,5)	
FEMENINO	0,4(0,1-2,5)	0,7(0,2-2,8)	0,5(0,1-1,9)	1,2(0,5-2,7)	-	0,6(0,3-1,2)	
INSATISFECHO							
TOTAL	10,4(7,9-13,6)	14,2(11,9-16,9)	16,1(14,0-18,5)	16,1(13,4-19,3)	10,1(7,5-13,6)	14,0(12,8-15,2)	
MASCULINO	9,7(6,3-14,6)	13,6(10,1-18,0)	13,4(10,8-16,6)	13,7(10,6-17,6)	9,2(6,1-13,7)	12,4(10,8-14,1)	
FEMENINO	11,1(7,9-15,5)	14,7(11,7-18,2)	18,7(15,9-21,9)	18,6(14,8-23,1)	11,2(7,5-16,4)	15,5(13,9-17,2)	
NI SATISFECHO NI INSATISFECHO							
TOTAL	4,4(2,8-6,8)	7,8(5,9-10,2)	13,3(11,2-15,9)	6,1(4,5-8,3)	12,2(9,2-16,1)	8,7(7,7-9,8)	F=6,067; df1=14,363; df2=9967,960; p=<0,000001
MASCULINO	2,7(1,4-5,3)	5,5(3,3-9,1)	12,7(9,9-16,1)	7,8(5,3-11,4)	10,1(6,3-15,6)	7,9(6,6-9,4)	
FEMENINO	5,9(3,4-10,2)	9,5(6,9-13,0)	14,0(11,3-17,3)	4,3(2,8-6,5)	14,6(10,2-20,6)	9,4(8,1-11,0)	
SATISFECHO							
TOTAL	68,8(63,9-73,3)	64,7(61,1-68,2)	63,1(59,9-66,2)	69,2(65,7-72,4)	71,5(66,6-76,0)	66,7(65,0-68,4)	
MASCULINO	71,2(63,6-77,8)	66,3(60,5-71,7)	66,9(62,6-70,9)	71,2(66,3-75,6)	73,3(66,2-79,5)	69,2(66,7-71,6)	
FEMENINO	66,5(59,2-73,1)	63,6(58,5-68,3)	59,5(55,2-63,6)	67,1(62,4-71,4)	69,4(62,9-75,3)	64,4(61,9-66,7)	
MUY SATISFECHO							
TOTAL	16,2(12,7-20,5)	12,7(10,2-15,8)	6,9(5,4-8,8)	8,0(6,1-10,5)	6,1(3,7-9,9)	10,2(9,0-11,5)	
MASCULINO	16,4(11,2-23,3)	14,3(10,0-20,0)	6,5(4,7-9,0)	7,2(4,7-11,0)	7,2(3,7-13,6)	10,3(8,6-12,4)	
FEMENINO	16,0(10,8-23,1)	11,6(8,7-15,2)	7,3(5,3-10,0)	8,8(6,4-12,0)	4,8(2,2-10,1)	10,1(8,5-11,9)	

* El puntaje neutral en la escala de satisfacción con la vida se ha considerado 15; por lo tanto, un puntaje de 16 a 20 se considera como satisfecho; de 14 a 10, nsatisfecho; 21 a 25, muy satisfecho; y el 5 a 9, muy insatisfecho.

AUTOEFICACIA

Autoeficacia es la percepción personal de ser capaz de producir un efecto deseado para dirigir el propio curso vital y de manera activa. Refleja la creencia de ser capaz de controlar las demandas ambientales mediante acciones adaptativas: trazarse metas más altas, desplegar mayor esfuerzo y persistencia y recuperarse más rápidamente de problemas. Se asocia positivamente con mejor salud, mayores logros y mejor integración social, y negativamente con disminuida autoestima, pesimismo, desamparo, ansiedad y depresión. Evaluada con la Escala de Autoeficacia de Schwarzer y Jerusalem, con un rango de 10 a 40 puntos en el que el mayor puntaje indica mayor autoeficacia, la media obtenida en la muestra fue 34,3. En estudios internacionales el valor medio promedio ha sido 29,46 y, en una evaluación previa en Lima de 33. De otro lado, se aprecia cierta superioridad de los varones sobre las mujeres en los puntajes obtenidos (Tabla 20FF).

TABLA 20F
AUTOEFICACIA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESCALA DE AUTOEFICACIA DE SCHWARZER Y JERUSALEM (ESCALA DE 10 A 40)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MEDIA	34,35 (33,9-34,8)	33,73 (33,3-34,2)	33,85 (33,4-34,3)	35,20 (34,7-35,7)	34,90 (34,2-35,6)	34,30 (34,1-34,5)	df1=4,000; df2=691,000; Wald F=6,277; p=0,00006

TABLA 20FF
AUTOEFICACIA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN SEXO EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESCALA DE AUTOEFICACIA DE SCHWARZER Y JERUSALEM (ESCALA DE 10 A 40)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA CENTRO	34,35(33,9-34,8)	0,25	35,0	40,0	30,0	39,0	$df1=1,000$; $df2=132,000$; Wald $F=19,177$; $p=0,00002$
MASCULINO	35,35(34,7-36,0)	0,35	37,0	40,0	32,0	40,0	
FEMENINO	33,40(32,8-34,0)	0,31	34,0	40,0	30,0	37,0	
LIMA NORTE	33,73(33,3-34,2)	0,24	34,0	40,0	30,0	39,0	$df1=1,000$; $df2=174,000$; Wald $F=0,783$; $p=0,377$
MASCULINO	33,97(33,2-34,8)	0,40	35,0	40,0	30,0	39,0	
FEMENINO	33,55(33,0-34,1)	0,29	34,0	40,0	30,0	39,0	
LIMA ESTE	33,85(33,4-34,3)	0,24	34,0	40,0	30,0	39,0	$df1=1,000$; $df2=166,000$; Wald $F=20,711$; $p=0,00001$
MASCULINO	34,57(34,0-35,1)	0,30	36,0	40,0	30,0	40,0	
FEMENINO	33,14(32,6-33,7)	0,27	33,0	40,0	30,0	39,0	
LIMA SUR	35,20(34,7-35,7)	0,25	37,0	40,0	31,0	40,0	$df1=1,000$; $df2=148,000$; Wald $F=4,698$; $p=0,032$
MASCULINO	35,59(35,0-36,2)	0,31	37,0	40,0	32,0	40,0	
FEMENINO	34,80(34,2-35,4)	0,31	36,0	40,0	31,0	40,0	
CALLAO	34,90(34,2-35,6)	0,34	36,0	40,0	31,0	40,0	$df1=1,000$; $df2=73,000$; Wald $F=0,343$; $p=0,560$
MASCULINO	35,05(34,2-35,9)	0,45	37,0	40,0	31,0	40,0	
FEMENINO	34,73(33,9-35,6)	0,41	36,0	40,0	30,0	40,0	
TOTAL	34,30(34,1-34,5)	0,12	35,0	40,0	30,0	39,0	$df1=1,000$; $df2=694,000$; Wald $F=29,241$; $p<0,000001$
MASCULINO	34,84(34,5-35,2)	0,16	36,0	40,0	31,0	40,0	
FEMENINO	33,79(33,5-34,1)	0,14	34,0	40,0	30,0	39,0	

RESILIENCIA

Resiliencia es la capacidad personal para seguir proyectándose hacia el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles o de traumas a veces graves. La Escala de Resiliencia del Yo de Block y col., con un rango de 14 a 56 puntos, donde el mayor puntaje corresponde mayor resiliencia, la muestra obtiene una media de 47,10, siendo para Lima Centro 46,64, Lima Norte 46,67, Lima Este 46,39, Lima Sur 48,46 y Callao 47,92. Observándose mayor puntaje en el género masculino frente a los valores obtenidos en mujeres (Tabla 20GG).

TABLA 20G
RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESCALA DE RESILIENCIA DEL YO DE BLOCK (ESCALA DE 14 A 56)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MEDIA	46,64 (45,9-47,3)	46,67 (46,0-47,3)	46,39 (45,8-47,0)	48,46 (47,8-49,1)	47,92 (47,0-48,8)	47,10 (46,8-47,4)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald $F=6,845$; $p=0,00002$

TABLA 20GG
RESILIENCIA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN SEXO EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESCALA DE RESILIENCIA DEL YO DE BLOCK (ESCALA DE 14 A 56)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA CENTRO	46,64(45,9-47,3)	0,36	47,0	42,0	42,0	52,0	$df1=1,000$; $df2=132,000$; Wald $F=16,442$; $p=0,00009$
MASCULINO	47,92(47,0-48,8)	0,46	49,0	55,0	43,0	54,0	
FEMENINO	45,43(44,5-46,4)	0,47	46,0	42,0	41,0	50,0	
LIMA NORTE	46,67(46,0-47,3)	0,35	47,0	56,0	42,0	53,0	$df1=1,000$; $df2=174,000$; Wald $F=1,733$; $p=0,190$
MASCULINO	47,12(46,1-48,1)	0,51	48,0	56,0	42,0	54,0	
FEMENINO	46,33(45,5-47,1)	0,41	47,0	56,0	41,0	53,0	

ESCALA DE RESILIENCIA DEL YO DE BLOCK (ESCALA DE 14 A 56)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA ESTE	46,39(45,8-47,0)	0,31	47,0	56,0	42,0	52,0	$df1=1,000; df2=166,000;$ $Wald F=12,930; p=0,00043$
MASCULINO	47,10(46,4-47,8)	0,38	47,0	56,0	42,0	53,0	
FEMENINO	45,71(45,1-46,4)	0,34	46,0	42,0	41,0	52,0	
LIMA SUR	48,46(47,8-49,1)	0,35	50,0	56,0	44,0	54,0	$df1=1,000; df2=148,000;$ $Wald F=2,454; p=0,119$
MASCULINO	48,82(48,0-50,0)	0,43	50,0	56,0	44,8	54,0	
FEMENINO	48,10(47,3-48,9)	0,40	49,0	56,0	44,0	53,0	
CALLAO	47,92(47,0-48,8)	0,47	49,0	56,0	42,0	54,0	$df1=1,000; df2=73,000;$ $Wald F=0,654; p=0,421$
MASCULINO	48,21(46,9-49,5)	0,66	50,0	56,0	42,0	54,0	
FEMENINO	47,59(46,5-48,7)	0,54	48,0	56,0	42,0	53,0	
TOTAL	47,10(46,8-47,4)	0,16	48,0	56,0	42,0	53,0	$df1=1,000; df2=694,000;$ $Wald F=24,590; p<0,00001$
MASCULINO	47,75(47,3-48,2)	0,21	49,0	56,0	43,0	54,0	
FEMENINO	46,50(46,1-46,9)	0,19	47,0	56,0	42,0	53,0	

SATISFACCIÓN PERSONAL

La satisfacción personal en las distintas áreas de la vida está en directa relación con la autoestima personal, la cual se construye en forma muy compleja desde temprana edad a través de las experiencias con el medio y el temperamento propio de cada individuo. Esta interacción deriva en logros con los cuales la persona puede o no estar conforme, lo cual influye en su autovalía personal. En una escala de 5 a 20, el grado de satisfacción personal global de los encuestados se encuentra en una media de 17,75. Según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, encontramos una media en Lima Centro 18,24, en Lima Norte 17,48, en Lima Este 17,55, en Lima Sur 17,91 y en Callao 17,81. (Tabla 21B). En el Estudio Epidemiológico Metropolitano del 2002, se encontró que el grado de satisfacción personal global de los adultos encuestados fue una media de 15,4.

TABLA 21A
SATISFACCIÓN PERSONAL GLOBAL* EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SATISFACCIÓN PERSONAL GLOBAL (ESCALA DE 5 A 20)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MEDIA	18,24 (18,0-18,5)	17,48 (17,3-17,7)	17,55 (17,4-17,7)	17,91 (17,7-18,1)	17,81 (17,5-18,1)	17,75 (17,7-17,8)	$df1=4,000; df2=691,000;$ $Wald F=9,102; p<0,00001$

TABLA 21B
SATISFACCIÓN PERSONAL GLOBAL* EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN SEXO
EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SATISFACCIÓN PERSONAL GLOBAL (ESCALA DE 5 A 20)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA CENTRO	18,24(18,0-18,5)	0,11	19,0	20,0	17,1	20,0	$df1=1,000; df2=132,000;$ $Wald F=7,088; p=0,009$
MASCULINO	18,50(18,3-18,7)	0,12	19,0	20,0	17,6	20,0	
FEMENINO	18,00(17,7-18,3)	0,16	18,8	20,0	17,0	20,0	
LIMA NORTE	17,48(17,3-17,7)	0,10	18,0	20,0	16,1	19,0	$df1=1,000; df2=174,000;$ $Wald F=10,230; p=0,002$
MASCULINO	17,79(17,5-18,0)	0,13	18,3	20,0	16,5	19,0	
FEMENINO	17,25(17,0-17,5)	0,13	17,8	20,0	16,0	19,0	
LIMA ESTE	17,55(17,4-17,7)	0,08	18,0	20,0	16,1	19,0	$df1=1,000; df2=166,000;$ $Wald F=6,338; p=0,013$
MASCULINO	17,74(17,5-17,9)	0,11	18,1	20,0	16,5	19,7	
FEMENINO	17,37(17,2-17,6)	0,11	18,0	20,0	16,0	19,0	
LIMA SUR	17,91(17,7-18,1)	0,11	18,6	20,0	17,0	20,0	$df1=1,000; df2=148,000;$ $Wald F=4,084; p=0,045$
MASCULINO	18,08(17,8-18,3)	0,13	18,8	20,0	17,0	20,0	
FEMENINO	17,73(17,5-18,0)	0,14	18,6	20,0	16,4	20,0	
CALLAO	17,81(17,5-18,1)	0,14	18,6	20,0	16,5	19,9	$df1=1,000; df2=73,000;$ $Wald F=3,469; p=0,067$
MASCULINO	18,03(17,7-18,4)	0,17	18,8	20,0	17,0	20,0	
FEMENINO	17,57(17,2-18,0)	0,20	18,0	20,0	16,3	19,8	
TOTAL	17,75(17,7-17,8)	0,05	18,5	20,0	16,4	19,9	$df1=1,000; df2=694,000;$ $Wald F=32,624; p<0,00001$
MASCULINO	18,00(17,9-18,1)	0,06	18,6	20,0	17,0	20,0	
FEMENINO	17,53(17,4-17,7)	0,06	18,0	20,0	16,3	19,8	

* En base a ítems sobre aspecto físico, inteligencia, nivel económico, estudios y relaciones sociales, en una escala de 5 puntos cada uno, transformados en sistema vigesimal.

Con relación a la satisfacción personal específica, más de la mitad de los encuestados muestra una considerable satisfacción con respecto a su color de piel, inteligencia, religión, aspecto físico y su profesión u oficio que estudió. Sobre el grado de satisfacción del nivel educativo alcanzado, según áreas poblacionales, se observa que el 15,7% en Lima Centro, el 23,5% en Lima Norte, el 29,8% en Lima Este, el 24,2% en Lima Sur, el 21,4% en Callao y el 23,6% en total de los adultos, sienten ninguna o poca satisfacción con su nivel educativo. El nivel económico, es otro aspecto por el que manifestaron menor grado de satisfacción; así encontramos que el 8,5% en Lima Centro, el 16,9% en Lima Norte, el 17,8% en Lima Este, el 16,1% en Lima Sur, el 16,3% en Callao y el 15,4% del total de los adultos encuestados nada o poca satisfacción sienten al respecto. El lugar de residencia, ocupa el tercer lugar en menor grado de satisfacción, y según áreas poblacionales, tenemos que el 12,0% en Lima Centro, el 11,5% en Lima Norte, el 14,7% en Lima Este, el 10,5% en Lima Sur, el 13,5% en Callao y el 12,4% en total (Tabla 22). Si comparamos con los datos obtenidos en el 2002, la insatisfacción principal era con el nivel económico, en donde se alcanzaba una cifra tan alta como el 40,6%. Mientras que el mayor grado de satisfacción personal en ese año fue el nivel de inteligencia con un 48,5% del total. Asimismo, se puede observar que el grado de satisfacción personal encontrado en el 2012, en general, es mayor lo reportado en el 2002.

TABLA 22
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL ESPECÍFICA EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ÁREA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
ASPECTO FÍSICO							$F=2,582$; $df1=7,464$; $df2=5180,158$; $p=0,010$
NADA O POCO	3,5(2,2-5,7)	3,9(2,6-5,7)	4,8(3,6-6,2)	5,9(4,3-8,0)	4,9(3,1-7,7)	4,6(3,9-5,4)	
MASCULINO	1,7(0,7-4,0)	2,0(0,9-4,5)	4,4(2,8-6,9)	3,9(2,2-6,6)	4,5(2,5-8,0)	3,3(2,5-4,3)	
FEMENINO	5,3(3,0-9,3)	5,2(3,5-7,8)	5,2(3,6-7,3)	7,9(5,5-11,1)	5,4(2,7-10,3)	5,8(4,7-7,0)	
REGULAR	17,6(14,3-21,4)	21,1(17,9-24,7)	24,4(22,1-26,9)	17,7(15,0-20,7)	16,9(13,9-20,5)	20,1(18,8-21,6)	
MASCULINO	13,8(10,0-18,8)	16,3(12,1-21,7)	21,7(18,4-25,4)	17,3(13,6-21,6)	12,3(8,5-17,5)	17,0(15,1-19,0)	
FEMENINO	21,1(16,4-26,9)	24,6(20,3-29,4)	27,1(23,9-30,6)	18,1(14,8-22,0)	22,1(16,7-28,6)	23,1(21,1-25,2)	
BASTANTE O MUCHO	78,9(74,6-82,6)	75,1(71,1-78,6)	70,8(68,2-73,3)	76,4(72,8-79,7)	78,2(74,5-81,5)	75,3(73,7-76,9)	
MASCULINO	84,5(79,0-88,7)	81,7(76,0-86,2)	73,9(70,0-77,5)	78,8(74,3-82,8)	83,2(77,8-87,6)	79,8(77,6-81,8)	
FEMENINO	73,6(67,4-78,9)	70,2(64,9-75,0)	67,7(64,0-71,3)	74,0(69,1-78,4)	72,5(65,9-78,3)	71,2(68,9-73,4)	
COLOR DE PIEL							$F=1,579$; $df1=7,106$; $df2=4931,312$; $p=0,135$
NADA O POCO	0,9(0,2-3,3)	2,6(1,6-4,4)	3,0(2,1-4,3)	2,3(1,4-3,6)	1,4(0,6-3,2)	2,2(1,7-2,8)	
MASCULINO	0,5(0,1-2,2)	2,7(1,1-6,2)	3,3(2,0-5,4)	1,4(0,5-3,9)	1,1(0,4-3,4)	2,0(1,3-2,9)	
FEMENINO	1,2(0,2-7,0)	2,6(1,4-4,9)	2,7(1,7-4,2)	3,1(1,8-5,3)	1,7(0,7-4,1)	2,4(1,7-3,3)	
REGULAR	9,8(7,2-13,1)	11,8(9,6-14,5)	12,9(11,0-15,1)	12,2(9,9-14,8)	8,9(6,4-12,3)	11,5(10,4-12,7)	
MASCULINO	8,1(5,2-12,4)	9,8(6,6-14,5)	12,2(9,4-15,7)	11,4(8,2-15,7)	5,1(2,9-8,8)	9,9(8,4-11,7)	
FEMENINO	11,4(7,7-16,5)	13,2(10,5-16,5)	13,6(11,0-16,6)	12,9(9,8-16,8)	13,3(9,1-18,9)	12,9(11,5-14,6)	
BASTANTE O MUCHO	89,3(85,9-92,0)	85,6(82,7-88,0)	84,2(81,8-86,2)	85,6(82,8-88,0)	89,7(86,1-92,5)	86,3(85,0-87,5)	
MASCULINO	91,4(87,1-94,4)	87,5(82,7-91,1)	84,6(80,9-87,6)	87,2(82,8-90,5)	93,8(89,9-96,3)	88,1(86,3-89,7)	
FEMENINO	87,4(81,8-91,4)	84,1(80,5-87,2)	83,7(80,5-86,5)	83,9(79,7-87,5)	85,1(79,4-89,4)	84,7(82,9-86,3)	
INTELIGENCIA							$F=3,799$; $df1=7,562$; $df2=5247,961$; $p=0,00026$
NADA O POCO	2,4(1,3-4,2)	5,3(3,8-7,5)	4,6(3,6-5,9)	5,5(3,9-7,6)	5,2(3,5-7,7)	4,6(3,9-5,5)	
MASCULINO	1,3(0,4-4,0)	1,7(0,8-3,9)	2,9(1,7-4,9)	5,4(3,1-9,2)	5,0(2,8-8,7)	3,1(2,3-4,2)	
FEMENINO	3,4(1,8-6,3)	8,0(5,5-11,3)	6,3(4,7-8,3)	5,6(3,7-8,4)	5,4(2,8-10,0)	6,1(5,0-7,3)	
REGULAR	12,1(9,5-15,3)	17,1(14,4-20,3)	18,0(15,9-20,4)	12,6(10,5-15,1)	10,6(8,0-13,9)	14,8(13,6-16,1)	
MASCULINO	10,2(7,1-14,3)	15,6(11,5-20,7)	15,4(12,5-18,8)	10,7(8,0-14,1)	7,7(4,7-12,5)	12,6(11,0-14,4)	
FEMENINO	14,0(10,1-19,0)	18,2(14,7-22,4)	20,6(17,6-24,0)	14,6(11,5-18,5)	13,8(9,5-19,7)	16,9(15,2-18,8)	
BASTANTE O MUCHO	85,5(82,0-88,4)	77,6(74,0-80,7)	77,4(74,7-79,8)	81,9(78,7-84,7)	84,2(80,4-87,5)	80,5(79,0-81,9)	
MASCULINO	88,5(84,2-91,8)	82,7(77,6-86,9)	81,7(78,0-84,9)	84,0(79,6-87,5)	87,3(82,3-91,1)	84,3(82,4-86,1)	
FEMENINO	82,6(77,5-86,8)	73,8(69,1-78,0)	73,1(69,3-76,5)	79,8(75,3-83,7)	80,89(74,3-86,0)	77,0(74,9-79,0)	

ÁREA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
NIVEL ECONÓMICO							$F=6,813; df1=7,291;$ $df2=5059,752; p=<0,00001$
NADA O POCO	8,5(6,2-11,7)	16,9(14,2-19,9)	17,8(15,4-20,5)	16,1(13,2-19,5)	16,3(12,9-20,4)	15,4(14,1-16,8)	
MASCULINO	7,5(4,8-11,7)	15,0(11,0-20,1)	16,7(13,2-20,9)	14,6(10,7-19,5)	16,3(11,7-22,2)	14,2(12,4-16,2)	
FEMENINO	9,5(6,3-14,0)	18,2(14,9-22,1)	18,9(15,8-22,5)	17,7(14,3-21,6)	16,4(11,8-22,2)	16,6(14,9-18,4)	
REGULAR	35,3(29,8-41,2)	45,4(41,3-49,6)	44,6(41,7-47,5)	38,3(34,9-41,7)	41,8(36,6-47,1)	41,6(39,7-43,5)	
MASCULINO	28,7(22,0-36,6)	44,6(38,5-50,9)	44,5(40,3-48,7)	39,2(34,0-44,8)	39,3(32,1-47,1)	40,0(37,3-42,7)	
FEMENINO	41,4(34,2-49,1)	46,0(40,8-51,3)	44,7(40,6-49,0)	37,3(33,1-41,7)	44,5(38,3-50,9)	43,0(40,6-45,5)	
BASTANTE O MUCHO	56,2(49,9-62,3)	37,7(33,6-42,0)	37,6(34,3-41,0)	45,6(41,8-49,5)	41,9(36,6-47,4)	43,0(41,0-45,0)	
MASCULINO	63,7(55,4-71,2)	40,4(34,1-47,0)	38,8(34,6-43,3)	46,2(40,9-51,6)	44,4(36,5-52,5)	45,8(43,0-48,7)	
FEMENINO	49,1(41,2-56,9)	35,8(30,9-40,9)	36,4(31,8-41,2)	45,0(39,9-50,3)	39,2(33,2-45,4)	40,3(37,8-43,0)	
PROFESIÓN U OFICIO QUE ESTUDIO(A)							$F=2,905; df1=7,540;$ $df2=5232,676; p=0,004$
NADA O POCO	7,1(4,7-10,6)	8,7(5,9-12,7)	4,2(2,6-6,5)	8,1(5,3-12,1)	5,1(2,6-9,6)	7,0(5,7-8,5)	
MASCULINO	8,1(4,7-13,6)	5,5(2,4-12,1)	2,7(1,2-6,0)	8,6(4,6-15,4)	5,2(2,2-11,9)	6,3(4,6-8,7)	
FEMENINO	5,9(3,2-10,5)	10,8(6,9-16,5)	5,6(3,3-9,3)	7,6(4,5-12,4)	4,9(2,1-11,0)	7,6(5,9-9,7)	
REGULAR	12,2(8,8-16,6)	23,7(18,5-29,7)	19,8(15,9-24,4)	18,7(14,8-23,4)	22,7(16,0-31,1)	18,8(16,7-21,2)	
MASCULINO	9,9(6,2-15,5)	25,5(17,6-35,3)	17,7(12,4-24,8)	16,9(11,6-24,0)	20,5(11,2-34,5)	17,1(14,2-20,5)	
FEMENINO	14,9(9,2-23,2)	22,5(16,4-30,0)	21,9(16,8-28,0)	20,7(15,3-27,5)	25,3(16,3-37,0)	20,5(17,5-23,9)	
BASTANTE O MUCHO	80,7(75,9-84,8)	67,7(61,1-73,6)	76,0(71,0-80,3)	73,1(67,5-78,1)	72,2(63,6-79,5)	74,2(71,6-76,7)	
MASCULINO	82,0(75,9-86,8)	69,0(58,9-77,6)	79,5(72,4-85,2)	74,5(65,8-81,5)	74,3(60,8-84,4)	76,5(72,9-79,8)	
FEMENINO	79,2(70,1-86,1)	66,8(58,9-73,8)	72,5(65,6-78,4)	71,7(64,1-78,3)	69,8(58,4-79,1)	71,9(68,2-75,4)	
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO							$F=6,729; df1=7,503;$ $df2=5206,769; p=<0,00001$
NADA O POCO	15,7(12,2-20,0)	23,5(20,3-27,0)	29,8(26,8-33,1)	24,2(20,8-28,0)	21,4(16,9-26,7)	23,6(22,0-25,3)	
MASCULINO	14,0(9,9-19,5)	18,6(13,8-24,5)	26,7(22,7-31,2)	22,0(17,3-27,7)	15,6(10,9-21,9)	20,2(18,0-22,6)	
FEMENINO	17,3(12,7-23,2)	27,1(22,9-31,8)	32,9(28,9-37,1)	26,5(22,1-31,3)	28,1(21,9-35,2)	26,8(24,6-29,0)	
REGULAR	30,4(25,7-35,4)	38,8(34,7-43,1)	29,8(26,8-33,0)	28,7(25,5-32,1)	33,4(28,8-38,3)	32,5(30,7-34,3)	
MASCULINO	28,4(21,9-36,0)	41,4(34,7-48,4)	32,0(27,4-36,9)	31,7(26,6-37,4)	36,0(29,6-42,9)	34,0(31,2-36,8)	
FEMENINO	32,2(26,1-39,0)	36,9(32,3-41,8)	27,6(24,2-31,3)	25,6(21,9-29,8)	30,4(24,6-36,9)	31,0(28,9-33,3)	
BASTANTE O MUCHO	53,9(48,0-59,7)	37,7(34,0-41,6)	40,4(36,7-44,1)	47,1(42,6-51,6)	45,2(40,2-50,3)	43,9(41,9-46,0)	
MASCULINO	57,6(50,0-64,8)	40,1(33,8-46,7)	41,3(36,0-46,8)	46,2(40,4-52,2)	48,4(41,7-55,2)	45,8(42,9-48,7)	
FEMENINO	50,5(42,8-58,1)	35,9(31,6-40,5)	39,5(35,2-43,9)	47,9(42,3-53,6)	41,5(34,6-48,8)	42,2(39,7-44,7)	
RELIGIÓN							$F=8,128; df1=7,610;$ $df2=5281,588; p=<0,00001$
NADA O POCO	5,3(3,6-7,7)	9,4(7,3-12,1)	8,7(7,0-10,7)	5,7(4,2-7,8)	5,4(3,6-7,9)	7,3(6,4-8,4)	
MASCULINO	7,9(5,1-12,1)	11,9(8,5-16,3)	12,4(9,7-15,6)	7,0(4,7-10,5)	6,1(3,9-9,6)	9,6(8,2-11,2)	
FEMENINO	3,0(1,6-5,5)	7,6(5,2-11,0)	5,1(3,7-6,9)	4,4(2,8-7,0)	4,6(2,6-7,9)	5,3(4,3-6,5)	
REGULAR	14,6(11,6-18,2)	24,1(20,6-28,0)	15,8(13,4-18,4)	11,8(9,6-14,3)	14,8(11,7-18,7)	16,9(15,5-18,4)	
MASCULINO	12,1(8,5-17,0)	26,9(21,8-32,7)	18,6(15,1-22,8)	13,1(9,9-17,1)	15,2(10,8-20,8)	17,9(15,9-20,0)	
FEMENINO	16,8(12,7-21,9)	22,1(17,8-27,1)	13,0(10,6-15,8)	10,5(7,6-14,3)	14,4(10,6-19,5)	16,0(14,2-17,9)	
BASTANTE O MUCHO	80,1(76,1-83,6)	66,5(62,1-70,6)	75,6(72,3-78,6)	82,5(79,5-85,2)	79,8(75,3-83,6)	75,8(74,0-77,4)	
MASCULINO	79,9(74,1-84,7)	61,2(54,8-67,3)	69,0(64,3-73,4)	79,9(75,3-83,8)	78,7(72,2-84,0)	72,5(70,0-74,9)	
FEMENINO	80,2(74,8-84,8)	70,3(64,8-75,2)	81,9(78,4-85,0)	85,1(80,9-88,5)	81,0(75,1-85,8)	78,7(76,5-80,8)	
RELACIONES SOCIALES							$F=6,724; df1=7,720;$ $df2=5357,712; p=<0,00001$
NADA O POCO	8,6(6,4-11,6)	11,6(9,5-14,1)	11,5(9,6-13,8)	7,1(5,5-9,2)	8,7(6,2-12,1)	9,8(8,8-10,9)	
MASCULINO	9,8(6,3-14,7)	9,4(6,4-13,6)	10,3(7,7-13,5)	5,1(3,2-8,0)	6,6(3,6-11,9)	8,4(7,0-10,0)	
FEMENINO	7,5(4,9-11,4)	13,2(10,5-16,5)	12,8(10,3-15,8)	9,2(6,8-12,3)	11,1(7,6-16,0)	11,1(9,8-12,6)	
REGULAR	22,6(18,9-26,7)	32,7(29,2-36,3)	25,9(23,1-29,0)	20,0(17,2-23,2)	23,3(18,7-28,6)	25,6(24,1-27,3)	
MASCULINO	18,8(14,1-24,7)	35,5(29,5-42,0)	27,4(23,4-31,9)	21,2(17,3-25,6)	23,3(17,1-31,0)	26,0(23,6-28,5)	
FEMENINO	26,2(21,2-31,8)	30,6(26,3-35,2)	24,4(20,9-28,3)	18,9(15,0-23,4)	23,3(18,4-28,9)	25,3(23,3-27,5)	
BASTANTE O MUCHO	68,8(63,9-73,3)	55,7(51,9-59,5)	62,5(59,2-65,8)	72,9(69,5-76,0)	68,0(61,8-73,5)	64,5(62,7-66,3)	
MASCULINO	71,4(65,6-76,6)	55,1(48,9-61,1)	62,3(57,4-66,9)	73,8(69,3-77,8)	70,0(61,4-77,4)	65,6(63,0-68,1)	
FEMENINO	66,3(59,5-72,4)	56,2(51,2-61,1)	62,8(58,4-67,1)	72,0(67,1-76,3)	65,7(58,5-72,2)	63,5(61,1-65,9)	

ÁREA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
LUGAR DE RESIDENCIA							$F=7,417$; $df1=7,442$; $df2=5164,682$; $p<0,00001$
NADA O POCO	12,0(8,8-16,2)	11,5(9,3-14,3)	14,7(12,5-17,1)	10,5(8,4-12,9)	13,5(10,0-17,9)	12,4(11,2-13,7)	
MASCULINO	9,0(5,7-13,9)	10,0(7,0-14,1)	12,1(9,4-15,4)	8,6(5,9-12,3)	9,8(6,4-14,7)	10,0(8,6-11,7)	
FEMENINO	14,8(10,0-21,4)	12,7(9,8-16,2)	17,2(14,3-20,5)	12,3(9,6-15,7)	17,7(12,4-24,6)	14,5(12,9-16,4)	
REGULAR	24,3(20,4-28,6)	39,7(36,1-43,4)	29,0(26,2-32,0)	24,0(21,2-27,2)	28,4(23,7-33,6)	29,9(28,3-31,6)	
MASCULINO	20,8(16,1-26,5)	44,0(37,7-50,6)	30,3(26,1-34,9)	23,0(18,9-27,7)	26,7(20,5-33,9)	29,9(27,4-32,5)	
FEMENINO	27,6(21,9-34,1)	36,5(31,8-41,4)	27,7(24,3-31,4)	25,1(20,8-30,0)	30,3(23,7-37,8)	30,0(27,8-32,3)	
BASTANTE O MUCHO	63,7(58,3-68,9)	48,8(45,0-52,5)	56,3(52,7-59,9)	65,5(61,7-69,1)	58,1(51,8-64,2)	57,7(55,8-59,6)	
MASCULINO	70,2(63,7-76,0)	45,9(40,1-51,9)	57,6(52,5-62,6)	68,4(63,5-72,9)	63,5(56,4-70,1)	60,1(57,4-62,7)	
FEMENINO	57,6(50,4-64,5)	50,8(45,8-55,8)	55,1(50,7-59,5)	62,6(57,1-67,7)	52,0(43,2-60,7)	55,4(52,9-58,0)	

SATISFACCIÓN LABORAL

Estimar el grado de satisfacción laboral es un aspecto importante de la salud mental; el desempleo y el subempleo crean condiciones desfavorables para las personas. Adicionalmente, la calidad del empleo puede ser fuente de condiciones anímicas negativas. Utilizando la escala de satisfacción laboral global encontramos una media de 17,42. Según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, tenemos en Lima Centro una media de 17,72, en Lima Norte 17,15, en Lima Este 17,25, en Lima Sur 17,60 y en Callao 17,66. Cifras superiores a las encontradas en el Estudio Epidemiológico de Lima Metropolitana del 2002, en el que en satisfacción laboral global mostraba una media de 15,4, y la de Lima Rural del 2007 una media de 16,6. El grado de satisfacción laboral global deriva de la suma de los puntajes (del 1 al 4) de cada uno de los aspectos convertidas al sistema vigesimal (Tablas 23A y 23B).

TABLA 23A
SATISFACCIÓN LABORAL GLOBAL EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SATISFACCIÓN LABORAL GLOBAL (ESCALA DE 5 A 20)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MEDIA	17,72 (17,4-18,0)	17,15 (16,9-17,4)	17,25 (17,1-17,5)	17,60 (17,4-17,8)	17,66 (17,3-18,0)	17,42 (17,3-17,5)	$df1=4,000$; $df2=676,000$; $Wald F=4,071$; $p=0,003$

TABLA 23B
SATISFACCIÓN LABORAL GLOBAL EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN SEXO EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SATISFACCIÓN LABORAL GLOBAL (ESCALA DE 5 A 20)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA CENTRO	17,72(17,4-18,0)	0,15	18,3	20,0	16,3	20,0	
MASCULINO	17,82(17,4-18,2)	0,20	18,3	20,0	16,3	20,0	$df1=1,000$; $df2=126,000$; $Wald F=0,573$; $p=0,450$
FEMENINO	17,60(17,2-18,0)	0,21	18,8	20,0	15,8	20,0	
LIMA NORTE	17,15(16,9-17,4)	0,12	17,5	20,0	15,0	19,2	
MASCULINO	17,02(16,7-17,4)	0,18	17,5	20,0	15,0	19,2	$df1=1,000$; $df2=172,000$; $Wald F=1,278$; $p=0,260$
FEMENINO	17,29(17,0-17,6)	0,16	17,5	20,0	15,0	20,0	
LIMA ESTE	17,25(17,1-17,5)	0,10	17,5	20,0	15,0	20,0	
MASCULINO	17,26(17,0-17,5)	0,13	17,5	20,0	15,0	20,0	$df1=1,000$; $df2=164,000$; $Wald F=0,004$; $p=0,949$
FEMENINO	17,25(17,0-17,5)	0,14	17,5	20,0	15,0	19,2	
LIMA SUR	17,60(17,4-17,8)	0,11	18,3	20,0	16,3	20,0	
MASCULINO	17,85(17,6-18,1)	0,14	18,8	20,0	16,7	20,0	$df1=1,000$; $df2=144,000$; $Wald F=7,510$; $p=0,007$
FEMENINO	17,27(16,9-17,6)	0,17	18,0	20,0	15,8	19,2	
CALLAO	17,66(17,3-18,0)	0,17	18,3	20,0	16,3	20,0	
MASCULINO	17,73(17,3-18,2)	0,22	18,8	20,0	16,3	20,0	$df1=1,000$; $df2=72,000$; $Wald F=0,448$; $p=0,506$
FEMENINO	17,53(17,1-18,0)	0,23	18,3	20,0	15,8	20,0	
TOTAL	17,42(17,3-17,5)	0,06	18,3	20,0	15,8	20,0	
MASCULINO	17,47(17,3-17,6)	0,08	18,3	20,0	15,8	20,0	$df1=1,000$; $df2=679,000$; $Wald F=1,286$; $p=0,257$
FEMENINO	17,35(17,2-17,5)	0,08	18,0	20,0	15,8	19,2	

* Sobre la base de 6 ítems de la tabla siguiente, en una escala de 4 puntos cada uno, transformados en sistema vigesimal.

Si consideramos el grado de satisfacción según condiciones específicas, se observa que aproximadamente el 70% de la población adulta presenta satisfacción con las actividades que realiza, con sus compañeros de trabajo y con el ambiente físico donde labora; sin embargo, casi el 20% refiere ninguna o poca satisfacción con la remuneración que percibe. A pesar de ello, este resultado ha mejorado en relación a lo hallado en Lima Metropolitana en el año 2002, cuando fue del 46,3% (tabla 24A).

TABLA 24A
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL ESPECÍFICA EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SATISFACCIÓN LABORAL ESPECÍFICA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
CON ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE REALIZA							$F=2,359; df1=7,552;$ $df2=5240,847; p=0,018$
NADA O POCO	3,5(2,0-6,0)	4,8(3,2-7,1)	5,6(4,0-7,7)	5,5(3,9-7,6)	3,9(2,2-6,9)	4,8(4,0-5,8)	
MASCULINO	4,0(1,9-8,3)	4,6(2,5-8,3)	6,0(4,1-8,8)	4,1(2,4-7,1)	5,0(2,5-9,7)	4,8(3,7-6,2)	
FEMENINO	2,8(1,2-6,5)	5,0(2,9-8,4)	4,9(3,1-7,5)	7,3(4,9-10,8)	2,0(0,7-5,6)	4,8(3,8-6,2)	
REGULAR	23,3(18,5-29,0)	27,2(22,8-32,1)	28,4(25,0-32,0)	18,5(15,4-22,1)	24,5(19,8-29,9)	24,7(22,8-26,7)	
MASCULINO	22,9(16,9-30,2)	28,2(21,6-35,9)	28,6(24,3-33,2)	17,3(13,5-21,8)	22,5(16,2-30,5)	24,4(21,8-27,2)	
FEMENINO	23,9(17,0-32,6)	26,2(20,8-32,3)	28,1(23,9-32,7)	20,2(16,2-24,9)	28,2(21,3-36,3)	25,1(22,6-27,9)	
BASTANTE O MUCHO	73,2(67,5-78,2)	68,0(62,9-72,7)	66,0(62,2-69,7)	76,0(72,1-79,5)	71,6(65,6-76,8)	70,4(68,3-72,5)	
MASCULINO	73,2(65,9-79,3)	67,2(59,6-74,0)	65,4(60,6-69,9)	78,6(73,7-82,8)	72,5(63,9-79,7)	70,7(67,9-73,5)	
FEMENINO	73,3(64,9-80,3)	68,8(62,2-74,8)	67,0(62,0-71,6)	72,4(67,4-76,9)	69,9(61,7-77,0)	70,0(67,1-72,8)	
CON EL AMBIENTE FÍSICO DONDE LABORA							$F=2,796; df1=7,221;$ $df2=5011,221; p=0,006$
NADA O POCO	4,2(2,3-7,8)	5,9(4,0-8,8)	7,3(5,6-9,4)	6,5(4,8-8,9)	4,2(2,4-7,4)	6,0(5,0-7,1)	
MASCULINO	5,5(2,4-11,9)	7,3(4,3-12,0)	7,7(5,5-10,6)	4,3(2,5-7,2)	4,4(2,2-8,5)	6,1(4,8-7,8)	
FEMENINO	2,7(1,1-6,3)	4,5(2,7-7,4)	6,7(4,6-9,7)	9,5(6,8-13,1)	4,0(1,8-8,5)	5,7(4,6-7,1)	
REGULAR	26,9(21,7-32,8)	31,6(26,2-37,5)	29,6(26,3-33,1)	19,9(16,7-23,6)	25,1(20,0-31,0)	27,1(25,0-29,4)	
MASCULINO	24,9(18,2-33,0)	32,2(24,1-41,6)	29,8(25,4-34,7)	23,8(19,1-29,3)	24,1(17,6-32,0)	27,7(24,7-30,9)	
FEMENINO	29,3(21,8-38,1)	30,8(24,5-38,0)	29,1(24,5-34,2)	14,7(11,1-19,1)	26,8(19,5-35,8)	26,3(23,5-29,4)	
BASTANTE O MUCHO	68,9(62,8-74,4)	62,5(56,5-68,1)	63,1(59,6-66,6)	73,6(69,4-77,4)	70,7(64,3-76,3)	66,9(64,6-69,2)	
MASCULINO	69,7(61,3-76,9)	60,5(51,3-68,9)	62,5(58,0-66,8)	71,9(66,3-76,9)	71,6(63,0-78,8)	66,2(62,9-69,3)	
FEMENINO	68,0(58,9-75,8)	64,7(57,3-71,4)	64,1(58,8-69,1)	75,8(70,4-80,5)	69,2(60,2-76,9)	67,9(64,7-71,0)	
CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO							$F=2,113; df1=7,611;$ $df2=5281,908; p=0,034$
NADA O POCO	2,0(0,8-5,2)	6,7(4,2-10,6)	5,3(3,6-7,8)	4,8(3,0-7,5)	3,9(2,1-7,0)	4,9(3,9-6,2)	
MASCULINO	1,1(0,2-5,1)	5,8(2,8-11,7)	6,0(3,9-9,3)	4,7(2,3-9,3)	4,2(2,0-8,8)	4,8(3,4-6,6)	
FEMENINO	3,2(0,9-10,2)	8,0(4,4-13,9)	3,9(1,9-7,7)	4,9(2,8-8,5)	3,3(1,2-8,9)	5,1(3,6-7,2)	
REGULAR	20,4(15,6-26,3)	27,9(22,9-33,5)	26,6(22,3-31,4)	20,5(16,1-25,7)	26,4(19,9-34,2)	24,6(22,2-27,1)	
MASCULINO	19,7(13,7-27,5)	30,1(23,7-37,5)	27,8(22,5-33,8)	19,1(14,1-25,4)	23,0(15,6-32,6)	24,7(21,8-27,9)	
FEMENINO	21,4(14,2-30,9)	24,9(18,0-33,3)	24,5(18,6-31,5)	22,6(16,5-30,2)	33,0(21,6-46,9)	24,4(21,0-28,1)	
BASTANTE O MUCHO	77,5(71,5-82,5)	65,4(59,9-70,4)	68,1(63,2-72,6)	74,7(69,6-79,3)	69,7(61,9-76,4)	70,5(68,0-72,9)	
MASCULINO	79,1(71,3-85,3)	64,0(56,6-70,8)	66,2(60,1-71,8)	76,2(69,8-81,7)	72,7(63,1-80,6)	70,5(67,3-73,6)	
FEMENINO	75,5(65,7-83,1)	67,2(58,6-74,7)	71,6(64,6-77,7)	72,5(65,1-78,8)	63,7(49,8-75,6)	70,5(66,7-74,1)	
CON LA CARGA DE TRABAJO QUE DESARROLLA A DIARIO							$F=2,484; df1=7,385;$ $df2=5125,311; p=0,013$
NADA O POCO	5,9(3,4-10,0)	9,2(6,7-12,5)	8,5(6,5-11,1)	10,1(7,9-12,9)	7,5(4,9-11,3)	8,5(7,3-9,8)	
MASCULINO	4,5(1,8-11,0)	8,8(5,5-13,9)	9,3(6,7-12,9)	8,9(6,1-12,8)	7,4(4,3-12,5)	8,1(6,6-10,0)	
FEMENINO	7,6(3,7-15,1)	9,5(6,4-14,0)	7,4(5,2-10,3)	11,8(8,4-16,3)	7,5(3,8-14,2)	9,0(7,4-11,0)	
REGULAR	35,5(29,4-42,0)	37,8(33,0-42,7)	37,3(33,9-40,8)	31,3(27,1-35,9)	24,6(19,7-30,3)	34,5(32,4-36,8)	
MASCULINO	32,3(24,6-41,1)	40,7(32,6-49,3)	36,5(31,8-41,4)	30,3(24,9-36,2)	22,0(15,9-29,6)	33,8(30,8-37,1)	
FEMENINO	39,4(30,8-48,7)	34,5(28,9-40,5)	38,6(33,9-43,5)	32,8(27,3-38,8)	29,3(21,6-38,4)	35,5(32,6-38,5)	
BASTANTE O MUCHO	58,6(52,6-64,4)	53,1(48,0-58,1)	54,2(50,4-57,9)	58,5(53,8-63,1)	67,9(61,5-73,7)	56,9(54,7-59,2)	
MASCULINO	63,2(54,4-71,1)	50,5(42,4-58,5)	54,2(49,3-59,1)	60,8(54,7-66,6)	70,5(62,0-77,8)	58,0(54,8-61,2)	
FEMENINO	52,9(44,1-61,6)	56,0(49,5-62,3)	54,0(48,7-59,3)	55,4(48,9-61,7)	63,2(53,8-71,7)	55,5(52,3-58,6)	
CON EL TRATO O RECONOCIMIENTO QUE RECIBE DE SUS JEFES							$F=4,477; df1=7,461;$ $df2=5177,614; p=0,00003$
NADA O POCO	8,2(5,0-13,2)	9,6(6,5-13,7)	10,0(7,7-12,9)	10,1(7,5-13,4)	9,8(6,0-15,6)	9,6(8,2-11,3)	
MASCULINO	8,4(4,2-16,2)	10,1(5,8-17,1)	8,9(6,1-13,0)	9,4(5,9-14,6)	9,0(4,8-16,4)	9,3(7,3-11,7)	
FEMENINO	8,0(3,8-16,1)	8,8(5,3-14,4)	11,8(8,4-16,2)	10,9(7,4-15,7)	11,4(6,0-20,6)	10,1(8,1-12,4)	
REGULAR	31,3(23,7-40,1)	43,4(36,8-50,2)	35,4(30,6-40,6)	21,3(17,2-26,1)	31,0(23,0-40,2)	33,2(30,3-36,1)	
MASCULINO	31,4(20,9-44,2)	48,9(39,6-58,3)	38,1(32,0-44,7)	20,5(15,3-27,0)	32,2(23,0-43,0)	35,3(31,5-39,3)	
FEMENINO	31,3(21,8-42,7)	36,8(27,9-46,6)	30,8(25,1-37,1)	22,3(16,8-29,0)	28,6(16,8-44,2)	30,3(26,5-34,4)	
BASTANTE O MUCHO	60,5(52,3-68,0)	47,0(40,5-53,7)	54,6(49,5-59,6)	68,6(63,9-73,0)	59,2(50,5-67,3)	57,2(54,3-60,1)	
MASCULINO	60,2(48,8-70,6)	41,0(32,7-49,8)	52,9(46,5-59,2)	70,1(63,6-75,8)	58,8(48,9-67,9)	55,5(51,7-59,2)	
FEMENINO	60,7(49,4-71,0)	54,4(44,6-63,8)	57,4(50,6-64,0)	66,8(60,3-72,7)	60,0(46,6-72,1)	59,6(55,5-63,6)	

SATISFACCIÓN LABORAL ESPECÍFICA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
CON LA REMUNERACIÓN QUE PERCIBE							$F=3,187$; $df1=7,520$; $df2=5218,786$; $p=0,002$
NADA O POCO	10,8(7,5-15,3)	21,1(17,6-25,1)	21,6(18,6-25,0)	19,0(15,5-23,0)	17,5(12,7-23,6)	18,7(17,0-20,5)	
MASCULINO	9,1(5,7-14,0)	19,3(14,5-25,1)	20,4(16,3-25,2)	13,8(9,4-19,7)	17,5(11,9-25,0)	16,5(14,4-19,0)	
FEMENINO	12,9(7,8-20,6)	23,2(18,3-29,0)	23,6(19,3-28,5)	26,0(20,8-32,0)	17,4(11,4-25,7)	21,7(19,2-24,4)	
REGULAR	52,8(46,1-59,4)	46,0(40,8-51,3)	41,9(38,6-45,3)	40,1(35,8-44,7)	46,1(39,4-53,0)	44,8(42,5-47,2)	
MASCULINO	52,4(43,4-61,4)	49,1(41,9-56,3)	40,9(36,4-45,6)	41,6(35,9-47,5)	45,6(37,3-54,2)	45,4(42,4-48,5)	
FEMENINO	53,3(44,8-61,6)	42,6(35,6-50,0)	43,5(39,0-48,2)	38,2(32,0-44,8)	47,0(37,5-56,8)	44,0(40,8-47,3)	
BASTANTE O MUCHO	36,4(30,2-43,2)	32,9(28,7-37,3)	36,4(32,8-42,2)	40,9(36,9-45,1)	36,4(30,8-42,4)	36,5(34,4-38,6)	
MASCULINO	38,5(30,0-47,7)	31,7(25,5-38,6)	38,7(34,1-43,6)	44,6(38,9-50,5)	36,9(29,5-44,9)	38,1(35,1-41,0)	
FEMENINO	33,8(26,0-42,6)	34,2(28,4-40,4)	32,9(28,1-38,1)	35,8(30,3-41,8)	35,6(27,7-44,4)	34,3(31,4-37,3)	

CALIDAD DE SUEÑO

Como se mencionara al inicio de esta publicación, los problemas de sueño se han vinculado con calidad de vida, con conductas de búsqueda de atención y con accidentes de tránsito; en otras palabras, representan un problema de salud pública. En este estudio se exploraron los problemas de sueño a través del Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh. El componente de calidad subjetiva de sueño se refiere a una valoración que hace la persona; la latencia del sueño se refiere al tiempo que demora la persona en quedarse dormida; la duración representa las horas de sueño promedio; la eficiencia del sueño describe la relación entre las horas de sueño y las horas que la persona se encuentra en la cama sin dormir; las perturbaciones del sueño se refieren a distintos problemas para dormir a causa de, por ejemplo, despertarse durante la noche, levantarse para ir al baño, no respirar bien, roncar ruidosamente, etc.; la medicación para dormir puntualiza las veces que la persona ha tomado medicación indicada o no por un facultativo, y la disfunción diurna da cuenta de las veces que la persona ha experimentado somnolencia o dificultad para mantenerse despierta mientras realizaba alguna actividad como conducir o comer. Los resultados encontrados en este estudio son similares a los encontrados en otras latitudes. Así, según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, encontramos que en Lima Centro el 12%, Lima Norte el 11,2%, Lima Este el 10,2%, Lima Sur el 9,5% y Callao el 7,9% calificaron su calidad de sueño como malo a bastante malo. Esta misma categoría fue encontrada para el 10,4% del total de adultos encuestados. Para los problemas de sueño que ameritan atención médica, tenemos, según áreas poblacionales, al 26,4% en Lima Centro, 27,1% en Lima Norte, 22,7% en Lima Este, 23,1% en Lima Sur, 19,3% en Callao, y al 24,2% del total de adultos. El 58,9% del total duerme 7 horas diarias o menos. Así el 55,3% en Lima Centro, el 66,2% en Lima Norte, el 57,3% en Lima Este, el 56,2% en Lima Sur, el 55,3% en Callao presentaron dicha condición. Además, el 9,1% en Lima Centro, el 5% en Lima Norte, el 3,4% en Lima Este, el 4,3% en Lima Sur, el 4,1% en Callao y 5,1% del total de la población en estudio ha tomado alguna medicación para dormir en el último mes. Debemos resaltar que el 33% en Lima Centro, 31,5% en Lima Norte, 25,2% en Lima Este, 26,9% en Lima Sur, 29,1% en Callao y 29% del total de adultos han manifestado presentar disfunción diurna en algún grado (Tabla 24B). Estos resultados confirman la importancia de considerar los problemas de sueño en los programas e intervenciones de salud.

Las causas de los problemas para dormir, fueron predominantemente por tener que levantarse para ir al baño, y según áreas poblacionales, tenemos al 35,8% en Lima Centro, al 37,5% en Lima Norte, al 31,3% en Lima Este, al 24,7% en Lima Sur, al 29,1% en Callao, y al 32,1% del total de adultos. El despertarse durante la noche, se observó en un 34,2% en Lima Centro, un 41,6% en Lima Norte, un 28,2% en Lima Este, un 22,9% en Lima Sur, un 27,3% en Callao y para el 31,6% del total. Sentir frío, es el tercer factor hallado perturbador de sueño con un 22,6% en Lima Centro, 24,1% en Lima Norte, 17,2% en Lima Este, 16,5% en Lima Sur, 8,1% en Callao y para el 18,9% del total. Las pesadillas, son un problema para el 13,9% en Lima Centro, 13,9% en Lima Norte, 14% en Lima Este, 12,8% en Lima Sur, 9% en Callao y para el 13,2% del total de adultos encuestados (Tabla 24C).

TABLA 24B
CALIDAD DE SUEÑO EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

COMPONENTES	LIMA CENTRO	LIMA NORTE	LIMA ESTE	LIMA SUR	CALLAO	TOTAL
CALIFICACIÓN	% (ES)	% (ES)	% (ES)	% (ES)	% (ES)	% (ES)
CALIDAD DE SUEÑO (p=<0,00001)						
BASTANTE BUENO	25,7% (ES 2,2) (IC95% 21,5-30,3)	13,9% (ES 1,6) (IC95% 11,1-17,3)	13,0% (ES 1,1) (IC95% 11,0-15,3)	8,0% (ES 1,0) (IC95% 6,2-10,2)	18,0% (ES 2,6) (IC95% 13,5-23,6)	14,9% (ES 0,7) (IC95% 13,6-16,4)
BUENO	62,3% (ES 2,4) (IC95% 57,5-66,9)	74,9% (ES 1,9) (IC95% 71,0-78,3)	76,8% (ES 1,5) (IC95% 73,8-79,5)	82,5% (ES 1,3) (IC95% 79,9-84,9)	74,1% (ES 2,4) (IC95% 69,0-78,6)	74,7% (ES 0,8) (IC95% 73,0-76,3)
MALO	10,9% (ES 1,5) (IC95% 8,3-14,2)	10,8% (ES 1,2) (IC95% 8,7-13,5)	9,8% (ES 1,0) (IC95% 8,0-12,0)	9,1% (ES 1,0) (IC95% 7,3-11,3)	7,4% (ES 1,4) (IC95% 5,2-10,6)	9,9% (ES 0,5) (IC95% 8,9-11,0)
BASTANTE MALO	1,1% (ES 0,5) (IC95% 0,5-2,7)	0,4% (ES 0,2) (IC95% 0,1-0,9)	0,4% (ES 0,2) (IC95% 0,2-1,0)	0,4% (ES 0,2) (IC95% 0,1-1,0)	0,5% (ES 0,4) (IC95% 0,1-2,1)	0,5% (ES 0,1) (IC95% 0,3-0,8)
LATENCIA DEL SUEÑO (p=<0,00001)						
APROPIADA	40,1% (ES 3,1) (IC95% 34,3-46,2)	48,9% (ES 2,4) (IC95% 44,3-53,5)	59,2% (ES 1,7) (IC95% 55,8-62,5)	56,1% (ES 2,2) (IC95% 51,8-60,4)	58,2% (ES 3,0) (IC95% 52,2-64,0)	52,4% (ES 1,1) (IC95% 50,3-54,5)
LEVE ALTERACIÓN	43,7% (ES 2,9) (IC95% 38,2-49,4)	32,2% (ES 2,4) (IC95% 27,7-37,0)	28,6% (ES 1,6) (IC95% 25,6-31,8)	31,4% (ES 1,9) (IC95% 27,8-35,2)	29,5% (ES 3,1) (IC95% 23,8-36,0)	32,9% (ES 1,0) (IC95% 30,9-34,9)
MODERA ALTERACIÓN	11,6% (ES 1,6) (IC95% 8,8-15,1)	13,5% (ES 1,4) (IC95% 11,0-16,5)	10,2% (ES 0,9) (IC95% 8,5-12,2)	9,1% (ES 1,1) (IC95% 7,2-11,5)	10,4% (ES 1,6) (IC95% 7,6-14,0)	11,1% (ES 0,6) (IC95% 10,0-12,3)
SEVERA ALTERACIÓN	4,5% (ES 1,0) (IC95% 2,9-7,0)	5,3% (ES 0,9) (IC95% 3,8-7,5)	2,0% (ES 0,4) (IC95% 1,4-3,0)	3,3% (ES 0,7) (IC95% 2,2-5,0)	1,9% (ES 0,6) (IC95% 1,0-3,4)	3,6% (ES 0,4) (IC95% 3,0-4,4)
DURACIÓN DEL SUEÑO (p=0,001)						
MÁS DE 7 HORAS	44,7% (ES 2,4) (IC95% 40,0-49,5)	33,7% (ES 1,9) (IC95% 30,1-37,6)	42,7% (ES 1,4) (IC95% 39,9-45,6)	43,8% (ES 1,7) (IC95% 40,4-47,3)	44,7% (ES 2,6) (IC95% 39,7-49,9)	41,1% (ES 0,9) (IC95% 39,4-42,6)
ENTRE 6 Y 7 HORAS	24,9% (ES 1,9) (IC95% 21,4-28,8)	31,4% (ES 2,0) (IC95% 27,7-35,4)	25,9% (ES 1,4) (IC95% 23,3-28,7)	27,9% (ES 1,5) (IC95% 25,0-31,0)	31,8% (ES 2,5) (IC95% 27,1-36,9)	28,3% (ES 0,8) (IC95% 26,7-29,9)
ENTRE 5 Y 6 HORAS	24,7% (ES 2,1) (IC95% 20,9-29,1)	26,7% (ES 1,8) (IC95% 23,4-30,3)	25,0% (ES 1,3) (IC95% 22,5-27,7)	23,4% (ES 1,5) (IC95% 20,5-26,4)	20,4% (ES 2,1) (IC95% 16,6-24,8)	24,6% (ES 0,8) (IC95% 23,1-26,1)
MENOS DE 5 HORAS	5,7% (ES 1,6) (IC95% 3,2-9,9)	8,1% (ES 1,1) (IC95% 6,2-10,4)	6,4% (ES 0,8) (IC95% 4,9-8,2)	4,9% (ES 0,7) (IC95% 3,6-6,6)	3,1% (ES 0,8) (IC95% 1,8-5,2)	6,0% (ES 0,5) (IC95% 5,2-7,1)
EFICIENCIA DEL SUEÑO (p=0,003)						
MÁS DEL 85%	84,0% (ES 2,0) (IC95% 79,7-87,5)	77,2% (ES 1,8) (IC95% 73,4-80,6)	84,1% (ES 1,2) (IC95% 81,6-86,3)	84,2% (ES 1,6) (IC95% 80,8-87,0)	88,4% (ES 1,6) (IC95% 84,9-91,1)	82,7% (ES 0,8) (IC95% 81,1-84,1)
DEL 75 AL 84%	10,6% (ES 1,7) (IC95% 7,7-14,4)	14,5% (ES 1,3) (IC95% 12,1-17,2)	10,6% (ES 0,9) (IC95% 8,9-12,6)	10,7% (ES 1,2) (IC95% 8,6-13,3)	9,9% (ES 1,3) (IC95% 7,7-12,8)	11,6% (ES 0,6) (IC95% 10,5-12,8)
DEL 65 AL 74%	3,0% (ES 0,8) (IC95% 1,7-5,1)	5,2% (ES 0,9) (IC95% 3,7-7,3)	3,4% (ES 0,6) (IC95% 2,4-4,8)	2,8% (ES 0,6) (IC95% 1,8-4,2)	1,4% (ES 0,7) (IC95% 0,5-3,5)	3,5% (ES 0,3) (IC95% 2,8-4,2)
MENOS DEL 65%	2,5% (ES 0,7) (IC95% 1,4-4,4)	3,1% (ES 0,7) (IC95% 2,0-4,9)	1,9% (ES 0,5) (IC95% 1,1-3,2)	2,4% (ES 0,9) (IC95% 1,1-4,8)	0,3% (ES 0,2) (IC95% 0,1-1,2)	2,2% (ES 0,3) (IC95% 1,7-3,0)
PERTURBACIONES DEL SUEÑO (p=0,00042)						
NINGUNA	42,8% (ES 2,8) (IC95% 37,5-48,3)	38,4% (ES 2,2) (IC95% 34,3-42,8)	48,2% (ES 2,0) (IC95% 44,3-52,1)	49,7% (ES 2,4) (IC95% 44,9-54,4)	50,8% (ES 3,5) (IC95% 44,0-57,5)	45,2% (ES 1,1) (IC95% 43,1-47,4)
ENTRE 1 Y 9	55,4% (ES 2,7) (IC95% 50,1-60,6)	57,5% (ES 2,1) (IC95% 53,3-61,6)	48,8% (ES 1,9) (IC95% 45,2-52,5)	48,3% (ES 2,3) (IC95% 43,8-52,8)	47,4% (ES 3,5) (IC95% 40,7-54,2)	52,0% (ES 1,1) (IC95% 50,0-54,1)
ENTRE 10 Y 18	1,7% (ES 0,5) (IC95% 1,0-3,1)	4,1% (ES 0,9) (IC95% 2,6-6,2)	3,0% (ES 0,5) (IC95% 2,1-4,2)	2,1% (ES 0,5) (IC95% 1,3-3,2)	1,8% (ES 0,6) (IC95% 0,9-3,5)	2,7% (ES 0,3) (IC95% 2,2-3,4)
ENTRE 19 Y 27	-	-	-	-	-	-
MEDICACIÓN PARA DORMIR (p=0,00010)						
NINGUNA VEZ EN ÚLTIMAS 4 SEM.	90,9% (ES 1,6) (IC95% 87,2-93,5)	95,1% (ES 0,9) (IC95% 93,0-96,6)	96,6% (ES 0,6) (IC95% 95,2-97,5)	95,7% (ES 0,8) (IC95% 93,9-97,0)	95,9% (ES 1,0) (IC95% 93,4-97,5)	94,9% (ES 0,4) (IC95% 94,0-95,7)
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2,4% (ES 0,7) (IC95% 1,4-4,1)	1,7% (ES 0,5) (IC95% 0,9-3,1)	1,1% (ES 0,4) (IC95% 0,6-2,1)	1,0% (ES 0,3) (IC95% 0,5-1,7)	2,4% (ES 0,9) (IC95% 1,1-5,0)	1,6% (ES 0,2) (IC95% 1,2-2,1)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	2,0% (ES 0,7) (IC95% 1,1-3,9)	2,1% (ES 0,6) (IC95% 1,1-3,6)	0,8% (ES 0,3) (IC95% 0,4-1,5)	1,3% (ES 0,5) (IC95% 0,6-2,6)	0,9% (ES 0,4) (IC95% 0,4-2,0)	1,5% (ES 0,2) (IC95% 1,1-2,0)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	4,7% (ES 1,1) (IC95% 3,0-7,4)	1,2% (ES 0,5) (IC95% 0,5-2,5)	1,5% (ES 0,4) (IC95% 0,9-2,5)	2,0% (ES 0,5) (IC95% 1,3-3,1)	0,8% (ES 0,4) (IC95% 0,3-1,9)	2,0% (ES 0,3) (IC95% 1,5-2,6)
DISFUNCIÓN DIURNA (p=0,070)						
NINGUNA	66,9% (ES 2,7) (IC95% 61,5-71,9)	68,4% (ES 1,8) (IC95% 64,8-71,8)	74,8% (ES 1,5) (IC95% 71,6-77,7)	73,1% (ES 1,9) (IC95% 69,2-76,6)	70,9% (ES 2,8) (IC95% 65,0-76,1)	71,0% (ES 0,9) (IC95% 69,1-72,7)
LEVE	28,4% (ES 2,3) (IC95% 24,0-33,2)	27,8% (ES 1,8) (IC95% 24,5-31,4)	22,2% (ES 1,4) (IC95% 19,6-25,2)	23,1% (ES 1,7) (IC95% 19,9-26,6)	27,3% (ES 2,7) (IC95% 22,1-33,2)	25,5% (ES 0,9) (IC95% 23,9-27,2)

COMPONENTES CALIFICACIÓN	LIMA CENTRO % (ES)	LIMA NORTE % (ES)	LIMA ESTE % (ES)	LIMA SUR % (ES)	CALLAO % (ES)	TOTAL % (ES)
MODERADA	4,2% (ES 1,1) (IC95% 2,6-6,9)	3,0% (ES 0,7) (IC95% 1,9-4,7)	2,7% (ES 0,6) (IC95% 1,8-4,1)	3,5% (ES 0,7) (IC95% 2,3-5,1)	1,8% (ES 0,6) (IC95% 1,0-3,5)	3,1% (ES 0,3) (IC95% 2,5-3,9)
SEVERA	0,4% (ES 0,2) (IC95% 0,2-1,2)	0,7% (ES 0,3) (IC95% 0,3-1,5)	0,3% (ES 0,1) (IC95% 0,1-0,7)	0,3% (ES 0,2) (IC95% 0,1-1,4)	-	0,4% (ES 0,1) (IC95% 0,2-0,7)
PUNTAJE TOTAL (N=4406)						(p=<0,00001)
SIN PROBLEMA DE SUEÑO (SCORE <5)	63,7% (ES 2,7) (IC95% 58,2-68,9)	61,5% (ES 2,2) (IC95% 57,1-65,7)	71,1% (ES 1,7) (IC95% 67,6-74,3)	70,2% (ES 2,1) (IC95% 65,8-74,2)	77,4% (ES 2,2) (IC95% 72,8-81,4)	67,7% (ES 1,0) (IC95% 65,7-69,7)
MERECE ATENCIÓN MÉDICA	26,4% (ES 2,2) (IC95% 22,2-30,9)	27,1% (ES 1,9) (IC95% 23,5-31,1)	22,7% (ES 1,5) (IC95% 19,9-25,8)	23,1% (ES 1,8) (IC95% 19,8-26,9)	19,3% (ES 2,1) (IC95% 15,4-23,8)	24,2% (ES 0,9) (IC95% 22,6-26,0)
MERECE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO	9,5% (ES 1,4) (IC95% 7,1-12,7)	11,2% (ES 1,3) (IC95% 9,0-13,9)	6,1% (ES 0,7) (IC95% 4,8-7,8)	6,7% (ES 1,0) (IC95% 5,0-8,8)	3,3% (ES 0,9) (IC95% 2,0-5,5)	7,9% (ES 0,5) (IC95% 6,9-8,9)
SE TRATA DE UN PROBLEMA DE SUEÑO GRAVE	0,4% (ES 0,2) (IC95% 0,1-1,3)	0,2% (ES 0,2) (IC95% 0,1-0,9)	0,1% (ES 0,0) (IC95% 0,0-0,2)	0,0% (ES 0,0) (IC95% 0,0-0,3)	0,0% (ES 0,0) (IC95% 0,0-0,3)	0,2% (ES 0,1) (IC95% 0,1-0,3)

TABLA 24C

PERTURBACIONES DEL SUEÑO EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

PROBLEMAS PARA DORMIR A CAUSA DE...	LIMA CENTRO % (ES)	LIMA NORTE % (ES)	LIMA ESTE % (ES)	LIMA SUR % (ES)	CALLAO % (ES)	TOTAL % (ES)
CALIFICACIÓN						
DESPERTARSE DURANTE LA NOCHE O LA MADRUGADA						(p=<0,00001)
NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEM.	65,7% (ES 3,3) (IC95% 59,0-71,8)	58,4% (ES 2,2) (IC95% 54,1-62,7)	71,8% (ES 1,9) (IC95% 68,0-75,4)	77,1% (ES 2,0) (IC95% 72,9-80,9)	72,5% (ES 2,5) (IC95% 67,4-77,1)	68,4% (ES 1,1) (IC95% 66,2-70,4)
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	21,8% (ES 2,4) (IC95% 17,5-26,9)	24,4% (ES 1,8) (IC95% 21,0-28,2)	12,9% (ES 1,4) (IC95% 10,4-15,8)	11,7% (ES 1,3) (IC95% 9,3-14,5)	18,7% (ES 2,2) (IC95% 14,8-23,4)	17,9% (ES 0,8) (IC95% 16,3-19,6)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	9,9% (ES 1,6) (IC95% 7,1-13,6)	11,9% (ES 1,3) (IC95% 9,5-14,7)	9,7% (ES 1,1) (IC95% 7,8-12,0)	7,1% (ES 1,1) (IC95% 5,3-9,6)	6,6% (ES 1,2) (IC95% 4,5-9,4)	9,4% (ES 0,6) (IC95% 8,4-10,6)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	2,5% (ES 0,8) (IC95% 1,4-4,5)	5,3% (ES 0,9) (IC95% 3,8-7,4)	5,6% (ES 0,8) (IC95% 4,3-7,3)	4,1% (ES 0,8) (IC95% 2,8-5,9)	2,2% (ES 0,6) (IC95% 1,3-3,8)	4,3% (ES 0,4) (IC95% 3,6-5,1)
TENER QUE LEVANTARSE PARA IR AL BAÑO						(p=0,00006)
NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEM.	64,2% (ES 3,3) (IC95% 57,5-70,4)	62,6% (ES 2,3) (IC95% 58,0-66,9)	68,7% (ES 1,8) (IC95% 65,1-72,1)	75,2% (ES 1,9) (IC95% 71,3-78,8)	71,0% (ES 2,8) (IC95% 65,1-76,2)	67,9% (ES 1,1) (IC95% 65,7-69,9)
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	21,4% (ES 2,0) (IC95% 17,7-25,7)	20,1% (ES 1,7) (IC95% 16,9-23,7)	12,5% (ES 1,3) (IC95% 10,1-15,3)	13,3% (ES 1,3) (IC95% 11,0-16,0)	18,1% (ES 2,6) (IC95% 13,6-23,6)	16,8% (ES 0,8) (IC95% 15,4-18,4)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	10,6% (ES 2,1) (IC95% 7,2-15,4)	11,1% (ES 1,3) (IC95% 8,8-13,9)	11,3% (ES 1,2) (IC95% 9,2-13,9)	6,7% (ES 1,1) (IC95% 4,9-9,2)	7,1% (ES 1,5) (IC95% 4,6-10,7)	9,7% (ES 0,6) (IC95% 8,5-11,1)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	3,8% (ES 1,0) (IC95% 2,2-6,4)	6,3% (ES 1,1) (IC95% 4,4-8,9)	7,5% (ES 0,9) (IC95% 6,0-9,4)	4,7% (ES 1,0) (IC95% 3,0-7,2)	3,9% (ES 1,1) (IC95% 2,3-6,6)	5,6% (ES 0,5) (IC95% 4,7-6,6)
NO PODER RESPIRAR BIEN						(p=0,00019)
NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEM.	93,0% (ES 1,6) (IC95% 89,2-95,5)	93,1% (ES 1,1) (IC95% 90,8-94,9)	95,3% (ES 0,7) (IC95% 93,8-96,5)	95,1% (ES 0,8) (IC95% 93,1-96,5)	96,9% (ES 0,8) (IC95% 95,0-98,1)	94,5% (ES 0,5) (IC95% 93,5-95,3)
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	6,3% (ES 1,6) (IC95% 3,8-10,1)	5,0% (ES 0,8) (IC95% 3,7-6,9)	1,8% (ES 0,4) (IC95% 1,1-2,9)	3,8% (ES 0,8) (IC95% 2,5-5,7)	2,3% (ES 0,7) (IC95% 1,2-4,1)	3,9% (ES 0,4) (IC95% 3,2-4,8)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	0,6% (ES 0,3) (IC95% 0,2-1,9)	1,5% (ES 0,5) (IC95% 0,8-2,7)	2,1% (ES 0,4) (IC95% 1,4-3,2)	0,6% (ES 0,2) (IC95% 0,3-1,3)	0,8% (ES 0,4) (IC95% 0,3-2,0)	1,2% (ES 0,2) (IC95% 0,9-1,7)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,1% (ES 0,1) (IC95% 0,0-0,8)	0,4% (ES 0,2) (IC95% 0,1-1,1)	0,7% (ES 0,2) (IC95% 0,4-1,4)	0,5% (ES 0,2) (IC95% 0,2-1,2)	-	0,4% (ES 0,1) (IC95% 0,3-0,6)
TOSER O RONCAR RUIDOSAMENTE						(p=0,005)
NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEM.	92,2% (ES 1,5) (IC95% 88,6-94,7)	92,0% (ES 1,1) (IC95% 89,6-93,9)	93,3% (ES 0,9) (IC95% 91,3-94,8)	95,2% (ES 0,8) (IC95% 93,2-96,6)	96,6% (ES 1,0) (IC95% 94,0-98,1)	93,5% (ES 0,5) (IC95% 92,5-94,4)
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	6,5% (ES 1,5) (IC95% 4,1-10,1)	5,7% (ES 0,9) (IC95% 4,2-7,8)	3,6% (ES 0,7) (IC95% 2,5-5,1)	2,7% (ES 0,5) (IC95% 1,8-4,0)	2,1% (ES 0,7) (IC95% 1,1-4,2)	4,3% (ES 0,4) (IC95% 3,6-5,2)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,2% (ES 0,5) (IC95% 0,6-2,5)	1,6% (ES 0,5) (IC95% 0,9-2,8)	2,0% (ES 0,5) (IC95% 1,3-3,1)	1,4% (ES 0,5) (IC95% 0,6-2,9)	1,3% (ES 0,6) (IC95% 0,5-3,1)	1,5% (ES 0,2) (IC95% 1,2-2,1)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,1% (ES 0,1) (IC95% 0,0-0,9)	0,6% (ES 0,3) (IC95% 0,3-1,5)	1,1% (ES 0,3) (IC95% 0,7-1,8)	0,7% (ES 0,3) (IC95% 0,3-1,6)	-	0,6% (ES 0,1) (IC95% 0,4-0,9)
SENTIR FRÍO						(p=<0,00001)
NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEM.	77,3% (ES 2,7) (IC95% 71,6-82,1)	75,8% (ES 2,1) (IC95% 71,5-79,6)	82,8% (ES 1,5) (IC95% 79,6-85,5)	83,5% (ES 1,8) (IC95% 79,8-86,7)	92,0% (ES 1,4) (IC95% 88,7-94,4)	81,1% (ES 0,9) (IC95% 79,2-82,8)

PROBLEMAS PARA DORMIR A CAUSA DE...	LIMA CENTRO % (ES)	LIMA NORTE % (ES)	LIMA ESTE % (ES)	LIMA SUR % (ES)	CALLAO % (ES)	TOTAL % (ES)
CALIFICACIÓN						
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	12,3% (ES 1,8) (IC95% 9,2-16,3)	14,8% (ES 1,6) (IC95% 11,9-18,3)	8,4% (ES 0,9) (IC95% 6,8-10,5)	10,4% (ES 1,2) (IC95% 8,2-13,0)	5,3% (ES 1,1) (IC95% 3,5-7,9)	10,9% (ES 0,7) (IC95% 9,7-12,2)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	9,8% (ES 1,9) (IC95% 6,7-14,3)	7,0% (ES 1,1) (IC95% 5,2-9,4)	5,4% (ES 0,8) (IC95% 3,9-7,3)	4,4% (ES 0,8) (IC95% 3,1-6,3)	1,9% (ES 0,6) (IC95% 1,0-3,5)	6,0% (ES 0,5) (IC95% 5,1-7,1)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,5% (ES 0,3) (IC95% 0,2-1,7)	2,3% (ES 0,6) (IC95% 1,4-3,7)	3,4% (ES 0,7) (IC95% 2,3-5,1)	1,7% (ES 0,5) (IC95% 1,0-3,0)	0,9% (ES 0,5) (IC95% 0,3-3,0)	2,0% (ES 0,3) (IC95% 1,6-2,6)
SENTIR DEMASIADO CALOR						(p=0,00015)
NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEM.	93,7% (ES 1,3) (IC95% 90,6-95,9)	92,3% (ES 1,2) (IC95% 89,6-94,3)	95,5% (ES 0,6) (IC95% 94,1-96,6)	92,7% (ES 1,0) (IC95% 90,6-94,3)	95,2% (ES 1,1) (IC95% 92,4-97,0)	93,7% (ES 0,5) (IC95% 92,7-94,6)
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	5,9% (ES 1,3) (IC95% 3,8-9,0)	3,8% (ES 0,8) (IC95% 2,5-5,7)	2,5% (ES 0,5) (IC95% 1,7-3,6)	4,5% (ES 0,7) (IC95% 3,3-6,0)	2,6% (ES 0,9) (IC95% 1,3-4,9)	3,8% (ES 0,4) (IC95% 3,2-4,6)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	0,4% (ES 0,3) (IC95% 0,1-1,6)	3,4% (ES 0,8) (IC95% 2,2-5,3)	1,6% (ES 0,4) (IC95% 1,0-2,6)	2,2% (ES 0,6) (IC95% 1,3-3,6)	1,0% (ES 0,4) (IC95% 0,4-2,3)	1,9% (ES 0,3) (IC95% 1,5-2,5)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	-	0,5% (ES 0,3) (IC95% 0,2-1,3)	0,4% (ES 0,2) (IC95% 0,2-0,9)	0,6% (ES 0,3) (IC95% 0,3-1,5)	1,2% (ES 0,6) (IC95% 0,5-3,0)	0,5% (ES 0,1) (IC95% 0,3-0,8)
TENER PESADILLAS						(p=0,097)
NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEM.	86,1% (ES 1,7) (IC95% 82,5-89,1)	86,1% (ES 1,6) (IC95% 82,7-88,9)	86,0% (ES 1,4) (IC95% 83,1-88,5)	87,2% (ES 1,2) (IC95% 84,5-89,4)	91,0% (ES 1,7) (IC95% 87,0-93,9)	86,8% (ES 0,7) (IC95% 85,4-88,1)
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	9,8% (ES 1,4) (IC95% 7,3-12,9)	9,0% (ES 1,3) (IC95% 6,8-11,9)	8,1% (ES 1,0) (IC95% 6,4-10,2)	8,9% (ES 1,0) (IC95% 7,2-11,0)	6,3% (ES 1,6) (IC95% 3,7-10,4)	8,6% (ES 0,6) (IC95% 7,6-9,7)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	3,5% (ES 0,8) (IC95% 2,2-5,5)	4,5% (ES 1,0) (IC95% 2,9-6,8)	4,7% (ES 0,7) (IC95% 3,5-6,4)	2,5% (ES 0,5) (IC95% 1,7-3,8)	1,9% (ES 0,6) (IC95% 1,0-3,7)	3,7% (ES 0,4) (IC95% 3,0-4,5)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,6% (ES 0,4) (IC95% 0,2-1,9)	0,4% (ES 0,2) (IC95% 0,1-1,0)	1,2% (ES 0,3) (IC95% 0,7-2,0)	1,4% (ES 0,4) (IC95% 0,8-2,4)	0,8% (ES 0,4) (IC95% 0,3-1,9)	0,9% (ES 0,1) (IC95% 0,6-1,2)
SUFRIR DOLORES						(p=0,190)
NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEM.	89,1% (ES 1,6) (IC95% 85,6-91,8)	86,0% (ES 1,5) (IC95% 82,7-88,7)	89,9% (ES 1,1) (IC95% 87,6-91,8)	87,6% (ES 1,4) (IC95% 84,6-90,1)	91,0% (ES 1,6) (IC95% 87,3-93,7)	88,4% (ES 0,6) (IC95% 87,0-89,6)
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	5,6% (ES 1,0) (IC95% 4,0-8,0)	6,2% (ES 0,9) (IC95% 4,6-8,3)	4,9% (ES 0,7) (IC95% 3,7-6,5)	7,0% (ES 0,9) (IC95% 5,4-9,1)	4,8% (ES 1,0) (IC95% 3,1-7,3)	5,8% (ES 0,4) (IC95% 5,0-6,7)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	3,9% (ES 0,8) (IC95% 2,5-5,9)	5,7% (ES 1,0) (IC95% 4,1-7,9)	3,1% (ES 0,6) (IC95% 2,1-4,7)	3,6% (ES 0,7) (IC95% 2,5-5,2)	2,8% (ES 0,9) (IC95% 1,5-5,4)	4,0% (ES 0,4) (IC95% 3,3-4,8)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,4% (ES 0,5) (IC95% 0,7-2,8)	2,1% (ES 0,5) (IC95% 1,3-3,4)	2,1% (ES 0,4) (IC95% 1,5-3,0)	1,7% (ES 0,4) (IC95% 1,1-2,7)	1,4% (ES 0,5) (IC95% 0,6-2,9)	1,8% (ES 0,2) (IC95% 1,4-2,3)
OTRAS RAZONES						(p=<0,00001)
NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEM.	4,5% (ES 4,4) (IC95% 0,6-26,4)	72,9% (ES 7,0) (IC95% 57,3-84,4)	43,1% (ES 8,9) (IC95% 27,1-60,7)	63,4% (ES 7,4) (IC95% 48,1-76,4)	4,2% (ES 4,1) (IC95% 0,6-25,0)	52,7% (ES 4,9) (IC95% 43,2-62,0)
MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	29,9% (ES 12,7) (IC95% 11,4-58,5)	0,5% (ES 0,5) (IC95% 0,1-3,8)	10,8% (ES 4,1) (IC95% 5,0-21,9)	12,3% (ES 4,5) (IC95% 5,8-24,1)	20,9% (ES 9,5) (IC95% 7,9-45,1)	9,9% (ES 2,5) (IC95% 6,0-15,9)
UNA O DOS VECES A LA SEMANA	28,1% (ES 10,3) (IC95% 12,6-51,4)	7,8% (ES 3,8) (IC95% 2,9-19,4)	11,8% (ES 5,1) (IC95% 4,8-25,9)	8,9% (ES 3,2) (IC95% 4,3-17,6)	50,0% (ES 10,8) (IC95% 30,0-70,0)	14,3% (ES 2,7) (IC95% 9,8-20,4)
TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	37,5% (ES 11,4) (IC95% 18,8-61,0)	18,7% (ES 5,9) (IC95% 9,7-33,1)	34,3% (ES 7,9) (IC95% 20,8-51,0)	15,4% (ES 4,8) (IC95% 8,2-27,2)	24,9% (ES 9,5) (IC95% 11,0-47,3)	23,1% (ES 3,5) (IC95% 16,9-30,7)

CALIDAD DE VIDA

La calidad de vida es una construcción conceptual que involucra áreas como el bienestar físico, psicológico, autocuidado, funcionamiento ocupacional e interpersonal, apoyo socioemocional, apoyo comunitario, plenitud personal y satisfacción espiritual. A continuación se presenta el resultado correspondiente al Índice de Calidad de Vida, escala de 1 a 10, siendo 10 excelente. Según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, se encontró una media de 8,14 en Lima Centro, 7,98 en Lima Norte, 7,77 en Lima Este, 7,76 en Lima Sur, 8,06 en Callao y de 7,92 en total. Este resultado es ligeramente superior al hallado en el Estudio Epidemiológico Metropolitano del año 2002, que presentó una media de 7,63, y al de Lima Rural del 2007 con un 7,42. La cifra encontrada indica un nivel aceptable de calidad de vida desde la perspectiva de la propia persona. Estudios a profundidad presentarán relaciones específicas de este indicador con otras variables (Tabla 25B). La evaluación total no muestra diferencias significativas según el sexo; sin embargo, sí existe una diferencia significativa en los componentes específicos de bienestar físico y bienestar psicológico o emocional a favor de los varones.

TABLA 25A
CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN (ESCALA DE 1 A 10)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PUNTAJE TOTAL	8,1415 (8,0169-8,2662)	7,9836 (7,8828-8,0844)	7,7714 (7,6883-7,8544)	7,7600 (7,6531-7,8669)	8,0617 (7,9232-8,2002)	7,9212 (7,8717-7,9708)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=9,514; $p<0,00001$
BIENESTAR FÍSICO	7,92 (7,74-8,10)	7,64 (7,47-7,80)	7,40 (7,29-7,50)	7,36 (7,21-7,51)	7,78 (7,58-7,98)	7,59 (7,51-7,66)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=9,061; $p<0,00001$
BIENESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL	8,23 (8,06-8,39)	8,08 (7,95-8,21)	7,82 (7,72-7,92)	7,77 (7,63-7,90)	8,13 (7,96-8,30)	7,98 (7,92-8,05)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=8,213; $p<0,00001$
AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO	8,66 (8,53-8,78)	8,59 (8,48-8,69)	8,36 (8,26-8,47)	8,40 (8,27-8,53)	8,58 (8,45-8,70)	8,50 (8,45-8,56)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=4,721; $p=0,001$
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL	8,54 (8,40-8,68)	8,58 (8,47-8,69)	8,36 (8,25-8,46)	8,36 (8,22-8,50)	8,51 (8,37-8,66)	8,47 (8,41-8,52)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=3,119; $p=0,015$
FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL	8,53 (8,39-8,68)	8,31 (8,20-8,43)	8,16 (8,06-8,27)	8,18 (8,05-8,30)	8,42 (8,27-8,56)	8,30 (8,24-8,35)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=5,646; $p=0,00018$
APOYO SOCIAL-EMOCIONAL	8,12 (7,92-8,32)	7,84 (7,69-7,99)	7,65 (7,51-7,78)	7,43 (7,27-7,59)	7,94 (7,74-8,14)	7,77 (7,69-7,84)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=8,967; $p<0,00001$
APOYO COMUNITARIO Y DE SERVICIOS	6,43 (6,21-6,65)	6,53 (6,34-6,73)	6,34 (6,16-6,52)	6,26 (6,08-6,45)	6,75 (6,46-7,03)	6,43 (6,34-6,53)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=2,492; $p=0,042$
PLENITUD PERSONAL	8,16 (8,00-8,32)	7,88 (7,74-8,02)	7,51 (7,39-7,63)	7,71 (7,58-7,84)	7,94 (7,76-8,11)	7,81 (7,74-7,88)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=11,780; $p<0,00001$
SATISFACCIÓN ESPIRITUAL	8,39 (8,24-8,54)	8,02 (7,90-8,15)	8,06 (7,95-8,16)	8,04 (7,92-8,16)	8,30 (8,14-8,47)	8,13 (8,07-8,19)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=5,614; $p=0,00019$
CALIDAD DE VIDA GLOBAL	8,440 (8,29-8,59)	8,35 (8,23-8,47)	8,07 (7,97-8,16)	8,10 (7,97-8,22)	8,29 (8,11-8,47)	8,24 (8,18-8,29)	$df1=4,000$; $df2=691,000$; Wald F=6,705; $p=0,00003$

TABLA 25B
CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN SEXO EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN (ESCALA DE 1 A 10)	MEDIA	E.S.	IC 95%		MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
			INFERIOR	SUPERIOR					
LIMA CENTRO									
PUNTAJE TOTAL									
TOTAL	8,1415	0,06349	8,0169	8,2662	8,3	8,7	7,5	8,9	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=5,096; p=0,026
MASCULINO	8,2682	0,07918	8,1117	8,4247	8,5	8,9	7,7	9,0	
FEMENINO	8,0212	0,08756	7,8481	8,1943	8,1	8,7	7,3	8,8	
BIENESTAR FÍSICO									
TOTAL	7,92	0,091	7,74	8,10	8,0	9,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=5,260; p=0,023
MASCULINO	8,09	0,115	7,86	8,31	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,75	0,117	7,52	7,99	8,0	9,0	7,0	9,0	
BIENESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL									
TOTAL	8,23	0,083	8,06	8,39	8,0	9,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=8,193; p=0,005
MASCULINO	8,45	0,092	8,27	8,63	9,0	9,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,01	0,127	7,76	8,27	8,0	9,0	7,0	9,0	
AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO									
TOTAL	8,66	0,064	8,53	8,78	9,0	9,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=5,115; p=0,025
MASCULINO	8,78	0,076	8,63	8,93	9,0	9,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,54	0,090	8,36	8,72	9,0	9,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL									
TOTAL	8,54	0,072	8,40	8,68	9,0	9,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=1,089; p=0,299
MASCULINO	8,61	0,096	8,42	8,80	9,0	8,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,47	0,101	8,27	8,67	9,0	9,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL									
TOTAL	8,53	0,075	8,39	8,68	9,0	9,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=1,996; p=0,160
MASCULINO	8,64	0,097	8,45	8,83	9,0	10,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,43	0,111	8,21	8,65	9,0	9,0	8,0	10,0	
APOYO SOCIAL-EMOCIONAL									
TOTAL	8,12	0,100	7,92	8,32	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=0,251; p=0,617
MASCULINO	8,16	0,109	7,94	8,37	8,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,08	0,141	7,80	8,36	8,0	9,0	7,0	9,0	

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN (ESCALA DE 1 A 10)	MEDIA	E.S.	IC 95%		MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
			INFERIOR	SUPERIOR					
APOYO COMUNITARIO Y DE SERVICIOS									
TOTAL	6,43	0,113	6,21	6,65	7,0	8,0	5,0	8,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=3,633; p=0,059
MASCULINO	6,67	0,184	6,30	7,03	7,0	8,0	5,0	8,0	
FEMENINO	6,21	0,144	5,92	6,49	7,0	8,0	5,0	8,0	
PLENITUD PERSONAL									
TOTAL	8,16	0,083	8,00	8,32	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=5,419; p=0,021
MASCULINO	8,33	0,101	8,13	8,53	9,0	9,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,00	0,114	7,77	8,22	8,0	8,0	7,0	9,0	
SATISFACCIÓN ESPIRITUAL									
TOTAL	8,39	0,076	8,24	8,54	8,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=0,353; p=0,553
MASCULINO	8,43	0,103	8,23	8,64	9,0	9,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,35	0,110	8,13	8,56	8,0	8,0	8,0	9,0	
CALIDAD DE VIDA GLOBAL									
TOTAL	8,44	0,076	8,29	8,59	9,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=1,235; p=0,269
MASCULINO	8,51	0,096	8,32	8,70	9,0	8,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,37	0,101	8,17	8,57	8,0	8,0	8,0	9,0	
LIMA NORTE									
PUNTAJE TOTAL									
TOTAL	7,9836	0,05138	7,8827	8,0844	8,1	7,8	7,2	8,8	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=0,325; p=0,569
MASCULINO	8,0135	0,07944	7,8568	8,1701	8,1	7,2	7,3	8,9	
FEMENINO	7,9613	0,05897	7,8449	8,0777	8,0	8,2	7,2	8,8	
BIENESTAR FÍSICO									
TOTAL	7,64	0,084	7,47	7,80	8,0	8,0	6,0	9,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=5,862; p=0,016
MASCULINO	7,83	0,125	7,58	8,07	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,49	0,094	7,31	7,68	8,0	8,0	6,0	9,0	
BIENESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL									
TOTAL	8,08	0,066	7,95	8,21	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=8,156; p=0,005
MASCULINO	8,28	0,097	8,09	8,47	8,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	7,93	0,082	7,77	8,10	8,0	8,0	7,0	9,0	
AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO									
TOTAL	8,59	0,053	8,48	8,69	9,0	10,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=0,067; p=0,796
MASCULINO	8,57	0,084	8,41	8,74	9,0	10,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,60	0,065	8,47	8,73	9,0	10,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL									
TOTAL	8,58	0,056	8,47	8,69	9,0	10,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=0,003; p=0,955
MASCULINO	8,58	0,093	8,40	8,76	9,0	10,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,59	0,068	8,45	8,72	9,0	10,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL									
TOTAL	8,31	0,059	8,20	8,43	8,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=0,751; p=0,387
MASCULINO	8,26	0,090	8,08	8,43	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,35	0,072	8,21	8,49	8,0	8,0	8,0	10,0	
APOYO SOCIAL-EMOCIONAL									
TOTAL	7,84	0,076	7,69	7,99	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=0,886; p=0,348
MASCULINO	7,76	0,128	7,51	8,01	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,89	0,082	7,73	8,05	8,0	8,0	7,0	9,0	
APOYO COMUNITARIO Y DE SERVICIOS									
TOTAL	6,53	0,099	6,34	6,73	7,0	8,0	5,0	8,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=2,115; p=0,148
MASCULINO	6,38	0,152	6,09	6,68	7,0	8,0	5,0	8,0	
FEMENINO	6,64	0,116	6,41	6,87	7,0	8,0	5,0	8,0	
PLENITUD PERSONAL									
TOTAL	7,88	0,070	7,74	8,02	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=1,517; p=0,220
MASCULINO	7,97	0,097	7,78	8,16	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,82	0,089	7,64	7,99	8,0	8,0	7,0	9,0	
SATISFACCIÓN ESPIRITUAL									
TOTAL	8,02	0,066	7,89	8,15	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=0,001; p=0,977
MASCULINO	8,03	0,097	7,83	8,22	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,02	0,079	7,87	8,18	8,0	8,0	7,0	9,0	
CALIDAD DE VIDA GLOBAL									
TOTAL	8,35	0,061	8,23	8,47	8,0	8,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=3,288; p=0,072
MASCULINO	8,46	0,082	8,30	8,62	8,0	8,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,26	0,081	8,10	8,42	8,0	8,0	8,0	9,0	

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN (ESCALA DE 1 A 10)	MEDIA	E.S.	IC 95%		MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
			INFERIOR	SUPERIOR					
LIMA ESTE									
PUNTAJE TOTAL									
TOTAL	7,7714	0,04457	7,6839	7,8589	7,8	8,0	7,1	8,5	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=0,387; p=0,535
MASCULINO	7,7928	0,06090	7,6800	7,9056	7,8	8,0	7,2	8,5	
FEMENINO	7,7503	0,05132	7,6536	7,8470	7,8	8,0	7,0	8,5	
BIENESTAR FÍSICO									
TOTAL	7,40	0,055	7,29	7,51	8,0	8,0	6,0	8,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=0,803; p=0,372
MASCULINO	7,44	0,078	7,30	7,59	8,0	8,0	6,0	8,0	
FEMENINO	7,35	0,070	7,22	7,49	8,0	8,0	6,0	8,0	
BIENESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL									
TOTAL	7,82	0,053	7,72	7,92	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=6,912; p=0,009
MASCULINO	7,93	0,074	7,79	8,07	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,71	0,062	7,59	7,83	8,0	8,0	7,0	9,0	
AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO									
TOTAL	8,36	0,054	8,26	8,47	8,0	8,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=0,830; p=0,364
MASCULINO	8,32	0,074	8,18	8,47	8,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,40	0,063	8,28	8,52	8,0	8,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL									
TOTAL	8,36	0,054	8,25	8,46	8,0	8,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=0,184; p=0,669
MASCULINO	8,34	0,078	8,19	8,49	8,0	8,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,38	0,064	8,25	8,50	8,0	8,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL									
TOTAL	8,16	0,053	8,06	8,27	8,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=0,006; p=0,938
MASCULINO	8,17	0,081	8,01	8,33	8,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,16	0,062	8,04	8,28	8,0	8,0	8,0	9,0	
APOYO SOCIAL-EMOCIONAL									
TOTAL	7,65	0,070	7,51	7,78	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=0,045; p=0,832
MASCULINO	7,63	0,096	7,46	7,81	8,0	8,0	6,0	9,0	
FEMENINO	7,66	0,087	7,49	7,83	8,0	8,0	7,0	9,0	
APOYO COMUNITARIO Y DE SERVICIOS									
TOTAL	6,34	0,097	6,15	6,53	6,0	8,0	5,0	8,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=1,892; p=0,171
MASCULINO	6,43	0,119	6,21	6,65	6,0	8,0	5,0	8,0	
FEMENINO	6,24	0,120	6,01	6,47	6,0	6,0	5,0	8,0	
PLENITUD PERSONAL									
TOTAL	7,51	0,063	7,39	7,63	8,0	8,0	6,0	9,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=1,229; p=0,269
MASCULINO	7,56	0,084	7,40	7,72	8,0	8,0	6,0	9,0	
FEMENINO	7,46	0,075	7,31	7,60	8,0	8,0	6,0	8,0	
SATISFACCIÓN ESPIRITUAL									
TOTAL	8,06	0,053	7,95	8,16	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=2,344; p=0,128
MASCULINO	7,99	0,073	7,84	8,13	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,12	0,065	8,00	8,25	8,0	8,0	7,0	9,0	
CALIDAD DE VIDA GLOBAL									
TOTAL	8,07	0,048	7,97	8,16	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=1,182; p=0,279
MASCULINO	8,12	0,070	7,98	8,25	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,02	0,062	7,90	8,14	8,0	8,0	7,0	9,0	
LIMA SUR									
PUNTAJE TOTAL									
TOTAL	7,7600	0,05444	7,6531	7,8669	7,9	8,0	7,0	8,6	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=0,017; p=0,896
MASCULINO	7,7540	0,07864	7,5986	7,9094	7,8	8,0	7,1	8,5	
FEMENINO	7,7660	0,06305	7,6415	7,8906	7,9	7,6	7,0	8,6	
BIENESTAR FÍSICO									
TOTAL	7,36	0,076	7,21	7,51	8,0	8,0	6,0	8,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=10,229; p=0,002
MASCULINO	7,55	0,100	7,35	7,75	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,17	0,089	7,00	7,35	7,0	8,0	6,0	8,0	
BIENESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL									
TOTAL	7,77	0,069	7,63	7,90	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=3,542; p=0,062
MASCULINO	7,87	0,089	7,69	8,05	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,66	0,088	7,49	7,83	8,0	8,0	7,0	9,0	

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN (ESCALA DE 1 A 10)	MEDIA	E.S.	IC 95%		MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO									
TOTAL	8,40	0,067	8,27	8,53	8,0	10,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=0,472; p=0,493
MASCULINO	8,36	0,095	8,17	8,55	8,0	8,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,44	0,078	8,28	8,59	9,0	10,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL									
TOTAL	8,36	0,072	8,22	8,50	8,0	10,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=2,553; p=0,112
MASCULINO	8,26	0,105	8,05	8,47	8,0	8,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,46	0,082	8,29	8,62	9,0	10,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL									
TOTAL	8,18	0,065	8,05	8,30	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=0,062; p=0,804
MASCULINO	8,19	0,088	8,01	8,36	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,16	0,080	8,00	8,32	8,0	8,0	7,0	9,0	
APOYO SOCIAL-EMOCIONAL									
TOTAL	7,43	0,082	7,27	7,59	8,0	8,0	6,0	9,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=2,346; p=0,128
MASCULINO	7,33	0,116	7,10	7,56	8,0	8,0	6,0	9,0	
FEMENINO	7,54	0,097	7,35	7,73	8,0	8,0	7,0	9,0	
APOYO COMUNITARIO Y DE SERVICIOS									
TOTAL	6,26	0,094	6,08	6,45	6,0	8,0	5,0	8,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=0,064; p=0,800
MASCULINO	6,29	0,137	6,01	6,56	6,0	8,0	5,0	8,0	
FEMENINO	6,24	0,114	6,02	6,47	6,0	7,0	5,0	8,0	
PLENITUD PERSONAL									
TOTAL	7,71	0,065	7,58	7,84	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=0,107; p=0,744
MASCULINO	7,73	0,096	7,54	7,92	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,69	0,079	7,54	7,85	8,0	8,0	7,0	9,0	
SATISFACCIÓN ESPIRITUAL									
TOTAL	8,04	0,062	7,92	8,16	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=10,684; p=0,001
MASCULINO	7,84	0,092	7,66	8,03	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,23	0,078	8,07	8,38	8,0	8,0	8,0	10,0	
CALIDAD DE VIDA GLOBAL									
TOTAL	8,10	0,063	7,97	8,22	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=0,063; p=0,803
MASCULINO	8,11	0,090	7,93	8,29	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,08	0,077	7,93	8,24	8,0	8,0	7,0	9,0	
CALLAO									
PUNTAJE TOTAL									
TOTAL	8,0617	0,07053	7,9232	8,2002	8,1	8,0	7,4	8,8	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,916; p=0,342
MASCULINO	8,0157	0,08569	7,8449	8,1865	8,0	8,0	7,4	8,8	
FEMENINO	8,1134	0,08731	7,9395	8,2874	8,2	8,0	7,5	8,8	
BIENESTAR FÍSICO									
TOTAL	7,78	0,103	7,58	7,98	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,880; p=0,351
MASCULINO	7,85	0,120	7,61	8,09	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,71	0,137	7,43	7,98	8,0	8,0	7,0	9,0	
BIENESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL									
TOTAL	8,13	0,085	7,96	8,30	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,230; p=0,633
MASCULINO	8,16	0,105	7,95	8,37	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,09	0,117	7,86	8,33	8,0	8,0	7,0	9,0	
AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO									
TOTAL	8,58	0,064	8,45	8,70	9,0	8,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,328; p=0,568
MASCULINO	8,55	0,082	8,38	8,71	9,0	8,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,62	0,096	8,43	8,81	9,0	8,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL									
TOTAL	8,51	0,075	8,37	8,66	9,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=1,879; p=0,175
MASCULINO	8,43	0,097	8,24	8,63	9,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,60	0,094	8,42	8,79	9,0	8,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL									
TOTAL	8,42	0,072	8,27	8,56	8,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,001; p=0,976
MASCULINO	8,41	0,090	8,23	8,59	8,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,42	0,101	8,22	8,62	8,0	8,0	8,0	9,0	

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN (ESCALA DE 1 A 10)	MEDIA	E.S.	IC 95%		MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
			INFERIOR	SUPERIOR					
APOYO SOCIAL-EMOCIONAL									
TOTAL	7,94	0,100	7,74	8,14	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=1,869; p=0,176
MASCULINO	7,85	0,126	7,59	8,10	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,04	0,119	7,81	8,28	8,0	8,0	7,0	9,0	
APOYO COMUNITARIO Y DE SERVICIOS									
TOTAL	6,75	0,144	6,46	7,03	7,0	8,0	5,0	8,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=10,492; p=0,002
MASCULINO	6,43	0,194	6,04	6,81	7,0	8,0	4,0	8,0	
FEMENINO	7,11	0,146	6,82	7,40	8,0	8,0	6,0	8,0	
PLENITUD PERSONAL									
TOTAL	7,94	0,090	7,76	8,11	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,261; p=0,611
MASCULINO	7,97	0,109	7,75	8,19	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,90	0,126	7,65	8,15	8,0	8,0	7,0	9,0	
SATISFACCIÓN ESPIRITUAL									
TOTAL	8,30	0,085	8,14	8,47	8,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,299; p=0,586
MASCULINO	8,27	0,106	8,05	8,48	8,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,34	0,114	8,12	8,57	8,0	8,0	8,0	9,0	
CALIDAD DE VIDA GLOBAL									
TOTAL	8,29	0,091	8,11	8,47	8,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,643; p=0,425
MASCULINO	8,24	0,117	8,01	8,47	8,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,34	0,100	8,14	8,54	8,0	8,0	8,0	9,0	
TOTAL									
PUNTAJE TOTAL									
TOTAL	7,9212	0,02534	7,8715	7,9710	8,0	8,0	7,2	8,7	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=1,353; p=0,245
MASCULINO	7,9468	0,03544	7,8772	8,0163	8,0	8,0	7,3	8,8	
FEMENINO	7,8976	0,03058	7,8376	7,9576	8,0	8,0	7,2	8,7	
BIENESTAR FÍSICO									
TOTAL	7,59	0,037	7,51	7,66	8,0	8,0	6,0	9,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=18,786; p=0,00002
MASCULINO	7,72	0,050	7,62	7,82	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,46	0,044	7,38	7,55	8,0	8,0	6,0	9,0	
BIENESTAR PSICOLÓGICO O EMOCIONAL									
TOTAL	7,98	0,032	7,92	8,05	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=22,780; p=<0,00001
MASCULINO	8,12	0,042	8,04	8,20	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,86	0,042	7,77	7,94	8,0	8,0	7,0	9,0	
AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO									
TOTAL	8,50	0,028	8,45	8,56	9,0	8,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=0,078; p=0,780
MASCULINO	8,50	0,039	8,42	8,57	9,0	8,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,51	0,034	8,44	8,58	9,0	8,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL									
TOTAL	8,47	0,029	8,41	8,52	9,0	8,0	8,0	10,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=1,045; p=0,307
MASCULINO	8,44	0,043	8,35	8,52	9,0	8,0	8,0	10,0	
FEMENINO	8,49	0,036	8,42	8,56	9,0	10,0	8,0	10,0	
FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL									
TOTAL	8,30	0,029	8,24	8,35	8,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=0,094; p=0,760
MASCULINO	8,31	0,041	8,22	8,39	8,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,29	0,038	8,22	8,36	8,0	8,0	8,0	9,0	
APOYO SOCIAL-EMOCIONAL									
TOTAL	7,77	0,038	7,69	7,84	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=2,431; p=0,119
MASCULINO	7,71	0,053	7,61	7,82	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,81	0,046	7,72	7,91	8,0	8,0	7,0	9,0	
APOYO COMUNITARIO Y DE SERVICIOS									
TOTAL	6,43	0,047	6,34	6,53	7,0	8,0	5,0	8,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=0,013; p=0,908
MASCULINO	6,43	0,068	6,30	6,56	7,0	8,0	5,0	8,0	
FEMENINO	6,44	0,059	6,32	6,55	7,0	8,0	5,0	8,0	
PLENITUD PERSONAL									
TOTAL	7,81	0,034	7,74	7,88	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=5,487; p=0,019
MASCULINO	7,88	0,046	7,79	7,97	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	7,75	0,043	7,66	7,83	8,0	8,0	7,0	9,0	

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN (ESCALA DE 1 A 10)	MEDIA	E.S.	IC 95%		MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
			INFERIOR	SUPERIOR					
SATISFACCIÓN ESPIRITUAL									
TOTAL	8,13	0,030	8,07	8,19	8,0	8,0	7,0	9,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=3,157; p=0,076
MASCULINO	8,08	0,043	7,99	8,16	8,0	8,0	7,0	9,0	
FEMENINO	8,17	0,039	8,10	8,25	8,0	8,0	7,0	9,0	
CALIDAD DE VIDA GLOBAL									
TOTAL	8,24	0,030	8,18	8,30	8,0	8,0	8,0	9,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=2,842; p=0,092
MASCULINO	8,28	0,041	8,20	8,36	8,0	8,0	8,0	9,0	
FEMENINO	8,19	0,038	8,12	8,27	8,0	8,0	8,0	9,0	

DISCAPACIDAD E INHABILIDAD

La discapacidad y la inhabilidad se refieren a la disminución, pérdida o ausencia de la capacidad para funcionar en el medio social y laboral. La diferencia entre ambos conceptos radica en que el primero surge como consecuencia de una enfermedad, en tanto que el segundo se debe a la falta o insuficiencia de desarrollo de habilidades.

En este informe se presentan los indicadores generales en la población adulta a través de una escala de puntuación de 5 a 20 (siendo 5 la ausencia de discapacidad), encontrándose una media de 5,22 en Lima Centro, 5,30 en Lima Norte, 5,30 en Lima Este, 5,40 en Lima Sur, 5,27 en Callao y 5,30 en total. Este resultado es ligeramente inferior a la encontrada hace 10 años, con una media de 5,7 (Tabla 26A-26B). Sobre la población que tiene al menos alguna discapacidad o inhabilidad, según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, encontramos una media de 6,4 en Lima Centro, 8,9 en Lima Norte, 12,3 en Lima Este, 15,0 en Lima Sur, 6,6 en Callao y 10,3 en total. (Tabla 27A), En los Estudios Epidemiológico Metropolitano del 2002 y de Lima Rural del 2007 se observó la presencia de al menos alguna discapacidad o inhabilidad en la población adulta de un 26,5% y un 12,3% respectivamente. El análisis de las dificultades o limitaciones específicas según sexo no muestra diferencias significativas (Tabla 27B).

TABLA 26A
NIVEL GENERAL DE DISCAPACIDAD DE LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

NIVEL GENERAL DE DISCAPACIDAD (ESCALA DE 5 A 20, DONDE 5 ES AUSENCIA DE DISCAPACIDAD)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MEDIA	5,22 (5,14-5,31)	5,30 (5,20-5,39)	5,30 (5,24-5,37)	5,40 (5,29-5,52)	5,27 (5,12-5,41)	5,30 (5,26-5,35)	$df1=4,000; df2=691,000;$ $Wald F=1,632; p=0,164$

TABLA 26B
NIVEL GENERAL DE DISCAPACIDAD DE LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN SEXO
EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

NIVEL GENERAL DE DISCAPACIDAD (ESCALA DE 5 A 20, DONDE 5 ES AUSENCIA DE DISCAPACIDAD)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA CENTRO	5,22(5,1-5,3)	0,04	5,0	5,0	5,0	5,0	$df1=1,000; df2=132,000;$ $Wald F=0,969; p=0,327$
MASCULINO	5,18(5,1-5,3)	0,06	5,0	5,0	5,0	5,0	
FEMENINO	5,26(5,1-5,4)	0,06	5,0	5,0	5,0	5,0	

NIVEL GENERAL DE DISCAPACIDAD (ESCALA DE 5 A 20, DONDE 5 ES AUSENCIA DE DISCAPACIDAD)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA NORTE	5,30(5,2-5,4)	0,05	5,0	5,0	5,0	5,0	<i>df1=1,000; df2=174,000; Wald F=2,172; p=0,142</i>
MASCULINO	5,22(5,1-5,3)	0,06	5,0	5,0	5,0	5,0	
FEMENINO	5,35(5,2-5,5)	0,07	5,0	5,0	5,0	5,0	
LIMA ESTE	5,30(5,2-5,4)	0,03	5,0	5,0	5,0	5,0	<i>df1=1,000; df2=166,000; Wald F=1,639; p=0,202</i>
MASCULINO	5,26(5,2-5,3)	0,05	5,0	5,0	5,0	5,0	
FEMENINO	5,34(5,2-5,4)	0,05	5,0	5,0	5,0	5,0	
LIMA SUR	5,40(5,3-5,5)	0,06	5,0	5,0	5,0	5,0	<i>df1=1,000; df2=148,000; Wald F=1,033; p=0,311</i>
MASCULINO	5,36(5,2-5,5)	0,08	5,0	5,0	5,0	5,0	
FEMENINO	5,45(5,3-5,6)	0,06	5,0	5,0	5,0	5,0	
CALLAO	5,27(5,1-5,4)	0,07	5,0	5,0	5,0	5,0	<i>df1=1,000; df2=73,000; Wald F=2,025; p=0,159</i>
MASCULINO	5,36(5,1-5,6)	0,12	5,0	5,0	5,0	5,0	
FEMENINO	5,17(5,0-5,3)	0,08	5,0	5,0	5,0	5,0	
TOTAL	5,30(5,3-5,3)	0,02	5,0	5,0	5,0	5,0	<i>df1=1,000; df2=694,000; Wald F=2,776; p=0,096</i>
MASCULINO	5,27(5,2-5,3)	0,03	5,0	5,0	5,0	5,0	
FEMENINO	5,34(5,3-5,4)	0,03	5,0	5,0	5,0	5,0	

TABLA 27A
AL MENOS ALGUNA DISCAPACIDAD O INHABILIDAD EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

AL MENOS ALGUNA DISCAPACIDAD O INHABILIDAD	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
TOTAL	6,4(4,6-9,0)	8,9(6,8-11,4)	12,3(10,2-14,7)	15,0(12,2-18,3)	6,6(4,3-9,9)	10,3(9,2-11,5)	<i>F=7,467; df1=3,962; df2=2749,329; p=0,00001</i>
MASCULINO	5,0(2,9-8,3)	8,3(5,3-12,8)	10,7(7,9-14,2)	13,2(9,6-17,9)	8,3(5,1-13,3)	9,4(7,9-11,2)	
FEMENINO	7,9(5,1-11,9)	9,2(6,8-12,4)	13,9(11,0-17,3)	16,7(13,4-20,7)	4,6(2,6-8,0)	11,1(9,7-12,7)	

TABLA 27B
DISCAPACIDAD O INHABILIDAD ESPECÍFICA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MANTENER REGULARMENTE EL ASEO DE SU CUERPO, SU ALIÑO O ARREGLO PERSONAL							<i>F=1,536; df1=10,789; df2=7487,445; p=0,113</i>
NINGUNA	97,2(95,6-98,3)	95,9(94,1-97,1)	97,5(96,4-98,3)	96,0(94,0-97,4)	97,1(94,9-98,4)	96,7(96,0-97,3)	
MASCULINO	99,0(96,8-99,7)	96,5(93,1-98,3)	98,0(96,5-98,8)	96,5(93,3-98,2)	96,3(92,4-98,2)	97,3(96,2-98,0)	
FEMENINO	95,6(92,7-97,4)	95,4(93,2-96,9)	97,1(95,1-98,3)	95,5(93,2-97,1)	98,1(94,5-99,3)	96,1(95,2-96,9)	
LEVE	2,2(1,3-3,7)	2,5(1,6-4,0)	1,7(1,0-2,7)	2,2(1,3-3,5)	1,0(0,4-2,5)	2,0(1,6-2,6)	
MASCULINO	0,7(0,3-2,0)	2,4(1,1-5,2)	0,9(0,4-2,4)	1,5(0,5-4,0)	1,3(0,4-4,2)	1,4(0,9-2,2)	
FEMENINO	3,6(2,0-6,5)	2,7(1,5-4,6)	2,3(1,3-4,3)	2,9(1,6-5,0)	0,7(0,2-2,8)	2,6(1,9-3,4)	
MODERADA	0,3(0,1-1,0)	1,4(0,8-2,6)	0,8(0,4-1,5)	1,5(0,7-2,9)	1,0(0,4-2,3)	1,0(0,7-1,4)	
MASCULINO	-	1,1(0,4-3,3)	1,1(0,5-2,2)	1,6(0,6-4,3)	1,6(0,6-4,0)	1,1(0,7-1,7)	
FEMENINO	0,6(0,2-1,9)	1,6(0,8-3,3)	0,5(0,1-1,5)	1,3(0,6-2,9)	0,3(0,0-2,2)	1,0(0,6-1,6)	
SEVERA O ABSOLUTA	0,3(0,1-1,1)	0,2(0,0-1,2)	0,0(0,0-0,3)	0,4(0,1-1,0)	0,8(0,2-2,8)	0,3(0,1-0,5)	
MASCULINO	0,3(0,0-2,3)	-	-	0,4(0,1-1,8)	0,8(0,2-3,7)	0,2(0,1-0,6)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,6)	0,3(0,0-2,0)	0,1(0,0-0,5)	0,3(0,1-1,3)	0,9(0,1-6,0)	0,3(0,1-0,7)	

DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE SUS OCUPACIONES (ESTUDIOS, TRABAJOS O CASA)							$F=0,597$; $df1=11,088$; $df2=7694,880$; $p=0,834$
NINGUNA	95,8(93,7-97,2)	94,2(92,0-95,8)	94,9(93,3-96,2)	94,2(92,1-95,8)	94,5(91,1-96,6)	94,7(93,8-95,4)	
MASCULINO	97,8(95,3-98,9)	95,2(91,6-97,4)	96,8(94,7-98,1)	93,9(90,4-96,2)	92,5(87,4-95,6)	95,5(94,2-96,5)	
FEMENINO	94,0(90,2-96,3)	93,4(90,4-95,5)	93,1(90,2-95,1)	94,5(92,0-96,2)	96,7(93,5-98,4)	94,0(92,7-95,0)	
LEVE	2,6(1,5-4,6)	3,1(2,0-4,8)	3,3(2,3-4,7)	3,0(1,9-4,6)	2,5(1,4-4,5)	3,0(2,4-3,7)	
MASCULINO	1,0(0,4-2,6)	2,6(1,2-5,3)	1,7(0,9-3,3)	3,6(2,1-6,1)	2,8(1,1-6,9)	2,3(1,7-3,2)	
FEMENINO	4,1(2,1-7,8)	3,5(2,1-5,8)	4,8(3,1-7,3)	2,4(1,3-4,4)	2,1(1,0-4,3)	3,6(2,7-4,6)	
MODERADA	1,3(0,7-2,4)	2,0(1,2-3,5)	1,5(0,9-2,5)	2,1(1,2-3,6)	1,9(1,0-3,8)	1,8(1,4-2,3)	
MASCULINO	0,9(0,3-2,8)	1,8(0,6-5,2)	1,5(0,7-3,1)	2,1(0,8-5,5)	3,4(1,7-6,8)	1,8(1,2-2,8)	
FEMENINO	1,7(0,8-3,6)	2,2(1,2-4,1)	1,6(0,8-3,1)	2,1(1,2-3,6)	0,3(0,0-1,9)	1,8(1,3-2,4)	
SEVERA O ABSOLUTA	0,3(0,1-1,1)	0,6(0,3-1,7)	0,3(0,1-0,7)	0,7(0,4-1,5)	1,1(0,4-3,1)	0,6(0,4-0,9)	
MASCULINO	0,3(0,0-2,3)	0,4(0,1-2,8)	-	0,4(0,1-1,8)	1,3(0,4-4,5)	0,4(0,2-0,9)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,6)	0,8(0,3-2,5)	0,6(0,2-1,4)	1,1(0,5-2,4)	0,9(0,1-6,0)	0,7(0,4-1,2)	
ASUMIR Y DESEMPEÑAR SATISFACTORIAMENTE SUS FUNCIONES COMO MADRE, PADRE, ESPOSO(A) O HIJO(A)							$F=1,894$; $df1=11,225$; $df2=7790,318$; $p=0,034$
NINGUNA	96,8(94,7-98,1)	96,6(95,0-97,7)	94,8(92,9-96,2)	93,0(90,6-94,8)	97,1(94,8-98,4)	95,5(94,7-96,2)	
MASCULINO	98,1(96,1-99,1)	97,7(94,8-99,0)	94,3(91,0-96,4)	93,7(90,1-96,0)	96,4(92,6-98,3)	95,9(94,6-96,9)	
FEMENINO	95,5(91,8-97,6)	95,8(93,5-97,3)	95,4(93,3-96,8)	92,2(89,0-94,6)	97,9(95,7-99,0)	95,1(94,0-96,1)	
LEVE	1,9(0,9-3,8)	2,1(1,2-3,5)	3,8(2,7-5,4)	4,2(2,9-6,1)	1,5(0,7-3,2)	2,8(2,3-3,5)	
MASCULINO	0,2(0,0-1,1)	1,9(0,7-5,0)	4,0(2,4-6,7)	3,9(2,1-7,1)	1,5(0,4-5,3)	2,5(1,8-3,6)	
FEMENINO	3,5(1,7-7,1)	2,2(1,2-3,9)	3,6(2,3-5,6)	4,5(2,9-7,1)	1,5(0,6-3,6)	3,2(2,4-4,1)	
MODERADA	0,8(0,3-2,2)	0,7(0,3-1,7)	0,9(0,5-1,7)	2,1(1,2-3,4)	1,0(0,4-2,5)	1,1(0,8-1,5)	
MASCULINO	0,8(0,2-2,5)	-	1,1(0,4-2,6)	1,8(0,8-4,2)	1,3(0,4-4,2)	1,0(0,6-1,6)	
FEMENINO	0,7(0,2-3,3)	1,3(0,5-2,9)	0,7(0,3-1,5)	2,3(1,3-4,1)	0,6(0,1-2,4)	1,2(0,8-1,8)	
SEVERA O ABSOLUTA	0,6(0,2-1,5)	0,6(0,2-1,5)	0,5(0,2-1,1)	0,7(0,4-1,5)	0,4(0,1-2,0)	0,6(0,4-0,9)	
MASCULINO	0,9(0,3-2,8)	0,4(0,1-1,6)	0,6(0,2-2,0)	0,6(0,2-1,9)	0,8(0,2-3,7)	0,6(0,4-1,1)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,6)	0,7(0,2-2,4)	0,3(0,1-1,0)	0,9(0,4-2,1)	-	0,5(0,3-1,0)	
RELACIONARSE CON SUS FAMILIARES, AMIGOS, VECINOS Y PERSONAS EN GENERAL							$F=2,702$; $df1=11,548$; $df2=8014,437$; $p=0,001$
NINGUNA	98,0(96,4-98,9)	98,2(97,1-98,9)	96,3(94,9-97,3)	94,5(92,5-96,0)	98,7(97,0-99,4)	97,0(96,4-97,5)	
MASCULINO	98,0(95,3-99,2)	98,9(97,1-99,6)	97,5(95,5-98,6)	95,7(93,0-97,4)	98,0(95,1-99,2)	97,6(96,7-98,2)	
FEMENINO	98,0(95,7-99,1)	97,7(96,0-98,7)	95,1(93,1-96,5)	93,3(90,3-95,4)	99,4(97,5-99,8)	96,4(95,5-97,1)	
LEVE	1,4(0,7-2,9)	1,1(0,6-2,0)	2,6(1,7-3,7)	3,7(2,6-5,3)	0,7(0,2-2,3)	2,0(1,6-2,5)	
MASCULINO	1,4(0,4-4,1)	0,9(0,3-2,8)	1,8(0,9-3,7)	3,6(2,1-6,2)	0,8(0,2-3,4)	1,8(1,2-2,6)	
FEMENINO	1,5(0,6-3,8)	1,2(0,6-2,6)	3,3(2,2-5,0)	3,8(2,3-6,2)	0,6(0,2-2,5)	2,2(1,7-2,9)	
MODERADA	0,3(0,1-0,9)	0,5(0,2-1,2)	0,9(0,5-1,6)	1,4(0,8-2,5)	0,6(0,2-2,0)	0,8(0,5-1,1)	
MASCULINO	-	0,2(0,0-1,5)	0,6(0,2-1,4)	0,3(0,0-1,9)	1,2(0,4-3,8)	0,4(0,2-0,8)	
FEMENINO	0,5(0,2-1,8)	0,6(0,2-1,9)	1,2(0,5-2,7)	2,6(1,5-4,6)	-	1,1(0,7-1,6)	
SEVERA O ABSOLUTA	0,3(0,1-1,2)	0,2(0,1-1,0)	0,3(0,1-0,9)	0,4(0,1-1,0)	-	0,3(0,1-0,5)	
MASCULINO	0,6(0,2-2,5)	-	0,2(0,0-1,1)	0,4(0,1-1,8)	-	0,2(0,1-0,6)	
FEMENINO	-	0,4(0,1-1,8)	0,4(0,1-1,3)	0,3(0,1-1,4)	-	0,3(0,1-0,6)	
PLANIFICAR SUS ACTIVIDADES, LUEGO ORGANIZARLAS Y EJECUTARLAS							$F=1,413$; $df1=11,129$; $df2=7723,487$; $p=0,158$
NINGUNA	97,5(96,0-98,4)	95,6(93,8-96,9)	94,5(92,9-95,7)	95,7(93,9-96,9)	97,0(94,8-98,3)	95,8(95,1-96,5)	
MASCULINO	97,7(95,3-98,9)	96,2(92,8-98,1)	95,3(93,0-96,9)	96,3(93,7-97,9)	96,9(93,3-98,6)	96,4(95,3-97,2)	
FEMENINO	97,2(94,8-98,5)	95,2(92,9-96,8)	93,6(91,2-95,4)	95,0(92,6-96,7)	97,1(94,0-98,6)	95,3(94,3-96,2)	
LEVE	1,5(0,8-2,8)	2,7(1,7-4,2)	3,8(2,8-5,2)	2,7(1,7-4,1)	1,1(0,6-2,2)	2,6(2,1-3,2)	
MASCULINO	1,4(0,5-3,7)	2,8(1,2-6,1)	3,1(1,7-5,3)	1,8(0,7-4,3)	1,0(0,3-2,8)	2,2(1,5-3,1)	
FEMENINO	1,6(0,7-3,7)	2,6(1,5-4,5)	4,6(3,2-6,6)	3,6(2,2-5,9)	1,3(0,5-3,1)	3,0(2,3-3,8)	
MODERADA	0,6(0,2-1,7)	1,5(0,8-2,6)	1,5(1,0-2,3)	1,2(0,7-2,1)	1,5(0,7-3,2)	1,3(1,0-1,7)	
MASCULINO	0,3(0,0-2,0)	1,0(0,3-3,4)	1,4(0,7-2,6)	1,5(0,7-3,3)	1,5(0,5-4,0)	1,1(0,7-1,7)	
FEMENINO	0,9(0,3-3,0)	1,89(0,9-3,5)	1,6(0,9-3,0)	0,9(0,4-1,9)	1,6(0,5-5,1)	1,4(1,0-2,0)	
SEVERA O ABSOLUTA	0,4(0,1-1,3)	0,2(0,1-1,0)	0,2(0,1-0,6)	0,5(0,2-1,1)	0,3(0,0-2,2)	0,3(0,2-0,5)	
MASCULINO	0,6(0,2-2,4)	-	0,3(0,1-1,0)	0,4(0,1-1,8)	0,6(0,1-4,2)	0,3(0,2-0,7)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,6)	0,4(0,1-1,8)	0,2(0,0-1,1)	0,5(0,2-1,4)	-	0,3(0,1-0,6)	

ASPECTOS PSICOPÁTICOS

El clima de paz y tranquilidad que debe existir entre los ciudadanos se ve afectado cuando la persona quiebra sistemáticamente las reglas y leyes que la sociedad establece. Si bien existe una personalidad definidamente antisocial, cuyas causas se han relacionado hasta con factores genéticos, en esta ocasión se evalúan tendencias más sutiles y sensibles a los cambios e influencias de la sociedad. La permisividad frente a la psicopatía, se presenta según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, en 4,5% en Lima Centro, 4,8% en Lima Norte, 4,6% en Lima Este, 5,2% en Lima Sur, 5,7% en Callao y en 4,9% en total. Esta permisividad se ha medido a través de la tolerancia de las personas hacia conductas delictivas como el robo; así se observa que el 2,6% en Lima Centro, 1,9% en Lima Norte, 1,7% en Lima Este, 2,4% en Lima Sur, 2,8% en Callao y 2,2% del total de adultos, ante el robo no le importa y no hace nada. (Tabla 28A). La permisividad hallada en el Estudio Epidemiológico Metropolitano del 2002 fue de un 10,6%, y en el de Lima Rural del 2007 fue de un 9,2%.

En cuanto a las tendencias psicopáticas, según áreas poblacionales el 4,1% en Lima Centro, 4,9% en Lima Norte, 6,7% en Lima Este, 5,3% en Lima Sur, 6,1% en Callao y 5,4% en total de la población es permisivos la mentira frecuente o el robo. Estos resultados son bastante menores a los encontrados en el 2002, cuando la prevalencia de tendencias psicopáticas era del 15,4% (Tabla 28B).

TABLA 28A
PERMISIVIDAD FRENTE A LA PSICOPATÍA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ASPECTOS PSICOPÁTICOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PERMISIVIDAD FRENTE A LA PSICOPATÍA*							
TOTAL	4,5(3,0-6,8)	4,8(3,4-6,7)	4,6(3,5-6,1)	5,2(3,7-7,2)	5,7(3,8-8,5)	4,9(4,2-5,7)	$F=0,220$; $df1=3,898$; $df2=2705,396$; $p=0,924$
MASCULINO	6,4(3,7-10,8)	7,5(4,8-11,6)	4,9(3,3-7,3)	4,6(2,8-7,5)	6,4(3,9-10,4)	5,9(4,7-7,3)	
FEMENINO	2,7(1,5-5,0)	2,8(1,7-4,7)	4,3(3,0-6,3)	5,7(3,7-8,7)	4,9(2,5-9,5)	3,9(3,2-4,9)	
ANTE ROBO, NO LE IMPORTA Y NO HACE NADA							
TOTAL	2,6(1,5-4,5)	1,9(1,0-3,5)	1,7(1,1-2,7)	2,4(1,4-3,9)	2,8(1,5-5,2)	2,2(1,7-2,8)	$F=2,757$; $df1=22,102$; $df2=15339,031$; $p=0,00002$
MASCULINO	3,9(1,9-7,6)	3,1(1,4-6,5)	1,8(0,9-3,4)	2,8(1,4-5,5)	2,5(1,0-6,0)	2,8(2,0-3,8)	
FEMENINO	1,4(0,6-3,5)	1,0(0,4-2,6)	1,7(0,8-3,2)	2,0(1,0-3,8)	3,2(1,2-7,9)	1,6(1,1-2,4)	
CONSIDERA PERMITIDO ANTE DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS EL ROBO							
TOTAL	2,3(1,3-3,9)	3,1(2,0-4,7)	3,1(2,2-4,5)	2,8(1,8-4,4)	2,9(1,7-4,8)	2,9(2,3-3,5)	$F=2,300$; $df1=7,380$; $df2=5121,787$; $p=0,022$
MASCULINO	2,8(1,4-5,7)	4,8(2,7-8,4)	3,6(2,2-5,8)	1,8(0,9-3,7)	3,9(2,1-7,1)	3,4(2,6-4,5)	
FEMENINO	1,8(0,8-3,9)	1,8(1,0-3,3)	2,7(1,7-4,3)	3,8(2,1-6,6)	1,8(0,7-4,4)	2,4(1,8-3,2)	

* Se refiere a que, si el entrevistado ve a una persona robando en una tienda o puesto de mercado, no le importa y no hace nada, o considerar que ante determinadas circunstancias o situaciones difíciles es permitido robar.

TABLA 28B
ALGUNAS TENDENCIAS PSICOPÁTICAS EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ASPECTOS PSICOPÁTICOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
OBTENCIÓN DE OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADOS							$F=1,694$; $df1=13,344$; $df2=9260,819$; $p=0,053$
NUNCA	94,0(91,0-96,1)	89,5(86,4-91,9)	90,4(88,1-92,2)	91,5(89,3-93,2)	89,3(84,7-92,7)	90,9(89,7-92,0)	
MASCULINO	90,5(84,7-94,2)	82,9(77,4-87,3)	85,6(81,8-88,7)	88,3(84,3-91,3)	84,2(76,7-89,6)	86,2(84,1-88,1)	
FEMENINO	97,4(95,2-98,6)	94,3(91,5-96,2)	95,1(92,9-96,6)	94,7(92,3-96,4)	95,1(91,2-97,3)	95,2(94,1-96,1)	
RARA VEZ	5,1(3,2-8,0)	9,0(6,8-11,8)	7,4(5,7-9,5)	7,4(5,7-9,4)	7,9(5,3-11,5)	7,5(6,5-8,6)	
MASCULINO	8,6(5,1-14,2)	13,8(9,9-18,9)	10,9(8,2-14,3)	9,8(7,1-13,5)	10,6(6,5-16,9)	10,9(9,3-12,8)	
FEMENINO	1,8(0,9-3,5)	5,4(3,5-8,2)	4,0(2,6-6,0)	4,9(3,2-7,2)	4,8(2,6-8,7)	4,3(3,4-5,3)	

ASPECTOS PSICOPÁTICOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA	
OCASIONALMENTE	0,9(0,4-2,0)	1,4(0,7-2,8)	2,2(1,4-3,3)	0,8(0,4-1,8)	1,7(0,7-4,0)	1,4(1,0-1,9)	F=1,783; df1=14,289; df2=9916,911; p=0,034	
MASCULINO	0,9(0,3-3,1)	2,9(1,3-6,0)	3,4(2,1-5,4)	1,5(0,6-3,4)	3,1(1,3-7,5)	2,4(1,7-3,3)		
FEMENINO	0,8(0,3-2,5)	0,3(0,1-1,2)	1,0(0,4-2,2)	0,2(0,0-0,7)	0,1(0,0-1,0)	0,5(0,3-0,9)		
FRECUENTEMENTE	-	0,2(0,0-1,2)	0,0(0,0-0,2)	0,3(0,1-1,0)	1,1(0,4-3,2)	0,2(0,1-0,5)		
MASCULINO	-	0,4(0,1-2,8)	0,1(0,0-0,4)	0,4(0,1-1,7)	2,1(0,7-5,8)	0,4(0,2-1,0)		
FEMENINO	-	-	-	0,2(0,0-1,6)	-	0,0(0,0-0,3)		
MUY FRECUENTEMENTE	-	-	0,1(0,0-0,5)	-	-	0,0(0,0-0,1)		
MASCULINO	-	-	0,1(0,0-1,0)	-	-	0,0(0,0-0,3)		
FEMENINO	-	-	-	-	-	-		
MENTIRA FRECUENTE EN LA ADULTEZ								F=2,464; df1=10,402; df2=7219,184; p=0,005
NUNCA	35,8(30,9-41,0)	32,6(28,8-36,6)	32,4(29,6-35,5)	40,7(36,8-44,7)	39,3(34,3-44,6)	35,5(33,7-37,4)		
MASCULINO	37,1(30,8-43,9)	26,8(21,9-32,5)	24,5(21,1-28,3)	36,5(31,4-42,0)	34,3(27,9-41,4)	31,0(28,7-33,5)		
FEMENINO	34,6(28,4-41,5)	36,8(31,7-42,3)	40,2(36,5-44,1)	44,9(39,8-50,1)	45,0(39,1-51,0)	39,7(37,2-42,1)		
RARA VEZ	53,4(48,5-58,2)	57,9(53,9-61,8)	57,4(54,3-60,5)	49,4(45,5-53,3)	47,5(42,2-52,8)	54,1(52,3-56,0)		
MASCULINO	52,4(46,1-58,7)	61,8(55,5-67,8)	65,0(60,9-68,9)	54,1(48,7-59,5)	51,2(43,4-58,9)	58,0(55,4-60,6)		
FEMENINO	54,3(47,4-61,0)	55,0(50,1-59,9)	50,0(46,1-54,0)	44,6(39,6-49,7)	43,4(37,2-49,7)	50,5(48,1-52,9)		
OCASIONALMENTE	9,4(7,1-12,4)	8,5(6,5-11,0)	8,9(7,3-10,8)	8,6(6,3-11,5)	12,0(8,7-16,3)	9,1(8,1-10,3)		
MASCULINO	9,9(6,7-14,4)	9,8(6,8-13,9)	9,3(6,9-12,5)	7,8(5,1-11,8)	13,4(9,1-19,2)	9,7(8,2-11,4)		
FEMENINO	8,9(6,0-13,0)	7,5(5,2-10,7)	8,4(6,5-10,8)	9,3(6,6-12,9)	10,4(6,5-16,3)	8,6(7,3-10,1)		
FRECUENTEMENTE	1,3(0,6-2,6)	0,9(0,4-2,1)	1,2(0,7-2,1)	1,0(0,5-1,9)	1,0(0,3-2,7)	1,1(0,8-1,5)		
MASCULINO	0,6(0,1-2,2)	1,3(0,4-4,3)	1,2(0,5-2,9)	1,1(0,4-2,8)	1,2(0,3-4,7)	1,1(0,7-1,8)		
FEMENINO	2,0(0,9-4,4)	0,6(0,2-1,7)	1,3(0,6-2,6)	0,9(0,4-2,1)	0,7(0,2-2,9)	1,1(0,7-1,6)		
MUY FRECUENTEMENTE	0,1(0,0-0,7)	0,1(0,0-0,6)	0,0(0,0-0,2)	0,4(0,1-1,4)	0,2(0,0-1,4)	0,2(0,1-0,3)		
MASCULINO	-	0,2(0,0-1,5)	-	0,4(0,1-2,7)	-	0,1(0,0-0,6)		
FEMENINO	0,2(0,0-1,4)	-	0,1(0,0-0,4)	0,4(0,1-2,0)	0,4(0,1-3,0)	0,2(0,1-0,5)		
VENTA DE OBJETO DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADOS							F=1,137; df1=3,760; df2=2609,687; p=0,337	
NUNCA	96,6(94,8-97,8)	93,9(91,4-95,6)	96,9(95,8-97,8)	97,2(95,8-98,2)	95,5(92,8-97,2)	96,0(95,2-96,7)		
MASCULINO	97,3(94,9-98,6)	90,6(85,7-94,0)	95,1(92,9-96,6)	95,6(92,8-97,3)	94,1(89,6-96,7)	94,4(92,9-95,6)		
FEMENINO	96,1(93,2-97,7)	96,2(93,7-97,8)	98,7(97,5-99,4)	99,0(97,4-99,6)	97,2(92,7-98,9)	97,4(96,5-98,1)		
RARA VEZ	3,1(2,0-4,8)	5,4(3,8-7,6)	2,1(1,5-3,2)	1,7(1,0-2,9)	3,1(1,7-5,4)	3,2(2,6-3,9)		
MASCULINO	2,7(1,4-5,1)	7,9(5,0-12,2)	3,6(2,3-5,5)	2,9(1,6-5,3)	3,3(1,6-6,9)	4,3(3,3-5,5)		
FEMENINO	3,4(1,9-6,0)	3,6(2,1-6,0)	0,7(0,3-1,7)	0,4(0,1-1,6)	2,8(1,1-7,3)	2,2(1,6-3,1)		
OCASIONALMENTE	0,3(0,0-1,9)	0,2(0,1-0,8)	0,8(0,4-1,6)	0,5(0,1-1,6)	1,4(0,5-3,9)	0,6(0,3-0,9)		
MASCULINO	-	0,5(0,1-1,9)	1,2(0,5-2,6)	0,6(0,1-2,8)	2,6(0,9-7,2)	0,8(0,5-1,5)		
FEMENINO	0,5(0,1-3,7)	-	0,5(0,2-1,7)	0,4(0,1-2,5)	-	0,3(0,1-0,7)		
FRECUENTEMENTE	-	0,5(0,2-1,4)	0,1(0,0-0,4)	0,3(0,1-0,9)	-	0,2(0,1-0,5)		
MASCULINO	-	1,0(0,3-3,1)	0,2(0,0-0,7)	0,4(0,1-1,7)	-	0,4(0,2-0,8)		
FEMENINO	-	0,2(0,0-1,1)	-	0,2(0,1-0,9)	-	0,1(0,0-0,3)		
MUY FRECUENTEMENTE	-	-	-	0,3(0,1-1,2)	-	0,1(0,0-0,2)		
MASCULINO	-	-	-	0,5(0,1-2,2)	-	0,1(0,0-0,5)		
FEMENINO	-	-	-	-	-	-		
PREVALENCIA DE TENDENCIAS PSICOPÁTICAS**							F=1,137; df1=3,760; df2=2609,687; p=0,337	
TOTAL	4,1(2,7-6,2)	4,9(3,3-7,3)	6,7(5,2-8,6)	5,3(4,0-7,0)	6,1(4,0-9,1)	5,4(4,6-6,3)		
MASCULINO	2,9(1,3-6,4)	7,6(4,8-11,9)	9,7(7,1-13,2)	6,8(4,7-9,7)	9,3(6,1-14,0)	7,3(6,1-8,9)		
FEMENINO	5,2(3,1-8,3)	3,0(1,6-5,6)	3,6(2,5-5,3)	3,7(2,4-5,9)	2,4(0,8-7,3)	3,6(2,8-4,6)		

** Se refiere a haber adquirido al menos ocasionalmente objetos de muy dudosa procedencia o robados, a haber participado en un robo alguna vez, mentir mucho, frecuentemente o muy frecuentemente o a haber ganado dinero al menos ocasionalmente vendiendo cosas de dudosa procedencia o robadas.

INDICADORES SUICIDAS

Observamos que la prevalencia anual de deseos de morir es mayor en el sexo femenino con un 6,0% en Lima Centro, 5,3% en Lima Norte, 7,6% en Lima Este, 8,5% en Lima Sur, 7,9% en Callao y 6,8% en total, en comparación a lo mostrado por los varones con un 2,2% del total de adultos encuestados.

Esto es congruente con los hallazgos de estados anímicos prevalentes y con la presencia de trastornos clínicos, como veremos más adelante. En relación a la prevalencia de vida de deseos de morir, tenemos que el 16,7% en Lima Centro, 22,7% en Lima Norte, 26,9% en Lima Este, 26,8% en Lima Sur, 21,3% en Callao y el 23,4% en total de la población adulta han manifestado alguna vez en su vida deseos de morir; el 4,2% en Lima Centro, 4,1% en Lima Norte, 5,1% en Lima Este, 5,1% en Lima Sur, 4,4% en Callao y el 4,6% en total lo ha considerado en el último año, mientras que un 0,6% en Lima Centro, 1,3% en Lima Norte, 2,3% en Lima Este, 1,1% en Lima Sur, 1,0% en Callao y el 1,3% en total, en el último mes. Con relación a ideas suicidas más definidas, el 5,7% en Lima Centro, 7,7% en Lima Norte, 11,1% en Lima Este, 10,1% en Lima Sur, 9,7% en Callao y el 8,9% en total ha tenido alguna vez en su vida pensamientos de quitarse la vida y, el 2,4% en Lima Centro, 3,3% en Lima Norte, 3,9% en Lima Este, 4,4% en Lima Sur, 3,1% en Callao y 3,5% en total, planes suicidas. En cuanto a la conducta suicida, o intento suicida, indicador más objetivo con impacto familiar y económico, el 2,1% en Lima Centro, 3,4% en Lima Norte, 2,9% en Lima Este, 2,6% en Lima Sur, 3,0% en Callao y el 2,8% en total ha intentado suicidarse alguna vez en su vida, mientras que el 0,4% en Lima Centro, 0,2% en Lima Norte, 0,5% en Lima Este, 0,7% en Lima Sur, 0,1% en Callao y el 0,4% en total lo ha intentado en el último año. Esta última cifra, debido al tamaño de la muestra y al nivel de precisión, debe ser tomada con cautela; sin embargo, es clara la tendencia. De las personas que intentaron suicidarse, un 4,76% en Lima Centro, 8,82% en Lima Norte, 3,45% en Lima Este, 3,85% en Lima Sur, y el 3,57% en total considera todavía dicha conducta como una posibilidad de solución a sus problemas. (Tabla 29). Es importante señalar que nuestra población rural muestra cifras más altas sobre estos indicadores suicidas, según el Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Lima Rural del año 2007, con excepción de la prevalencia de pensamientos de quitarse la vida, planes suicida o el haber intentado suicidarse alguna vez en su vida. Se puede observar una mejora sobre la situación encontrada en el 2002, en donde se observaba que el 30,3% de la población adulta de Lima Metropolitana y Callao, había pensado alguna vez en quitarse la vida y el 5,2% lo había intentado. Asimismo, el índice de potencialidad suicida pasó de 0,6 en el 2002 a 0,1 en el 2012 de total de la población, es decir, que en el 2002, un 11,6% de las personas que habían intentado suicidarse aún consideraban esta conducta como una solución, mientras que en el 2012 del total de los adultos, solo un 3,6% lo consideraba como posibilidad.

TABLA 29
INDICADORES SUICIDAS EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

INDICADORES SUICIDAS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA DE VIDA DE DESEOS DE MORIR							
TOTAL	16,7(13,1-21,0)	22,7(19,3-26,4)	26,9(24,1-29,8)	26,8(23,8-30,0)	21,3(18,2-24,8)	23,4(21,9-25,0)	$F=5,661; df1=3,570;$ $df2=2477,367; p=0,00030$
MASCULINO	8,0(4,9-12,7)	16,3(11,9-21,9)	19,0(15,4-23,3)	17,5(13,8-22,0)	14,0(10,5-18,3)	15,5(13,7-17,6)	
FEMENINO	25,0(19,4-31,5)	27,3(23,1-32,1)	34,6(30,7-38,7)	36,2(32,1-40,6)	29,7(23,9-36,1)	30,6(28,5-32,9)	
PREVALENCIA ANUAL DE DESEOS DE MORIR							
TOTAL	4,2(2,4-7,3)	4,1(2,8-5,9)	5,1(3,9-6,7)	5,1(3,8-6,9)	4,4(2,8-7,0)	4,6(3,9-5,4)	$F=0,344; df1=3,556;$ $df2=2467,611; p=0,827$
MASCULINO	2,4(0,7-7,9)	2,5(1,1-5,6)	2,6(1,4-4,8)	1,8(0,7-4,7)	1,4(0,5-3,6)	2,2(1,5-3,3)	
FEMENINO	6,0(3,3-10,7)	5,3(3,6-7,7)	7,6(5,6-10,1)	8,5(6,4-11,2)	7,9(4,7-12,9)	6,8(5,7-8,1)	
PREVALENCIA MENSUAL DE DESEOS DE MORIR							
TOTAL	0,6(0,3-1,5)	1,3(0,6-2,8)	2,3(1,5-3,4)	1,1(0,6-1,9)	1,0(0,4-2,4)	1,3(1,0-1,8)	$F=2,185; df1=3,503;$ $df2=2431,140; p=0,077$
MASCULINO	0,3(0,1-1,2)	1,0(0,2-4,6)	0,5(0,2-1,5)	-	0,3(0,0-2,1)	0,4(0,2-1,1)	
FEMENINO	0,9(0,3-2,6)	1,6(0,7-3,6)	4,0(2,5-6,1)	2,2(1,2-3,8)	1,8(0,7-4,7)	2,2(1,6-2,9)	
PREVALENCIA DE VIDA DE PENSAMIENTOS DE QUITARSE LA VIDA							
TOTAL	5,7(3,8-8,5)	7,7(5,8-10,2)	11,1(9,3-13,3)	10,1(8,2-12,5)	9,7(7,2-13,1)	8,9(8,0-10,0)	$F=3,371; df1=3,795;$ $df2=2633,844; p=0,011$
MASCULINO	1,3(0,5-3,6)	6,1(3,4-10,7)	8,4(6,1-11,6)	5,8(3,6-9,3)	6,1(3,5-10,3)	5,8(4,6-7,3)	
FEMENINO	9,8(6,6-14,4)	8,9(6,5-12,0)	13,7(11,1-16,8)	14,5(11,8-17,7)	13,9(9,3-20,1)	11,8(10,4-13,4)	
PREVALENCIA ANUAL DE PENSAMIENTOS DE QUITARSE LA VIDA							
TOTAL	1,5(0,7-3,5)	2,1(1,2-3,7)	2,9(2,0-4,1)	1,9(1,1-3,0)	2,3(1,4-3,8)	2,2(1,7-2,7)	$F=0,781; df1=3,548;$ $df2=2462,324; p=0,524$
MASCULINO	0,6(0,1-2,7)	1,8(0,6-5,6)	2,0(1,0-3,8)	0,3(0,0-2,1)	0,4(0,1-2,6)	1,1(0,6-2,0)	
FEMENINO	2,5(1,2-5,2)	2,3(1,2-4,3)	3,8(2,4-5,9)	3,5(2,1-5,7)	4,4(2,6-7,6)	3,1(2,4-4,0)	

INDICADORES SUICIDAS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA MENSUAL DE PENSAMIENTOS DE QUITARSE LA VIDA							
TOTAL	0,2(0,1-0,9)	1,0(0,4-2,7)	0,9(0,5-1,6)	0,2(0,1-1,0)	0,5(0,1-1,6)	0,6(0,4-1,0)	$F=1,700; df1=3,372; df2=2340,361; p=0,158$
MASCULINO	-	1,3(0,3-5,3)	0,4(0,1-1,5)	0,3(0,0-2,1)	0,4(0,1-2,6)	0,5(0,2-1,3)	
FEMENINO	0,4(0,1-1,8)	0,8(0,2-3,2)	1,4(0,7-2,6)	0,2(0,0-1,3)	0,6(0,1-2,6)	0,7(0,4-1,3)	
PREVALENCIA DE VIDA DE PLANES DE ÍNDOLE SUICIDA							
TOTAL	2,4(1,4-4,1)	3,3(2,2-5,0)	3,9(2,8-5,4)	4,4(3,2-6,0)	3,1(1,9-5,2)	3,5(2,9-4,2)	$F=1,078; df1=3,885; df2=2696,179; p=0,365$
MASCULINO	0,3(0,1-1,4)	1,5(0,5-4,3)	3,0(1,7-5,4)	1,9(0,9-4,1)	1,3(0,3-5,4)	1,8(1,2-2,6)	
FEMENINO	4,3(2,5-7,5)	4,6(2,9-7,1)	4,8(3,4-6,7)	6,8(4,9-9,5)	5,3(3,1-8,9)	5,1(4,2-6,2)	
PREVALENCIA ANUAL DE PLANES DE ÍNDOLE SUICIDA							
TOTAL	0,7(0,2-2,0)	0,9(0,4-2,3)	0,9(0,5-1,6)	1,0(0,5-1,9)	0,4(0,1-1,7)	0,8(0,6-1,2)	$F=0,332; df1=3,668; df2=2545,549; p=0,841$
MASCULINO	-	-	0,8(0,3-2,0)	0,3(0,0-2,1)	-	0,3(0,1-0,6)	
FEMENINO	1,3(0,4-3,7)	1,6(0,7-3,9)	1,1(0,6-2,1)	1,6(0,8-3,3)	0,9(0,2-3,7)	1,4(0,9-2,1)	
PREVALENCIA MENSUAL DE PLANES DE ÍNDOLE SUICIDA							
TOTAL	0,1(0,0-0,8)	0,4(0,1-1,8)	0,2(0,1-0,7)	0,1(0,0-1,1)	-	0,2(0,1-0,5)	$F=0,751; df1=3,122; df2=2166,333; p=0,527$
MASCULINO	-	-	0,0(0,0-0,3)	0,3(0,0-2,1)	-	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,6)	0,8(0,2-3,2)	0,4(0,1-1,4)	-	-	0,4(0,1-1,0)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONDUCTAS SUICIDAS							
TOTAL	2,1(1,2-3,7)	3,4(2,3-4,9)	2,9(1,9-4,2)	2,6(1,6-4,2)	3,0(1,8-4,9)	2,8(2,3-3,5)	$F=0,542; df1=3,915; df2=2716,768; p=0,701$
MASCULINO	0,3(0,1-1,3)	2,4(1,0-5,5)	2,2(1,1-4,4)	2,3(0,9-5,5)	2,2(0,8-5,5)	1,9(1,3-2,9)	
FEMENINO	3,9(2,3-6,6)	4,1(2,7-6,1)	3,5(2,4-5,1)	3,0(1,8-4,9)	3,9(2,1-7,1)	3,7(3,0-4,6)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONDUCTAS SUICIDAS							
TOTAL	0,4(0,1-1,8)	0,2(0,1-0,9)	0,5(0,2-1,2)	0,7(0,3-1,6)	0,1(0,0-0,5)	0,4(0,2-0,7)	$F=0,932; df1=3,319; df2=2303,232; p=0,431$
MASCULINO	-	-	0,4(0,1-1,8)	-	-	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	0,8(0,2-3,4)	0,4(0,1-1,6)	0,7(0,3-1,7)	1,3(0,5-3,3)	0,1(0,0-1,0)	0,7(0,4-1,2)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONDUCTAS SUICIDAS							
TOTAL	-	-	0,1(0,0-0,7)	-	0,1(0,0-0,5)	0,0(0,0-0,1)	$F=0,457; df1=2,928; df2=2032,354; p=0,708$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	-	0,2(0,0-1,3)	-	0,1(0,0-1,0)	0,1(0,0-0,3)	
PREVALENCIA DE LA POTENCIALIDAD SUICIDA							
TOTAL	0,1(0,0-0,5) (4,76% INTENTOS)	0,3(0,1-1,0) (8,82% INTENTOS)	0,1(0,0-0,4) (3,45% INTENTOS)	0,1(0,0-0,5) (3,85% INTENTOS)	-	0,1(0,1-0,3) (3,57% INTENTOS)	$F=1,406; df1=3,418; df2=2371,965; p=0,235$
MASCULINO	0,1(0,0-1,0)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	
FEMENINO	-	0,5(0,2-1,7)	0,2(0,1-0,9)	0,1(0,0-0,9)	-	0,2(0,1-0,6)	

Se observa en la Tabla 30A que los principales motivos de deseos, pensamientos y planes suicidas son, en orden de frecuencia: problemas con la pareja con un 29,3%, problemas con los padres con un 19,0% y dificultades económicas con un 12,5% (Tabla 30A). Sobre los principales motivos de intento suicida son: problemas de pareja y separación de la pareja o cónyuge, problemas con los padres, problemas con la salud física y experiencias traumáticas. En el sexo femenino, los motivos de intento suicida se relacionan principalmente con problemas con la pareja, seguido con los problemas con los padres. En los hombres, la distribución es más heterogénea, siendo la causa más frecuente los problemas con la pareja o cónyuge. Cabe resaltar que en el 2002 un motivo importante lo constituían los problemas económicos. (Tabla 30B).

TABLA 30A
MOTIVOS DEL DESEO DE MORIR, DE LOS PENSAMIENTOS, PLANES E INTENTOS SUICIDAS EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

MOTIVOS	MOTIVOS DE DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
PROBLEMAS CON LA AUTOIMAGEN							F=1,473; df1=3,652; df2=2534,766; p=0,212
TOTAL	2,7(1,0-7,4)	1,5(0,5-4,6)	1,3(0,5-3,3)	0,2(0,0-1,4)	0,7(0,1-4,5)	1,2(0,7-2,1)	
MASCULINO	3,6(0,5-22,3)	1,3(0,2-8,6)	-	-	-	0,6(0,2-2,6)	
FEMENINO	2,4(0,7-8,1)	1,6(0,4-6,0)	2,0(0,7-5,2)	0,3(0,0-2,2)	1,0(0,1-6,8)	1,4(0,8-2,7)	

MOTIVOS	MOTIVOS DE DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
PROBLEMAS CON LOS PADRES							F=1,686; df1=3,804; df2=2639,664; p=0,154
TOTAL	19,3(12,2-29,1)	19,1(13,4-26,3)	20,3(16,3-24,9)	21,7(16,9-27,3)	8,7(4,5-16,4)	19,0(16,5-21,8)	
MASCULINO	26,1(11,3-49,3)	25,8(14,5-41,6)	19,3(12,5-28,5)	19,8(11,6-31,8)	8,8(3,1-22,4)	20,4(15,6-26,2)	
FEMENINO	17,2(9,9-28,1)	16,1(10,3-24,4)	20,9(16,0-26,7)	22,5(16,8-29,6)	8,7(3,9-18,2)	18,3(15,4-21,7)	
PROBLEMAS CON LOS HIJOS							F=1,561; df1=3,592; df2=2492,533; p=0,188
TOTAL	7,3(3,0-16,9)	3,0(1,3-6,7)	2,0(1,0-4,2)	4,2(2,3-7,7)	6,8(2,2-19,1)	3,9(2,7-5,7)	
MASCULINO	-	-	0,4(0,1-2,6)	3,6(0,8-15,3)	0,9(0,1-6,1)	1,1(0,3-3,8)	
FEMENINO	9,6(3,8-21,8)	4,3(1,9-9,4)	2,9(1,4-6,1)	4,5(2,4-8,3)	10,1(3,2-28,0)	5,3(3,6-7,7)	
PROBLEMAS CON OTROS PARIENTES							F=2,207; df1=3,493; df2=2424,133; p=0,075
TOTAL	6,8(3,2-14,0)	10,2(6,0-16,8)	5,0(3,2-7,6)	6,0(3,5-10,2)	2,5(1,0-6,0)	6,6(5,0-8,6)	
MASCULINO	3,7(0,5-22,8)	4,5(1,3-14,5)	4,2(1,8-9,4)	6,9(2,8-15,9)	1,2(0,2-8,3)	4,5(2,7-7,6)	
FEMENINO	7,8(3,4-16,7)	12,7(7,0-21,7)	5,4(3,1-9,0)	5,6(2,8-11,0)	3,3(1,2-8,5)	7,5(5,4-10,4)	
PROBLEMAS CON LA PAREJA O CÓNYUGE							F=0,264; df1=3,783; df2=2625,067; p=0,892
TOTAL	27,3(18,5-38,2)	27,9(21,3-35,6)	31,5(26,6-36,8)	28,7(23,6-34,5)	30,9(22,4-40,9)	29,3(26,3-32,5)	
MASCULINO	10,7(2,6-34,9)	20,9(10,6-36,9)	26,3(17,6-37,3)	16,4(9,6-26,8)	17,2(9,1-30,2)	20,1(15,3-25,9)	
FEMENINO	32,4(22,3-44,4)	30,9(23,2-39,9)	34,3(28,2-40,9)	34,6(28,2-41,7)	38,6(26,9-51,8)	33,6(29,9-37,5)	
PROBLEMAS CON LAS AMISTADES							F=0,764; df1=3,484; df2=2417,595; p=0,532
TOTAL	-	-	0,9(0,2-3,5)	1,1(0,3-4,7)	1,1(0,3-4,4)	0,6(0,3-1,5)	
MASCULINO	-	-	1,4(0,2-9,5)	3,5(0,8-13,4)	-	1,3(0,4-4,0)	
FEMENINO	-	-	0,6(0,1-4,0)	-	1,7(0,4-6,8)	0,3(0,1-1,1)	
PROBLEMAS LABORALES							F=1,188; df1=3,902; df2=2707,846; p=0,314
TOTAL	1,3(0,3-5,6)	3,7(2,0-6,9)	2,1(0,9-4,6)	3,4(1,6-7,0)	0,7(0,1-4,8)	2,6(1,7-3,8)	
MASCULINO	3,9(0,6-22,4)	5,3(2,1-12,7)	4,9(1,9-12,0)	3,6(1,2-10,4)	-	4,0(2,4-6,9)	
FEMENINO	0,4(0,1-3,1)	3,0(1,2-7,2)	0,6(0,2-1,8)	3,3(1,2-8,5)	1,1(0,1-7,3)	1,9(1,1-3,3)	
PROBLEMAS CON LOS ESTUDIOS							F=4,651; df1=3,456; df2=2398,749; p=0,002
TOTAL	9,2(3,7-20,9)	3,4(1,6-7,4)	1,3(0,5-3,2)	1,6(0,5-4,6)	-	2,8(1,7-4,5)	
MASCULINO	8,6(2,6-24,9)	4,2(0,9-16,6)	2,1(0,6-7,0)	-	-	2,5(1,1-5,3)	
FEMENINO	9,4(3,1-25,0)	3,1(1,3-7,5)	0,8(0,2-3,4)	2,3(0,8-6,7)	-	2,9(1,5-5,4)	
PROBLEMAS CON SUS COMPAÑEROS(AS) DE ESTUDIOS							F=1,214; df1=3,259; df2=2261,520; p=0,303
TOTAL	1,3(0,3-5,2)	-	-	0,7(0,1-4,8)	-	0,3(0,1-1,1)	
MASCULINO	3,6(0,5-22,3)	-	-	2,2(0,3-14,0)	-	0,9(0,2-3,5)	
FEMENINO	0,6(0,1-3,9)	-	-	-	-	0,1(0,0-0,6)	
PROBLEMAS ECONÓMICOS							F=0,919; df1=3,623; df2=2514,144; p=0,445
TOTAL	11,7(5,5-23,3)	16,1(11,2-22,7)	10,0(7,0-14,2)	11,3(7,8-16,2)	14,0(8,3-22,4)	12,5(10,3-15,1)	
MASCULINO	7,4(1,9-25,0)	14,8(7,0-28,6)	10,3(5,4-18,7)	19,6(12,2-30,0)	17,1(7,4-34,9)	14,1(10,3-19,0)	
FEMENINO	13,1(5,6-27,5)	16,7(10,9-24,7)	9,9(6,6-14,6)	7,3(4,2-12,6)	12,2(6,0-23,1)	11,8(9,2-14,9)	
PROBLEMAS CON LA SALUD FÍSICA							F=2,722; df1=3,729; df2=2587,803; p=0,031
TOTAL	18,1(11,1-28,3)	10,1(6,0-16,5)	7,6(5,3-10,8)	8,0(5,3-12,0)	14,9(8,6-24,5)	10,4(8,4-12,8)	
MASCULINO	8,6(2,4-26,7)	9,0(3,9-19,5)	9,0(4,9-15,8)	9,4(4,7-17,9)	25,1(11,5-46,6)	10,9(7,7-15,2)	
FEMENINO	21,1(12,8-32,6)	10,6(5,7-18,8)	6,8(4,1-11,0)	7,4(4,4-12,0)	9,1(4,6-17,2)	10,1(7,8-13,2)	
SALUD FÍSICA DE ALGÚN FAMILIAR							F=1,891; df1=3,328; df2=2309,412; p=0,122
TOTAL	7,4(2,5-19,5)	4,4(2,0-9,1)	1,3(0,5-3,0)	2,9(1,3-6,5)	4,1(1,6-9,8)	3,5(2,3-5,4)	
MASCULINO	1,6(0,2-11,3)	1,5(0,2-10,2)	0,7(0,1-5,1)	3,9(0,9-15,6)	8,1(2,6-22,6)	2,6(1,2-5,5)	
FEMENINO	9,2(3,1-24,1)	5,6(2,5-12,2)	1,5(0,6-4,0)	2,4(1,0-6,1)	1,8(0,4-7,2)	3,9(2,3-6,5)	
SEPARACIÓN DE ALGÚN FAMILIAR							F=0,896; df1=3,894; df2=2702,619; p=0,463
TOTAL	-	1,9(0,7-5,5)	2,4(1,1-5,1)	2,0(0,8-5,1)	4,1(1,2-13,1)	2,0(1,2-3,3)	
MASCULINO	-	2,2(0,3-13,9)	3,5(1,0-11,7)	2,6(0,6-10,5)	6,0(0,8-32,6)	2,9(1,3-6,4)	
FEMENINO	-	1,8(0,5-6,2)	1,8(0,7-4,5)	1,7(0,7-4,2)	3,0(0,7-11,6)	1,6(0,9-2,8)	

MOTIVOS	MOTIVOS DE DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
MUERTE DE LA PAREJA							F=0,567; df1=3,603; df2=2500,453; p=0,668
TOTAL	1,2(0,4-3,6)	2,2(0,8-5,5)	2,2(1,2-4,1)	2,5(1,1-5,4)	4,1(1,3-11,7)	2,3(1,6-3,5)	
MASCULINO	1,7(0,2-11,6)	1,5(0,2-10,4)	1,7(0,6-4,5)	0,7(0,1-5,2)	-	1,2(0,5-2,8)	
FEMENINO	1,0(0,3-4,2)	2,5(0,8-6,9)	2,6(1,2-5,4)	3,3(1,4-7,6)	6,4(2,1-17,7)	2,9(1,8-4,5)	
SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE							F=1,047; df1=3,614; df2=2507,775; p=0,378
TOTAL	7,8(4,0-14,5)	14,1(8,9-21,6)	14,2(10,5-18,8)	11,1(7,6-15,9)	9,8(5,8-16,2)	12,2(10,0-14,8)	
MASCULINO	8,4(2,4-25,1)	15,6(6,0-34,7)	20,6(12,5-31,9)	10,2(4,6-21,1)	7,5(2,5-20,9)	14,3(9,8-20,2)	
FEMENINO	7,6(3,3-16,2)	13,5(8,1-21,6)	10,7(7,5-15,1)	11,5(7,4-17,6)	11,1(6,1-19,3)	11,2(8,9-14,1)	
MUERTE DE UN HIJO							F=2,065; df1=3,821; df2=2651,528; p=0,086
TOTAL	5,9(2,6-12,9)	2,7(1,1-6,3)	2,2(1,1-4,3)	2,0(0,9-4,8)	-	2,5(1,7-3,8)	
MASCULINO	-	-	2,7(0,9-7,9)	0,4(0,1-2,7)	-	0,9(0,3-2,6)	
FEMENINO	7,8(3,5-16,5)	3,9(1,6-8,8)	1,9(0,8-4,5)	2,8(1,2-6,7)	-	3,3(2,1-5,1)	
MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES							F=0,808; df1=3,852; df2=2673,633; p=0,516
TOTAL	2,0(0,7-5,5)	5,7(3,2-10,0)	5,9(3,8-9,2)	5,6(3,3-9,3)	6,4(2,8-13,6)	5,4(4,1-7,0)	
MASCULINO	1,9(0,3-13,1)	3,6(1,0-12,3)	5,6(2,3-12,9)	7,4(3,2-16,1)	5,6(1,7-16,7)	5,2(3,2-8,4)	
FEMENINO	2,1(0,6-6,7)	6,6(3,4-12,4)	6,1(3,6-10,1)	4,7(2,3-9,4)	6,8(2,7-16,0)	5,4(3,9-7,5)	
PROBLEMAS CON EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS							F=1,222; df1=2,999; df2=2081,610; p=0,300
TOTAL	6,5(1,8-20,3)	3,6(1,7-7,5)	5,5(3,1-9,6)	2,0(0,8-4,7)	2,2(0,8-6,0)	4,0(2,6-5,9)	
MASCULINO	17,3(2,7-61,3)	2,3(0,3-14,8)	5,3(2,3-11,9)	0,4(0,1-2,7)	2,0(0,3-13,2)	4,1(1,7-9,5)	
FEMENINO	3,1(1,1-8,4)	4,1(1,8-9,0)	5,7(2,6-11,9)	2,7(1,1-6,8)	2,3(0,7-7,3)	3,9(2,5-5,9)	
SIN MOTIVO APARENTE							F=3,698; df1=3,857; df2=2677,047; p=0,006
TOTAL	7,5(3,3-16,0)	1,0(0,2-4,0)	0,7(0,2-2,7)	4,2(1,8-9,5)	2,4(0,5-10,1)	2,6(1,6-4,2)	
MASCULINO	3,0(0,4-19,2)	2,0(0,3-13,1)	1,1(0,2-7,4)	9,5(3,3-24,5)	4,9(0,7-26,9)	4,0(1,9-8,2)	
FEMENINO	8,8(3,6-19,9)	0,5(0,1-3,6)	0,4(0,1-3,1)	1,6(0,5-5,2)	1,0(0,1-6,8)	2,0(1,0-3,7)	
OTROS							F=1,122; df1=3,792; df2=2631,460; p=0,343
TOTAL	5,2(2,6-10,2)	11,0(6,9-17,0)	11,6(8,1-16,2)	9,7(6,4-14,3)	12,9(7,9-20,5)	10,3(8,4-12,6)	
MASCULINO	13,1(4,7-31,6)	15,7(7,3-30,7)	11,0(6,2-18,9)	10,1(4,4-21,4)	15,9(6,6-33,5)	12,7(8,9-17,7)	
FEMENINO	2,9(1,0-8,0)	8,9(5,5-14,2)	11,8(8,1-17,0)	9,5(5,9-14,9)	11,3(6,2-19,9)	9,2(7,3-11,5)	

TABLA 30B
MOTIVOS DE INTENTOS SUICIDAS EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

MOTIVOS	MOTIVOS DE INTENTOS SUICIDAS					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
PROBLEMAS CON LA AUTOIMAGEN							
TOTAL	-	6,1(1,6-20,9)	4,4(0,8-21,2)	-	-	3,0(1,0-8,7)	$F=0,691; df1=3,942; df2=2735,942; p=0,596$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	8,7(2,3-27,7)	7,0(1,0-36,1)	-	-	4,5(1,5-12,8)	
PROBLEMAS CON LOS PADRES							
TOTAL	30,8(12,9-57,4)	27,6(14,3-46,5)	23,9(13,8-38,1)	36,7(17,1-61,9)	19,2(6,4-45,2)	27,8(20,0-37,3)	$F=0,404; df1=3,777; df2=2620,981; p=0,795$
MASCULINO	-	15,2(2,0-61,2)	18,5(5,1-48,9)	40,8(11,1-79,1)	18,3(2,2-69,3)	23,1(9,8-45,2)	
FEMENINO	31,9(13,0-59,4)	32,9(16,8-54,4)	27,2(12,8-48,7)	33,4(13,2-62,3)	19,7(5,5-50,7)	30,1(21,0-41,1)	
PROBLEMAS CON LOS HIJOS							
TOTAL	-	2,5(0,3-15,9)	4,7(1,4-14,6)	3,6(0,5-22,2)	5,7(1,3-22,1)	3,3(1,5-7,2)	$F=0,352; df1=3,706; df2=2571,927; p=0,828$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	3,5(0,5-21,6)	7,6(2,4-22,1)	6,4(0,9-34,6)	9,2(2,0-33,2)	4,9(2,2-10,5)	

MOTIVOS	MOTIVOS DE INTENTOS SUICIDAS					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
PROBLEMAS CON OTROS PARIENTES							
TOTAL	-	10,9(3,4-29,6)	2,9(0,7-11,5)	10,1(2,1-36,7)	3,1(0,4-20,3)	6,5(2,9-13,7)	F=0,942; df1=3,225; df2=2237,857; p=0,424
MASCULINO	-	-	-	5,9(0,7-36,3)	8,2(0,9-46,4)	2,7(0,6-10,7)	
FEMENINO	-	15,6(5,0-39,3)	4,6(1,1-17,5)	13,4(2,0-54,4)	-	8,3(3,5-18,6)	
PROBLEMAS CON LA PAREJA O CÓNYUGE							
TOTAL	22,7(6,6-55,1)	43,2(26,4-61,8)	41,9(26,7-58,8)	29,3(14,0-51,3)	36,0(15,8-62,9)	36,8(28,1-46,5)	F=0,624; df1=3,907; df2=2711,748; p=0,642
MASCULINO	-	36,2(8,4-77,9)	30,6(5,9-75,6)	36,4(11,5-71,6)	29,1(5,5-74,3)	33,2(16,6-55,4)	
FEMENINO	23,4(6,8-56,4)	46,3(28,4-65,2)	48,8(29,7-68,2)	23,8(9,5-48,6)	40,4(15,7-71,1)	38,5(28,8-49,3)	
PROBLEMAS CON LAS AMISTADES							
TOTAL	-	-	2,8(0,4-17,5)	-	3,6(0,5-22,6)	1,1(0,3-4,5)	F=0,596; df1=3,583; df2=2486,638; p=0,647
MASCULINO	-	-	7,3(0,9-39,4)	-	-	2,1(0,3-13,9)	
FEMENINO	-	-	-	-	5,8(0,8-33,3)	0,6(0,1-4,2)	
PROBLEMAS LABORALES							
TOTAL	-	-	1,3(0,2-8,7)	-	-	0,3(0,0-2,2)	F=0,281; df1=3,488; df2=2420,590; p=0,867
MASCULINO	-	-	3,3(0,4-21,9)	-	-	1,0(0,1-6,8)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
PROBLEMAS CON LOS ESTUDIOS							
TOTAL	12,6(3,2-38,4)	5,9(0,8-31,9)	2,8(0,4-17,5)	3,3(0,4-20,9)	-	4,8(1,8-12,1)	F=0,682; df1=3,318; df2=2302,748; p=0,577
MASCULINO	-	19,6(2,7-68,3)	7,3(0,9-39,4)	-	-	8,0(1,7-30,0)	
FEMENINO	13,0(3,2-40,3)	-	-	5,9(0,8-32,8)	-	3,3(1,0-9,8)	
PROBLEMAS ECONÓMICOS							
TOTAL	5,8(0,8-32,5)	7,8(1,9-26,5)	1,5(0,2-10,4)	5,1(1,2-19,0)	4,5(0,6-27,0)	5,1(2,2-11,1)	F=0,449; df1=3,645; df2=2529,688; p=0,755
MASCULINO	-	-	-	6,0(0,7-36,5)	-	1,6(0,2-10,6)	
FEMENINO	6,0(0,8-33,3)	11,1(2,8-35,2)	2,4(0,3-15,8)	4,4(0,6-26,2)	7,3(1,0-38,8)	6,8(2,8-15,3)	
PROBLEMAS CON LA SALUD FÍSICA							
TOTAL	13,6(3,2-42,8)	3,5(0,5-20,0)	3,5(0,8-14,5)	-	17,1(2,6-61,5)	5,7(2,3-13,3)	F=1,410; df1=3,456; df2=2398,171; p=0,234
MASCULINO	-	-	6,6(0,8-36,7)	-	44,5(8,0-88,1)	8,0(1,7-30,7)	
FEMENINO	14,1(3,3-43,7)	5,0(0,8-26,1)	1,7(0,2-11,5)	-	-	4,6(1,6-12,2)	
SALUD FÍSICA DE ALGÚN FAMILIAR							
TOTAL	-	-	1,1(0,2-7,1)	-	7,0(1,0-37,2)	1,1(0,2-4,9)	F=1,372; df1=3,396; df2=2356,779; p=0,246
MASCULINO	-	-	-	-	18,3(2,2-69,3)	2,5(0,3-16,1)	
FEMENINO	-	-	1,7(0,3-10,5)	-	-	0,4(0,1-2,7)	
SEPARACIÓN DE ALGÚN FAMILIAR							
TOTAL	-	2,3(0,3-15,1)	1,1(0,2-7,1)	5,5(1,3-20,4)	-	2,1(0,7-5,7)	F=0,695; df1=3,512; df2=2437,133; p=0,577
MASCULINO	-	-	-	6,9(0,8-40,0)	-	1,8(0,2-12,0)	
FEMENINO	-	3,3(0,5-20,6)	1,7(0,3-10,5)	4,4(0,6-26,2)	-	2,2(0,6-7,1)	
MUERTE DE LA PAREJA							
TOTAL	-	-	-	-	21,0(6,1-52,1)	2,4(0,7-8,2)	F=4,390; df1=3,975; df2=2758,942; p=0,002
MASCULINO	-	-	-	-	15,4(1,8-64,5)	2,1(0,3-14,0)	
FEMENINO	-	-	-	-	24,5(5,5-64,4)	2,6(0,5-11,5)	
SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE							
TOTAL	15,7(4,0-45,6)	10,7(2,3-37,3)	22,9(9,5-45,7)	35,0(15,8-60,8)	12,3(2,6-42,6)	19,2(11,8-29,6)	F=1,045; df1=3,691; df2=2561,585; p=0,380
MASCULINO	100,0	26,5(4,0-75,8)	39,1(10,7-77,4)	21,0(2,8-71,3)	-	26,0(10,5-51,3)	
FEMENINO	12,9(2,6-44,6)	3,9(0,5-23,3)	12,8(4,2-33,0)	46,0(21,8-72,2)	19,9(4,3-57,7)	15,9(9,2-26,0)	

MOTIVOS	MOTIVOS DE INTENTOS SUICIDAS					TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)		
MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES							
TOTAL	5,6(0,8-31,9)	8,8(2,2-29,3)	-	2,6(0,3-17,0)	-	4,0(1,4-11,1)	$F=1,017$; $df1=3,547$; $df2=2461,461$; $p=0,392$
MASCULINO	-	13,6(1,8-58,1)	-	5,9(0,7-36,2)	-	5,6(1,2-22,5)	
FEMENINO	5,8(0,8-32,6)	6,8(1,0-35,3)	-	-	-	3,3(0,8-13,2)	
PROBLEMAS CON EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS							
TOTAL	11,2(2,3-40,2)	6,7(1,6-24,0)	6,4(1,3-26,3)	-	4,2(0,6-25,7)	5,6(2,5-12,2)	$F=0,556$; $df1=3,749$; $df2=2601,787$; $p=0,684$
MASCULINO	-	-	12,9(1,8-55,3)	-	-	3,8(0,5-22,7)	
FEMENINO	11,6(2,4-41,1)	9,6(2,3-32,1)	2,3(0,3-15,2)	-	6,9(0,9-37,3)	6,5(2,7-14,9)	
OTROS							
TOTAL	13,8(3,3-43,1)	16,2(6,8-33,6)	16,2(6,7-34,2)	16,0(4,7-42,6)	2,3(0,3-15,5)	14,2(8,6-22,6)	$F=0,467$; $df1=3,467$; $df2=2406,030$; $p=0,733$
MASCULINO	-	25,2(5,5-66,1)	30,2(9,4-64,4)	5,0(0,6-32,2)	-	17,6(7,6-36,0)	
FEMENINO	14,2(3,4-44,0)	12,3(4,2-30,8)	7,4(1,8-25,8)	24,6(6,7-59,6)	3,7(0,5-23,7)	12,6(6,7-22,4)	

TENDENCIA HACIA LA VIOLENCIA

La violencia siempre ha formado parte de la experiencia humana. Cada año, más de 1,6 millones de personas pierden la vida y muchas más sufren lesiones no mortales como resultado de la violencia autoinflingida, interpersonal o colectiva. En conjunto, la violencia es una de las principales causas de muerte en todo el mundo para la población de 15 a 44 años de edad. Desde principios de los años ochenta, el campo de la salud pública ha pasado a ser un recurso valioso en la respuesta a la violencia. Es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos, de la misma manera en que las medidas de salud pública han logrado prevenir y disminuir las complicaciones relacionadas con el embarazo, las lesiones en el lugar de trabajo, las enfermedades infecciosas y las afecciones resultantes del consumo de alimentos y agua contaminados en muchas partes del mundo.

El enfoque de la violencia desde la perspectiva de la salud pública se basa en los requisitos rigurosos del método científico, en la búsqueda de soluciones; por tanto, es necesario obtener conocimiento de ella, mediante la recopilación sistemática de datos sobre la magnitud, el alcance, las características y las consecuencias de la violencia en los niveles local, nacional e internacional; investigar por qué se produce; buscar posibles formas de prevenirla, usando la información descrita; ejecutar acciones que en diversas circunstancias resulten efectivas, acompañadas de una difusión amplia de información y de una evaluación de la eficacia en relación con los costos de los programas.

La definición usada por la Organización Mundial de la Salud vincula la intención con la comisión del acto mismo, independientemente de las consecuencias que se producen, debe entenderse que "el uso intencional de la fuerza o el poder físico" incluye el descuido y todos los tipos de maltrato físico, sexual y psíquico, así como el suicidio y otros actos de autoagresión.

En este caso solo se ha medido la prevalencia de vida de conductas como peleas con algún tipo de armas y abuso físico a menores, encontrándose, según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, que un 18,8% en Lima Centro, 21,5% en Lima Norte, 23,7% en Lima Este, 24,3% en Lima Sur, 28,6% en Callao y el 22,9% en total se ha visto involucrado en alguno de estos tipos de conducta. En el 2002, se reportó mayor nivel de participación en actividades violentas con un 30,2% de la población total. Se observa, además, que el 16,8% en Lima Centro, 17,6% en Lima Norte, 19,4% en Lima Este, 20,4% en Lima Sur, 24,8% en Callao y el 19,2% en total ha participado en más de una pelea que terminó en golpes. También se han tomado en cuenta indicadores más sutiles, tales como el pensamiento homicida, teniendo que su prevalencia de vida es de 3,0%, mientras que su prevalencia anual el 0,9% y su prevalencia mensual el 0,3%. (Tabla 31).

TABLA 31
TENDENCIAS HACIA LA VIOLENCIA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

INDICADOR	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA DE VIDA DE TENDENCIAS VIOLENTAS*							
TOTAL	18,8(15,8-22,3)	21,5(18,2-25,2)	23,7(20,8-26,8)	24,3(21,3-27,7)	28,6(23,4-34,5)	22,9(21,4-24,6)	$F=2,885; df1=3,881; df2=2693,647; p=0,023$
MASCULINO	27,4(22,2-33,3)	31,1(25,3-37,6)	34,4(30,1-39,1)	33,5(28,7-38,8)	42,9(34,8-51,5)	33,2(30,7-35,9)	
FEMENINO	10,7(7,4-15,3)	14,4(11,4-18,1)	13,1(10,5-16,2)	15,0(12,0-18,5)	12,6(8,7-17,8)	13,4(11,9-15,1)	
LE HA PEGADO A UN NIÑO MENOR Y LE HA DEJADO MORETONES							
TOTAL	3,9(2,5-5,8)	6,8(5,1-9,1)	5,8(4,6-7,2)	6,7(5,1-8,7)	5,6(3,2-9,5)	5,9(5,1-6,8)	$F=1,429; df1=3,728; df2=2587,549; p=0,225$
MASCULINO	3,3(1,6-6,7)	4,3(2,3-7,8)	3,8(2,5-5,6)	5,5(3,6-8,4)	5,8(2,4-13,7)	4,4(3,4-5,8)	
FEMENINO	4,4(2,7-7,2)	8,7(6,2-12,1)	7,8(5,9-10,1)	7,8(5,6-10,8)	5,3(2,9-9,3)	7,2(6,1-8,6)	
HA PARTICIPADO EN MÁS DE UNA PELEA QUE HA ACABADO A GOLPES							
TOTAL	16,8(13,9-20,2)	17,6(14,5-21,1)	19,4(16,7-22,4)	20,4(17,6-23,5)	24,8(20,5-29,7)	19,2(17,8-20,8)	$F=1,528; df1=5,558; df2=3857,262; p=0,170$
MASCULINO	26,5(21,3-32,4)	29,7(24,0-36,2)	31,9(27,3-36,8)	31,5(26,8-36,6)	40,0(33,2-47,3)	31,3(28,8-33,9)	
FEMENINO	7,7(5,1-11,5)	8,6(6,3-11,6)	7,1(5,2-9,7)	9,2(7,0-12,0)	7,6(4,8-11,9)	8,1(6,9-9,4)	
EN UNA PELEA HA USADO PIEDRAS, PALOS, CUCHILLOS (NAVAJAS), HONDAS, MACHETE, VERDUGUILLO U HOZ							
TOTAL	1,7(0,9-3,1)	3,5(2,2-5,4)	4,4(3,2-6,1)	4,0(2,8-5,8)	4,8(3,0-7,6)	3,7(3,0-4,4)	$F=1,391; df1=7,313; df2=5075,386; p=0,201$
MASCULINO	3,3(1,7-6,2)	5,9(3,5-9,6)	6,9(4,9-9,8)	5,5(3,5-8,6)	7,0(4,1-11,6)	5,7(4,6-7,1)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,8)	1,7(0,7-4,1)	2,0(1,2-3,2)	2,5(1,5-4,3)	2,4(1,1-4,9)	1,7(1,2-2,5)	
EN UNA PELEA HA USADO ARMAS DE FUEGO COMO PISTOLAS							
TOTAL	0,8(0,3-1,9)	1,3(0,5-2,8)	0,7(0,3-1,4)	0,5(0,2-1,5)	1,7(0,7-4,2)	0,9(0,6-1,4)	$F=0,968; df1=7,541; df2=5233,613; p=0,457$
MASCULINO	1,6(0,7-3,9)	1,7(0,7-3,9)	1,1(0,5-2,5)	1,0(0,3-2,9)	3,2(1,3-7,7)	1,6(1,0-2,3)	
FEMENINO	-	0,9(0,2-3,7)	0,3(0,1-1,3)	-	-	0,4(0,1-1,1)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSIDERACIONES O PENSAMIENTOS DE ÍNDOLE HOMICIDA**							
TOTAL	2,2(1,2-3,7)	4,3(2,9-6,3)	3,1(2,2-4,2)	2,5(1,6-3,8)	2,3(1,2-4,4)	3,0(2,5-3,7)	$F=1,895; df1=3,856; df2=2675,743; p=0,111$
MASCULINO	3,0(1,6-5,7)	5,4(3,1-9,5)	3,8(2,4-6,0)	2,2(1,1-4,5)	2,9(1,3-6,2)	3,6(2,7-4,8)	
FEMENINO	1,3(0,5-3,6)	3,4(2,0-5,6)	2,4(1,4-3,9)	2,7(1,6-4,6)	1,6(0,6-4,2)	2,5(1,9-3,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSIDERACIONES O PENSAMIENTOS DE ÍNDOLE HOMICIDA							
TOTAL	0,5(0,2-1,4)	1,4(0,7-3,0)	1,0(0,6-1,8)	0,6(0,3-1,3)	0,2(0,1-0,9)	0,9(0,6-1,3)	$F=1,890; df1=3,340; df2=2317,673; p=0,122$
MASCULINO	1,0(0,3-2,8)	1,5(0,5-4,7)	1,3(0,6-2,8)	0,5(0,1-1,4)	0,2(0,0-1,5)	1,0(0,6-1,7)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,8)	1,3(0,5-3,7)	0,7(0,3-1,6)	0,8(0,3-2,2)	0,3(0,0-1,8)	0,8(0,4-1,4)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSIDERACIONES O PENSAMIENTOS DE ÍNDOLE HOMICIDA							
TOTAL	0,2(0,1-0,6)	0,7(0,2-2,1)	0,3(0,1-0,8)	0,2(0,0-0,7)	0,1(0,0-0,8)	0,3(0,2-0,7)	$F=1,792; df1=3,184; df2=2209,641; p=0,143$
MASCULINO	0,3(0,1-1,1)	1,1(0,3-4,5)	0,4(0,1-1,5)	0,3(0,1-1,3)	0,2(0,0-1,5)	0,5(0,2-1,1)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,8)	0,4(0,1-2,6)	0,1(0,0-0,5)	-	-	0,2(0,0-0,6)	

* Se refiere a si, después de los 18 años, le ha pegado a un niño menor y le ha dejado moretones, o desde los 18 años ha participado en más de una pelea que haya acabado en golpes o ha usado piedras, palos, cuchillos o armas de fuego en una pelea.

** Se refiere a si el entrevistado ha tenido la idea de matar a alguien.

FACTORES PROTECTORES

En el área de sentimientos de protección familiar, el grado de cohesión familiar medida a través del respeto y apoyo mutuo, el orgullo familiar y el compartir principios y valores se encuentran en niveles altos, siendo un factor positivo frente a los otros factores psicosociales que atentan contra la salud mental. El sentimiento de cohesión familiar es mayor en los varones y se mantiene sin variación con relación a los resultados del 2002 (Tabla 32AA). Si bien la mayoría de los entrevistados se refiere positivamente a sus vínculos familiares, encontramos que el 4,6% en Lima Centro, 4,2% en Lima Norte,

7,4% en Lima Este, 6,4% en Lima Sur, 1,7% en Callao y el 5,2% en total manifiesta no sentirse apoyado por sus familiares. Estos valores se corroboran cuando expresan que antes problemas no sienten contar con su familia, teniendo el 4,6% en Lima Centro, 5,8% en Lima Norte, 7,6% en Lima Este, 5,7% en Lima Sur, 2,8% en Callao y el 5,7% en total, dicho sentimiento. (Tabla 32B). Desde el punto de vista de la salud mental familiar y de la salud pública, este grupo de personas debe ser considerado en riesgo por tener, probablemente, familias disfuncionales. De la misma manera, el factor religioso es muy importante en la población, y la mayoría se apoya en él para enfrentar los retos cotidianos que le presenta la vida; sin embargo, la participación religiosa activa se encuentra en niveles relativamente bajos (Tabla 33). Pese a que el factor religioso ha cobrado relativamente mayor importancia en estos últimos 10 años, el porcentaje de personas que transmite la religión a sus hijos ha caído estrepitosamente, variando de un 59,3% en el 2002 a un 32,8% en el 2012. De la misma manera la predicación religiosa solo alcanza un valor de 19,3% del total de adultos.

TABLA 32A
GRADO DE COHESIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

GRADO DE COHESIÓN FAMILIAR (ESCALA DE 5 A 20)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MEDIA	19,07 (18,88-19,26)	18,87 (18,72-19,02)	18,64 (15,51-18,77)	18,92 (18,75-19,08)	19,33 (19,20-19,46)	18,91 (18,84-18,98)	df1=4,000; df2=691,000; Wald F=14,229; p<0,00001

TABLA 32AA
GRADO DE COHESIÓN FAMILIAR, SEGÚN SEXO EN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

GRADO DE COHESIÓN FAMILIAR (ESCALA DE 5 A 20)	MEDIA (IC 95%)	E.S.	MEDIANA	MODA	P25	P75	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES POR SEXO
LIMA CENTRO	19,07(18,9-19,3)	0,10	20,0	20,0	19,2	20,0	df1=1,000; df2=132,000; Wald F=4,917; p=0,028
MASCULINO	19,28(19,1-19,5)	0,11	20,0	20,0	19,2	20,0	
FEMENINO	18,87(18,6-19,2)	0,15	20,0	20,0	19,2	20,0	
LIMA NORTE	18,87(18,7-19,0)	0,08	20,0	20,0	18,3	20,0	df1=1,000; df2=174,000; Wald F=0,241; p=0,624
MASCULINO	18,83(18,6-19,1)	0,13	20,0	20,0	18,3	20,0	
FEMENINO	18,90(18,7-19,1)	0,10	20,0	20,0	18,3	20,0	
LIMA ESTE	18,64(18,5-18,8)	0,07	20,0	20,0	18,3	20,0	df1=1,000; df2=166,000; Wald F=0,245; p=0,621
MASCULINO	18,68(18,5-18,9)	0,11	20,0	20,0	18,3	20,0	
FEMENINO	18,61(18,5-18,8)	0,08	20,0	20,0	18,3	20,0	
LIMA SUR	18,92(18,7-19,1)	0,09	20,0	20,0	18,3	20,0	df1=1,000; df2=148,000; Wald F=5,056; p=0,026
MASCULINO	19,09(18,9-19,3)	0,11	20,0	20,0	19,2	20,0	
FEMENINO	18,74(18,5-19,0)	0,12	20,0	20,0	18,3	20,0	
CALLAO	19,33(19,2-19,5)	0,07	20,0	20,0	19,2	20,0	df1=1,000; df2=73,000; Wald F=0,328; p=0,569
MASCULINO	19,36(19,2-19,5)	0,08	20,0	20,0	19,2	20,0	
FEMENINO	19,29(19,1-19,5)	0,10	20,0	20,0	19,2	20,0	
TOTAL	18,91(18,8-19,0)	0,04	20,0	20,0	18,3	20,0	df1=1,000; df2=694,000; Wald F=4,714; p=0,030
MASCULINO	19,00(18,9-19,1)	0,05	20,0	20,0	18,3	20,0	
FEMENINO	18,83(18,7-18,9)	0,05	20,0	20,0	18,3	20,0	

TABLA 32B
COHESIÓN FAMILIAR ESPECÍFICA DE LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ASPECTO FAMILIAR	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
¿CUÁNTO LE IMPORTARÍA HACER PASAR VERGÜENZA A SU FAMILIA?							F=3,871; df1=7,578; df2=5258,824; p=0,00021
NADA O POCO	2,9(1,7-4,8)	2,9(1,8-4,6)	6,0(4,2-8,5)	5,6(3,9-7,9)	2,3(1,2-4,3)	4,2(3,4-5,0)	
MASCULINO	2,8(1,4-5,6)	3,6(1,8-7,2)	8,0(5,0-12,6)	5,6(3,6-8,5)	3,1(1,4-6,8)	4,9(3,8-6,5)	
FEMENINO	2,9(1,3-6,3)	2,4(1,3-4,4)	4,1(2,7-6,1)	5,7(3,5-9,0)	1,3(0,4-4,2)	3,4(2,6-4,4)	
REGULAR	7,7(5,4-10,9)	6,2(4,5-8,4)	6,4(5,0-8,0)	3,7(2,6-5,3)	2,7(1,5-4,8)	5,6(4,8-6,5)	
MASCULINO	7,1(4,2-11,8)	9,8(6,7-14,0)	6,7(4,8-9,3)	3,1(1,7-5,4)	1,7(0,7-3,9)	6,1(4,9-7,5)	
FEMENINO	8,3(5,3-12,6)	3,5(2,1-5,8)	6,0(4,5-7,9)	4,4(2,9-6,8)	3,9(2,0-7,5)	5,1(4,2-6,2)	
BASTANTE O MUCHO	89,4(85,9-92,1)	91,0(88,4-93,0)	87,6(84,9-89,9)	90,6(88,0-92,7)	95,0(92,5-96,7)	90,2(89,0-91,3)	
MASCULINO	90,0(84,6-93,7)	86,6(81,8-90,3)	85,3(80,9-88,8)	91,3(87,8-93,9)	95,2(91,5-97,3)	88,9(87,0-90,6)	
FEMENINO	88,9(84,1-92,3)	94,1(91,3-96,1)	89,9(87,1-92,1)	89,9(86,2-92,8)	94,8(90,9-97,0)	91,5(90,0-92,7)	

ASPECTO FAMILIAR	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE LO(A) RESPETAN?							$F=2,890$; $df1=7,512$; $df2=5213,332$; $p=0,004$
NADA O POCO	3,0(1,9-4,8)	2,7(1,7-4,3)	4,6(3,5-6,1)	3,3(2,3-4,7)	1,7(0,8-3,7)	3,2(2,7-3,9)	
MASCULINO	2,2(1,0-4,5)	1,0(0,3-3,3)	3,7(2,2-6,3)	1,9(0,8-4,5)	0,4(0,1-2,5)	2,0(1,4-2,9)	
FEMENINO	3,8(2,1-6,8)	4,0(2,4-6,6)	5,5(4,0-7,4)	4,7(3,3-6,7)	3,2(1,4-7,3)	4,4(3,5-5,4)	
REGULAR	10,2(7,5-13,8)	11,6(9,2-14,6)	15,8(13,6-18,3)	11,1(9,1-13,4)	9,6(6,9-13,2)	12,1(10,9-13,3)	
MASCULINO	6,9(4,3-10,7)	13,0(9,0-18,4)	16,0(13,0-19,7)	8,2(5,9-11,4)	10,3(6,3-16,4)	11,3(9,7-13,2)	
FEMENINO	13,4(9,2-19,2)	10,6(7,7-14,4)	15,5(12,8-18,8)	13,9(10,9-17,7)	8,9(6,0-12,8)	12,7(11,2-14,5)	
BASTANTE O MUCHO	86,8(82,8-89,9)	85,7(82,5-88,4)	79,6(77,0-82,0)	85,6(83,0-87,9)	88,7(84,8-91,7)	84,7(83,3-86,0)	
MASCULINO	91,0(86,3-94,1)	86,0(80,5-90,1)	80,2(75,9-83,9)	89,9(86,4-92,6)	89,4(83,3-93,4)	86,7(84,6-88,5)	
FEMENINO	82,8(76,7-87,5)	85,5(81,2-88,9)	79,0(75,6-82,0)	81,3(77,2-84,8)	88,0(82,4-91,9)	82,9(80,9-84,7)	
¿CUÁNTO SIENTE QUE SE APOYAN UNOS A OTROS?							$F=6,350$; $df1=7,290$; $df2=5058,926$; $p<0,00001$
NADA O POCO	4,6(3,0-6,9)	4,2(3,0-6,0)	7,4(5,9-9,2)	6,4(4,9-8,4)	1,7(0,9-3,5)	5,2(4,5-6,1)	
MASCULINO	2,9(1,3-6,1)	4,5(2,5-7,8)	6,4(4,3-9,3)	4,8(2,9-7,7)	1,7(0,7-4,0)	4,4(3,4-5,6)	
FEMENINO	6,2(3,8-10,0)	4,0(2,6-6,2)	8,4(6,6-10,8)	8,1(5,9-11,0)	1,8(0,6-5,6)	6,0(5,1-7,2)	
REGULAR	10,0(7,4-13,5)	18,0(15,1-21,2)	16,8(14,7-19,1)	11,5(9,5-13,9)	10,6(8,0-13,8)	14,2(13,0-15,5)	
MASCULINO	7,2(4,8-10,7)	17,9(13,5-23,3)	16,0(13,1-19,3)	10,2(7,6-13,5)	10,0(6,6-14,9)	12,9(11,3-14,7)	
FEMENINO	12,8(8,5-18,6)	18,0(14,3-22,4)	17,6(14,9-20,6)	12,8(10,0-16,4)	11,2(7,5-16,4)	15,3(13,6-17,2)	
BASTANTE O MUCHO	85,4(81,2-88,8)	77,8(74,1-81,1)	75,8(73,2-78,3)	82,1(78,9-84,9)	87,7(83,9-90,7)	80,6(79,0-82,1)	
MASCULINO	89,9(85,7-93,0)	77,7(71,3-83,0)	77,7(73,6-81,3)	85,1(81,2-88,3)	88,3(83,1-92,1)	82,7(80,5-84,7)	
FEMENINO	81,1(74,1-86,5)	77,9(73,1-82,1)	74,0(70,5-77,2)	79,0(74,2-83,2)	87,0(81,6-91,0)	78,6(76,4-80,7)	
¿CUÁN ORGULLOSO(A) SE SIENTE DE SU FAMILIA?							$F=3,157$; $df1=7,471$; $df2=5184,695$; $p=0,002$
NADA O POCO	1,9(1,0-3,5)	1,3(0,7-2,4)	3,1(2,4-4,1)	3,2(2,1-4,8)	0,6(0,1-2,2)	2,2(1,7-2,7)	
MASCULINO	0,8(0,3-2,5)	1,5(0,5-4,3)	1,8(1,1-3,1)	3,2(1,7-6,3)	-	1,7(1,1-2,5)	
FEMENINO	2,9(1,3-6,0)	1,1(0,6-2,2)	4,4(3,1-6,3)	3,1(1,8-5,2)	1,2(0,3-4,6)	2,6(2,0-3,4)	
REGULAR	8,2(6,0-11,3)	11,1(8,7-14,1)	10,9(9,2-13,0)	9,2(7,4-11,3)	6,0(4,3-8,4)	9,6(8,6-10,8)	
MASCULINO	6,7(4,1-10,6)	11,6(7,8-16,9)	11,7(9,0-15,2)	7,6(5,2-10,8)	6,4(3,9-10,5)	9,3(7,8-11,0)	
FEMENINO	9,8(6,5-14,5)	10,7(8,0-14,2)	10,2(8,1-12,8)	10,8(8,2-14,1)	5,6(3,5-8,9)	9,9(8,6-11,5)	
BASTANTE O MUCHO	89,9(86,6-92,4)	87,6(84,6-90,1)	85,9(83,7-87,9)	87,7(84,9-90,0)	93,4(90,9-95,3)	88,2(87,0-89,3)	
MASCULINO	92,5(88,5-95,2)	86,8(81,5-90,8)	86,4(82,9-89,4)	89,2(85,3-92,1)	93,6(89,5-96,1)	89,0(87,2-90,6)	
FEMENINO	87,4(82,4-91,1)	88,1(84,6-91,0)	85,4(82,6-87,9)	86,1(82,2-89,3)	93,2(89,2-95,8)	87,5(85,8-88,9)	
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE SUS VALORES MORALES SE PARECEN A LOS DE SU FAMILIA?							$F=6,541$; $df1=7,680$; $df2=5329,835$; $p<0,00001$
NADA O POCO	4,0(2,6-6,2)	5,5(4,0-7,6)	6,0(4,7-7,7)	5,1(3,8-6,8)	1,9(1,0-3,6)	4,9(4,2-5,7)	
MASCULINO	3,6(1,8-7,2)	5,1(2,9-8,9)	6,4(4,4-9,2)	4,2(2,5-6,9)	1,7(0,8-3,5)	4,6(3,6-5,8)	
FEMENINO	4,3(2,4-7,6)	5,9(4,1-8,4)	5,7(4,1-7,7)	6,0(4,2-8,6)	2,1(0,8-5,5)	5,2(4,3-6,3)	
REGULAR	14,1(11,2-17,5)	23,3(20,3-26,6)	18,6(16,3-21,1)	13,1(10,9-15,7)	13,6(10,3-17,8)	17,4(16,1-18,8)	
MASCULINO	10,9(7,2-16,2)	25,2(20,5-30,6)	17,4(14,4-20,9)	12,6(9,5-16,4)	12,7(7,8-19,9)	16,5(14,6-18,6)	
FEMENINO	17,1(12,6-22,8)	21,9(18,1-26,4)	19,8(16,7-23,2)	13,7(10,6-17,4)	14,7(10,9-19,6)	18,3(16,4-20,2)	
BASTANTE O MUCHO	81,9(78,1-85,2)	71,1(67,4-74,5)	75,4(72,6-78,0)	81,8(78,8-84,5)	84,5(80,1-88,0)	77,7(76,1-79,2)	
MASCULINO	85,4(79,9-89,7)	69,7(64,1-74,7)	76,2(71,8-80,1)	83,3(79,0-86,8)	85,6(78,3-90,7)	78,9(76,6-81,1)	
FEMENINO	78,6(72,0-83,9)	72,2(67,1-76,7)	74,6(71,1-77,7)	80,3(75,9-84,1)	83,2(77,8-87,5)	76,5(74,3-78,6)	
¿QUÉ TANTO SE SIENTE PARTE DEL PROGRESO DE SU FAMILIA?							$F=3,477$; $df1=7,527$; $df2=5223,638$; $p=0,001$
NADA O POCO	3,4(2,2-5,5)	4,7(3,4-6,5)	7,0(5,6-8,7)	5,2(3,8-7,1)	3,6(2,1-5,9)	5,0(4,3-5,8)	
MASCULINO	2,6(1,1-5,9)	3,8(2,1-6,9)	5,8(3,9-8,5)	3,9(2,2-6,6)	2,8(1,4-5,4)	4,0(3,1-5,1)	
FEMENINO	4,2(2,5-7,1)	5,4(3,7-7,7)	8,2(6,3-10,6)	6,6(4,5-9,6)	4,4(2,2-8,5)	6,0(5,0-7,1)	
REGULAR	13,7(10,8-17,2)	18,6(15,4-22,2)	18,1(15,8-20,6)	15,1(12,7-18,0)	11,1(8,5-14,5)	16,1(14,8-17,5)	
MASCULINO	9,9(6,1-15,6)	20,3(15,2-26,6)	17,3(13,9-21,2)	13,6(10,3-17,8)	14,3(9,9-20,1)	15,5(13,5-17,8)	
FEMENINO	17,4(13,3-22,4)	17,3(13,7-21,6)	18,9(16,2-22,0)	16,7(13,2-21,0)	7,6(4,9-11,5)	16,6(14,9-18,5)	
BASTANTE O MUCHO	82,9(78,8-86,3)	76,7(72,8-80,2)	74,9(72,1-77,5)	79,7(76,4-82,6)	85,3(81,7-88,4)	78,9(77,3-80,4)	
MASCULINO	87,5(81,6-91,7)	75,8(69,1-81,5)	76,9(72,5-80,8)	82,5(78,0-86,3)	82,9(76,8-87,7)	80,5(78,0-82,7)	
FEMENINO	78,4(72,5-83,3)	77,3(72,8-81,3)	72,9(69,4-76,1)	76,7(72,0-80,8)	88,0(83,1-91,6)	77,4(75,3-79,3)	

ASPECTO FAMILIAR	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
¿SIENTE UD. QUE PUEDE CONTAR CON SU FAMILIA CUANDO TIENE PROBLEMAS?							$F=2,431$; $df1=7,515$; $df2=5215,352$; $p=0,015$
NADA O POCO	4,6(3,1-6,9)	5,8(4,1-8,1)	7,6(6,2-9,3)	5,7(4,2-7,7)	2,8(1,7-4,5)	5,7(4,9-6,6)	
MASCULINO	3,8(1,9-7,2)	5,7(3,0-10,5)	6,3(4,3-9,1)	1,9(1,0-3,7)	3,3(1,7-6,5)	4,4(3,4-5,8)	
FEMENINO	5,5(3,3-8,8)	5,9(4,0-8,6)	8,9(7,0-11,1)	9,6(6,9-13,2)	2,2(1,1-4,4)	6,9(5,8-8,1)	
REGULAR	14,5(11,6-18,0)	12,6(10,3-15,4)	12,0(10,0-14,2)	11,0(9,0-13,5)	9,1(6,7-12,3)	12,1(11,0-13,3)	
MASCULINO	12,6(8,4-18,5)	12,1(8,8-16,5)	12,0(9,1-15,6)	12,0(9,0-15,9)	8,5(5,7-12,7)	11,7(10,1-13,6)	
FEMENINO	16,4(12,4-21,3)	13,0(9,9-16,9)	12,0(9,7-14,7)	10,0(7,7-13,0)	9,8(6,5-14,7)	12,4(10,9-14,1)	
BASTANTE O MUCHO	80,9(76,9-84,2)	81,6(78,4-84,4)	80,4(78,0-82,7)	83,2(80,5-85,7)	88,1(84,8-90,7)	82,2(80,8-83,5)	
MASCULINO	83,6(77,4-88,4)	82,2(76,5-86,7)	81,7(77,7-85,2)	86,0(82,0-89,3)	88,1(83,5-91,6)	83,9(81,7-85,8)	
FEMENINO	78,2(72,4-83,0)	81,1(77,0-84,7)	79,2(76,1-81,9)	80,4(76,2-84,0)	88,0(83,2-91,5)	80,7(78,8-82,4)	
¿CONVERSA CON SU FAMILIA SOBRE SUS ASPECTOS PERSONALES?							$F=5,808$; $df1=7,547$; $df2=5237,535$; $p<0,00001$
NADA O POCO	10,0(7,7-12,8)	14,3(11,6-17,5)	17,9(15,5-20,6)	16,7(14,1-19,8)	6,2(4,3-8,7)	14,1(12,8-15,4)	
MASCULINO	10,1(6,7-15,1)	15,2(11,2-20,3)	19,6(16,1-23,7)	15,9(12,2-20,5)	7,3(4,7-11,1)	14,6(12,8-16,6)	
FEMENINO	9,9(7,1-13,6)	13,6(10,6-17,4)	16,3(13,6-19,4)	17,6(14,1-21,6)	4,9(2,6-9,2)	13,5(12,0-15,2)	
REGULAR	18,8(15,5-22,8)	20,5(17,3-24,1)	18,3(16,1-20,6)	16,5(13,9-19,3)	14,7(11,3-19,0)	18,2(16,8-19,7)	
MASCULINO	19,1(13,9-25,7)	19,6(14,9-25,3)	16,5(13,4-20,1)	18,4(14,6-22,9)	15,5(10,4-22,4)	18,0(15,9-20,2)	
FEMENINO	18,6(14,3-23,7)	21,2(16,9-26,2)	20,0(17,0-23,4)	14,5(11,7-18,0)	13,9(10,1-18,8)	18,4(16,6-20,4)	
BASTANTE O MUCHO	71,1(66,6-75,3)	65,2(60,9-69,3)	63,8(60,6-66,9)	66,8(63,1-70,3)	79,1(74,5-83,0)	67,7(65,9-69,5)	
MASCULINO	70,7(63,7-76,9)	65,2(58,3-71,5)	63,9(59,2-68,4)	65,7(60,5-70,6)	77,3(70,4-82,9)	67,4(64,7-70,0)	
FEMENINO	71,5(65,5-76,9)	65,2(59,9-70,1)	63,7(59,6-67,6)	67,9(62,9-72,5)	81,2(75,2-85,9)	68,0(65,7-70,3)	
¿TOMAN EN CUENTA SU OPINIÓN EN LAS DECISIONES IMPORTANTES?							$F=3,933$; $df1=7,500$; $df2=5204,862$; $p=0,00018$
NADA O POCO	5,9(4,2-8,3)	5,6(4,1-7,6)	9,0(7,3-10,9)	6,4(4,8-8,5)	2,3(1,3-4,0)	6,3(5,5-7,2)	
MASCULINO	3,8(2,0-7,0)	6,9(4,5-10,5)	9,2(6,8-12,2)	4,8(2,9-7,9)	2,4(1,0-5,3)	5,9(4,8-7,3)	
FEMENINO	8,0(5,2-11,9)	4,6(3,0-6,9)	8,8(6,9-11,1)	8,0(5,7-11,3)	2,2(1,0-5,1)	6,6(5,6-7,8)	
REGULAR	12,2(9,4-15,7)	15,5(12,6-19,1)	13,7(11,8-16,0)	14,3(11,9-17,0)	8,7(6,2-12,2)	13,5(12,3-14,9)	
MASCULINO	11,1(7,6-16,0)	14,3(9,8-20,3)	12,9(10,0-16,4)	13,4(10,3-17,2)	8,9(5,6-13,9)	12,5(10,8-14,5)	
FEMENINO	13,2(9,4-18,4)	16,5(12,8-21,0)	14,6(12,1-17,5)	15,2(11,9-19,1)	8,6(5,5-13,3)	14,4(12,8-16,3)	
BASTANTE O MUCHO	81,9(77,8-85,4)	78,9(75,3-82,1)	77,3(74,5-79,9)	79,3(76,3-82,1)	89,0(85,4-91,7)	80,2(78,7-81,6)	
MASCULINO	85,1(79,4-89,4)	78,8(73,2-83,5)	77,9(73,6-81,8)	81,8(77,3-85,6)	88,8(83,1-92,7)	81,5(79,3-83,6)	
FEMENINO	78,8(73,0-83,6)	79,0(74,3-82,9)	76,7(73,4-79,7)	76,8(72,3-80,8)	89,2(84,5-92,6)	79,0(76,9-80,9)	
¿SU FAMILIA MUESTRA INTERÉS POR SUS SENTIMIENTOS Y AFECTOS?							$F=3,258$; $df1=7,617$; $df2=5286,195$; $p=0,001$
NADA O POCO	4,5(3,0-6,5)	8,4(6,4-10,9)	7,8(6,3-9,5)	7,2(5,5-9,4)	2,8(1,6-4,8)	6,7(5,9-7,7)	
MASCULINO	2,9(1,5-5,5)	6,9(4,4-10,8)	6,3(4,5-8,9)	5,7(3,4-9,2)	4,0(2,0-7,9)	5,4(4,4-6,8)	
FEMENINO	6,0(3,7-9,4)	9,4(6,8-12,9)	9,2(7,2-11,6)	8,8(6,3-12,1)	1,4(0,6-3,6)	7,9(6,7-9,2)	
REGULAR	14,7(11,6-18,4)	14,5(11,8-17,6)	16,3(13,9-19,1)	12,7(10,4-15,3)	11,0(8,1-14,7)	14,2(12,9-15,6)	
MASCULINO	13,1(9,1-18,6)	14,3(10,4-19,3)	16,5(12,9-20,7)	13,5(10,1-17,7)	10,2(6,2-16,3)	14,0(12,1-16,0)	
FEMENINO	16,1(12,0-21,4)	14,6(11,0-19,0)	16,2(13,4-19,4)	11,8(9,4-14,7)	11,8(8,1-16,9)	14,4(12,8-16,2)	
BASTANTE O MUCHO	80,9(76,9-84,4)	77,2(73,4-80,6)	75,9(72,9-78,7)	80,1(76,7-83,1)	86,2(82,4-89,3)	79,1(77,5-80,6)	
MASCULINO	84,0(78,1-88,5)	78,8(72,5-83,9)	77,2(72,9-81,0)	80,8(76,2-84,8)	85,8(79,5-90,4)	80,6(78,2-82,7)	
FEMENINO	77,9(72,2-82,7)	76,0(71,2-80,3)	74,6(70,9-78,0)	79,4(74,9-83,2)	86,8(81,6-90,7)	77,7(75,6-79,7)	
¿SIENTE QUE SU FAMILIA LO(A) TOMA EN CUENTA?							$F=1,584$; $df1=7,394$; $df2=5131,541$; $p=0,131$
NADA O POCO	3,8(2,5-5,8)	5,1(3,7-7,0)	5,4(4,2-6,9)	5,1(3,8-7,0)	1,8(0,7-4,8)	4,6(3,9-5,4)	
MASCULINO	2,4(1,1-5,2)	4,1(2,2-7,5)	4,1(2,6-6,5)	3,7(2,1-6,6)	2,6(0,9-7,2)	3,6(2,7-4,7)	
FEMENINO	5,2(3,1-8,6)	5,9(4,0-8,5)	6,7(5,1-8,8)	6,6(4,6-9,4)	0,8(0,2-3,4)	5,6(4,7-6,7)	
REGULAR	12,3(9,0-16,4)	12,1(9,7-15,0)	12,0(10,1-14,1)	11,1(9,0-13,5)	8,3(5,8-11,6)	11,5(10,3-12,7)	
MASCULINO	11,1(7,1-16,8)	11,7(8,3-16,3)	11,3(8,6-14,7)	9,7(7,1-13,2)	8,8(5,3-14,2)	10,7(9,1-12,5)	
FEMENINO	13,4(9,4-18,8)	12,4(9,2-16,6)	12,7(10,4-15,3)	12,4(9,7-15,7)	7,7(4,8-12,0)	12,2(10,7-13,9)	
BASTANTE O MUCHO	83,9(79,6-87,5)	82,8(79,6-85,6)	82,6(80,3-84,7)	83,8(80,8-86,4)	89,9(86,1-92,8)	83,9(82,5-85,2)	
MASCULINO	86,5(80,2-91,0)	84,2(78,7-88,5)	84,6(80,9-87,7)	86,5(82,6-89,7)	88,6(82,9-92,5)	85,7(83,6-87,6)	
FEMENINO	81,4(75,8-86,0)	81,7(77,5-85,3)	80,6(77,5-83,3)	81,0(76,6-84,7)	91,5(87,1-94,4)	82,2(80,3-84,0)	

TABLA 33
TENDENCIAS RELIGIOSAS DE LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TENDENCIAS RELIGIOSAS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
SIENTE PROTECCIÓN DE DIOS							
TOTAL	89,4(85,4-92,4)	93,1(90,6-94,9)	92,2(90,3-93,7)	92,7(90,5-94,4)	93,3(90,6-95,2)	92,2(91,1-93,1)	$F=1,630$; $df1=3,623$; $df2=2514,170$; $p=0,170$
MASCULINO	84,2(76,8-89,5)	89,8(85,2-93,1)	87,4(83,9-90,1)	90,0(86,3-92,7)	92,1(87,7-95,0)	88,5(86,6-90,2)	
FEMENINO	94,2(90,3-96,6)	95,4(92,8-97,1)	96,9(95,4-98,0)	95,4(93,0-97,0)	94,6(89,8-97,2)	95,5(94,4-96,4)	
DIOS ES MUY IMPORTANTE							
TOTAL	89,1(85,5-91,8)	91,5(88,7-93,7)	92,1(90,3-93,7)	89,8(86,3-92,5)	95,2(92,9-96,9)	91,3(90,1-92,4)	$F=2,495$; $df1=3,632$; $df2=2520,772$; $p=0,047$
MASCULINO	82,5(75,7-87,7)	90,0(85,5-93,2)	87,1(83,8-89,8)	87,9(83,6-91,1)	94,1(90,0-96,6)	88,0(86,1-89,7)	
FEMENINO	95,2(91,2-97,4)	92,7(89,3-95,0)	97,1(95,5-98,1)	91,8(86,9-95,0)	96,6(93,3-98,2)	94,4(92,9-95,5)	
ASISTE A IGLESIA O TEMPLO							
TOTAL	57,8(53,1-62,3)	54,7(50,2-59,1)	60,2(56,8-63,5)	64,9(61,5-68,1)	56,5(51,2-61,6)	58,9(57,0-60,7)	$F=2,023$; $df1=5,261$; $df2=3651,188$; $p=0,069$
MASCULINO	46,4(39,5-53,4)	45,9(38,8-53,2)	54,1(49,4-58,8)	54,2(49,1-59,2)	50,6(42,2-59,0)	50,4(47,5-53,3)	
FEMENINO	68,5(62,8-73,7)	61,1(56,2-65,9)	66,2(61,9-70,3)	75,7(71,9-79,2)	63,1(56,9-68,8)	66,7(64,4-68,8)	
PARTICIPA ACTIVAMENTE							
TOTAL	14,8(11,5-18,8)	15,2(12,6-18,3)	14,6(12,4-17,2)	15,2(12,8-17,9)	15,1(12,0-18,7)	15,0(13,7-16,3)	$F=0,601$; $df1=5,108$; $df2=3544,964$; $p=0,703$
MASCULINO	9,7(6,4-14,6)	13,2(9,5-18,3)	10,5(7,8-14,1)	12,4(9,2-16,4)	11,8(8,3-16,6)	11,6(10,0-13,4)	
FEMENINO	19,6(14,4-26,0)	16,7(13,4-20,6)	18,7(15,6-22,2)	18,0(14,7-21,8)	18,7(14,2-24,4)	18,1(16,3-20,0)	
LEE ESCRITURAS RELIGIOSAS							
TOTAL	41,7(36,6-47,0)	50,5(46,0-55,1)	45,3(41,7-48,9)	52,0(48,3-55,6)	47,3(41,0-53,6)	47,7(45,6-49,7)	$F=2,075$; $df1=7,507$; $df2=5209,642$; $p=0,038$
MASCULINO	35,0(28,1-42,7)	39,1(32,4-46,1)	41,9(37,1-46,8)	47,6(42,3-52,9)	43,0(34,8-51,7)	41,4(38,6-44,3)	
FEMENINO	48,1(40,9-55,3)	59,0(53,4-64,4)	48,6(44,1-53,1)	56,4(51,7-61,0)	52,1(45,1-59,0)	53,5(50,8-56,1)	
TRASMITE RELIGIÓN A HIJOS O NIETOS							
TOTAL	35,3(30,2-40,7)	30,9(27,0-35,1)	27,9(24,9-31,0)	39,9(36,3-43,8)	30,8(25,8-36,2)	32,8(30,9-34,7)	$F=8,484$; $df1=7,633$; $df2=5297,459$; $p<0,00001$
MASCULINO	26,6(20,2-34,2)	18,9(14,2-24,7)	22,3(18,4-26,9)	31,1(26,2-36,5)	22,2(16,2-29,7)	24,2(21,7-26,8)	
FEMENINO	43,5(36,8-50,4)	39,7(35,0-44,6)	33,3(29,7-37,0)	48,9(44,1-53,7)	40,4(33,5-47,7)	40,7(38,4-43,1)	
PREDICA RELIGIÓN A OTRAS PERSONAS							
TOTAL	15,5(12,0-19,7)	20,0(16,4-24,1)	17,1(14,7-19,8)	22,7(19,5-26,3)	22,4(18,4-27,0)	19,3(17,8-21,0)	$F=2,032$; $df1=6,434$; $df2=4465,105$; $p=0,053$
MASCULINO	10,4(6,9-15,2)	16,0(11,5-21,7)	15,2(11,9-19,3)	19,0(14,9-23,9)	18,8(14,0-24,7)	15,8(13,8-17,9)	
FEMENINO	20,3(14,9-26,9)	23,0(18,4-28,3)	19,1(16,0-22,5)	26,5(22,3-31,2)	26,5(20,5-33,6)	22,6(20,5-24,9)	
RELIGIÓN AYUDA A SOLUCIONAR PROBLEMAS							
TOTAL	65,2(60,2-69,9)	67,8(63,7-71,7)	61,6(58,7-64,5)	57,7(53,5-61,8)	59,7(54,9-64,2)	62,9(61,0-64,7)	$F=4,237$; $df1=7,428$; $df2=5155,248$; $p=0,00008$
MASCULINO	61,3(54,2-67,9)	67,7(61,4-73,4)	60,3(55,6-64,7)	52,9(47,9-57,8)	56,8(50,1-63,3)	60,2(57,6-62,7)	
FEMENINO	68,9(62,2-74,8)	67,9(62,9-72,5)	62,9(59,2-66,5)	62,6(57,2-67,7)	62,9(56,2-69,1)	65,3(63,0-67,7)	

TRASTORNOS CLÍNICOS

En la Tabla 34 se presentan las prevalencias de vida, anual, de seis meses y actual por grupos de trastornos clínicos, según los criterios de investigación de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). En general, 26,1% de la población de Lima Metropolitana presentó algún trastorno mental alguna vez en su vida, no existiendo diferencias estadísticamente significativas entre las áreas poblacionales, sin embargo se observa diferencias significativas en la prevalencia puntual de cualquier trastorno, siendo mayor en el Lima Este (10,0%) y menor en el Callao (4,1%). En términos de grupos de desórdenes se mantienen diferencias estadísticamente significativas entre las áreas poblacionales para la prevalencia anual y puntual de los trastornos de ansiedad, siendo nuevamente mayor en Lima Este (4,2% y 3,1% respectivamente) y menor en el Callao (1,4% y 0,7%

respectivamente). En lo que respecta a los trastornos depresivos existen diferencias significativas entre las áreas poblacionales con relación a la prevalencia de vida siendo mayor en Lima Centro (20,5%) y menor en Lima Norte (14,0%); sin embargo, no existen diferencias estadísticamente significativas ni en la prevalencia anual ni actual.

En general los resultados sobre prevalencia de trastornos mentales encontrados en este estudio son menores a los hallazgos del 2002, cuando el 37,3% de las personas reportaban haber sufrido alguna vez en su vida de algún trastorno mental y un 23,5% lo presentaba al momento de la encuesta. No se pueden hacer comparaciones con respecto a las áreas poblacionales por el tamaño de la muestra del estudio del año 2002.

Las Tablas 35A, 35B, 36, 37 y 38A presentan las prevalencias de vida, anuales, de seis meses y actuales de los principales trastornos mentales específicos según sexo y la prevalencia de vida de síntomas psicóticos en la población adulta según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao. En general el trastorno más frecuentes son el episodio depresivo, el consumo perjudicial/ dependencia de alcohol, la fobia social, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático. El análisis por género evidencia diferencias significativas para el episodio depresivo, más frecuente en la mujer y para el consumo perjudicial/dependencia de alcohol para el hombre. No se encontraron diferencias significativas por género para las otras patologías. En lo que concierne a la prevalencia de vida, el desorden más frecuente y con diferencias estadísticamente significativas entre las áreas poblacionales ha sido el trastorno depresivo en general con 20,5% en Lima Centro, 14,0% en Lima Norte, 17,1% en Lima Este, 19,9% en Lima Sur, 15,6% en Callao, 17,3% en total (Tabla 35A). Otras diferencias estadísticamente significativas entre las áreas poblacionales se encontró para la prevalencia de vida, anual y actual de la fobia social (mayor en Lima Este con 3,4% vida y menor en el Callao con 0,9% vida) y para la prevalencia de vida y anual (tendencia) del consumo perjudicial/dependencia de alcohol (mayor en Lima Este con 10,0% de vida y menor en Lima Centro con 6,0% de vida)¹³⁰. También se observó diferencias estadísticamente significativas para la prevalencia anual y actual de la agorafobia siendo mayor en Lima Este (0,8%).

En los que respecta al episodio psicótico no se encontraron diferencias significativas entre las áreas poblacionales, situándose entre 2,5% para Lima Centro y 1,0% para el Callao. En este sentido debemos tomar en cuenta que el instrumento utilizado (MINI) consigna el episodio psicótico a manera de un síndrome y no como esquizofrenia. Esta última no se incluye generalmente en estudios internacionales por problemas de sobre estimación³⁶, y porque podría tener connotaciones culturales. En el caso de este estudio se ha aplicado el criterio del MINI, es decir, considerar al menos un síntoma psicótico, pero agregándose el pleno convencimiento del mismo y con al menos un mes de duración¹³¹ acercándonos a los criterios de esquizofrenia de la CIE-10. La prevalencia de los síntomas psicóticos se muestra en la Tabla 35B.

No se hallaron casos de episodio maniaco en Lima Centro y el Callao, resultado consistente con otros estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Mental. Esto puede deberse a: a) una prevalencia baja en nuestro medio, por lo que el tamaño muestral no haya sido suficiente para su identificación; b) que los criterios de la CIE-10 aplicados a través del MINI tengan dificultades para la identificación de tales casos en nuestro medio debido a factores culturales u otros, o c) que los entrevistados tiendan a negar síntomas que impliquen trastornos mentales mayores¹³². En un estudio realizado en varones de Sao Paulo se encontró una prevalencia de trastorno bipolar de 0,0%, en tanto que en otro estudio llevado a cabo en mujeres de Brasilia, la prevalencia fue también de 0,0%, lo que obviamente no significa que no exista dicha patología en estos lugares¹³³. En otros estudios epidemiológicos que utilizaron el CIDI, especialmente en países en vías de desarrollo, se han demostrado bajas prevalencias de vida del trastorno bipolar; tales son los casos de Etiopía (0,1%)¹³⁴, Irán (0,18%)¹³⁵ e Iraq (0,2%)¹³⁶.

TABLA 34
PREVALENCIA DE VIDA ANUAL, DE SEIS MESES Y ACTUAL DE TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL
EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS MENTALES	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO*							
TOTAL	27,6(22,7-33,1)	23,8(20,4-27,5)	27,5(24,7-30,5)	28,3(24,7-32,2)	21,8(17,6-26,6)	26,1(24,3-27,8)	$F=1,662$; $df1=3,758$; $df2=2607,965$; $p=0,160$
MASCULINO	17,8(13,1-23,7)	22,9(17,6-29,1)	25,3(21,2-29,9)	20,9(16,7-25,8)	20,8(15,4-27,4)	21,9(19,7-24,3)	
FEMENINO	37,0(29,5-45,1)	24,4(20,5-28,8)	29,6(26,0-33,5)	35,7(30,8-40,9)	22,9(17,2-29,8)	29,9(27,5-32,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO							
TOTAL	10,8(8,2-14,0)	11,4(9,1-14,2)	14,4(12,3-16,9)	11,7(9,6-14,2)	8,6(6,5-11,3)	11,8(10,7-13,0)	$F=2,321$; $df1=3,774$; $df2=2619,492$; $p=0,058$
MASCULINO	7,2(4,8-10,7)	12,3(8,6-17,4)	16,6(13,0-21,0)	8,3(6,0-11,5)	8,3(5,4-12,5)	11,2(9,6-13,0)	
FEMENINO	14,2(10,0-19,7)	10,7(8,2-13,8)	12,2(9,9-15,0)	15,1(11,9-18,8)	9,0(6,1-12,9)	12,3(10,9-13,9)	
PREVALENCIA DE SEIS MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO**							
TOTAL	9,8(7,3-13,1)	9,5(7,4-12,2)	12,2(10,1-14,6)	10,1(8,3-12,3)	6,9(5,0-9,6)	10,1(9,0-11,2)	$F=1,920$; $df1=3,761$; $df2=2610,110$; $p=0,109$
MASCULINO	7,1(4,7-10,5)	11,8(8,1-16,8)	14,9(11,5-19,0)	7,1(5,1-9,9)	7,3(4,6-11,4)	10,2(8,7-12,0)	
FEMENINO	12,4(8,4-18,0)	7,8(5,6-10,8)	9,5(7,4-12,2)	13,1(10,4-16,5)	6,5(4,1-10,3)	9,9(8,6-11,4)	
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO ***							
TOTAL	8,6(6,3-11,7)	7,6(5,8-10,0)	10,0(8,0-12,4)	7,0(5,5-9,0)	4,1(2,7-6,3)	7,9(6,9-8,9)	$F=3,062$; $df1=3,806$; $df2=2641,685$; $p=0,017$
MASCULINO	6,6(4,3-10,0)	10,0(6,6-14,8)	12,5(9,2-16,7)	6,4(4,5-9,1)	5,3(3,2-8,6)	8,7(7,2-10,4)	
FEMENINO	10,5(6,8-15,9)	5,9(4,0-8,6)	7,6(5,6-10,1)	7,7(5,5-10,6)	2,8(1,4-5,5)	7,1(6,0-8,5)	
PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL***							
TOTAL	11,2(8,4-14,7)	10,1(7,9-12,9)	11,5(9,8-13,6)	10,2(8,2-12,7)	8,2(5,7-11,7)	10,5(9,4-11,6)	$F=0,731$; $df1=3,834$; $df2=2660,656$; $p=0,565$
MASCULINO	7,0(4,1-11,8)	9,6(6,2-14,5)	8,9(6,5-12,2)	6,6(4,3-9,9)	8,1(5,3-12,2)	8,1(6,7-9,8)	
FEMENINO	15,1(11,2-20,1)	10,5(7,8-14,0)	14,1(11,5-17,1)	13,9(11,0-17,5)	8,3(4,9-13,9)	12,6(11,1-14,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							
TOTAL	2,1(1,3-3,5)	3,0(2,0-4,7)	4,2(3,2-5,6)	2,5(1,7-3,7)	1,4(0,7-3,1)	2,9(2,4-3,5)	$F=2,634$; $df1=3,823$; $df2=2653,503$; $p=0,035$
MASCULINO	1,1(0,4-3,2)	3,4(1,6-7,0)	3,7(2,2-5,9)	1,9(0,9-4,1)	0,6(0,1-4,1)	2,4(1,7-3,4)	
FEMENINO	3,1(1,8-5,3)	2,8(1,6-4,7)	4,7(3,3-6,7)	3,1(1,9-4,9)	2,4(1,1-5,3)	3,3(2,7-4,2)	
PREVALENCIA DE SEIS MESES DE TRASTORNO DE ANSIEDAD EN GENERAL							
TOTAL	1,9(1,1-3,2)	2,3(1,3-3,8)	3,9(2,9-5,1)	2,0(1,3-3,2)	1,2(0,5-2,7)	2,4(2,0-3,0)	$F=3,000$; $df1=3,750$; $df2=2602,836$; $p=0,020$
MASCULINO	1,1(0,4-3,2)	2,9(1,3-6,2)	3,3(2,0-5,4)	1,3(0,5-3,3)	0,6(0,1-4,1)	2,1(1,4-3,0)	
FEMENINO	2,7(1,5-4,8)	1,8(0,9-3,6)	4,5(3,1-6,4)	2,7(1,6-4,6)	1,9(0,8-4,6)	2,8(2,2-3,5)	
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							
TOTAL	1,7(1,0-3,0)	1,7(0,9-3,1)	3,1(2,2-4,3)	1,3(0,7-2,4)	0,7(0,2-2,0)	1,9(1,5-2,4)	$F=3,105$; $df1=3,807$; $df2=2642,399$; $p=0,016$
MASCULINO	0,9(0,3-3,2)	1,9(0,7-5,1)	2,8(1,6-4,9)	1,2(0,4-3,2)	0,6(0,1-4,1)	1,7(1,1-2,5)	
FEMENINO	2,4(1,3-4,5)	1,5(0,8-3,1)	3,5(2,3-5,3)	1,5(0,7-3,0)	0,8(0,2-2,4)	2,1(1,5-2,7)	
PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL****							
TOTAL	20,5(16,7-25,0)	14,0(11,6-16,8)	17,1(14,8-19,8)	19,9(16,7-23,5)	15,6(12,4-19,5)	17,3(15,9-18,7)	$F=3,168$; $df1=3,860$; $df2=2679,092$; $p=0,014$
MASCULINO	12,7(8,8-18,0)	10,6(7,2-15,3)	13,0(10,0-16,7)	13,0(9,5-17,7)	14,5(9,6-21,2)	12,6(10,8-14,5)	
FEMENINO	28,0(21,8-35,3)	16,4(13,4-20,1)	21,2(18,1-24,8)	26,8(22,5-31,6)	16,8(12,8-21,8)	21,6(19,7-23,7)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							
TOTAL	6,1(4,1-8,8)	5,2(3,8-7,1)	7,3(5,9-9,1)	6,7(5,0-8,9)	5,7(4,1-7,9)	6,2(5,4-7,1)	$F=0,928$; $df1=3,751$; $df2=2603,285$; $p=0,442$
MASCULINO	1,8(0,8-4,0)	2,9(1,2-6,8)	6,1(4,1-8,9)	3,1(1,6-5,9)	4,9(2,7-8,8)	3,8(2,9-5,0)	
FEMENINO	10,2(6,6-15,3)	6,9(4,9-9,4)	8,6(6,5-11,1)	10,3(7,6-13,8)	6,6(4,3-9,9)	8,5(7,3-9,9)	

TRASTORNOS MENTALES	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA DE SEIS MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							
TOTAL	5,1(3,3-7,9)	3,7(2,5-5,5)	5,1(3,9-6,8)	5,3(3,9-7,2)	3,7(2,3-5,8)	4,6(3,9-5,5)	$F=0,889$; $df1=3,754$; $df2=2605,388$; $p=0,464$
MASCULINO	1,6(0,7-3,9)	2,9(1,2-6,8)	4,3(2,8-6,7)	2,0(0,9-4,6)	3,5(1,7-7,2)	2,9(2,1-4,1)	
FEMENINO	8,4(5,1-13,6)	4,3(2,8-6,5)	5,9(4,1-8,4)	8,6(6,3-11,7)	3,8(2,2-6,7)	6,2(5,1-7,5)	
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							
TOTAL	4,3(2,6-6,8)	2,6(1,6-4,2)	2,9(2,0-4,3)	2,7(1,7-4,2)	1,2(0,6-2,7)	2,8(2,3-3,5)	$F=1,757$; $df1=3,760$; $df2=2609,285$; $p=0,139$
MASCULINO	1,6(0,7-3,9)	2,3(0,8-6,1)	1,7(0,8-3,6)	1,3(0,4-3,7)	1,2(0,4-3,4)	1,7(1,1-2,6)	
FEMENINO	6,8(3,9-11,6)	2,8(1,6-4,7)	4,1(2,7-6,4)	4,1(2,5-6,7)	1,3(0,4-3,7)	3,9(3,0-5,0)	
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO O DEPENDENCIA DE CUALQUIER SUSTANCIA							
TOTAL	2,6(1,6-4,3)	3,3(2,0-5,2)	4,3(3,1-5,9)	2,5(1,7-3,8)	2,7(1,5-4,6)	3,2(2,6-3,9)	$F=1,191$; $df1=3,721$; $df2=2582,262$; $p=0,313$
MASCULINO	4,4(2,5-7,6)	6,0(3,6-10,0)	8,4(6,0-11,5)	4,1(2,7-6,2)	4,0(2,2-7,2)	5,7(4,6-7,0)	
FEMENINO	0,9(0,3-2,5)	1,2(0,4-3,5)	0,2(0,0-1,0)	1,0(0,4-2,5)	1,2(0,4-3,5)	0,9(0,5-1,5)	

* En dependencia o consumo perjudicial de sustancias se incluye solo la prevalencia anual; en la conducta alimentaria, solo la prevalencia actual.

** Se incluye la prevalencia anual de consumo perjudicial o dependencia de sustancias nocivas.

*** Trastornos de ansiedad: incluye agorafobia, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés post-traumático y fobia social.

**** Trastornos depresivos en general: incluye episodio depresivo moderado a severo y distimia.

TABLA 35A
PREVALENCIA DE VIDA DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS MENTALES EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CIE-10	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
EPISODIO PSICÓTICO*							
TOTAL	2,5(1,3-4,7)	1,1(0,5-2,2)	1,1(0,6-1,9)	2,0(1,2-3,2)	1,0(0,3-2,9)	1,5(1,1-2,0)	$F=1,678$; $df1=3,858$; $df2=2677,310$; $p=0,155$
MASCULINO	1,7(0,5-5,1)	1,0(0,4-2,7)	1,0(0,4-2,8)	1,5(0,6-3,6)	1,7(0,5-5,4)	1,3(0,8-2,1)	
FEMENINO	3,3(1,6-6,5)	1,1(0,4-3,1)	1,1(0,5-2,2)	2,4(1,4-4,2)	0,1(0,0-0,7)	1,6(1,1-2,4)	
EPISODIO MANÍACO							
TOTAL	-	0,1(0,0-1,0)	0,1(0,0-0,4)	-	-	0,1(0,0-0,2)	$F=0,555$; $df1=3,605$; $df2=2501,980$; $p=0,677$
MASCULINO	-	-	0,1(0,0-0,8)	-	-	0,0(0,0-0,2)	
FEMENINO	-	0,2(0,0-1,7)	-	-	-	0,1(0,0-0,5)	
HIPOMANÍA							
TOTAL	-	0,2(0,0-1,4)	0,1(0,0-0,7)	0,2(0,0-1,3)	-	0,1(0,0-0,4)	$F=0,395$; $df1=3,690$; $df2=2560,707$; $p=0,797$
MASCULINO	-	0,5(0,1-3,2)	0,2(0,0-1,4)	0,4(0,1-2,6)	-	0,2(0,1-0,8)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
BIPOLAR (MANÍA E HIPOMANÍA)							
TOTAL	-	0,3(0,1-1,4)	0,2(0,0-0,6)	0,2(0,0-1,3)	-	0,2(0,1-0,4)	$F=0,682$; $df1=3,711$; $df2=2575,451$; $p=0,594$
MASCULINO	-	0,5(0,1-3,2)	0,3(0,1-1,3)	0,4(0,1-2,5)	-	0,3(0,1-0,8)	
FEMENINO	-	0,2(0,0-1,7)	-	-	-	0,1(0,0-0,5)	
EPISODIO DEPRESIVO							
TOTAL	20,5(16,7-25,0)	14,0(11,6-16,8)	17,1(14,7-19,8)	19,8(16,6-23,3)	15,5(12,3-19,4)	17,2(15,8-18,7)	$F=3,120$; $df1=3,861$; $df2=2679,637$; $p=0,015$
MASCULINO	12,7(8,8-18,0)	10,6(7,2-15,3)	13,0(10,0-16,7)	13,0(9,5-17,7)	14,3(9,5-21,1)	12,5(10,8-14,5)	
FEMENINO	28,0(21,8-35,3)	16,4(13,4-20,1)	21,1(18,0-24,7)	26,5(22,3-31,3)	16,8(12,8-21,8)	21,6(19,6-23,7)	
EPISODIO DEPRESIVO LEVE							
TOTAL	3,6(2,4-5,6)	1,4(0,8-2,6)	4,2(3,1-5,9)	3,0(2,0-4,5)	1,5(0,8-2,8)	2,8(2,3-3,5)	$F=4,394$; $df1=3,819$; $df2=2650,269$; $p=0,002$
MASCULINO	2,7(1,2-6,0)	0,3(0,1-1,6)	4,7(2,9-7,7)	2,1(1,0-4,2)	0,4(0,1-1,7)	2,3(1,6-3,2)	
FEMENINO	4,5(2,7-7,5)	2,3(1,3-3,9)	3,8(2,6-5,4)	3,9(2,5-6,3)	2,7(1,3-5,5)	3,4(2,7-4,2)	

TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CIE-10	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO							
TOTAL	7,7(5,7-10,3)	5,2(3,8-7,2)	4,7(3,5-6,2)	5,0(3,5-7,1)	5,2(3,3-8,2)	5,5(4,7-6,4)	F=1,529; df1=3,947; df2=2739,064; p=0,192
MASCULINO	5,2(3,1-8,6)	5,0(2,7-9,1)	3,6(2,2-5,7)	2,9(1,3-6,3)	4,2(1,6-10,3)	4,1(3,1-5,5)	
FEMENINO	10,0(6,7-14,7)	5,4(3,7-7,8)	5,8(4,1-8,1)	7,1(4,9-10,1)	6,4(4,0-10,0)	6,7(5,6-8,0)	
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO							
TOTAL	9,2(6,3-13,2)	7,6(5,9-9,9)	8,2(6,6-10,1)	11,7(9,5-14,4)	8,8(6,6-11,6)	9,0(8,0-10,1)	F=1,889; df1=3,539; df2=2456,284; p=0,118
MASCULINO	4,7(2,4-9,1)	5,7(3,4-9,5)	4,8(3,1-7,3)	8,0(5,3-11,9)	9,8(6,7-13,9)	6,3(5,1-7,7)	
FEMENINO	13,5(8,9-20,0)	9,0(6,9-11,7)	11,6(9,2-14,5)	15,5(12,3-19,3)	7,8(5,1-11,6)	11,5(10,1-13,2)	
DISTIMIA							
TOTAL	0,7(0,3-1,6)	0,2(0,0-1,3)	1,0(0,6-1,9)	0,4(0,1-1,2)	0,7(0,3-1,7)	0,6(0,4-0,9)	F=1,523; df1=3,418; df2=2371,825; p=0,201
MASCULINO	0,4(0,1-1,4)	-	0,4(0,1-1,8)	0,4(0,1-2,7)	0,9(0,3-2,7)	0,4(0,2-0,7)	
FEMENINO	1,1(0,4-2,9)	0,3(0,0-2,2)	1,7(0,8-3,2)	0,5(0,2-1,3)	0,4(0,1-2,7)	0,8(0,5-1,3)	
AGORAFOBIA							
TOTAL	0,7(0,2-1,9)	1,3(0,7-2,4)	1,2(0,7-2,2)	1,8(1,1-3,0)	0,8(0,3-2,2)	1,2(0,9-1,6)	F=1,025; df1=3,894; df2=2702,241; p=0,392
MASCULINO	0,1(0,0-1,0)	1,8(0,7-4,3)	0,6(0,1-3,2)	1,3(0,5-3,6)	0,9(0,2-3,6)	1,0(0,6-1,7)	
FEMENINO	1,2(0,4-3,5)	0,9(0,3-2,2)	1,8(1,0-3,2)	2,4(1,4-4,0)	0,7(0,2-2,9)	1,4(1,0-2,0)	
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO							
TOTAL	5,8(3,9-8,6)	5,2(3,7-7,3)	5,0(3,9-6,4)	4,5(3,4-6,1)	4,8(3,1-7,5)	5,1(4,4-5,9)	F=0,272; df1=3,726; df2=2585,578; p=0,885
MASCULINO	4,0(2,0-8,0)	3,6(1,8-6,9)	3,8(2,5-5,7)	1,4(0,6-3,5)	4,5(2,6-7,6)	3,4(2,5-4,4)	
FEMENINO	7,5(4,6-12,0)	6,4(4,3-9,6)	6,2(4,6-8,4)	7,7(5,5-10,5)	5,2(2,8-9,6)	6,7(5,6-8,0)	
FOBIA SOCIAL							
TOTAL	1,5(0,8-2,8)	3,0(1,9-4,9)	3,4(2,5-4,6)	1,1(0,5-2,3)	0,9(0,3-2,5)	2,2(1,7-2,8)	F=3,963; df1=3,849; df2=2671,430; p=0,004
MASCULINO	0,6(0,2-1,9)	4,0(2,1-7,8)	2,2(1,2-3,8)	1,4(0,5-3,7)	1,1(0,3-4,3)	2,0(1,4-3,0)	
FEMENINO	2,3(1,1-4,6)	2,3(1,2-4,4)	4,5(3,1-6,7)	0,8(0,3-2,0)	0,7(0,2-2,9)	2,4(1,8-3,2)	
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA							
TOTAL	0,5(0,2-1,5)	0,1(0,0-0,9)	0,5(0,2-1,4)	0,6(0,3-1,4)	1,0(0,4-2,8)	0,5(0,3-0,8)	F=1,247; df1=3,962; df2=2749,902; p=0,289
MASCULINO	0,3(0,0-2,3)	-	0,6(0,1-2,5)	0,5(0,2-1,6)	-	0,3(0,1-0,7)	
FEMENINO	0,6(0,2-2,6)	0,2(0,0-1,5)	0,5(0,2-1,6)	0,7(0,3-1,7)	2,2(0,8-5,9)	0,6(0,4-1,1)	
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA							
TOTAL	4,2(2,6-6,7)	2,2(1,4-3,7)	3,2(2,3-4,4)	3,4(2,3-5,0)	1,4(0,5-3,8)	3,0(2,4-3,6)	F=1,800; df1=3,880; df2=2692,611; p=0,128
MASCULINO	3,1(1,6-5,9)	2,5(1,2-5,1)	3,0(1,7-5,1)	2,2(1,1-4,3)	1,6(0,4-5,4)	2,6(1,9-3,5)	
FEMENINO	5,3(2,9-9,4)	2,0(1,1-3,5)	3,4(2,2-5,2)	4,6(3,0-6,9)	1,3(0,5-3,4)	3,3(2,6-4,3)	
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO							
TOTAL	0,3(0,1-1,0)	0,4(0,1-0,9)	0,1(0,0-0,4)	0,2(0,1-0,7)	0,3(0,0-2,2)	0,2(0,1-0,4)	F=0,538; df1=3,575; df2=2480,801; p=0,688
MASCULINO	-	0,2(0,0-1,6)	-	0,2(0,0-0,8)	0,6(0,1-4,1)	0,2(0,1-0,5)	
FEMENINO	0,6(0,2-1,9)	0,4(0,1-1,4)	0,2(0,0-0,7)	0,2(0,0-1,5)	-	0,3(0,2-0,6)	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL							
TOTAL	6,0(4,1-8,8)	6,2(4,5-8,6)	10,0(8,1-12,4)	7,5(5,8-9,8)	6,8(4,9-9,3)	7,5(6,5-8,5)	F=2,594; df1=3,764; df2=2612,399; p=0,038
MASCULINO	11,2(7,4-16,5)	12,4(8,8-17,2)	18,9(15,6-22,8)	11,4(8,6-15,0)	11,6(8,5-15,8)	13,5(11,8-15,4)	
FEMENINO	1,1(0,5-2,6)	1,7(0,7-4,0)	1,3(0,7-2,4)	3,6(2,0-6,4)	1,3(0,5-3,4)	1,8(1,3-2,6)	

* Los criterios del MINI consideran la presencia de episodio psicótico con la presencia de al menos un síntoma psicótico. Para el caso de este estudio se ha considerado positivo el síntoma psicótico siempre y cuando exista un completo convencimiento del síntoma y haya estado presente al menos un síntoma psicótico al mes (Tabla 35B).

TABLA 35B
PREVALENCIA DE VIDA DE SÍNTOMAS PSICÓTICOS EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

EXPERIENCIAS POCO USUALES O EXTRAÑAS QUE PUEDEN OCURRIRLE A ALGUNAS PERSONAS, EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA...							
	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN LO(A) ESPIABA O CONSPIRABA O TRAMABA ALGO CONTRA USTED?							
TOTAL	4,2(2,3-7,6)	2,7(1,7-4,3)	1,2(0,7-2,0)	2,3(1,4-3,6)	1,5(0,6-3,4)	2,4(1,8-3,1)	$F=3,164; df1=3,536; df2=2454,136; p=0,017$
MASCULINO	2,8(1,5-5,4)	3,7(2,0-7,0)	1,2(0,5-2,8)	1,7(0,7-3,7)	2,3(0,9-6,0)	2,3(1,6-3,3)	
FEMENINO	5,6(2,5-12,1)	1,9(0,9-3,8)	1,2(0,6-2,3)	2,9(1,7-4,8)	0,5(0,1-2,0)	2,4(1,6-3,6)	
¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN INTENTABA HACERLE DAÑO?							
TOTAL	4,2(2,6-6,9)	2,3(1,3-4,0)	0,6(0,2-1,4)	2,2(1,5-3,4)	0,7(0,3-1,6)	2,0(1,5-2,7)	$F=6,390; df1=3,441; df2=2388,184; p=0,00012$
MASCULINO	2,6(1,2-5,8)	3,1(1,5-6,1)	0,7(0,2-2,5)	1,6(0,7-3,5)	0,8(0,2-2,7)	1,8(1,2-2,7)	
FEMENINO	5,7(3,1-10,5)	1,7(0,7-4,4)	0,4(0,1-1,4)	2,8(1,7-4,6)	0,5(0,1-2,0)	2,2(1,5-3,2)	
¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE LE PODÍAN LEER SUS PENSAMIENTOS O QUE PODÍA LEER LOS PENSAMIENTOS DE OTROS?							
TOTAL	0,8(0,4-2,0)	0,2(0,1-0,5)	0,4(0,1-1,1)	0,4(0,2-1,0)	-	0,4(0,2-0,6)	$F=2,021; df1=3,542; df2=2458,285; p=0,098$
MASCULINO	1,0(0,3-3,0)	-	0,4(0,1-2,3)	0,2(0,0-1,0)	-	0,3(0,1-0,8)	
FEMENINO	0,7(0,2-2,9)	0,3(0,1-0,8)	0,3(0,1-1,2)	0,6(0,2-1,7)	-	0,4(0,2-0,7)	
¿HA CREÍDO QUE ALGUIEN O ALGUNA COSA DEL EXTERIOR LE METÍA EN LA CABEZA PENSAMIENTOS EXTRAÑOS QUE NO ERAN LOS SUYOS O LE HACÍA ACTUAR DE UNA MANERA INHABITUAL PARA USTED?							
TOTAL	-	0,4(0,1-1,3)	0,2(0,1-0,6)	0,5(0,2-1,5)	0,2(0,0-1,3)	0,3(0,1-0,5)	$F=1,025; df1=3,590; df2=2491,567; p=0,388$
MASCULINO	-	0,4(0,1-2,6)	0,3(0,1-1,2)	0,4(0,1-2,3)	0,3(0,0-2,4)	0,3(0,1-0,7)	
FEMENINO	-	0,5(0,1-1,9)	0,1(0,0-0,7)	0,6(0,1-2,4)	-	0,3(0,1-0,7)	
¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN SE DIRIGÍA DIRECTAMENTE A USTED A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN, LA RADIO O LOS PERIÓDICOS O QUE CIERTAS PERSONAS QUE NO CONOCÍA PERSONALMENTE SE INTERESABAN PARTICULARMENTE POR USTED?							
TOTAL	0,1(0,0-0,4)	0,5(0,1-1,7)	0,1(0,0-0,5)	0,5(0,2-1,3)	-	0,3(0,1-0,5)	$F=1,658; df1=2,873; df2=1993,667; p=0,176$
MASCULINO	0,1(0,0-0,8)	1,0(0,2-4,0)	0,1(0,0-1,0)	0,3(0,1-1,7)	-	0,4(0,1-1,0)	
FEMENINO	-	0,1(0,0-0,6)	-	0,6(0,2-2,2)	-	0,1(0,0-0,4)	
¿HA TENIDO IDEAS QUE LAS PERSONAS CERCANAS A USTED CONSIDERABAN COMO EXTRAÑAS O FUERA DE LA REALIDAD?							
TOTAL	0,1(0,0-0,7)	0,2(0,1-1,0)	0,1(0,0-0,4)	0,2(0,1-0,8)	-	0,2(0,1-0,3)	$F=0,472; df1=3,551; df2=2464,220; p=0,734$
MASCULINO	-	0,3(0,0-2,4)	0,1(0,0-1,0)	0,1(0,0-0,5)	-	0,1(0,0-0,5)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,5)	0,2(0,0-1,1)	0,1(0,0-0,3)	0,4(0,1-1,6)	-	0,2(0,1-0,4)	
¿HA ESCUCHADO COSAS QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN OÍR, COMO VOCES?							
TOTAL	2,2(1,2-4,1)	2,8(1,7-4,6)	1,0(0,5-1,8)	2,8(1,9-4,2)	1,3(0,6-2,7)	2,1(1,6-2,7)	$F=2,594; df1=3,676; df2=2550,970; p=0,039$
MASCULINO	2,3(1,1-4,8)	3,9(2,0-7,4)	1,0(0,4-2,7)	1,7(0,8-3,4)	1,9(0,8-4,6)	2,2(1,5-3,1)	
FEMENINO	2,1(0,9-4,9)	2,0(1,0-4,1)	0,9(0,4-2,0)	4,0(2,5-6,4)	0,6(0,2-1,9)	2,0(1,5-2,8)	
¿HA VISTO COSAS O HA TENIDO VISIONES QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN VER?							
TOTAL	3,8(1,9-7,5)	2,0(1,2-3,3)	0,7(0,3-1,5)	3,4(2,3-5,1)	0,9(0,4-1,9)	2,2(1,6-2,9)	$F=4,815; df1=3,062; df2=2125,032; p=0,002$
MASCULINO	1,9(0,8-4,1)	2,2(1,0-4,8)	0,4(0,1-2,3)	1,1(0,4-3,1)	1,2(0,4-3,3)	1,3(0,9-2,1)	
FEMENINO	5,6(2,3-13,1)	1,8(1,0-3,3)	1,0(0,4-2,1)	5,8(3,8-8,8)	0,5(0,1-1,9)	2,9(2,0-4,2)	

TABLA 36
PREVALENCIA ANUAL DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS MENTALES EN LA POBLACIÓN
ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CIE-10	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
EPISODIO DEPRESIVO							
TOTAL	5,9(4,0-8,6)	5,2(3,8-7,1)	7,3(5,9-9,1)	6,5(4,9-8,7)	5,6(4,0-7,8)	6,2(5,4-7,1)	F=0,938; df1=3,744; df2=2598,136; p=0,436
MASCULINO	1,8(0,8-4,0)	2,9(1,2-6,8)	6,1(4,1-8,9)	3,1(1,6-5,9)	4,8(2,6-8,7)	3,8(2,9-5,0)	
FEMENINO	9,8(6,3-14,8)	6,9(4,9-9,4)	8,6(6,5-11,1)	10,0(7,3-13,5)	6,6(4,3-9,9)	8,3(7,1-9,7)	
EPISODIO DEPRESIVO LEVE							
TOTAL	0,4(0,1-1,3)	0,3(0,1-1,2)	2,2(1,4-3,4)	0,7(0,3-1,6)	0,6(0,2-1,7)	0,9(0,6-1,3)	F=6,011; df1=3,765; df2=2612,611; p=0,00012
MASCULINO	0,1(0,0-0,7)	-	2,6(1,4-4,8)	0,1(0,0-0,8)	-	0,7(0,4-1,3)	
FEMENINO	0,8(0,2-2,6)	0,5(0,1-2,0)	1,8(1,0-3,3)	1,3(0,5-3,1)	1,2(0,4-3,6)	1,1(0,7-1,6)	
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO							
TOTAL	1,7(1,0-3,2)	2,2(1,3-3,7)	1,6(0,9-2,7)	2,0(1,2-3,3)	1,6(0,8-3,3)	1,9(1,4-2,4)	F=0,272; df1=3,891; df2=2700,155; p=0,892
MASCULINO	0,3(0,0-1,8)	2,0(0,7-5,5)	1,4(0,5-3,4)	0,8(0,2-2,7)	1,9(0,7-4,9)	1,3(0,7-2,1)	
FEMENINO	3,2(1,7-5,9)	2,3(1,3-4,0)	1,7(1,0-3,0)	3,2(1,8-5,6)	1,3(0,5-3,7)	2,4(1,8-3,2)	
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO							
TOTAL	3,7(2,2-6,2)	2,8(1,7-4,4)	3,6(2,6-4,9)	3,9(2,6-5,6)	3,4(2,2-5,3)	3,4(2,8-4,1)	F=0,406; df1=3,686; df2=2558,182; p=0,789
MASCULINO	1,4(0,5-3,7)	0,9(0,2-4,7)	2,1(1,0-4,4)	2,2(1,0-4,9)	2,8(1,3-6,2)	1,8(1,2-2,7)	
FEMENINO	5,8(3,2-10,5)	4,1(2,6-6,4)	5,0(3,6-6,9)	5,5(3,7-8,1)	4,0(2,3-7,1)	4,9(4,0-6,0)	
EPISODIO PSICÓTICO*							
TOTAL	1,3(0,5-3,2)	0,3(0,1-1,0)	0,5(0,2-1,3)	0,7(0,3-1,8)	0,2(0,0-1,0)	0,6(0,4-1,0)	F=1,708; df1=3,621; df2=2512,882; p=0,152
MASCULINO	0,8(0,3-2,6)	0,6(0,1-2,3)	0,6(0,2-2,5)	0,9(0,3-3,1)	0,3(0,0-2,1)	0,7(0,4-1,2)	
FEMENINO	1,7(0,6-4,7)	0,2(0,0-1,1)	0,5(0,2-1,4)	0,5(0,2-1,8)	0,1(0,0-0,7)	0,6(0,3-1,1)	
BIPOLAR (MANÍA E HIPOMANÍA)							
TOTAL	-	0,2(0,0-1,4)	-	-	-	0,1(0,0-0,4)	F=0,831; df1=3,717; df2=2579,352; p=0,498
MASCULINO	-	0,5(0,1-3,2)	-	-	-	0,1(0,0-0,8)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
AGORAFOBIA							
TOTAL	0,1(0,0-0,7)	0,6(0,2-1,7)	0,9(0,4-1,7)	0,5(0,2-1,4)	0,1(0,0-1,1)	0,5(0,3-0,8)	F=1,536; df1=3,489; df2=2421,293; p=0,196
MASCULINO	-	0,9(0,2-3,5)	0,4(0,1-2,2)	0,7(0,2-2,5)	-	0,5(0,2-1,1)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,3)	0,4(0,1-2,0)	1,3(0,6-2,6)	0,4(0,1-1,4)	0,3(0,0-2,2)	0,6(0,3-1,0)	
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO							
TOTAL	0,4(0,1-1,6)	0,6(0,3-1,3)	0,9(0,5-1,8)	0,6(0,3-1,4)	0,6(0,2-1,9)	0,7(0,5-1,0)	F=0,440; df1=3,906; df2=2710,891; p=0,776
MASCULINO	0,5(0,1-3,3)	0,2(0,0-1,7)	1,1(0,4-2,8)	-	-	0,4(0,2-0,9)	
FEMENINO	0,4(0,1-2,0)	0,9(0,4-2,0)	0,8(0,4-1,8)	1,2(0,6-2,7)	1,2(0,4-4,0)	0,9(0,6-1,4)	
FOBIA SOCIAL							
TOTAL	0,6(0,2-1,6)	1,2(0,5-2,4)	1,7(1,0-2,7)	0,5(0,1-1,6)	0,3(0,0-2,2)	0,9(0,7-1,4)	F=2,010; df1=3,895; df2=2703,014; p=0,092
MASCULINO	-	1,8(0,7-4,7)	1,0(0,4-2,7)	0,8(0,2-3,2)	0,6(0,1-4,1)	0,9(0,5-1,7)	
FEMENINO	1,2(0,4-3,1)	0,7(0,2-2,2)	2,3(1,3-4,0)	0,1(0,0-0,8)	-	1,0(0,6-1,5)	
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA							
TOTAL	-	-	0,1(0,0-0,5)	0,2(0,1-0,6)	0,6(0,2-1,9)	0,1(0,1-0,3)	F=2,389; df1=2,875; df2=1994,930; p=0,070
MASCULINO	-	-	0,1(0,0-1,0)	0,2(0,0-1,1)	-	0,1(0,0-0,3)	
FEMENINO	-	-	0,1(0,0-0,7)	0,2(0,0-0,8)	1,3(0,4-4,0)	0,2(0,1-0,4)	
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA							
TOTAL	0,9(0,5-1,9)	0,7(0,3-1,6)	1,0(0,5-1,7)	0,6(0,3-1,3)	-	0,7(0,5-1,0)	F=1,203; df1=3,813; df2=2646,025; p=0,308
MASCULINO	0,6(0,2-2,1)	0,8(0,3-2,6)	1,1(0,5-2,4)	0,3(0,1-1,2)	-	0,6(0,4-1,1)	
FEMENINO	1,2(0,5-3,1)	0,6(0,2-1,9)	0,8(0,3-2,1)	0,9(0,4-2,2)	-	0,8(0,5-1,2)	

TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CIE-10	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO							
TOTAL	0,0(0,0-0,3)	0,1(0,0-0,6)	-	0,2(0,0-0,7)	0,3(0,0-2,2)	0,1(0,0-0,3)	$F=1,098$; $df1=3,320$; $df2=2303,905$; $p=0,352$
MASCULINO	-	-	-	0,1(0,0-0,8)	0,6(0,1-4,1)	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-1,0)	-	0,2(0,0-1,5)	-	0,1(0,0-0,3)	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL							
TOTAL	1,6(0,8-3,1)	2,4(1,4-4,2)	4,0(2,8-5,6)	2,1(1,3-3,4)	1,8(1,0-3,4)	2,5(2,0-3,2)	$F=2,394$; $df1=3,651$; $df2=2533,664$; $p=0,054$
MASCULINO	3,1(1,5-6,1)	4,8(2,6-8,7)	7,8(5,5-10,9)	3,5(2,2-5,7)	2,8(1,4-5,8)	4,8(3,7-6,0)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	0,6(0,1-2,9)	0,2(0,0-1,0)	0,7(0,2-2,3)	0,7(0,2-2,8)	0,5(0,2-1,0)	

* Los criterios del MINI consideran la presencia de episodio psicótico con la presencia de al menos un síntoma psicótico. Para el caso de este estudio se ha considerado positivo el síntoma psicótico siempre y cuando exista un completo convencimiento del síntoma y haya estado presente al menos un síntoma psicótico al mes.

TABLA 37
PREVALENCIA EN LOS SEIS ÚLTIMOS MESES DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS MENTALES EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CIE-10	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
EPISODIO DEPRESIVO							
TOTAL	4,9(3,1-7,7)	3,7(2,5-5,5)	5,1(3,9-6,8)	5,2(3,8-7,0)	3,6(2,3-5,6)	4,6(3,9-5,4)	$F=0,814$; $df1=3,744$; $df2=2598,157$; $p=0,509$
MASCULINO	1,6(0,7-3,9)	2,9(1,2-6,8)	4,3(2,8-6,7)	2,0(0,9-4,6)	3,4(1,6-7,1)	2,9(2,1-4,0)	
FEMENINO	8,1(4,9-13,1)	4,3(2,8-6,5)	5,9(4,1-8,4)	8,3(6,0-11,3)	3,8(2,2-6,7)	6,1(5,0-7,3)	
EPISODIO DEPRESIVO LEVE							
TOTAL	0,2(0,0-0,8)	0,3(0,1-1,2)	1,7(1,0-2,9)	0,4(0,1-1,1)	0,1(0,0-1,0)	0,6(0,4-1,0)	$F=6,785$; $df1=3,502$; $df2=2430,362$; $p=0,00005$
MASCULINO	0,1(0,0-0,7)	-	2,0(0,9-4,1)	0,1(0,0-0,8)	-	0,5(0,3-1,1)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,7)	0,5(0,1-2,0)	1,5(0,8-3,1)	0,7(0,2-2,2)	0,3(0,0-2,0)	0,7(0,4-1,2)	
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO							
TOTAL	1,2(0,6-2,5)	1,6(0,9-3,1)	1,1(0,5-2,2)	1,9(1,1-3,2)	1,1(0,4-2,8)	1,4(1,0-1,9)	$F=0,546$; $df1=3,884$; $df2=2695,476$; $p=0,697$
MASCULINO	0,3(0,0-1,8)	2,0(0,7-5,5)	1,1(0,4-3,3)	0,7(0,2-2,8)	1,2(0,3-4,4)	1,1(0,6-2,0)	
FEMENINO	2,1(0,9-4,5)	1,4(0,6-2,9)	1,1(0,6-2,1)	3,1(1,7-5,4)	1,0(0,3-3,5)	1,7(1,2-2,4)	
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO							
TOTAL	3,6(2,1-6,1)	1,8(1,0-3,3)	2,3(1,6-3,3)	2,9(1,9-4,3)	2,3(1,4-4,0)	2,5(2,0-3,1)	$F=1,196$; $df1=3,565$; $df2=2474,162$; $p=0,311$
MASCULINO	1,3(0,5-3,6)	0,9(0,2-4,7)	1,3(0,6-2,7)	1,2(0,4-3,7)	2,2(0,9-5,3)	1,3(0,8-2,1)	
FEMENINO	5,7(3,1-10,4)	2,4(1,3-4,4)	3,3(2,1-5,0)	4,5(3,1-6,6)	2,5(1,3-4,8)	3,6(2,8-4,6)	
EPISODIO PSICÓTICO							
TOTAL	1,1(0,4-3,0)	0,3(0,1-1,0)	0,4(0,1-1,2)	0,4(0,1-1,3)	0,2(0,0-1,0)	0,5(0,3-0,8)	$F=1,455$; $df1=3,593$; $df2=2493,762$; $p=0,218$
MASCULINO	0,8(0,3-2,6)	0,6(0,1-2,3)	0,4(0,1-2,5)	0,5(0,1-2,4)	0,3(0,0-2,1)	0,5(0,3-1,0)	
FEMENINO	1,4(0,4-4,4)	0,2(0,0-1,1)	0,5(0,2-1,4)	0,3(0,1-1,6)	0,1(0,0-0,7)	0,5(0,2-0,9)	
BIPOLAR (MANÍA E HIPOMANÍA)							
TOTAL	-	0,2(0,0-1,4)	-	-	-	0,1(0,0-0,4)	$F=0,831$; $df1=3,717$; $df2=2579,352$; $p=0,498$
MASCULINO	-	0,5(0,1-3,2)	-	-	-	0,1(0,0-0,8)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
AGORAFOBIA							
TOTAL	0,1(0,0-0,7)	0,1(0,0-1,0)	0,8(0,4-1,6)	0,2(0,1-0,6)	0,1(0,0-1,1)	0,3(0,2-0,5)	$F=3,302$; $df1=3,443$; $df2=2389,687$; $p=0,015$
MASCULINO	-	0,3(0,0-2,2)	0,4(0,1-2,2)	0,3(0,1-1,0)	-	0,2(0,1-0,7)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,3)	-	1,2(0,6-2,5)	0,2(0,1-0,9)	0,3(0,0-2,2)	0,4(0,2-0,7)	
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO							
TOTAL	0,4(0,1-1,6)	0,3(0,1-0,9)	0,7(0,3-1,4)	0,4(0,2-1,0)	0,6(0,2-1,9)	0,5(0,3-0,7)	$F=0,373$; $df1=3,854$; $df2=2674,460$; $p=0,821$
MASCULINO	0,5(0,1-3,3)	0,2(0,0-1,7)	0,7(0,2-2,0)	-	-	0,3(0,1-0,7)	
FEMENINO	0,4(0,1-2,0)	0,4(0,1-1,2)	0,7(0,3-1,6)	0,9(0,4-2,1)	1,2(0,4-4,0)	0,6(0,4-1,0)	

TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CIE-10	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
FOBIA SOCIAL							
TOTAL	0,4(0,1-1,2)	1,2(0,5-2,4)	1,7(1,0-2,7)	0,4(0,1-1,6)	0,3(0,0-2,2)	0,9(0,6-1,3)	$F=2,450; df1=3,830; df2=2658,298; p=0,047$
MASCULINO	-	1,8(0,7-4,7)	1,0(0,4-2,7)	0,8(0,2-3,2)	0,6(0,1-4,1)	0,9(0,5-1,7)	
FEMENINO	0,8(0,2-2,4)	0,7(0,2-2,2)	2,3(1,3-4,0)	-	-	0,9(0,5-1,4)	
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA							
TOTAL	-	-	0,1(0,0-0,5)	0,2(0,1-0,6)	0,4(0,1-1,5)	0,1(0,0-0,2)	$F=1,248; df1=2,826; df2=1961,411; p=0,291$
MASCULINO	-	-	0,1(0,0-1,0)	0,2(0,0-1,1)	-	0,1(0,0-0,3)	
FEMENINO	-	-	0,1(0,0-0,7)	0,2(0,0-0,8)	0,8(0,2-3,2)	0,1(0,1-0,4)	
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA							
TOTAL	0,9(0,4-1,9)	0,7(0,3-1,6)	0,9(0,5-1,7)	0,7(0,3-1,5)	-	0,7(0,5-1,0)	$F=1,028; df1=3,905; df2=2710,040; p=0,391$
MASCULINO	0,6(0,2-2,1)	0,8(0,3-2,6)	1,1(0,5-2,4)	0,1(0,0-0,9)	-	0,6(0,3-1,1)	
FEMENINO	1,2(0,5-3,0)	0,6(0,2-1,9)	0,8(0,3-2,0)	1,2(0,5-2,9)	-	0,8(0,5-1,3)	
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO							
TOTAL	0,0(0,0-0,3)	0,1(0,0-0,6)	-	0,2(0,0-0,7)	0,3(0,0-2,2)	0,1(0,0-0,3)	$F=1,098; df1=3,320; df2=2303,905; p=0,352$
MASCULINO	-	-	-	0,1(0,0-0,8)	0,6(0,1-4,1)	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-1,0)	-	0,2(0,0-1,5)	-	0,1(0,0-0,3)	

* Los criterios del MINI consideran la presencia de episodio psicótico con la presencia de al menos un síntoma psicótico. Para el caso de este estudio se ha considerado positivo el síntoma psicótico siempre y cuando exista un completo convencimiento del síntoma y haya estado presente al menos un síntoma psicótico al mes.

TABLA 38A
PREVALENCIA ACTUAL DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS MENTALES EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CIE-10	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
EPISODIO PSICÓTICO*							
TOTAL	1,0(0,3-3,0)	0,1(0,0-1,0)	0,3(0,1-0,8)	0,1(0,0-0,4)	-	0,3(0,1-0,6)	$F=2,761; df1=3,064; df2=2126,532; p=0,040$
MASCULINO	0,5(0,1-2,3)	0,3(0,0-2,4)	0,1(0,0-1,0)	0,1(0,0-1,0)	-	0,2(0,1-0,6)	
FEMENINO	1,4(0,4-4,4)	-	0,4(0,1-1,3)	0,1(0,0-0,4)	-	0,3(0,1-0,8)	
EPISODIO DEPRESIVO							
TOTAL	4,1(2,5-6,6)	2,6(1,6-4,2)	2,9(2,0-4,3)	2,5(1,6-4,1)	1,2(0,5-2,5)	2,8(2,2-3,5)	$F=1,666; df1=3,721; df2=2582,549; p=0,160$
MASCULINO	1,6(0,7-3,9)	2,3(0,8-6,1)	1,7(0,8-3,6)	1,3(0,4-3,7)	1,1(0,3-3,3)	1,6(1,0-2,6)	
FEMENINO	6,4(3,6-11,1)	2,8(1,6-4,7)	4,1(2,7-6,4)	3,8(2,3-6,4)	1,3(0,4-3,7)	3,8(2,9-4,9)	
EPISODIO DEPRESIVO LEVE							
TOTAL	0,2(0,0-0,8)	0,3(0,1-1,2)	0,6(0,3-1,4)	0,2(0,0-1,1)	-	0,3(0,2-0,6)	$F=1,132; df1=3,703; df2=2570,178; p=0,339$
MASCULINO	0,1(0,0-0,7)	-	0,2(0,0-1,7)	0,1(0,0-0,8)	-	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,7)	0,5(0,1-2,0)	1,0(0,4-2,4)	0,3(0,0-2,4)	-	0,5(0,2-1,0)	
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO							
TOTAL	1,0(0,4-2,1)	1,0(0,4-2,3)	0,8(0,3-1,9)	0,6(0,2-1,7)	0,2(0,0-1,4)	0,8(0,5-1,2)	$F=0,567; df1=3,714; df2=2577,437; p=0,674$
MASCULINO	0,3(0,0-1,8)	1,3(0,4-4,8)	0,8(0,2-3,1)	0,1(0,0-0,6)	-	0,6(0,2-1,4)	
FEMENINO	1,6(0,7-3,8)	0,7(0,3-2,1)	0,7(0,3-1,6)	1,2(0,4-3,4)	0,4(0,1-2,9)	0,9(0,6-1,5)	
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO							
TOTAL	3,0(1,6-5,5)	1,3(0,6-2,6)	1,5(0,9-2,5)	1,7(0,9-2,9)	1,0(0,4-2,2)	1,7(1,3-2,3)	$F=1,707; df1=3,576; df2=2481,763; p=0,153$
MASCULINO	1,3(0,5-3,6)	0,9(0,2-4,7)	0,6(0,2-1,6)	1,1(0,3-3,7)	1,1(0,3-3,3)	1,0(0,5-1,7)	
FEMENINO	4,5(2,2-9,3)	1,6(0,8-3,2)	2,4(1,5-4,0)	2,3(1,2-4,2)	0,9(0,2-3,1)	2,4(1,7-3,3)	
DISTIMIA							
TOTAL	0,4(0,1-1,3)	0,2(0,0-1,3)	0,2(0,0-0,7)	0,2(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,6)	0,2(0,1-0,4)	$F=0,364; df1=3,139; df2=2178,699; p=0,788$
MASCULINO	-	-	-	-	0,1(0,0-1,1)	0,0(0,0-0,1)	
FEMENINO	0,7(0,2-2,5)	0,3(0,0-2,2)	0,4(0,1-1,5)	0,3(0,1-1,3)	-	0,4(0,2-0,8)	

TRASTORNOS MENTALES SEGÚN LA CIE-10	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
AGORAFOBIA							
TOTAL	0,1(0,0-0,7)	0,1(0,0-1,0)	0,7(0,4-1,6)	0,2(0,1-0,5)	0,1(0,0-1,1)	0,3(0,2-0,5)	$F=2,959; df1=3,443;$ $df2=2389,706; p=0,025$
MASCULINO	-	0,3(0,0-2,2)	0,4(0,1-2,2)	0,1(0,0-0,9)	-	0,2(0,1-0,7)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,3)	-	1,1(0,5-2,4)	0,2(0,1-0,9)	0,3(0,0-2,2)	0,4(0,2-0,7)	
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO							
TOTAL	0,4(0,1-1,6)	0,3(0,1-0,9)	0,3(0,1-0,9)	0,2(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,6)	0,3(0,2-0,5)	$F=0,568; df1=3,539;$ $df2=2456,031; p=0,664$
MASCULINO	0,5(0,1-3,3)	0,2(0,0-1,7)	0,4(0,1-1,9)	-	-	0,2(0,1-0,7)	
FEMENINO	0,4(0,1-2,0)	0,3(0,1-1,2)	0,2(0,1-0,7)	0,3(0,1-1,2)	0,2(0,0-1,4)	0,3(0,2-0,6)	
FOBIA SOCIAL							
TOTAL	0,4(0,1-1,2)	0,8(0,3-1,9)	1,6(1,0-2,7)	0,4(0,1-1,6)	0,3(0,0-2,2)	0,8(0,5-1,2)	$F=2,451; df1=3,837;$ $df2=2662,719; p=0,047$
MASCULINO	-	1,3(0,4-3,8)	1,0(0,4-2,7)	0,8(0,2-3,2)	0,6(0,1-4,1)	0,8(0,4-1,5)	
FEMENINO	0,8(0,2-2,4)	0,5(0,1-2,0)	2,2(1,3-3,9)	-	-	0,8(0,5-1,3)	
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA							
TOTAL	0,7(0,3-1,7)	0,5(0,2-1,3)	0,7(0,3-1,4)	0,5(0,2-1,3)	0,1(0,0-0,9)	0,6(0,4-0,8)	$F=0,568; df1=3,782;$ $df2=2624,708; p=0,676$
MASCULINO	0,5(0,1-2,1)	0,4(0,1-1,7)	1,0(0,4-2,4)	0,1(0,0-0,9)	-	0,5(0,2-0,9)	
FEMENINO	1,0(0,3-2,8)	0,6(0,2-1,9)	0,4(0,1-1,5)	1,0(0,4-2,6)	0,3(0,0-1,8)	0,6(0,4-1,1)	
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO							
TOTAL	0,0(0,0-0,3)	0,1(0,0-0,6)	-	0,1(0,0-0,4)	0,3(0,0-2,2)	0,1(0,0-0,2)	$F=1,322; df1=3,143;$ $df2=2181,494; p=0,265$
MASCULINO	-	-	-	0,1(0,0-0,8)	0,6(0,1-4,1)	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-1,0)	-	-	-	0,1(0,0-0,3)	
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA							
TOTAL	-	-	0,1(0,0-0,4)	-	-	0,0(0,0-0,1)	$F=0,284; df1=3,195;$ $df2=2217,008; p=0,849$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	-	0,1(0,0-0,7)	-	-	0,0(0,0-0,2)	
BULIMIA NERVIOSA							
TOTAL	0,3(0,1-1,9)	-	0,1(0,0-0,4)	0,1(0,0-0,6)	0,2(0,0-1,3)	0,1(0,1-0,3)	$F=1,115; df1=2,966;$ $df2=2058,673; p=0,342$
MASCULINO	-	-	-	0,2(0,0-1,1)	0,3(0,0-2,4)	0,1(0,0-0,3)	
FEMENINO	0,7(0,1-3,6)	-	0,2(0,0-0,8)	0,1(0,0-0,8)	-	0,2(0,1-0,6)	
ANOREXIA NERVIOSA							
TOTAL	-	-	0,0(0,0-0,2)	-	-	0,0(0,0-0,1)	$F=0,167; df1=3,001;$ $df2=2082,365; p=0,919$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	-	0,1(0,0-0,4)	-	-	0,0(0,0-0,1)	
TENDENCIA A PROBLEMAS ALIMENTARIOS ***							
TOTAL	3,4(2,1-5,4)	4,8(3,4-6,9)	3,1(2,3-4,3)	3,9(2,8-5,3)	2,6(1,6-4,3)	3,7(3,1-4,5)	$F=1,421; df1=3,684;$ $df2=2556,748; p=0,228$
MASCULINO	0,5(0,1-1,6)	4,5(2,3-8,5)	2,9(1,6-5,0)	2,3(1,2-4,2)	2,0(0,8-4,8)	2,6(1,8-3,7)	
FEMENINO	6,2(3,8-9,9)	5,1(3,3-7,7)	3,4(2,3-5,0)	5,5(3,7-8,1)	3,3(1,8-6,1)	4,8(3,9-5,9)	

* Los criterios del MINI consideran la presencia de episodio psicótico con la presencia de al menos un síntoma psicótico. Para el caso de este estudio se ha considerado positivo el síntoma psicótico siempre y cuando exista un completo convencimiento del síntoma y haya estado presente al menos un síntoma psicótico al mes.

** La prevalencia actual de distimia se refiere a dos años con los criterios diagnósticos.

*** Se refiere a personas que alguna vez, con la finalidad de perder peso, se han inducido el vómito, han tomado laxantes, han realizado ejercicios excesivos por más de dos horas diarias, han tomado supresores del apetito, han tomado diuréticos, han tomado pastillas para la tiroides o se han obligado a seguir dietas rigurosas.

La tabla 38B muestra la edad promedio de inicio de los principales trastornos psiquiátricos. Si consideramos el promedio, la Fobia Social se inicia más tempranamente en todas las áreas poblacionales con una media de 14,96 en Lima Este y 16,42 en total y, el Trastorno de Ansiedad Generalizada, más tardíamente con una media de 36,97 en Lima Centro, 30,70 en Lima Este, 31,87 en Lima Sur y 31,89 en total. Los trastornos que con mayor frecuencia presentan un inicio temprano son la distimia (8 años), la fobia social (12 años), la agorafobia (16 años) y el episodio psicótico (17 años).

TABLA 38B
EDAD DE INICIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS MENTALES EN LA POBLACIÓN
ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TIPO DE TRASTORNO*	MEDIA	E.S.	MEDIANA	MODA	MIN.	MAX.	N
LIMA CENTRO							
EDAD DE INICIO DE TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	36,97	2,75	35,0	30,0	12,0	74,0	30
EDAD DE INICIO DE TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO	24,88	1,93	24,0	25,0	7,0	78,0	31
EDAD DE INICIO DE EPISODIO DEPRESIVO	32,13	1,61	28,0	18,0	7,0	71,0	135
LIMA NORTE							
EDAD DE INICIO DE TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO	23,84	2,21	23,0	20,0	5,0	50,0	43
EDAD DE INICIO DE EPISODIO DEPRESIVO	29,52	1,37	27,0	22,0	6,0	75,0	130
LIMA ESTE							
EDAD DE INICIO DE FOBIA SOCIAL	14,96	1,05	13,0	13,0	5,0	54,0	48
EDAD DE INICIO DE TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	30,70	2,61	27,0	24,0	7,0	77,0	45
EDAD DE INICIO DE TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO	26,61	2,06	21,0	20,0	6,0	71,0	73
EDAD DE INICIO DE EPISODIO DEPRESIVO	28,88	0,97	25,0	25,0	7,0	86,0	259
LIMA SUR							
EDAD DE INICIO DE TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	31,87	2,02	30,0	45,0	12,0	60,0	37
EDAD DE INICIO DE TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO	20,90	1,99	17,0	11,0	5,0	49,0	48
EDAD DE INICIO DE EPISODIO DEPRESIVO	30,11	1,25	25,0	16,0	8,0	86,0	216
CALLAO							
EDAD DE INICIO DE EPISODIO DEPRESIVO	34,58	2,13	32,0	35,0	7,0	79,0	92
TOTAL							
EDAD DE INICIO DE AGORAFOBIA	21,48	1,37	19,0	16,0	6,0	50,0	55
EDAD DE INICIO DE FOBIA SOCIAL	16,42	1,44	13,0	12,0	5,0	69,0	94
EDAD DE INICIO DE TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	31,89	1,38	30,0	30,0	7,0	77,0	143
EDAD DE INICIO DE TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO	24,29	0,98	22,0	20,0	5,0	78,0	223
EDAD DE INICIO DEL EPISODIO DEPRESIVO	30,53	0,62	26,0	25,0	6,0	86,0	832
EDAD DE INICIO DE DISTIMIA	33,82	4,14	32,0	8,0	5,0	78,0	30
EDAD DE INICIO DE PSICOSIS CON CONVENCIMIENTO Y AL MENOS UN MES	31,14	2,09	32,0	17,0	11,0	74,0	67

* Se excluyeron aquellos trastornos cuyo conteo no fue mayor de 30.

En la Tabla 38C se puede apreciar la duración en meses del último episodio del trastorno mental. Destaca la extensión de la distimia que por definición tiene una duración prolongada y la fobia social, que en promedio pueden durar seis años. No se evidencia diferencias significativas entre las áreas poblacionales, lo que resulta de las limitaciones que genera el tamaño de las muestras de cada trastorno, lo mismo puede afirmarse del número de episodios. El promedio en el número de episodios de los principales trastornos según grupos de edad, se presenta en la Tabla 38D, y se observa que la agorafobia es la patología con mayor número de episodios, seguida de la Fobia social, del Trastorno de Pánico y del Trastorno Obsesivo Compulsivo.

TABLA 38C
DURACIÓN EN MESES DEL ÚLTIMO EPISODIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS MENTALES EN LA POBLACIÓN
ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TIPO DE TRASTORNO	LIMA CENTRO MEDIA(IC 95%)	LIMA NORTE MEDIA(IC 95%)	LIMA ESTE MEDIA(IC 95%)	LIMA SUR MEDIA(IC 95%)	CALLAO MEDIA(IC 95%)	TOTAL MEDIA(IC 95%)
DURACIÓN EN MESES DE AGORAFOBIA	4,10 (-0,65-8,84)	34,26 (-14,63-83,16)	80,94 (32,34-129,55)	61,32 (-21,44-144,08)	42,90 (13,77-72,02)	53,16 (19,66-86,66)
DURACIÓN EN MESES DE TRASTORNO DE PÁNICO	2,43 (-0,93-5,80)	14,00 (14,00-14,00)	0,82 (0,57-1,07)	6,24 (0,41-12,07)	0,32 (-0,06-0,70)	3,35 (0,57 - 6,14)
DURACIÓN EN MESES DE FOBIA SOCIAL	93,75 (-5,25-192,75)	81,46 (27,59-135,32)	67,98 (37,57-98,38)	53,54 (-0,10-107,18)	12,39 (1,58-23,19)	71,90 (46,41 - 97,38)
DURACIÓN EN MESES DE TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO	18,66 (-6,16-43,49)	5,84 (0,57-11,10)	1,00 (1,00-1,00)	9,86 (-0,05-19,76)	12,00 (12,00-12,00)	9,54 (4,11 - 14,97)

TIPO DE TRASTORNO	LIMA CENTRO MEDIA(IC 95%)	LIMA NORTE MEDIA(IC 95%)	LIMA ESTE MEDIA(IC 95%)	LIMA SUR MEDIA(IC 95%)	CALLAO MEDIA(IC 95%)	TOTAL MEDIA(IC 95%)
DURACIÓN EN MESES DE TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	33,82 (11,75-55,89)	27,29 (-0,12-54,69)	20,58 (7,26-33,90)	19,27 (11,09-27,45)	17,59 (9,52-25,65)	24,80 (15,88 - 33,71)
DURACIÓN EN MESES DE TRASTORNO DE ESTRÉS POST TRAUMÁTICO	32,96 (-13,43-79,34)	26,31 (11,29-41,32)	27,31 (-2,76-57,38)	18,56 (4,03-33,09)	29,68 (-6,37-65,73)	26,94 (13,36 - 40,52)
DURACIÓN EN MESES DEL EPISODIO DEPRESIVO	22,30 (8,88-35,73)	33,40 (17,15-49,64)	12,60 (8,73-16,47)	12,79 (6,37-19,21)	11,15 (5,98-16,32)	19,02 (14,06 - 23,99)
DURACIÓN EN MESES DE DISTIMIA	66,11 (33,56-98,66)	228,00 (228,00-228,00)	77,04 (15,58-138,50)	33,73 (-3,11-70,57)	35,81 (23,78-47,84)	76,24 (34,81 -117,68)
DURACIÓN EN MESES DE TRASTORNO BIPOLAR	-	17,84 (-67,55-103,24)	8,63 (-9,53-26,78)	12,00 (12,00-12,00)	-	14,39 (-25,19 - 53,97)
DURACIÓN EN MESES DE PSICOSIS CON CONVENCIMIENTO Y AL MENOS UN MES	52,09 (-19,26-123,43)	7,19 (-2,21-14,59)	35,54 (-15,64-86,73)	6,35 (1,25-11,46)	7,67 (-6,71-22,05)	24,48 (1,98 - 46,99)

TABLA 38D
NÚMERO DE EPISODIOS DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS MENTALES EN LA POBLACIÓN ADULTA SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS MENTALES*	LIMA CENTRO MEDIA (IC 95%)	LIMA NORTE MEDIA (IC 95%)	LIMA ESTE MEDIA (IC 95%)	LIMA SUR MEDIA (IC 95%)	CALLAO MEDIA (IC 95%)	TOTAL MEDIA (IC 95%)
AGORAFOBIA	2,11(0,97-3,24)	2,15(1,66-2,64)	1,65(1,12-2,18)	1,85(1,45-2,25)	3,35(0,97-5,74)	2,01(1,67-2,35)
TRASTORNO DE PÁNICO	2,22(0,55-3,88)	1,67(1,67-1,67)	1,62(0,61-2,64)	1,59(0,77-2,41)	1,82(1,39-2,24)	1,77(1,27-2,27)
FOBIA SOCIAL	1,67(0,90-2,43)	1,77(1,23-2,32)	2,03(1,38-2,68)	1,14(0,99-1,29)	3,02(-0,21-6,26)	1,85(1,50-2,20)
TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO	1,38(0,51-2,25)	1,93(0,59-3,27)	3,35(-1,23-7,93)	1,64(-0,01-3,29)	1,00(1,00-1,00)	1,76(0,97-2,55)
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	1,38(1,15-1,61)	1,62(0,69-2,55)	1,46(1,24-1,68)	1,20(1,00-1,39)	1,51(1,14-1,88)	1,41(1,21-1,61)
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO	1,14(0,99-1,28)	1,49(1,18-1,80)	1,26(1,11-1,42)	1,34(1,13-1,55)	1,32(1,06-1,58)	1,31(1,21-1,42)
EPISODIO DEPRESIVO	1,54(1,38-1,70)	1,42(1,28-1,55)	1,62(1,45-1,80)	1,53(1,40-1,65)	1,50(1,32-1,68)	1,52(1,45-1,60)
DISTIMIA	1,00(1,00-1,00)	1,00(1,00-1,00)	1,26(0,98-1,54)	1,37(0,81-1,94)	1,00(1,00-1,00)	1,17(1,02-1,32)
TRASTORNO BIPOLAR	-	6,75(-22,41-35,91)	1,63(-0,39-3,64)	1,00(1,00-1,00)	-	4,25(-10,47-18,97)

USO DE SUSTANCIAS NOCIVAS

En esta área son importantes, desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica, la prevalencia de consumo en general, la edad de inicio y las conductas alcohólicas riesgosas, entre otras. Las sustancias nocivas legales más consumidas son el alcohol y el tabaco, y en todos los casos se encuentra una mayor frecuencia de uso, consumo perjudicial y dependencia en el género masculino. Según áreas poblacionales de Lima Metropolitana observamos que, sin considerar el alcohol, la prevalencia de vida de consumo de sustancias nocivas legales se encuentra en 62,4% en Lima Centro, 60,4% en Lima Norte, 64,9% en Lima Este, 68,8% en Lima Sur, 67,8% en Callao y en 64,4% en total, mientras que la prevalencia de vida de consumo de sustancias ilegales se halla en un 7,4% en Lima Centro, 5,7% en Lima Norte, 6,2% en Lima Este, 9,2% en Lima Sur, 8,1% en Callao y en 7,1% en total. El consumo actual (en el último mes)

de sustancias nocivas no alcohólicas legales e ilegales se encuentra en un 15,8% en Lima Centro, 13,9% en Lima Norte, 12,3% en Lima Este, 14,6% en Lima Sur, 12,1% en Callao y en 13,8% en total. (Tabla 39). Se observa en todas las prevalencias de consumo, que es mayor en el varón que en la mujer.

En la Tabla 40 respecto a las sustancias específicas, más consumida alguna vez es la marihuana, y según áreas poblacionales, tenemos en Lima Centro un 6,5%, en Lima Norte 4,7%, en Lima Este 5,4%, en Lima Sur 6,9%, en Callao 5,6% y un 5,7% en Total. Esta cifra es menor a la hallada en el Estudio Metropolitano del 2002 que encontró un 6,3% del total de adultos que alguna vez consumieron marihuana. Sin embargo, es mayor respecto al estudio en Lima Rural del 2007, que presentó una prevalencia de vida de 0,6% del total de personas adultas.

En segundo lugar, encontramos la hoja de coca con una prevalencia de vida de 3,7% en Lima Centro, 6,0% en Lima Norte, 8,1% en Lima Este, 3,8% en Lima Sur, 4,5% en Callao y de 5,5% en total. En tercer lugar encontramos a la cocaína en general (PBC o clorhidrato) con un 3,1% en Lima Centro, 2,2% en Lima Norte, 2,7% en Lima Este, 4,0% en Lima Sur, 5,1% en Callao y un 3,2% en total. Entre las prevalencias de consumo actual (en el último mes) sigue estando el alcohol en primer lugar, con un 42,6% en Lima Centro, 33,5% en Lima Norte, 39,5% en Lima Este, 42,8% en Lima Sur, 36,1% en Callao y un 38,7% en total, seguido del tabaco con un 15,6% en Lima Centro, 13,4% en Lima Norte, 11,7% en Lima Este, 14,3% en Lima Sur, 11,4% en Callao y un 13,3% en total.

TABLA 39
PREVALENCIA DE VIDA, ANUAL Y EN EL ÚLTIMO MES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS NO ALCOHÓLICAS EN GENERAL EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE CUALQUIER SUSTANCIA NOCIVA NO ALCOHÓLICA EN GENERAL (LEGALES E ILEGALES)							
TOTAL	62,8(56,5-68,6)	61,0(56,8-65,0)	64,9(61,2-68,4)	69,1(65,4-72,6)	67,9(61,5-73,7)	64,7(62,6-66,7)	F=2,174; df1=3,777; df2=2621,389; p=0,073
MASCULINO	74,3(66,2-80,9)	80,5(74,9-85,2)	81,1(76,8-84,7)	82,4(77,6-86,4)	83,9(77,1-89,0)	80,4(77,9-82,6)	
FEMENINO	51,8(43,6-59,9)	46,7(41,9-51,5)	49,0(44,3-53,7)	55,6(51,0-60,2)	49,8(41,7-57,9)	50,2(47,6-52,8)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS LEGALES NO ALCOHÓLICAS							
TOTAL	62,4(56,3-68,2)	60,4(56,3-64,5)	64,9(61,2-68,4)	68,8(65,0-72,4)	67,8(61,4-73,6)	64,4(62,3-66,4)	F=2,349; df1=3,795; df2=2633,858; p=0,056
MASCULINO	73,6(65,8-80,2)	79,2(73,4-84,1)	81,0(76,7-84,7)	82,1(77,2-86,2)	83,7(76,9-88,8)	79,9(77,3-82,2)	
FEMENINO	51,8(43,6-59,9)	46,7(41,9-51,5)	49,0(44,3-53,7)	55,4(50,8-59,9)	49,8(41,7-57,9)	50,1(47,5-52,7)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS ILEGALES NO ALCOHÓLICAS							
TOTAL	7,4(5,0-10,8)	5,7(4,1-7,9)	6,2(4,8-8,0)	9,2(7,1-11,7)	8,1(5,8-11,2)	7,1(6,2-8,1)	F=1,728; df1=3,743; df2=2597,623; p=0,146
MASCULINO	10,7(6,6-16,7)	10,2(7,0-14,7)	11,4(8,7-14,8)	15,1(11,9-19,1)	13,4(9,4-18,6)	12,0(10,4-13,9)	
FEMENINO	4,2(2,3-7,7)	2,4(1,2-4,8)	1,1(0,5-2,4)	3,1(1,8-5,4)	2,2(0,8-5,8)	2,5(1,9-3,5)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE CUALQUIER SUSTANCIA NOCIVA NO ALCOHÓLICA							
TOTAL	19,9(15,7-24,8)	22,4(19,0-26,1)	20,9(18,1-24,0)	22,6(19,5-26,0)	18,5(14,6-23,1)	21,2(19,6-22,9)	F=0,683; df1=3,802; df2=2638,683; p=0,597
MASCULINO	22,9(16,7-30,6)	32,6(26,6-39,2)	31,0(26,7-35,8)	31,8(27,3-36,8)	23,9(18,1-30,8)	29,3(26,8-32,0)	
FEMENINO	16,9(12,8-22,1)	14,9(11,6-18,8)	10,9(8,6-13,7)	13,3(10,5-16,6)	12,4(8,4-17,9)	13,7(12,1-15,4)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS LEGALES NO ALCOHÓLICAS							
TOTAL	19,8(15,6-24,7)	22,3(18,9-26,0)	20,4(17,7-23,5)	22,0(18,9-25,5)	17,9(13,9-22,6)	20,9(19,3-22,6)	F=0,729; df1=3,821; df2=2651,544; p=0,566
MASCULINO	22,9(16,7-30,6)	32,6(26,6-39,2)	30,4(26,1-35,0)	30,9(26,4-35,9)	22,7(16,7-30,1)	28,8(26,3-31,5)	
FEMENINO	16,8(12,7-21,9)	14,7(11,5-18,6)	10,7(8,4-13,5)	13,1(10,4-16,4)	12,4(8,4-17,9)	13,5(12,0-15,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS ILEGALES NO ALCOHÓLICAS							
TOTAL	1,0(0,5-2,1)	1,3(0,6-2,8)	1,0(0,4-2,2)	1,2(0,7-2,3)	1,4(0,5-3,7)	1,2(0,8-1,7)	F=0,160; df1=3,812; df2=2645,298; p=0,954
MASCULINO	1,0(0,3-3,1)	2,3(1,0-5,5)	1,8(0,7-4,2)	1,9(0,9-3,7)	2,2(0,8-6,1)	1,8(1,2-2,8)	
FEMENINO	1,0(0,4-2,5)	0,6(0,1-2,4)	0,2(0,0-1,6)	0,6(0,1-2,5)	0,5(0,1-3,3)	0,6(0,3-1,1)	

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
PREVALENCIA EN EL ÚLTIMO MES DE CONSUMO DE CUALQUIER SUSTANCIA NOCIVA NO ALCOHÓLICA EN GENERAL (LEGALES E ILEGALES)							
TOTAL	15,8(11,9-20,7)	13,9(11,3-17,1)	12,3(10,3-14,7)	14,6(12,3-17,2)	12,1(9,0-15,9)	13,8(12,5-15,2)	$F=0,897$; $df1=3,610$; $df2=2505,574$; $p=0,457$
MASCULINO	19,0(13,3-26,5)	20,8(16,0-26,5)	19,4(16,2-23,1)	21,2(17,6-25,4)	16,1(11,3-22,4)	19,7(17,6-22,0)	
FEMENINO	12,7(8,9-17,9)	8,9(6,3-12,3)	5,4(3,9-7,5)	7,9(5,9-10,5)	7,5(4,8-11,5)	8,4(7,1-9,9)	
PREVALENCIA EN EL ÚLTIMO MES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS LEGALES NO ALCOHÓLICAS							
TOTAL	15,8(11,9-20,7)	13,9(11,3-17,1)	12,3(10,3-14,7)	14,6(12,3-17,2)	11,4(8,4-15,4)	13,7(12,4-15,2)	$F=1,034$; $df1=3,635$; $df2=2522,657$; $p=0,385$
MASCULINO	19,0(13,3-26,5)	20,8(16,0-26,5)	19,4(16,2-23,1)	21,2(17,6-25,4)	14,9(10,1-21,5)	19,5(17,4-21,8)	
FEMENINO	12,7(8,9-17,9)	8,9(6,3-12,3)	5,4(3,9-7,5)	7,9(5,9-10,5)	7,5(4,8-11,5)	8,4(7,1-9,9)	
PREVALENCIA EN EL ÚLTIMO MES DE CONSUMO DE SUSTANCIAS NOCIVAS ILEGALES							
TOTAL	0,3(0,1-1,3)	0,5(0,1-1,7)	0,2(0,1-0,9)	0,2(0,0-0,8)	0,9(0,3-3,2)	0,4(0,2-0,7)	$F=0,969$; $df1=3,627$; $df2=2517,225$; $p=0,417$
MASCULINO	0,4(0,1-3,0)	1,1(0,3-4,0)	0,5(0,1-1,7)	0,4(0,1-1,6)	1,8(0,5-5,8)	0,7(0,4-1,4)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	

TABLA 40

PREVALENCIA DE VIDA, ANUAL Y EN EL ÚLTIMO MES DE CONSUMO DE LAS PRINCIPALES SUSTANCIAS LEGALES E ILEGALES EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS*	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE ALCOHOL							
TOTAL	95,9(93,0-97,6)	93,0(90,2-95,0)	95,6(94,2-96,7)	97,4(95,9-98,3)	95,8(92,6-97,7)	95,3(94,4-96,2)	$F=3,354$; $df1=3,707$; $df2=2572,676$; $p=0,012$
MASCULINO	97,0(91,1-99,0)	98,1(95,0-99,3)	97,7(95,8-98,7)	98,7(96,3-99,6)	97,3(92,4-99,1)	97,9(96,7-98,6)	
FEMENINO	94,8(90,9-97,1)	89,2(84,9-92,4)	93,6(91,2-95,4)	96,0(93,6-97,5)	94,0(90,2-96,4)	93,0(91,5-94,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE ALCOHOL							
TOTAL	67,0(61,5-72,0)	70,6(66,9-74,0)	74,9(72,0-77,6)	76,5(72,9-79,7)	67,9(62,5-72,8)	71,9(70,2-73,7)	$F=4,184$; $df1=3,812$; $df2=2645,316$; $p=0,003$
MASCULINO	74,7(67,8-80,5)	81,6(76,3-86,0)	83,6(80,0-86,6)	81,7(77,3-85,5)	76,7(69,3-82,8)	80,3(78,1-82,4)	
FEMENINO	59,6(51,9-66,8)	62,5(57,6-67,1)	66,4(62,2-70,4)	71,2(66,3-75,6)	57,9(52,3-63,3)	64,2(61,7-66,6)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE ALCOHOL							
TOTAL	42,6(36,8-48,7)	33,5(29,7-37,4)	39,5(36,3-42,8)	42,8(39,1-46,6)	36,1(30,2-42,4)	38,7(36,8-40,7)	$F=3,463$; $df1=3,732$; $df2=2589,956$; $p=0,009$
MASCULINO	53,4(45,6-61,1)	38,9(33,0-45,1)	51,1(46,5-55,6)	49,5(44,8-54,3)	42,9(34,0-52,2)	47,3(44,5-50,1)	
FEMENINO	32,4(25,3-40,5)	29,5(25,0-34,5)	28,1(24,4-32,2)	36,0(31,3-41,0)	28,4(22,5-35,1)	30,8(28,5-33,3)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE TABACO							
TOTAL	61,7(55,4-67,6)	58,0(53,8-62,0)	62,4(58,8-65,8)	67,6(63,9-71,2)	66,6(60,2-72,4)	62,6(60,6-64,6)	$F=2,956$; $df1=3,750$; $df2=2602,605$; $p=0,021$
MASCULINO	73,6(65,8-80,2)	77,5(71,7-82,5)	79,5(75,2-83,3)	82,1(77,2-86,2)	82,7(75,9-87,9)	79,0(76,4-81,3)	
FEMENINO	50,3(42,2-58,4)	43,6(38,7-48,6)	45,5(41,0-50,1)	53,0(48,6-57,4)	48,4(40,2-56,6)	47,5(45,0-50,1)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE TABACO							
TOTAL	19,4(15,2-24,3)	21,5(18,2-25,2)	19,0(16,4-21,8)	21,2(18,1-24,6)	16,8(13,0-21,4)	19,9(18,4-21,6)	$F=0,866$; $df1=3,795$; $df2=2633,807$; $p=0,479$
MASCULINO	22,4(16,2-30,1)	31,8(25,9-38,2)	28,9(24,9-33,3)	30,4(25,8-35,4)	20,8(15,3-27,6)	27,8(25,3-30,4)	
FEMENINO	16,5(12,4-21,5)	13,9(10,7-17,8)	9,2(7,0-11,9)	11,9(9,2-15,2)	12,2(8,2-17,7)	12,6(11,1-14,3)	
PREVALENCIA MENSUAL CONSUMO DE TABACO							
TOTAL	15,6(11,7-20,5)	13,4(10,8-16,6)	11,7(9,8-13,9)	14,3(12,0-16,9)	11,4(8,3-15,3)	13,3(12,0-14,7)	$F=1,148$; $df1=3,620$; $df2=2512,214$; $p=0,331$
MASCULINO	18,5(12,8-26,1)	20,4(15,6-26,2)	18,9(15,8-22,5)	21,2(17,5-25,4)	14,9(10,1-21,5)	19,2(17,1-21,5)	
FEMENINO	12,7(8,9-17,9)	8,3(5,9-11,7)	4,6(3,1-6,6)	7,3(5,4-9,9)	7,4(4,7-11,3)	7,9(6,6-9,4)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES							
TOTAL	0,5(0,1-1,8)	0,1(0,0-1,0)	0,1(0,0-0,5)	0,1(0,0-0,5)	0,2(0,0-1,3)	0,2(0,1-0,4)	$F=1,096$; $df1=3,438$; $df2=2386,139$; $p=0,353$
MASCULINO	0,9(0,2-3,6)	-	0,1(0,0-0,9)	0,2(0,1-1,0)	0,3(0,0-2,4)	0,3(0,1-0,7)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	0,2(0,0-1,7)	0,2(0,0-0,6)	-	-	0,1(0,0-0,4)	

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS*	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES							
TOTAL	0,2(0,0-1,2)	-	0,1(0,0-0,3)	0,1(0,0-0,5)	-	0,1(0,0-0,2)	$F=0,582$; $df1=3,208$; $df2=2226,269$; $p=0,638$
MASCULINO	0,3(0,0-2,4)	-	-	0,1(0,0-1,0)	-	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	-	-	0,2(0,0-0,6)	-	-	0,0(0,0-0,1)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES							
TOTAL	0,2(0,0-1,2)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	$F=0,693$; $df1=2,501$; $df2=1735,438$; $p=0,531$
MASCULINO	0,3(0,0-2,4)	-	-	-	-	0,1(0,0-0,4)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE PASTILLAS PARA DORMIR							
TOTAL	0,6(0,2-1,7)	0,4(0,1-1,1)	0,4(0,1-1,1)	0,7(0,3-1,4)	-	0,4(0,3-0,7)	$F=0,779$; $df1=3,882$; $df2=2694,263$; $p=0,535$
MASCULINO	0,9(0,2-3,5)	0,1(0,0-0,9)	0,3(0,0-1,9)	0,4(0,1-1,7)	-	0,3(0,1-0,8)	
FEMENINO	0,3(0,1-1,0)	0,6(0,2-1,9)	0,5(0,2-1,7)	1,0(0,5-2,2)	-	0,6(0,3-1,0)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE PASTILLAS PARA DORMIR							
TOTAL	0,1(0,0-1,0)	0,1(0,0-0,4)	0,3(0,1-1,1)	0,5(0,2-1,2)	-	0,2(0,1-0,4)	$F=1,710$; $df1=3,792$; $df2=2631,901$; $p=0,149$
MASCULINO	0,3(0,0-2,0)	0,1(0,0-0,9)	0,3(0,0-1,9)	0,4(0,1-1,7)	-	0,2(0,1-0,6)	
FEMENINO	-	-	0,4(0,1-1,6)	0,7(0,2-1,9)	-	0,2(0,1-0,5)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE PASTILLAS PARA DORMIR							
TOTAL	0,1(0,0-1,0)	0,1(0,0-0,4)	0,1(0,0-0,9)	0,3(0,1-0,8)	-	0,1(0,1-0,3)	$F=0,659$; $df1=3,651$; $df2=2533,939$; $p=0,607$
MASCULINO	0,3(0,0-2,0)	0,1(0,0-0,9)	-	-	-	0,1(0,0-0,3)	
FEMENINO	-	-	0,3(0,0-1,8)	0,5(0,2-1,5)	-	0,2(0,1-0,4)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE PASTILLAS PARA EL DOLOR DE CABEZA							
TOTAL	0,3(0,0-1,8)	1,1(0,6-2,3)	0,3(0,1-1,2)	1,8(0,8-4,0)	-	0,8(0,5-1,3)	$F=2,929$; $df1=3,834$; $df2=2660,578$; $p=0,021$
MASCULINO	0,5(0,1-3,7)	0,2(0,0-1,7)	0,6(0,1-2,4)	1,6(0,7-3,9)	-	0,6(0,3-1,3)	
FEMENINO	-	1,8(0,8-3,8)	0,1(0,0-0,6)	2,1(0,9-4,9)	-	1,0(0,5-1,7)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE PASTILLAS PARA EL DOLOR DE CABEZA							
TOTAL	0,3(0,0-1,8)	0,3(0,1-0,9)	0,0(0,0-0,3)	0,4(0,1-1,4)	-	0,2(0,1-0,5)	$F=0,836$; $df1=3,424$; $df2=2376,580$; $p=0,487$
MASCULINO	0,5(0,1-3,7)	0,2(0,0-1,7)	0,1(0,0-0,7)	0,4(0,1-3,1)	-	0,3(0,1-0,8)	
FEMENINO	-	0,3(0,1-1,4)	-	0,4(0,1-1,5)	-	0,2(0,1-0,5)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE PASTILLAS PARA EL DOLOR DE CABEZA							
TOTAL	-	0,1(0,0-0,8)	0,0(0,0-0,3)	0,1(0,0-0,6)	-	0,1(0,0-0,2)	$F=0,430$; $df1=3,494$; $df2=2424,715$; $p=0,761$
MASCULINO	-	-	0,1(0,0-0,7)	-	-	0,0(0,0-0,2)	
FEMENINO	-	0,2(0,0-1,4)	-	0,3(0,1-1,2)	-	0,1(0,0-0,4)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE JARABE PARA LA TOS							
TOTAL	-	0,4(0,1-1,0)	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,7)	-	0,2(0,1-0,3)	$F=1,395$; $df1=3,834$; $df2=2661,013$; $p=0,235$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	0,7(0,3-1,8)	0,3(0,1-1,2)	0,2(0,0-1,4)	-	0,3(0,1-0,7)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE JARABE PARA LA TOS							
TOTAL	-	-	-	0,1(0,0-0,7)	-	0,0(0,0-0,1)	$F=0,391$; $df1=2,504$; $df2=1737,473$; $p=0,723$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	-	-	0,2(0,0-1,4)	-	0,0(0,0-0,3)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE ESTIMULANTES							
TOTAL	1,1(0,4-2,6)	0,1(0,0-0,5)	0,3(0,1-0,7)	0,1(0,0-0,5)	-	0,3(0,2-0,6)	$F=4,845$; $df1=3,236$; $df2=2245,503$; $p=0,002$
MASCULINO	0,8(0,2-3,5)	-	-	-	-	0,1(0,0-0,6)	
FEMENINO	1,3(0,4-3,9)	0,2(0,1-0,9)	0,6(0,2-1,4)	0,2(0,1-1,0)	-	0,5(0,3-0,9)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE ESTIMULANTES							
TOTAL	-	0,1(0,0-0,5)	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,5)	-	0,1(0,0-0,2)	$F=0,474$; $df1=3,557$; $df2=2468,506$; $p=0,732$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	0,2(0,1-0,9)	0,3(0,1-1,2)	0,2(0,1-1,0)	-	0,2(0,1-0,4)	



PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS*	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE ESTIMULANTES							
TOTAL	-	0,1(0,0-0,5)	0,1(0,0-0,6)	-	-	0,1(0,0-0,2)	$F=0,676$; $df1=3,651$; $df2=2534,117$; $p=0,595$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	0,2(0,1-0,9)	0,3(0,1-1,2)	-	-	0,1(0,1-0,4)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE ÉXTASIS							
TOTAL	0,3(0,1-1,1)	-	0,1(0,0-0,6)	0,6(0,2-1,5)	-	0,2(0,1-0,4)	$F=2,212$; $df1=3,715$; $df2=2578,500$; $p=0,070$
MASCULINO	0,5(0,1-2,2)	-	0,2(0,0-1,2)	0,9(0,3-2,9)	-	0,3(0,1-0,8)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	-	-	0,2(0,1-1,1)	-	0,1(0,0-0,2)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE ÉXTASIS							
TOTAL	0,1(0,0-0,5)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,1)	$F=0,297$; $df1=2,174$; $df2=1508,655$; $p=0,761$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE ÉXTASIS							
TOTAL	0,1(0,0-0,5)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,1)	$F=0,297$; $df1=2,174$; $df2=1508,655$; $p=0,761$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE MARIHUANA							
TOTAL	6,5(4,2-9,7)	4,7(3,2-6,8)	5,4(4,0-7,1)	6,9(5,1-9,3)	5,6(3,8-8,3)	5,7(4,9-6,7)	$F=0,879$; $df1=3,766$; $df2=2613,945$; $p=0,471$
MASCULINO	9,2(5,6-14,8)	8,2(5,2-12,6)	9,7(7,1-13,2)	11,4(8,5-15,0)	8,7(5,6-13,2)	9,5(8,0-11,2)	
FEMENINO	3,9(2,0-7,3)	2,1(1,0-4,3)	1,1(0,5-2,3)	2,5(1,3-4,8)	2,2(0,8-5,8)	2,2(1,6-3,1)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE MARIHUANA							
TOTAL	1,0(0,5-2,1)	0,9(0,3-2,3)	1,0(0,4-2,2)	1,1(0,5-2,0)	0,9(0,3-2,7)	0,9(0,6-1,4)	$F=0,041$; $df1=3,652$; $df2=2534,423$; $p=0,995$
MASCULINO	1,0(0,3-3,1)	1,2(0,3-4,8)	1,7(0,7-4,1)	1,5(0,7-3,1)	1,2(0,4-4,1)	1,4(0,9-2,2)	
FEMENINO	1,0(0,4-2,5)	0,6(0,1-2,4)	0,2(0,0-1,6)	0,6(0,1-2,5)	0,5(0,1-3,3)	0,6(0,3-1,1)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE MARIHUANA							
TOTAL	0,3(0,1-1,3)	0,3(0,0-2,1)	0,2(0,1-0,9)	0,2(0,0-0,8)	0,4(0,1-1,9)	0,3(0,1-0,6)	$F=0,101$; $df1=3,286$; $df2=2280,746$; $p=0,968$
MASCULINO	0,4(0,1-3,0)	0,7(0,1-4,7)	0,5(0,1-1,7)	0,4(0,1-1,6)	0,8(0,2-3,6)	0,5(0,2-1,2)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE COCAÍNA							
TOTAL	2,7(1,4-5,2)	1,7(0,9-3,1)	1,6(1,0-2,8)	2,8(1,7-4,5)	2,8(1,7-4,6)	2,2(1,7-2,8)	$F=0,962$; $df1=3,707$; $df2=2572,915$; $p=0,423$
MASCULINO	4,6(2,2-9,4)	3,8(2,0-6,9)	3,0(1,7-5,2)	5,2(3,2-8,4)	5,1(2,9-8,7)	4,2(3,2-5,4)	
FEMENINO	0,9(0,2-3,8)	0,1(0,0-1,0)	0,3(0,1-1,6)	0,3(0,1-1,2)	0,2(0,0-1,4)	0,4(0,2-0,8)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE COCAÍNA							
TOTAL	0,1(0,0-0,4)	0,7(0,2-2,0)	0,2(0,1-0,9)	0,2(0,0-1,2)	0,3(0,0-2,2)	0,3(0,2-0,7)	$F=1,428$; $df1=3,484$; $df2=2417,976$; $p=0,228$
MASCULINO	-	1,6(0,6-4,5)	0,5(0,1-1,8)	0,3(0,0-2,3)	0,6(0,1-4,1)	0,6(0,3-1,3)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,8)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,1)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE COCAÍNA							
TOTAL	-	0,4(0,1-1,8)	0,1(0,0-1,0)	-	-	0,1(0,0-0,5)	$F=1,059$; $df1=3,525$; $df2=2446,037$; $p=0,371$
MASCULINO	-	0,9(0,2-4,1)	0,3(0,0-1,9)	-	-	0,3(0,1-1,0)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE PBC							
TOTAL	0,8(0,3-2,0)	1,3(0,7-2,5)	1,6(1,0-2,7)	2,6(1,6-4,1)	3,3 (1,8-6,2)	1,8(1,3-2,3)	$F=2,709$; $df1=3,923$; $df2=2722,835$; $p=0,030$
MASCULINO	1,5(0,6-3,9)	2,6(1,2-5,1)	3,1(1,8-5,3)	4,7(2,9-7,5)	6,3 (3,4-11,2)	3,4(2,6-4,5)	
FEMENINO	0,2(0,0-1,1)	0,4(0,1-2,4)	0,1(0,0-0,7)	0,4(0,1-1,4)	-	0,2(0,1-0,6)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE PBC							
TOTAL	-	0,3(0,1-1,1)	0,2(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,6)	0,5 (0,1-3,5)	0,2(0,1-0,4)	$F=0,934$; $df1=3,277$; $df2=2274,082$; $p=0,429$
MASCULINO	-	0,6(0,1-2,6)	0,3(0,1-1,2)	0,2(0,0-1,1)	1,0 (0,1-6,2)	0,4(0,2-0,9)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS*	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE PBC							
TOTAL	-	0,3(0,1-1,1)	0,1(0,0-0,5)	0,1(0,0-0,6)	0,5(0,1-3,5)	0,2(0,1-0,4)	$F=1,180$; $df1=3,242$; $df2=2249,944$; $p=0,316$
MASCULINO	-	0,6(0,1-2,6)	0,1(0,0-1,0)	0,2(0,0-1,1)	1,0(0,1-6,2)	0,3(0,1-0,9)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE COCAÍNA EN GENERAL(PBC O CLORHIDRATO)							
TOTAL	3,1(1,7-5,6)	2,2(1,4-3,7)	2,7(1,8-4,0)	4,0(2,8-5,8)	5,1 (3,3-7,8)	3,2(2,6-3,9)	$F=1,899$; $df1=3,805$; $df2=2641,007$; $p=0,112$
MASCULINO	5,2(2,7-9,9)	4,6(2,7-7,7)	5,0(3,4-7,5)	7,2(5,0-10,4)	9,4 (6,1-14,2)	6,0(4,8-7,3)	
FEMENINO	1,1(0,3-3,7)	0,5(0,1-2,2)	0,4(0,1-1,5)	0,7(0,3-1,8)	0,2 (0,0-1,4)	0,6(0,3-1,1)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE COCAÍNA EN GENERAL(PBC O CLORHIDRATO)							
TOTAL	0,1(0,0-0,4)	0,8(0,3-2,0)	0,3(0,1-0,9)	0,2(0,1-1,1)	0,8 (0,2-3,3)	0,4(0,2-0,8)	$F=1,599$; $df1=3,338$; $df2=2316,635$; $p=0,182$
MASCULINO	-	1,8(0,7-4,6)	0,6(0,2-1,9)	0,5(0,1-2,1)	1,5 (0,4-5,9)	0,9(0,5-1,6)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,8)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,1)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE COCAÍNA EN GENERAL(PBC O CLORHIDRATO)							
TOTAL	-	0,5(0,1-1,7)	0,2(0,0-0,9)	0,1(0,0-0,6)	0,5 (0,1-3,5)	0,2(0,1-0,6)	$F=0,928$; $df1=3,356$; $df2=2328,897$; $p=0,434$
MASCULINO	-	1,1(0,3-4,0)	0,4(0,1-1,8)	0,2(0,0-1,1)	1,0 (0,1-6,2)	0,5(0,2-1,2)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS							
TOTAL	0,5(0,2-1,7)	-	0,0(0,0-0,3)	0,2(0,0-0,8)	-	0,1(0,1-0,3)	$F=2,437$; $df1=3,440$; $df2=2387,087$; $p=0,054$
MASCULINO	0,7(0,1-3,4)	-	-	0,3(0,1-0,7)	-	0,2(0,1-0,6)	
FEMENINO	0,3(0,1-1,5)	-	0,1(0,0-0,7)	0,1(0,0-0,4)	-	0,1(0,0-0,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS							
TOTAL	0,1(0,0-0,5)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,1)	$F=0,297$; $df1=2,174$; $df2=1508,655$; $p=0,761$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE ALUCINÓGENOS							
TOTAL	0,1(0,0-0,5)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,1)	$F=0,297$; $df1=2,174$; $df2=1508,655$; $p=0,761$
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE HOJA DE COCA							
TOTAL	3,7(2,3-5,8)	6,0(4,2-8,7)	8,1(6,3-10,2)	3,8(2,6-5,4)	4,5(2,7-7,5)	5,5(4,7-6,5)	$F=3,806$; $df1=3,793$; $df2=2632,182$; $p=0,005$
MASCULINO	2,9(1,6-5,5)	8,4(5,4-12,9)	8,9(6,5-12,2)	4,8(3,0-7,6)	5,9(3,2-10,5)	6,5(5,3-8,0)	
FEMENINO	4,4(2,4-7,8)	4,3(2,7-6,7)	7,2(5,3-9,7)	2,7(1,6-4,7)	3,0(1,5-6,0)	4,6(3,7-5,6)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE HOJA DE COCA							
TOTAL	0,3(0,1-1,1)	1,1(0,6-1,9)	1,9(1,2-2,9)	0,4(0,1-1,1)	1,3(0,5-3,2)	1,0(0,7-1,4)	$F=3,665$; $df1=3,973$; $df2=2757,601$; $p=0,006$
MASCULINO	0,2(0,0-1,7)	1,8(0,9-3,7)	2,1(1,1-4,1)	0,6(0,2-2,1)	2,2(0,8-5,8)	1,4(0,9-2,1)	
FEMENINO	0,3(0,0-2,2)	0,5(0,2-1,6)	1,7(1,0-2,9)	0,2(0,0-1,1)	0,4(0,1-1,4)	0,7(0,4-1,1)	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE HOJA DE COCA							
TOTAL	0,1(0,0-0,8)	1,4(0,2-1,1)	0,8(0,4-1,6)	0,2(0,0-1,1)	0,1 (0,0-0,6)	0,4(0,2-0,6)	$F=2,326$; $df1=3,524$; $df2=2445,846$; $p=0,062$
MASCULINO	0,2(0,0-1,7)	0,6(0,2-1,8)	0,8(0,3-2,7)	0,4(0,1-2,1)	-	0,5(0,2-1,0)	
FEMENINO	-	0,3(0,1-1,4)	0,8(0,4-1,6)	-	0,2 (0,0-1,2)	0,3(0,2-0,6)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE INHALANTES							
TOTAL	0,3(0,0-1,9)	0,6(0,2-2,0)	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,9)	0,4(0,1-1,8)	0,3(0,1-0,6)	$F=1,003$; $df1=3,593$; $df2=2493,758$; $p=0,400$
MASCULINO	0,6(0,1-3,9)	1,2(0,3-4,7)	0,2(0,0-1,2)	0,3(0,0-1,9)	0,5(0,1-3,8)	0,5(0,2-1,3)	
FEMENINO	-	0,1(0,0-1,0)	-	-	0,2(0,0-1,4)	0,1(0,0-0,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE INHALANTES							
TOTAL	-	0,2(0,0-1,6)	-	-	-	0,1(0,0-0,4)	$F=0,927$; $df1=3,648$; $df2=2531,630$; $p=0,441$
MASCULINO	-	0,5(0,1-3,8)	-	-	-	0,1(0,0-0,9)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	

PREVALENCIAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS*	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS							
TOTAL	0,2(0,0-0,9)	0,2(0,0-1,0)	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,5)	-	0,1(0,1-0,3)	$F=0,336; df1=3,462; df2=2402,600; p=0,827$
MASCULINO	0,4(0,1-1,9)	0,4(0,1-2,6)	-	0,1(0,0-1,1)	-	0,2(0,1-0,6)	
FEMENINO	-	0,1(0,0-0,5)	0,2(0,1-1,1)	0,1(0,0-0,4)	-	0,1(0,0-0,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS							
TOTAL	0,1(0,0-1,0)	0,2(0,0-1,1)	-	-	-	0,1(0,0-0,3)	$F=0,592; df1=3,675; df2=2550,333; p=0,654$
MASCULINO	0,3(0,0-0,2)	0,4(0,1-2,6)	-	-	-	0,1(0,0-0,6)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
PREVALENCIA MENSUAL DE CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS							
TOTAL	0,1(0,0-1,0)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	$F=0,592; df1=2,425; df2=1682,930; p=0,585$
MASCULINO	0,3(0,0-2,0)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,4)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	

* Se refiere al consumo de sustancias por placer o recreación; no se refiere al consumo de alguna sustancia con fines médicos, como puede ser el caso de los tranquilizantes, analgésicos o algunos estimulantes.

En la tabla 41 se aprecia que la edad promedio de inicio del consumo, considerando todas las sustancias, fluctúa entre los 18 años y 30 años. Se observa que la media de edad para el consumo de tranquilizantes es de 29,73 años en Lima Centro, 15,00 años en Lima Norte, 33,03 años en Lima Este, 24,21 años en Lima Sur, 25,00 años en Callao y de 26,23 años en total, seguido por el consumo de los estimulantes con 22,04 años y la hoja de coca con 21,84 años. Las sustancias cuyo consumo se inicia en promedio a menor edad son los inhalantes con una media de 17,15 años. Sin embargo, se debe considerar que esta edad de inicio es con respecto a la población actualmente adulta, por lo que no es representativa necesariamente de los patrones de consumo actuales.

TABLA 41
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE LAS PRINCIPALES SUSTANCIAS NOCIVAS EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TIPO DE SUSTANCIA*	EDAD DE INICIO DEL CONSUMO					
	MEDIA	E.S.	MEDIANA	MODA	MIN.	MAX.
LIMA CENTRO						
TABACO	17,97	0,26	17,0	18	7	60
TRANQUILIZANTES	29,73	13,29	17,0	17	17	55
ESTIMULANTES	20,08	1,83	18,0	18	16	32
ÉXTASIS	21,59	3,18	25,0	25	14	25
PBC	22,53	3,51	19,0	17	14	35
COCAÍNA	20,52	0,83	19,0	17	14	28
HOJA DE COCA	18,81	1,62	17,0	20	8	55
MARIHUANA	20,35	1,13	19,0	16	12	39
INHALANTES	17,00	0,00	17,0	17	17	17
LIMA NORTE						
TABACO	18,56	0,28	18,0	18	6	60
TRANQUILIZANTES	15,00	0,00	15,0	15	15	15
ESTIMULANTES	36,51	2,91	39,0	39	33	39
PBC	19,52	1,31	19,0	20	13	30
COCAÍNA	19,91	1,02	19,0	18	12	25
HOJA DE COCA	22,80	2,23	18,0	20	6	71
MARIHUANA	17,94	0,55	18,0	18	13	30
INHALANTES	17,03	2,07	15,0	20	13	20
LIMA ESTE						
TABACO	18,92	0,19	18,0	18	7	54
TRANQUILIZANTES	33,03	3,74	36,0	36	28	36
ESTIMULANTES	21,66	2,37	21,0	17	17	41
ÉXTASIS	20,00	0,00	20,0	20	20	20

TIPO DE SUSTANCIA*	EDAD DE INICIO DEL CONSUMO					
	MEDIA	E.S.	MEDIANA	MODA	MIN.	MAX.
PBC	18,58	0,88	18,0	18	13	26
COCAÍNA	19,42	0,75	19,0	21	14	27
HOJA DE COCA	22,67	1,24	20,0	20	5	60
MARIHUANA	18,42	0,73	18,0	18	12	30
INHALANTES	22,00	0,00	22,0	22	22	22
LIMA SUR						
TABACO	18,46	0,21	18,0	18	1	64
TRANQUILIZANTES	24,21	4,13	21,0	21	21	30
ESTIMULANTES	17,50	0,50	18,0	18	17	18
ÉXTASIS	18,60	0,43	18,0	18	16	24
PBC	18,69	0,83	18,0	18	14	27
COCAÍNA	20,42	1,21	19,0	18	13	35
HOJA DE COCA	19,11	2,09	17,0	18	7	51
MARIHUANA	18,00	0,47	18,0	18	13	35
INHALANTES	18,00	0,00	18,0	18	18	18
CALLAO						
TABACO	18,63	0,36	18,0	18	0	50
TRANQUILIZANTES	25,00	0,00	25,0	25	25	25
PBC	19,37	1,66	18,0	18	14	68
COCAÍNA	20,75	1,70	18,0	17	15	40
HOJA DE COCA	23,43	2,24	20,0	20	8	60
MARIHUANA	16,91	0,71	16,0	16	12	50
INHALANTES	14,76	0,37	15,0	15	14	15
TOTAL						
TABACO	18,53	0,11	18,0	18	0	64
TRANQUILIZANTES	26,23	6,44	21,0	17	15	55
ESTIMULANTES	22,04	1,67	18,0	17	16	41
ÉXTASIS	19,59	1,11	19,0	18	14	25
PBC	19,27	0,57	18,0	18	13	68
COCAÍNA	20,20	0,50	19,0	18	12	40
HOJA DE COCA	21,84	0,89	19,0	20	5	71
MARIHUANA	18,42	0,35	18,0	18	12	50
INHALANTES	17,15	1,10	17,0	15	13	22

* Se refiere al consumo de sustancias por placer o recreación; no se refiere al consumo de alguna sustancia con fines médicos, como puede ser el caso de los tranquilizantes o algunos estimulantes.

Respecto al consumo perjudicial y dependencia de sustancias en el año, en cuanto al uso de alcohol, se ha definido al bebedor riesgoso como aquel que durante un año, en tres o más ocasiones, ha llegado a beber en menos de 3 horas más del equivalente a una botella de vino (o 3 vasos de alcohol “fuerte”), encontrándose una prevalencia del 5,8% en Lima Centro, 6,3% en Lima Norte, 13,7% en Lima Este, 8,5% en Lima Sur, 8,6% en Callao y del 8,8% en total. Esta cifra es bastante menor a la observada en el 2002, cuya prevalencia se encontró en 21,8% del total. La prevalencia del consumo perjudicial de alcohol según criterios de investigación de la CIE-10, es 0,9% en Lima Centro, 2,3% en Lima Norte, 2,1% en Lima Este, 1,1% en Lima Sur, 0,8% en Callao y un 1,6% en total, y la dependencia de alcohol es 0,7% en Lima Centro, 0,1% en Lima Norte, 1,8% en Lima Este, 1,0% en Lima Sur, 1,0% en Callao y el 0,9% en total (Tabla 42).

TABLA 42
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL Y DEPENDENCIA DE LAS PRINCIPALES SUSTANCIAS NOCIVAS EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TIPO DE SUSTANCIA (PREVALENCIA ANUAL)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
BEBEDOR RIESGOSO DE ALCOHOL							
TOTAL	5,8(4,0-8,4)	6,3(4,6-8,5)	13,7(11,4-16,4)	8,5(6,7-10,8)	8,6(6,0-12,3)	8,8(7,8-9,9)	$F=7,979$; $df1=3,944$; $df2=2737,400$; $p=<0,000001$
MASCULINO	9,8(6,5-14,6)	12,5(8,8-17,3)	25,4(21,3-30,0)	13,2(10,0-17,2)	14,4(10,0-20,5)	15,7(13,8-17,8)	
FEMENINO	2,1(1,0-4,3)	1,8(0,8-3,9)	2,2(1,3-3,6)	3,8(2,4-6,2)	2,1(0,8-5,1)	2,4(1,8-3,2)	

TIPO DE SUSTANCIA (PREVALENCIA ANUAL)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL							
TOTAL	0,9(0,4-2,2)	2,3(1,3-4,1)	2,1(1,4-3,4)	1,1(0,6-2,1)	0,8(0,3-2,4)	1,6(1,2-2,2)	F=1,942; df1=3,758; df2=2608,149; p=0,105
MASCULINO	1,9(0,8-4,5)	4,6(2,4-8,5)	4,2(2,6-6,6)	1,6(0,8-3,3)	1,6(0,6-4,4)	3,0(2,2-4,1)	
FEMENINO	-	0,6(0,1-2,9)	0,2(0,0-1,1)	0,6(0,2-2,3)	-	0,3(0,1-0,9)	
DEPENDENCIA DE ALCOHOL							
TOTAL	0,7(0,3-1,6)	0,1(0,0-0,7)	1,8(1,0-3,2)	1,0(0,5-2,0)	1,0(0,5-2,2)	0,9(0,6-1,3)	F=4,343; df1=3,866; df2=2683,157; p=0,002
MASCULINO	1,2(0,4-3,3)	0,2(0,0-1,6)	3,6(2,0-6,3)	1,9(0,9-3,9)	1,3(0,5-3,4)	1,7(1,2-2,6)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	-	0,1(0,0-0,4)	0,1(0,0-1,0)	0,7(0,2-2,8)	0,1(0,1-0,3)	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL							
TOTAL	1,6(0,8-3,1)	2,4(1,4-4,2)	4,0(2,8-5,6)	2,1(1,3-3,4)	1,8(1,0-3,4)	2,5(2,0-3,2)	F=2,394; df1=3,651; df2=2533,664; p=0,054
MASCULINO	3,1(1,5-6,1)	4,8(2,6-8,7)	7,8(5,5-10,9)	3,5(2,2-5,7)	2,8(1,4-5,8)	4,8(3,7-6,0)	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	0,6(0,1-2,9)	0,2(0,0-1,0)	0,7(0,2-2,3)	0,7(0,2-2,8)	0,5(0,2-1,0)	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE TABACO							
TOTAL	1,1(0,5-2,3)	0,7(0,3-1,7)	0,4(0,1-0,9)	0,6(0,2-1,5)	1,4(0,5-3,4)	0,7(0,5-1,1)	F=1,243; df1=3,839; df2=2663,944; p=0,291
MASCULINO	1,5(0,6-3,8)	0,8(0,2-2,4)	0,7(0,3-1,9)	1,0(0,4-2,8)	1,8(0,6-4,8)	1,1(0,7-1,7)	
FEMENINO	0,8(0,2-2,4)	0,6(0,1-2,7)	-	0,1(0,0-0,9)	0,9(0,2-3,5)	0,4(0,2-0,9)	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ESTIMULANTES							
TOTAL	-	-	-	0,1(0,0-0,4)	-	0,0(0,0-0,1)	F=0,252; df1=2,348; df2=1629,594; p=0,812
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	-	-	-	0,1(0,0-0,9)	-	0,0(0,0-0,2)	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ÉXTASIS							
TOTAL	0,1(0,0-0,5)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,1)	F=0,297; df1=2,174; df2=1508,655; p=0,761
MASCULINO	-	-	-	-	-	-	
FEMENINO	0,1(0,0-0,9)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE MARIHUANA							
TOTAL	0,2(0,0-1,3)	0,3(0,0-2,1)	0,2(0,0-0,9)	0,1(0,0-0,6)	0,3(0,0-2,2)	0,2(0,1-0,5)	F=0,218; df1=3,363; df2=2333,698; p=0,903
MASCULINO	0,4(0,1-2,5)	0,7(0,1-4,7)	0,4(0,1-1,8)	0,2(0,0-1,1)	0,6(0,1-4,1)	0,4(0,2-1,1)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA							
TOTAL	-	0,1(0,0-0,5)	0,1(0,0-1,0)	-	-	0,1(0,0-0,2)	F=0,527; df1=3,756; df2=2606,420; p=0,705
MASCULINO	-	0,2(0,0-1,1)	0,3(0,0-1,9)	-	-	0,1(0,0-0,5)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE PBC							
TOTAL	-	0,2(0,0-1,2)	-	0,1(0,0-0,6)	-	0,1(0,0-0,3)	F=0,591; df1=3,482; df2=2416,182; p=0,646
MASCULINO	-	0,4(0,1-2,8)	-	0,2(0,0-1,1)	-	0,1(0,0-0,6)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE COCAÍNA							
TOTAL	-	0,2(0,1-1,1)	0,1(0,0-1,0)	0,1(0,0-0,6)	-	0,1(0,0-0,3)	F=0,607; df1=3,737; df2=2593,270; p=0,646
MASCULINO	-	0,6(0,1-2,5)	0,3(0,0-1,9)	0,2(0,0-1,1)	-	0,2(0,1-0,7)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE OTRAS SUSTANCIAS							
TOTAL	0,1(0,0-1,0)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,2)	F=0,592; df1=2,425; df2=1682,930; p=0,585
MASCULINO	0,3(0,0-2,0)	-	-	-	-	0,0(0,0-0,4)	
FEMENINO	-	-	-	-	-	-	
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE CUALQUIER SUSTANCIA							
TOTAL	2,6(1,6-4,3)	3,3(2,0-5,2)	4,3(3,1-5,9)	2,5(1,7-3,8)	2,7(1,5-4,6)	3,2(2,6-3,9)	F=1,191; df1=3,721; df2=2582,262; p=0,313
MASCULINO	4,4(2,5-7,6)	6,0(3,6-10,0)	8,4(6,0-11,5)	4,1(2,7-6,2)	4,0(2,2-7,2)	5,7(4,6-7,0)	
FEMENINO	0,9(0,3-2,5)	1,2(0,4-3,5)	0,2(0,0-1,0)	1,0(0,4-2,5)	1,2(0,4-3,5)	0,9(0,5-1,5)	
DEPENDENCIA DE CUALQUIER SUSTANCIA							
TOTAL	1,6(0,9-3,1)	0,6(0,2-1,6)	2,3(1,4-3,7)	1,2(0,7-2,2)	1,6(0,8-3,0)	1,4(1,1-1,9)	F=2,147; df1=3,770; df2=2616,166; p=0,077
MASCULINO	2,8(1,3-5,6)	0,6(0,2-2,0)	4,5(2,8-7,2)	2,3(1,2-4,3)	2,0(0,9-4,4)	2,5(1,8-3,4)	
FEMENINO	0,6(0,2-1,9)	0,6(0,1-2,6)	0,1(0,0-0,4)	0,1(0,0-1,0)	1,2(0,4-3,5)	0,4(0,2-0,9)	

TRASTORNOS CLÍNICOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS

La prevalencia anual, a seis meses y actual de cualquier trastorno mental es mayor entre los 25 y 44 años. Aunque, es importante resaltar, el incremento en todos los tipos de prevalencias para depresión, en población mayor de 65 años. En el Estudio Metropolitano del 2002, se encontró que la mayor prevalencia actual de depresión estaba entre el rango de 45 a 64 años. La prevalencia anual del consumo perjudicial o dependencia del alcohol es mayor en el rango de 18 a 24 años (Tabla 43).

TABLA 43
PREVALENCIA ANUAL, A SEIS MESES Y ACTUAL DE TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL SEGÚN GRUPOS ETARIOS, EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL							$F=1,482$; $df1=2,978$; $df2=2067,020$; $p=0,218$
18 A 24 AÑOS	14,2(6,1-29,9)	7,4(3,9-13,6)	14,0(9,7-19,7)	10,1(6,3-15,8)	12,1(5,9-23,3)	11,1(8,6-14,1)	
25 A 44 AÑOS	12,2(8,2-17,7)	12,5(9,2-16,9)	15,7(12,4-19,6)	13,8(10,6-17,7)	8,9(5,6-14,0)	13,2(11,5-15,1)	
45 A 64 AÑOS	7,7(4,6-12,6)	12,0(7,7-18,1)	14,8(10,8-20,0)	11,9(8,2-16,8)	6,0(3,4-10,4)	11,0(9,1-13,3)	
MAYOR DE 65 AÑOS	11,1(6,4-18,4)	12,5(6,8-21,8)	8,2(4,4-14,8)	7,3(3,2-15,7)	9,4(4,6-18,4)	10,0(7,5-13,3)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL							$F=1,119$; $df1=2,981$; $df2=2068,982$; $p=0,340$
18 A 24 AÑOS	14,2(6,1-29,9)	6,5(3,2-12,8)	12,3(8,2-18,0)	8,2(4,8-13,6)	9,3(4,0-20,3)	9,7(7,3-12,7)	
25 A 44 AÑOS	10,5(6,8-15,9)	10,4(7,2-14,8)	12,7(9,6-16,5)	12,3(9,6-15,7)	7,7(4,7-12,6)	11,1(9,5-13,0)	
45 A 64 AÑOS	7,4(4,4-12,4)	10,7(6,7-16,7)	13,0(9,2-18,0)	10,1(6,8-14,7)	3,9(1,8-8,1)	9,6(7,8-11,8)	
MAYOR DE 65 AÑOS	9,5(5,2-16,9)	8,6(4,1-16,9)	7,5(3,8-14,1)	6,4(2,5-15,1)	8,5(3,9-17,6)	8,2(5,9-11,3)	
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL							$F=0,847$; $df1=2,971$; $df2=2061,613$; $p=0,467$
18 A 24 AÑOS	12,0(4,6-27,6)	4,4(1,7-10,8)	10,6(6,8-16,0)	4,7(2,3-9,5)	3,3(0,9-11,9)	7,0(5,0-9,8)	
25 A 44 AÑOS	8,6(5,2-13,8)	8,6(5,7-12,8)	10,0(7,3-13,6)	9,5(7,0-12,7)	3,2(1,3-7,7)	8,6(7,1-10,3)	
45 A 64 AÑOS	7,4(4,4-12,4)	9,7(5,9-15,6)	11,3(7,7-16,4)	6,0(3,6-10,0)	3,9(1,8-8,1)	8,2(6,5-10,2)	
MAYOR DE 65 AÑOS	8,4(4,3-15,7)	5,2(2,0-12,5)	5,2(2,3-11,2)	5,4(1,9-14,8)	7,6(3,6-15,4)	6,4(4,4-9,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							$F=0,774$; $df1=2,940$; $df2=2040,515$; $p=0,506$
18 A 24 AÑOS	1,6(0,3-7,3)	2,8(1,1-6,8)	2,8(1,3-6,0)	1,6(0,5-5,4)	3,8(1,0-13,5)	2,5(1,5-4,0)	
25 A 44 AÑOS	2,4(1,1-5,3)	2,9(1,5-5,7)	4,4(2,9-6,6)	2,0(1,1-3,6)	1,9(0,7-5,2)	3,0(2,2-3,9)	
45 A 64 AÑOS	1,3(0,4-4,1)	3,7(1,6-8,4)	6,0(3,6-9,8)	4,1(2,2-7,6)	0,5(0,1-3,5)	3,4(2,4-4,9)	
MAYOR DE 65 AÑOS	3,3(1,3-8,0)	2,6(0,6-11,1)	1,3(0,2-8,8)	1,8(0,3-11,3)	-	2,1(1,0-4,2)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							$F=0,654$; $df1=2,992$; $df2=2076,355$; $p=0,580$
18 A 24 AÑOS	1,6(0,3-7,3)	2,4(0,9-6,5)	2,5(1,1-5,7)	2,1(0,6-7,0)	3,8(1,0-13,5)	2,4(1,4-4,0)	
25 A 44 AÑOS	1,9(0,9-4,4)	2,2(0,9-5,1)	4,2(2,8-6,4)	1,7(0,9-3,2)	1,2(0,4-4,0)	2,5(1,8-3,5)	
45 A 64 AÑOS	1,3(0,4-4,1)	2,9(1,1-7,4)	5,3(3,2-8,7)	2,6(1,3-5,1)	0,5(0,1-3,5)	2,8(1,9-4,0)	
MAYOR DE 65 AÑOS	2,9(1,1-7,7)	0,7(0,1-5,2)	1,3(0,2-8,8)	1,8(0,3-11,3)	-	1,6(0,7-3,3)	
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							$F=0,510$; $df1=2,987$; $df2=2073,086$; $p=0,674$
18 A 24 AÑOS	1,6(0,3-7,3)	1,0(0,2-4,1)	2,3(0,9-5,5)	0,8(0,1-5,8)	2,0(0,3-12,7)	1,5(0,8-2,7)	
25 A 44 AÑOS	1,3(0,5-3,6)	2,1(0,9-5,1)	3,3(2,0-5,3)	0,7(0,3-1,6)	0,6(0,1-2,3)	1,9(1,3-2,8)	
45 A 64 AÑOS	1,3(0,4-4,1)	2,0(0,7-5,6)	4,2(2,3-7,7)	2,4(1,1-5,3)	0,5(0,1-3,5)	2,3(1,5-3,4)	
MAYOR DE 65 AÑOS	2,9(1,1-7,7)	0,7(0,1-5,2)	1,3(0,2-8,8)	1,8(0,3-11,3)	-	1,6(0,7-3,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							$F=1,019$; $df1=2,948$; $df2=2045,936$; $p=0,383$
18 A 24 AÑOS	11,0(3,8-27,8)	1,0(0,3-3,4)	6,5(3,8-10,8)	6,3(3,5-11,3)	10,3(4,6-21,5)	5,8(4,0-8,2)	
25 A 44 AÑOS	5,2(2,9-9,3)	6,4(4,0-10,1)	9,1(6,5-12,4)	6,8(4,4-10,5)	4,8(2,7-8,5)	6,9(5,6-8,4)	
45 A 64 AÑOS	4,4(2,3-8,0)	4,0(1,9-8,2)	5,7(3,2-9,9)	6,8(4,2-10,9)	4,8(2,5-9,0)	5,2(3,9-6,8)	
MAYOR DE 65 AÑOS	6,8(3,2-13,9)	9,9(5,1-18,5)	5,4(2,7-10,8)	6,5(2,7-15,1)	4,9(1,6-13,8)	7,0(4,9-10,0)	

TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIÓN DE LIMA
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							$F=0,588; df1=2,924; df2=2029,548; p=0,618$
18 A 24 AÑOS	11,0(3,8-27,8)	0,5(0,1-2,0)	4,8(2,5-9,0)	3,9(1,9-7,9)	6,2(2,0-18,2)	4,3(2,7-6,6)	
25 A 44 AÑOS	3,4(1,6-7,1)	4,5(2,4-8,2)	5,4(3,5-8,2)	5,5(3,5-8,6)	3,9(2,0-7,3)	4,7(3,7-6,1)	
45 A 64 AÑOS	4,1(2,2-7,8)	2,8(1,2-6,4)	5,0(2,7-9,2)	5,9(3,5-9,6)	2,0(0,7-5,6)	4,1(3,0-5,6)	
MAYOR DE 65 AÑOS	5,7(2,4-12,8)	7,9(3,6-16,3)	4,6(2,0-10,2)	5,6(2,0-14,6)	4,0(1,1-13,4)	5,8(3,8-8,7)	
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							$F=0,603; df1=2,881; df2=1999,455; p=0,607$
18 A 24 AÑOS	8,7(2,5-26,1)	0,3(0,0-2,0)	2,4(1,0-5,9)	1,7(0,5-5,2)	-	2,2(1,1-4,4)	
25 A 44 AÑOS	2,0(0,8-5,2)	2,9(1,3-6,5)	3,2(1,8-5,4)	3,8(2,1-6,8)	0,4(0,1-2,8)	2,8(2,0-4,0)	
45 A 64 AÑOS	4,1(2,2-7,8)	2,8(1,2-6,4)	3,1(1,3-7,2)	1,7(0,7-4,3)	2,0(0,7-5,6)	2,8(1,9-4,1)	
MAYOR DE 65 AÑOS	5,1(2,0-12,3)	4,5(1,6-12,0)	2,4(0,8-6,5)	2,8(0,5-13,3)	3,1(0,9-9,8)	3,8(2,2-6,4)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL							$F=3,210; df1=2,809; df2=1949,777; p=0,025$
18 A 24 AÑOS	1,7(0,2-11,2)	3,2(0,9-10,3)	6,3(3,4-11,2)	1,2(0,3-5,8)	3,3(0,9-11,9)	3,4(2,1-5,6)	
25 A 44 AÑOS	3,0(1,3-6,9)	1,9(0,8-4,5)	3,6(2,1-6,2)	3,7(2,2-6,4)	1,6(0,6-4,3)	2,9(2,1-3,9)	
45 A 64 AÑOS	1,1(0,3-4,4)	3,6(1,4-8,5)	4,1(2,2-7,6)	1,5(0,4-5,0)	0,8(0,1-5,7)	2,4(1,5-3,8)	
MAYOR DE 65 AÑOS	-	0,7(0,1-4,8)	-	-	2,9(0,9-8,9)	0,5(0,2-1,5)	
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=1,936; df1=2,783; df2=1931,639; p=0,127$
18 A 24 AÑOS	-	0,5(0,1-3,2)	-	-	-	0,1(0,0-1,0)	
25 A 44 AÑOS	1,4(0,2-9,0)	0,2(0,0-1,5)	0,6(0,1-2,4)	0,7(0,2-2,9)	0,4(0,1-2,9)	0,6(0,3-1,4)	
45 A 64 AÑOS	1,8(0,5-6,2)	0,6(0,1-4,2)	0,9(0,2-3,5)	1,6(0,5-5,0)	0,1(0,0-1,1)	1,1(0,5-2,1)	
MAYOR DE 65 AÑOS	1,2(0,3-4,6)	-	0,5(0,1-3,6)	-	-	0,4(0,1-1,3)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=0,756; df1=2,806; df2=1947,523; p=0,511$
18 A 24 AÑOS	-	0,5(0,1-3,2)	-	-	-	0,1(0,0-1,0)	
25 A 44 AÑOS	1,4(0,2-9,0)	0,2(0,0-1,5)	0,6(0,1-2,4)	0,7(0,2-2,9)	0,4(0,1-2,9)	0,6(0,3-1,4)	
45 A 64 AÑOS	1,3(0,3-5,8)	0,6(0,1-4,2)	0,4(0,1-2,9)	0,5(0,1-3,2)	0,1(0,0-0,1)	0,6(0,2-1,5)	
MAYOR DE 65 AÑOS	1,2(0,3-4,6)	-	0,5(0,1-3,6)	-	-	0,4(0,1-1,3)	
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=0,851; df1=2,585; df2=1793,926; p=0,452$
18 A 24 AÑOS	-	-	-	-	-	-	
25 A 44 AÑOS	1,4(0,2-9,0)	-	0,3(0,1-1,1)	0,3(0,1-1,1)	-	0,3(0,1-1,1)	
45 A 64 AÑOS	1,3(0,3-5,8)	0,6(0,1-4,2)	0,4(0,1-2,9)	-	-	0,5(0,2-1,4)	
MAYOR DE 65 AÑOS	0,5(0,1-3,7)	-	0,5(0,1-3,6)	-	-	0,2(0,1-1,0)	

POBREZA Y SALUD MENTAL

La relación entre la pobreza y la salud mental ha sido discutida al inicio de este informe. Uno de los aspectos más importantes a considerar en las políticas sociales es la protección de aquellos grupos humanos más vulnerables. La evaluación de la pobreza en este estudio se basó en estimaciones subjetivas del jefe del hogar, preguntándose en qué medida los ingresos familiares satisfacían las necesidades básicas (alimentación, vestido, salud y educación) y no básicas (distracción, educación diferenciada, etc.). Aquellos miembros de una familia que no pueden satisfacer la necesidad básica de alimentación son considerados pobres extremos; si satisfacen la necesidad básica de alimentación, pero no las otras necesidades básicas, son considerados pobres; si satisfacen todas las necesidades básicas, pero no otras necesidades, son considerados no pobres básicos, y si satisfacen sus necesidades básicas y otras necesidades, se les considera no pobres. Además, se ha incluido como medida objetiva de la pobreza las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que contienen características de la vivienda, hacinamiento, deficiencia de servicios higiénicos, agua potable, electricidad y niños en edad escolar que no estudian.

En este informe presentamos las asociaciones entre los primeros indicadores y los trastornos clínicos generales. En un reporte posterior se presentarán los análisis más detallados conjuntamente con el método de necesidades básicas insatisfechas.

En la Tabla 44A podemos observar las prevalencias anual, a seis meses y actual de los trastornos mentales en general según niveles de pobreza, medidas a través de las estimaciones subjetivas del jefe del hogar sobre la satisfacción de las necesidades y los ingresos familiares. Existe una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de pobreza y la presencia de trastornos psiquiátricos, siendo mayor en situaciones de pobreza. Similar situación se observa cuando el nivel de pobreza es cuantificado por el número de necesidades básicas insatisfechas. Este panorama es semejante al encontrado en el 2002, pese a que en esta oportunidad las cifras de prevalencia encontradas fueron bastante mayores y estuvieron más fuertemente asociadas a los niveles de pobreza (Tabla 44B).

TABLA 44A

PREVALENCIA ANUAL, A SEIS MESES Y ACTUAL DE TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL POR NIVEL DE POBREZA, SEGÚN PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD DE COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS, EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS CLÍNICOS GENERALES	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO							F=6,428; df1=2,953; df2=2049,393; p=0,00027
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	18,7(6,7-42,3)	26,8(14,6-43,9)	18,7(7,5-39,7)	16,9(2,4-62,9)	18,8(11,4-29,2)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	12,1(6,6-21,2)	14,9(10,1-21,5)	15,4(11,8-19,8)	17,2(12,7-22,9)	13,4(8,0-21,7)	15,0(12,7-17,7)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	10,6(7,4-14,8)	10,2(7,5-13,9)	15,1(12,1-18,7)	11,4(8,9-14,6)	7,7(5,0-11,8)	11,4(9,9-13,0)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	10,7(6,1-18,1)	9,0(5,0-15,8)	9,0(5,3-15,0)	3,1(1,2-7,6)	4,5(1,9-10,3)	8,0(5,9-10,8)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO							F=4,716; df1=2,949; df2=2046,952; p=0,003
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	18,7(6,7-42,3)	23,0(11,7-40,2)	16,6(5,8-38,8)	16,9(2,4-62,9)	17,4(10,3-27,9)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	11,0(5,7-20,1)	12,3(8,0-18,5)	12,3(9,0-16,6)	14,1(10,0-19,5)	12,4(7,2-20,5)	12,5(10,4-15,0)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	9,1(6,2-13,3)	8,5(6,0-12,0)	12,7(9,9-16,3)	10,3(8,0-13,2)	5,9(3,5-9,7)	9,6(8,3-11,2)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	10,5(5,9-17,9)	7,3(3,6-14,1)	8,8(5,1-14,9)	2,6(0,9-7,1)	2,4(0,8-7,1)	7,2(5,2-10,0)	
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO							F=4,113; df1=2,928; df2=2032,313; p=0,007
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	18,7(6,7-42,3)	23,0(11,7-40,2)	11,5(4,0-29,1)	-	15,2(8,7-25,4)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	10,0(4,9-19,1)	10,7(6,7-16,8)	9,6(6,6-13,9)	9,5(6,2-14,3)	9,1(4,8-16,3)	9,9(7,9-12,3)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	8,1(5,4-12,0)	6,5(4,3-9,7)	10,7(8,0-14,2)	7,0(5,0-9,8)	3,1(1,4-6,4)	7,4(6,2-8,8)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	8,9(4,7-16,2)	5,0(2,0-11,9)	6,9(3,6-13,0)	2,6(0,9-7,1)	1,6(0,4-6,6)	5,8(3,9-8,4)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL*							F=4,926; df1=2,956; df2=2051,200; p=0,002
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	-	2,7(0,4-14,5)	-	16,9(2,4-62,9)	1,7(0,4-6,7)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	5,0(2,2-10,9)	3,9(1,9-7,8)	5,7(3,6-8,9)	5,3(3,0-9,0)	0,7(0,1-4,7)	4,6(3,4-6,1)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	1,3(0,5-3,3)	2,9(1,6-5,2)	3,7(2,5-5,6)	1,9(1,0-3,5)	1,6(0,6-4,4)	2,5(1,9-3,3)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,7(0,7-4,4)	2,8(1,0-7,6)	3,1(1,4-6,9)	0,5(0,1-3,4)	0,5(0,1-4,0)	2,0(1,2-3,2)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							F=3,750; df1=2,962; df2=2055,831; p=0,011
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	-	2,7(0,4-14,5)	-	16,9(2,4-62,9)	1,7(0,4-6,7)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,8(2,1-10,8)	3,2(1,5-6,7)	4,5(2,7-7,5)	4,2(2,3-7,6)	0,7(0,1-4,7)	3,8(2,8-5,2)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	0,9(0,3-2,5)	2,0(1,0-4,1)	3,7(2,4-5,6)	1,7(0,9-3,3)	1,2(0,4-3,9)	2,1(1,5-2,8)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,7(0,7-4,4)	2,2(0,7-6,8)	3,4(1,6-7,2)	-	0,5(0,1-4,0)	1,8(1,1-3,0)	

TRASTORNOS CLÍNICOS GENERALES	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							$F=3,315$; $df1=2,840$; $df2=1970,950$; $p=0,021$
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	-	2,7(0,4-14,5)	-	-	0,6(0,1-4,3)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,4(1,8-10,4)	3,2(1,5-6,7)	3,3(1,7-6,2)	1,8(0,8-4,2)	0,7(0,1-4,7)	2,9(2,0-4,2)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	0,6(0,2-2,2)	1,5(0,7-3,3)	3,2(2,1-5,0)	1,6(0,7-3,4)	0,7(0,2-3,2)	1,7(1,2-2,4)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,7(0,7-4,4)	0,5(0,1-3,8)	2,5(1,0-6,4)	-	0,5(0,1-4,0)	1,2(0,7-2,2)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL **							$F=3,854$; $df1=2,857$; $df2=1983,024$; $p=0,010$
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	6,8(1,7-23,3)	14,0(5,0-33,7)	18,7(7,5-39,7)	-	10,1(5,3-18,2)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	5,7(2,2-14,3)	6,3(3,5-10,8)	8,3(5,7-12,1)	10,7(7,2-15,6)	11,1(6,3-18,8)	8,2(6,5-10,3)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	5,8(3,5-9,5)	5,4(3,4-8,5)	7,4(5,3-10,3)	5,9(4,0-8,8)	4,5(2,7-7,6)	5,9(4,9-7,2)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	6,9(3,3-14,1)	2,9(1,2-6,6)	4,4(1,8-10,5)	1,2(0,2-6,4)	2,9(0,9-9,0)	4,1(2,6-6,4)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							$F=2,821$; $df1=2,870$; $df2=1991,886$; $p=0,040$
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	6,8(1,7-23,3)	10,2(2,9-30,1)	16,6(5,8-38,8)	-	8,7(4,3-16,9)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,7(1,5-13,9)	3,7(1,7-7,7)	6,0(3,7-9,6)	7,7(4,8-12,1)	8,2(4,1-15,8)	5,8(4,4-7,7)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	4,4(2,4-7,8)	4,4(2,5-7,4)	5,4(3,6-8,0)	4,9(3,2-7,5)	2,8(1,4-5,7)	4,5(3,6-5,7)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	6,7(3,1-14,0)	1,1(0,4-3,7)	2,1(0,9-4,9)	1,2(0,2-6,4)	0,8(0,1-5,2)	2,9(1,7-5,0)	
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							$F=2,462$; $df1=2,764$; $df2=1918,097$; $p=0,066$
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	6,8(1,7-23,3)	7,9(1,7-29,4)	11,5(4,0-29,1)	-	7,0(3,3-14,4)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,1(1,1-13,8)	2,8(1,2-6,6)	3,4(1,8-6,4)	4,5(2,2-9,0)	4,9(2,1-11,0)	3,7(2,6-5,4)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	3,6(1,8-6,9)	2,9(1,4-5,7)	3,1(1,8-5,4)	1,9(1,0-3,6)	0,2(0,0-1,8)	2,5(1,8-3,5)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	5,6(2,3-12,7)	0,5(0,1-3,6)	0,8(0,2-3,2)	1,2(0,2-6,4)	-	2,1(1,0-4,2)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL							$F=2,411$; $df1=2,936$; $df2=2037,406$; $p=0,067$
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	11,9(2,8-39,1)	12,4(4,6-29,6)	-	-	7,7(3,0-18,7)	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,9(0,1-6,5)	3,8(1,6-8,6)	2,8(1,4-5,5)	2,3(1,0-5,2)	2,0(0,5-7,5)	2,6(1,7-4,1)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	2,5(1,2-5,5)	1,4(0,6-3,2)	4,4(2,8-6,9)	2,4(1,2-4,5)	2,0(0,9-4,4)	2,6(1,9-3,4)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,6(0,1-2,4)	2,0(0,3-12,5)	3,5(1,2-10,3)	1,4(0,4-4,5)	1,1(0,2-7,0)	1,7(0,8-3,6)	
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=0,532$; $df1=2,879$; $df2=1998,115$; $p=0,653$
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	-	-	-	-	-	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	1,0(0,1-6,5)	0,8(0,2-3,0)	0,8(0,2-2,7)	0,9(0,2-5,0)	0,2(0,0-1,4)	0,8(0,4-1,6)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	1,0(0,3-3,5)	-	0,5(0,1-1,6)	0,9(0,3-2,5)	0,3(0,0-1,9)	0,5(0,3-0,9)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,0(0,6-6,3)	0,9(0,1-5,8)	0,3(0,0-2,0)	-	-	0,8(0,3-2,1)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=0,702$; $df1=2,789$; $df2=1935,508$; $p=0,541$
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	-	-	-	-	-	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	-	0,8(0,2-3,0)	0,8(0,2-2,7)	0,1(0,0-0,8)	0,2(0,0-1,4)	0,5(0,2-1,1)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	1,0(0,3-3,5)	-	0,2(0,1-1,0)	0,7(0,2-2,3)	0,3(0,0-1,9)	0,4(0,2-0,8)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,0(0,6-6,3)	0,9(0,1-5,8)	0,3(0,0-2,0)	-	-	0,8(0,3-2,1)	
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=1,562$; $df1=2,662$; $df2=1847,741$; $p=0,202$
NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	-	-	-	-	-	-	
CUBREN SOLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	-	-	0,3(0,0-2,4)	0,1(0,0-0,8)	-	0,1(0,0-0,7)	
CUBREN TODAS LAS NECESIDADES BÁSICAS PERO NO OTRAS	1,0(0,3-3,5)	-	0,2(0,1-1,0)	0,1(0,0-0,9)	-	0,2(0,1-0,6)	
CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,5(0,4-6,2)	0,9(0,1-5,8)	0,3(0,0-2,0)	-	-	0,7(0,2-2,0)	

* Trastornos de ansiedad: incluyen agorafobia, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático y fobia social.

** Trastornos depresivos en general: incluyen episodio depresivo moderado a severo y distimia.

TABLA 44B

PREVALENCIA ANUAL, A SEIS MESES Y ACTUAL DE TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL POR NIVEL DE POBREZA, SEGÚN EL NÚMERO DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS CLÍNICOS GENERALES (PREVALENCIA GRAL.)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO							
TOTAL	10,8(8,2-14,0)	11,4(9,1-14,2)	14,4(12,3-16,9)	11,7(9,6-14,2)	8,6(6,5-11,3)	11,8(10,7-13,0)	F=11,611; df1=1; df2=694; p=0,001
POBRE (1 O MÁS NBI)	9,2(4,7-17,2)	13,4(9,0-19,5)	18,9(14,5-24,1)	17,2(12,6-22,9)	12,4(7,8-18,9)	15,3(13,0-18,0)	
NO POBRE (0 NBI)	10,9(8,2-14,5)	10,7(8,2-14,0)	12,8(10,5-15,6)	10,2(7,9-13,1)	7,3(5,1-10,2)	10,8(9,6-12,2)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO							
TOTAL	9,8(7,3-13,1)	9,5(7,4-12,2)	12,2(10,1-14,6)	10,1(8,3-12,3)	6,9(5,0-9,6)	10,1(9,0-11,2)	F=10,672; df1=1; df2=694; p=0,001
POBRE (1 O MÁS NBI)	8,4(4,1-16,7)	12,0(7,8-18,1)	15,2(11,2-20,2)	15,0(10,9-20,3)	11,8(7,4-18,4)	13,3(11,1-15,8)	
NO POBRE (0 NBI)	9,9(7,2-13,5)	8,7(6,4-11,8)	11,1(8,9-13,8)	8,8(6,8-11,3)	5,2(3,3-7,9)	9,2(8,0-10,5)	
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO							
TOTAL	8,6(6,3-11,7)	7,6(5,8-10,0)	10,0(8,0-12,4)	7,0(5,5-9,0)	4,1(2,7-6,3)	7,9(6,9-8,9)	F=4,800; df1=1; df2=694; p=0,029
POBRE (1 O MÁS NBI)	7,8(3,6-16,3)	8,8(5,5-13,9)	12,6(8,9-17,5)	9,7(6,6-14,0)	7,1(3,7-13,2)	9,8(7,9-12,1)	
NO POBRE (0 NBI)	8,7(6,2-12,1)	7,3(5,2-10,1)	9,1(7,0-11,7)	6,3(4,5-8,7)	3,1(1,8-5,2)	7,3(6,3-8,6)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL*							
TOTAL	2,1(1,3-3,5)	3,0(2,0-4,7)	4,2(3,1-5,6)	2,5(1,7-3,7)	1,4(0,7-3,1)	2,9(2,4-3,5)	F=9,897; df1=1; df2=694; p=0,002
POBRE (1 O MÁS NBI)	3,1(0,8-11,2)	3,2(1,5-6,8)	6,6(4,1-10,3)	5,2(2,8-9,6)	2,9(1,0-7,7)	4,6(3,3-6,2)	
NO POBRE (0 NBI)	2,0(1,2-3,5)	3,0(1,7-5,1)	3,4(2,3-4,8)	1,7(1,0-3,0)	0,9(0,3-2,8)	2,4(1,9-3,1)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							
TOTAL	1,9(1,1-3,2)	2,3(1,3-3,8)	3,9(2,9-5,2)	2,0(1,3-3,2)	1,2(0,5-2,7)	2,4(2,0-3,0)	F=10,798; df1=1; df2=694; p=0,001
POBRE (1 O MÁS NBI)	3,1(0,8-11,2)	2,1(0,9-5,3)	5,8(3,6-9,2)	5,4(2,9-10,0)	2,9(1,0-7,7)	4,0(2,9-5,6)	
NO POBRE (0 NBI)	1,8(1,0-3,1)	2,3(1,2-4,3)	3,2(2,2-4,7)	1,1(0,6-2,2)	0,6(0,1-2,4)	2,0(1,5-2,6)	
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL*							
TOTAL	1,7(1,0-3,0)	1,7(0,9-3,1)	3,1(2,2-4,4)	1,3(0,7-2,4)	0,7(0,2-2,0)	1,9(1,5-2,4)	F=2,632; df1=1; df2=694; p=0,105
POBRE (1 O MÁS NBI)	3,1(0,8-11,2)	1,3(0,4-4,2)	4,1(2,2-7,5)	2,3(0,9-5,8)	2,1(0,6-6,9)	2,6(1,7-3,9)	
NO POBRE (0 NBI)	1,6(0,8-2,9)	1,8(0,9-3,6)	2,8(1,8-4,2)	1,1(0,5-2,3)	0,2(0,0-1,2)	1,7(1,2-2,2)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL**							
TOTAL	6,1(4,1-8,8)	5,2(3,8-7,1)	7,3(5,9-9,1)	6,7(5,0-8,9)	5,7(4,1-7,9)	6,2(5,4-7,1)	F=2,896; df1=1; df2=694; p=0,089
POBRE (1 O MÁS NBI)	2,0(0,6-6,3)	6,0(3,2-11,0)	9,0(6,2-12,9)	9,6(6,3-14,6)	7,8(4,5-13,0)	7,6(6,0-9,6)	
NO POBRE (0 NBI)	6,5(4,4-9,5)	4,9(3,4-7,2)	6,7(5,0-9,0)	5,9(4,1-8,5)	4,9(3,2-7,5)	5,9(5,0-6,9)	
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							
TOTAL	5,1(3,3-7,9)	3,7(2,5-5,5)	5,1(3,9-6,8)	5,3(3,9-7,2)	3,7(2,3-5,8)	4,6(3,9-5,5)	F=2,692; df1=1; df2=694; p=0,101
POBRE (1 O MÁS NBI)	1,2(0,3-5,0)	4,9(2,4-9,8)	6,1(3,8-9,8)	7,2(4,5-11,3)	7,3(4,1-12,5)	5,8(4,3-7,6)	
NO POBRE (0 NBI)	5,5(3,5-8,5)	3,3(2,0-5,5)	4,8(3,3-6,8)	4,8(3,2-7,1)	2,4(1,2-4,9)	4,3(3,5-5,3)	
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							
TOTAL	4,3(2,6-6,8)	2,6(1,6-4,2)	2,9(2,0-4,3)	2,7(1,7-4,2)	1,2(0,6-2,7)	2,8(2,3-3,5)	F=0,496; df1=1; df2=694; p=0,482
POBRE (1 O MÁS NBI)	0,6(0,1-4,4)	2,9(1,2-6,9)	3,7(2,1-6,5)	4,3(2,2-8,0)	2,8(1,1-6,7)	3,2(2,2-4,6)	
NO POBRE (0 NBI)	4,6(2,9-7,4)	2,5(1,3-4,5)	2,7(1,6-4,3)	2,3(1,2-4,2)	0,7(0,2-2,3)	2,7(2,1-3,6)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL							
TOTAL	1,6(0,8-3,1)	2,4(1,4-4,2)	4,0(2,8-5,6)	2,1(1,3-3,4)	1,8(1,0-3,4)	2,5(2,0-3,2)	F=0,493; df1=1; df2=694; p=0,483
POBRE (1 O MÁS NBI)	4,2(1,1-14,2)	2,3(0,8-6,7)	4,5(2,6-7,9)	1,3(0,4-4,2)	2,3(0,7-7,2)	2,9(1,9-4,4)	
NO POBRE (0 NBI)	1,3(0,6-2,9)	2,4(1,2-4,7)	3,8(2,4-5,8)	2,4(1,4-3,9)	1,7(0,8-3,5)	2,4(1,8-3,2)	
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							
TOTAL	1,3(0,5-3,2)	0,3(0,1-1,0)	0,5(0,2-1,3)	0,7(0,3-1,8)	0,2(0,0-1,0)	0,6(0,4-1,0)	F=0,106; df1=1; df2=694; p=0,744
POBRE (1 O MÁS NBI)	-	1,0(0,2-3,9)	0,4(0,1-1,9)	0,8(0,2-3,2)	0,8(0,2-3,5)	0,7(0,3-1,5)	
NO POBRE (0 NBI)	1,4(0,6-3,5)	0,1(0,0-0,9)	0,6(0,2-1,5)	0,7(0,2-2,1)	-	0,6(0,3-1,0)	

TRASTORNOS CLÍNICOS GENERALES (PREVALENCIA GRAL.)	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							
TOTAL	1,1(0,4-3,0)	0,3(0,1-1,0)	0,4(0,1-1,2)	0,4(0,1-1,3)	0,2(0,0-1,0)	0,5(0,3-0,8)	$F=0,238$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,626$
POBRE (1 O MÁS NBI)	-	1,0(0,2-3,9)	0,4(0,1-1,9)	0,3(0,0-2,2)	0,8(0,2-3,5)	0,6(0,3-1,4)	
NO POBRE (0 NBI)	1,2(0,4-3,3)	0,1(0,0-0,9)	0,4(0,1-1,2)	0,4(0,1-1,6)	-	0,5(0,2-0,9)	
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							
TOTAL	1,0(0,3-3,0)	0,1(0,0-1,0)	0,3(0,1-0,8)	0,1(0,0-0,4)	-	0,3(0,1-0,6)	$F=0,215$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,643$
POBRE (1 O MÁS NBI)	-	0,6(0,1-4,1)	0,4(0,1-1,9)	0,3(0,0-2,2)	-	0,4(0,1-1,1)	
NO POBRE (0 NBI)	1,1(0,3-3,3)	-	0,2(0,0-0,9)	0,0(0,0-0,3)	-	0,3(0,1-0,7)	

* Trastornos de ansiedad: incluyen agorafobia, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés posttraumático y fobia social.

** Trastornos depresivos en general: incluyen episodio depresivo moderado a severo y distimia.

TRASTORNOS MENTALES SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES

Para efectos comparativos se presentan las prevalencias de los trastornos mentales en general según áreas poblacionales de Lima Metropolitana (Tabla 45). En líneas generales, se encuentra mayor prevalencia de vida de cualquier trastorno psiquiátrico en Lima Sur con un 28,3%, seguido de Lima Centro con un 27,6% y Lima Este con un 27,5%. Los trastornos depresivos tienen mayor prevalencia de vida en Lima Centro, mientras que la mayor prevalencia anual se encuentra en Lima Este, y la prevalencia de 6 meses en Lima Sur. Sobre el consumo perjudicial o dependencia de alcohol, la mayor prevalencia de vida y anual se encuentra en Lima Este. También, es en Lima Este, donde se observa una mayor prevalencia anual de ansiedad en general. En comparación al panorama observado en el 2002, se observa una disminución en la prevalencia de trastornos clínicos, para el 2012, en el Callao. En el 2002 no se consignaron las prevalencias de vida, anuales, ni la prevalencia de consumo de alcohol.

TABLA 45
PREVALENCIA DE VIDA, ANUAL, A SEIS MESES Y ACTUAL DE TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL	27,6(22,7-33,1)	23,8(20,4-27,5)	27,5(24,7-30,5)	28,3(24,7-32,2)	21,8(17,6-26,6)	26,1(24,3-27,8)	$F=1,662$; $df1=3,758$; $df2=2607,965$; $p=0,160$
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL	10,8(8,2-14,0)	11,4(9,1-14,2)	14,4(12,3-16,9)	11,7(9,6-14,2)	8,6(6,5-11,3)	11,8(10,7-13,0)	$F=2,321$; $df1=3,774$; $df2=2619,492$; $p=0,058$
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL	9,8(7,3-13,1)	9,5(7,4-12,2)	12,2(10,1-14,6)	10,1(8,3-12,3)	6,9(5,0-9,6)	10,1(9,0-11,2)	$F=1,920$; $df1=3,761$; $df2=2610,110$; $p=0,109$
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL	8,6(6,3-11,7)	7,6(5,8-10,0)	10,0(8,0-12,4)	7,0(5,5-9,0)	4,1(2,7-6,3)	7,9(6,9-8,9)	$F=3,062$; $df1=3,806$; $df2=2641,685$; $p=0,017$
PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL	11,2(8,4-14,7)	10,1(7,9-12,9)	11,5(9,8-13,6)	10,2(8,2-12,7)	8,2(5,7-11,7)	10,5(9,4-11,6)	$F=0,731$; $df1=3,834$; $df2=2660,656$; $p=0,565$
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL	2,1(1,3-3,5)	3,0(2,0-4,7)	4,2(3,2-5,6)	2,5(1,7-3,7)	1,4(0,7-3,1)	2,9(2,4-3,5)	$F=2,634$; $df1=3,823$; $df2=2653,503$; $p=0,035$
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL	1,9(1,1-3,2)	2,3(1,3-3,8)	3,9(2,9-5,1)	2,0(1,3-3,2)	1,2(0,5-2,7)	2,4(2,0-3,0)	$F=3,000$; $df1=3,750$; $df2=2602,836$; $p=0,020$
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL	1,7(1,0-3,0)	1,7(0,9-3,1)	3,1(2,2-4,3)	1,3(0,7-2,4)	0,7(0,2-2,0)	1,9(1,5-2,4)	$F=3,105$; $df1=3,807$; $df2=2642,399$; $p=0,016$
PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL	20,5(16,7-25,0)	14,0(11,6-16,8)	17,1(14,8-19,8)	19,9(16,7-23,5)	15,6(12,4-19,5)	17,3(15,9-18,7)	$F=3,168$; $df1=3,860$; $df2=2679,092$; $p=0,014$
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL	6,1(4,1-8,8)	5,2(3,8-7,1)	7,3(5,9-9,1)	6,7(5,0-8,9)	5,7(4,1-7,9)	6,2(5,4-7,1)	$F=0,928$; $df1=3,751$; $df2=2603,285$; $p=0,442$

TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL	5,1(3,3-7,9)	3,7(2,5-5,5)	5,1(3,9-6,8)	5,3(3,9-7,2)	3,7(2,3-5,8)	4,6(3,9-5,5)	$F=0,889$; $df1=3,754$; $df2=2605,388$; $p=0,464$
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL	4,3(2,6-6,8)	2,6(1,6-4,2)	2,9(2,0-4,3)	2,7(1,7-4,2)	1,2(0,6-2,7)	2,8(2,3-3,5)	$F=1,757$; $df1=3,760$; $df2=2609,285$; $p=0,139$
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL	6,0(4,1-8,8)	6,2(4,5-8,5)	10,0(8,1-12,4)	7,5(5,8-9,8)	6,8(4,9-9,3)	7,5(6,5-8,5)	$F=2,594$; $df1=3,764$; $df2=2612,399$; $p=0,038$
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL	1,6(0,8-3,1)	2,4(1,4-4,2)	4,0(2,8-5,6)	2,1(1,3-3,4)	1,8(1,0-3,4)	2,5(2,0-3,2)	$F=2,394$; $df1=3,651$; $df2=2533,664$; $p=0,054$

Lima Centro: Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Surquillo.
Lima Norte: Ancón, Carabaylo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rimac, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Santa Rosa.
Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho y Santa Anita.
Lima Sur: Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
Callao: Callao, Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta y Ventanilla.

EFFECTOS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

La violencia política es un fenómeno en el que se producen actos de violencia perpetrados por grupos de personas con un propósito político (OMS, 2002; Heskin, 2001)¹³⁷. Entre los años 1980 y 2000, el Perú vivió el fenómeno de la violencia política a través del conflicto más largo y de mayor impacto en su vida republicana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), instancia nacional encargada de esclarecer el proceso, los hechos y las responsabilidades de la violencia y la violación a los derechos humanos ejercidos por la subversión y por las fuerzas del orden, identificó 23 969 muertos y desaparecidos, y estimó una cifra de 69280 víctimas fatales durante los 20 años de conflicto.

Se ha considerado, para el reporte de los efectos de la violencia política, el informe de dos variables: la frecuencia con que las personas reportan haber experimentado la pérdida de familiares o bienes materiales por hechos directamente relacionados con la violencia en época de terrorismo, y la relación de aquella con trastornos psiquiátricos. Como resultado se ha encontrado que la población adulta encuestada según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao ha sido víctima de algún atentado vinculado al terrorismo y se han padecido pérdidas, tanto de vidas humanas como de bienes materiales, en forma significativa. Así tenemos en primer lugar a Lima Sur con un 2,2%, en haber tenido muerte de un familiar directo, y con 6,5% sobre muerte de otro familiar no directo. Sobre familiar desaparecido y testigo de muerte violenta, es también Lima Sur, donde se observa mayor porcentaje con un 3,4% y 2,9% respectivamente. En relación a familiar detenido, familiar en prisión y pérdidas de bienes, Lima Sur vuelve a presentar mayores niveles de pérdidas con un 2,1%, 1,7% y 3,2% respectivamente. El cambio de residencia por motivos de la violencia se refirió en mayor porcentaje en Lima Sur con un 4,5%. Estos valores se explican, cuando en relación a la pregunta si al menos tuvo una situación de pérdida personal y algún familiar fallecido o desaparecido, es Lima Sur, el área que presenta las cifras más altas con un 13,5% y 9,7% respectivamente. Además, si la pregunta fue sobre víctima de algún atentado vinculado al terrorismo, nuevamente Lima Sur, con un 1,3% presenta el segundo lugar, antecedido solo de Lima Centro con un 3,1%. (Tabla 46A).

TABLA 46A

PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA TERRORISTA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TIPO DE PÉRDIDA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MUERTE DE UN FAMILIAR DIRECTO (PADRES, ESPOSO(A), HIJOS)	0,9(0,2-4,1)	1,4(0,8-2,7)	1,8(1,2-2,8)	2,2(1,4-3,4)	1,2(0,5-3,0)	1,6(1,2-2,1)	$F=0,663$; $df1=2,955$; $df2=2050,861$; $p=0,572$
MUERTE DE OTRO FAMILIAR NO DIRECTO	2,9(1,6-5,1)	5,4(3,8-7,6)	6,2(4,9-7,7)	6,5(5,0-8,4)	4,5(3,0-6,8)	5,3(4,5-6,1)	$F=2,424$; $df1=3,647$; $df2=2530,817$; $p=0,052$
FAMILIAR DESAPARECIDO	1,2(0,4-3,5)	2,1(1,3-3,5)	3,0(2,2-4,0)	3,4(2,3-4,9)	2,2(1,2-3,9)	2,4(2,0-3,0)	$F=1,594$; $df1=3,306$; $df2=2294,296$; $p=0,184$

TIPO DE PÉRDIDA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
TESTIGO DE MUERTE VIOLENTA DE ALGUNA PERSONA	0,9(0,2-3,3)	2,2(1,3-3,8)	1,7(1,1-2,7)	2,9(1,9-4,3)	2,1(1,1-3,9)	2,0(1,5-2,6)	$F=1,346$; $df1=3,257$; $df2=2260,273$; $p=0,256$
FAMILIAR DETENIDO	0,5(0,2-1,6)	1,9(0,9-3,8)	1,6(1,0-2,5)	2,1(1,3-3,2)	0,8(0,3-1,9)	1,5(1,1-2,0)	$F=1,840$; $df1=3,380$; $df2=2345,614$; $p=0,130$
FAMILIAR EN PRISIÓN	0,7(0,2-2,3)	0,6(0,3-1,3)	1,1(0,7-1,8)	1,7(1,0-2,9)	0,9(0,3-2,9)	1,0(0,7-1,4)	$F=1,334$; $df1=3,717$; $df2=2579,515$; $p=0,257$
PÉRDIDA DE BIENES	0,5(0,1-1,9)	1,3(0,7-2,5)	2,0(1,3-3,2)	3,2(2,1-4,8)	1,4(0,6-3,0)	1,7(1,3-2,2)	$F=3,545$; $df1=3,835$; $df2=2661,323$; $p=0,008$
CAMBIO DE RESIDENCIA	1,0(0,4-2,5)	2,1(1,3-3,4)	3,1(2,2-4,3)	4,5(3,0-6,7)	1,4(0,7-3,0)	2,6(2,1-3,2)	$F=4,498$; $df1=3,832$; $df2=2659,648$; $p=0,002$
FUE VÍCTIMA DE ALGÚN ATENTADO VINCULADO AL TERRORISMO	3,1(1,8-5,4)	0,9(0,4-1,9)	1,1(0,6-1,9)	1,3(0,7-2,4)	0,9(0,4-2,1)	1,4(1,1-1,9)	$F=3,994$; $df1=3,679$; $df2=2553,245$; $p=0,004$
AL MENOS UNA SITUACIÓN DE PÉRDIDA PERSONAL	6,0(3,6-9,9)	9,6(7,4-12,5)	10,7(8,9-12,8)	13,5(11,0-16,4)	7,1(4,8-10,4)	9,8(8,7-11,0)	$F=4,054$; $df1=3,500$; $df2=2428,708$; $p=0,004$
ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,2(2,1-8,1)	6,9(5,1-9,4)	8,3(6,8-10,0)	9,7(7,7-12,1)	6,2(4,3-8,8)	7,3(6,3-8,3)	$F=2,803$; $df1=3,046$; $df2=2113,802$; $p=0,038$

Lima Centro: Lima, Breña, Jesús María, La Victoria, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Luis, San Miguel, Surquillo.
Lima Norte: Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, Rimac, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Santa Rosa.
Lima Este: Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho y Santa Anita.
Lima Sur: Barranco, Chorrillos, Lurín, Pachacamac, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.
Callao: Callao, Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Perla, La Punta y Ventanilla.

En la Tabla 46B se observa que la prevalencia de vida de algún trastorno psiquiátrico en las personas que han perdido algún familiar es de 32,1% en Lima Centro, 32,0% en Lima Norte, 38,7% en Lima Este, 37,2% en Lima Sur, 26,5% en Callao y de 34,8% en total, valores mayores en comparación con la de aquellas personas que no han presentado ninguna pérdida familiar. Lo mismo se observa en una mayor prevalencia anual en personas que han tenido algún familiar fallecido o desaparecido con un 16,5% del total en relación al 11,4% del total de personas sin alguna pérdida familiar. Esta relación es significativa con respecto a las prevalencias de vida y actual de los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad en general, similar a lo hallado en Lima Rural 2007.

TABLA 46B
PREVALENCIAS DE TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL SEGÚN PRESENCIA O AUSENCIA DE PÉRDIDAS PERSONALES POR LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA TERRORISTA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL							$F=10,914$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,001$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	32,1(12,4-61,2)	32,0(21,3-45,1)	38,7(29,7-48,5)	37,2(28,1-47,3)	26,5(13,6-45,1)	34,8(29,3-40,7)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	27,4(22,5-33,0)	23,2(19,6-27,1)	26,5(23,6-29,6)	27,3(23,6-31,4)	21,5(17,2-26,6)	25,4(23,6-27,2)	
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL							$F=5,718$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,017$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	13,3(4,4-33,8)	16,0(7,8-30,0)	19,7(12,8-29,3)	17,1(10,5-26,7)	9,2(2,8-25,7)	16,5(12,4-21,6)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,7(8,1-13,9)	11,0(8,7-13,9)	13,9(11,7-16,4)	11,1(8,9-13,7)	8,6(6,4-11,5)	11,4(10,3-12,7)	
PREVALENCIA A 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL							$F=7,499$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,006$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	13,3(4,4-33,8)	14,8(6,7-29,5)	18,0(11,2-27,7)	16,0(9,7-25,4)	6,9(1,7-24,4)	15,2(11,2-20,3)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,7(7,2-12,9)	9,1(7,0-11,8)	11,6(9,6-14,1)	9,5(7,6-11,8)	6,9(4,9-9,8)	9,7(8,6-10,8)	
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO MENTAL							$F=9,815$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,002$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,4(3,1-29,5)	12,7(5,1-28,0)	17,0(10,4-26,6)	13,7(8,0-22,3)	4,4(0,6-25,8)	13,2(9,4-18,2)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	8,6(6,2-11,7)	7,3(5,4-9,6)	9,4(7,4-11,8)	6,3(4,8-8,3)	4,1(2,6-6,5)	7,5(6,5-8,5)	

TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							$F=25,713$; $df1=1$; $df2=694$; $p=<0,00001$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	17,7(5,7-43,6)	15,9(9,1-26,4)	23,4(15,8-33,3)	20,5(13,5-29,9)	16,9(7,3-34,4)	19,5(15,3-24,6)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,9(8,1-14,5)	9,7(7,4-12,6)	10,5(8,7-12,5)	9,1(7,2-11,6)	7,6(5,1-11,3)	9,8(8,9-11,0)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							$F=3,524$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,061$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,4(0,9-18,9)	2,6(0,6-10,0)	7,9(3,9-15,4)	4,9(1,7-13,3)	-	4,7(2,8-7,8)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,0(1,2-3,4)	3,1(1,9-4,9)	3,9(2,8-5,3)	2,2(1,4-3,5)	1,5(0,7-3,3)	2,7(2,2-3,4)	
PREVALENCIA A 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							$F=4,508$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,034$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,4(0,9-18,9)	2,6(0,6-10,0)	7,3(3,4-14,8)	4,4(1,4-13,1)	-	4,3(2,5-7,4)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,8(1,0-3,1)	2,2(1,3-3,9)	3,6(2,6-4,9)	1,8(1,1-2,9)	1,3(0,5-2,9)	2,3(1,8-2,9)	
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL							$F=5,630$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,018$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,6(0,2-11,3)	2,6(0,6-10,0)	6,8(3,1-14,4)	3,8(1,0-13,1)	-	3,8(2,1-6,8)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,7(1,0-3,0)	1,6(0,9-3,1)	2,8(1,9-4,0)	1,1(0,5-2,0)	0,7(0,2-2,1)	1,7(1,3-2,2)	
PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							$F=4,934$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,027$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	17,2(6,0-40,5)	24,0(15,0-36,3)	20,6(13,9-29,3)	24,7(16,9-34,6)	17,8(7,5-36,7)	22,0(17,5-27,2)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	20,7(16,8-25,2)	13,2(10,8-16,1)	16,8(14,4-19,6)	19,4(16,2-23,1)	15,5(12,1-19,6)	16,9(15,5-18,4)	
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							$F=2,174$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,141$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,6(1,4-25,6)	9,9(3,8-23,6)	8,8(4,4-16,7)	9,5(4,9-17,7)	2,2(0,3-14,6)	8,4(5,5-12,7)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,1(4,1-8,9)	4,8(3,5-6,7)	7,2(5,7-9,1)	6,4(4,7-8,7)	5,9(4,2-8,2)	6,1(5,3-7,0)	
PREVALENCIA A 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							$F=3,808$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,051$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,6(1,4-25,6)	8,7(2,9-23,3)	7,7(3,6-15,8)	8,1(3,9-16,2)	-	7,3(4,5-11,6)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	5,1(3,2-7,9)	3,3(2,2-5,1)	4,9(3,6-6,6)	5,0(3,6-7,0)	3,9(2,5-6,1)	4,4(3,7-5,3)	
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL							$F=6,324$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,012$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,6(1,4-25,6)	7,9(2,4-23,3)	5,0(2,1-11,3)	5,3(2,5-11,1)	-	5,5(3,2-9,5)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,2(2,5-6,8)	2,2(1,3-3,7)	2,7(1,8-4,2)	2,4(1,4-4,0)	1,3(0,6-2,9)	2,6(2,1-3,3)	
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL							$F=3,653$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,056$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,9(2,3-39,5)	9,0(3,0-23,9)	13,4(7,4-23,2)	10,7(5,5-20,0)	7,9(2,8-20,2)	10,8(7,3-15,7)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	5,8(3,9-8,6)	6,0(4,2-8,4)	9,7(7,8-12,2)	7,2(5,4-9,6)	6,7(4,7-9,5)	7,2(6,2-8,3)	
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL							$F=1,226$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,269$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	-	-	9,1(4,2-18,5)	3,8(1,2-12,0)	-	3,6(1,9-6,8)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,6(0,8-3,2)	2,6(1,5-4,5)	3,5(2,4-5,1)	2,0(1,2-3,2)	2,0(1,1-3,6)	2,4(1,9-3,1)	
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=4,202$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,041$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,5(1,3-4,8)	2,0(0,4-8,4)	4,3(1,5-12,0)	2,8(0,7-11,2)	2,5(0,4-15,3)	2,9(1,5-5,7)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2(0,3-15,7)	1,0(0,4-2,3)	0,8(0,4-1,5)	1,9(1,1-3,2)	0,9(0,2-3,1)	1,4(1,0-1,9)	

TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=5,674$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,017$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2(0,3-15,7)	1,3(0,2-9,1)	1,3(0,3-5,5)	2,0(0,3-12,9)	2,5(0,4-15,3)	1,7(0,7-4,1)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,2(0,5-3,3)	0,3(0,1-1,1)	0,5(0,2-1,2)	0,6(0,2-1,6)	0,0(0,0-0,3)	0,5(0,3-0,9)	
PREVALENCIA A 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=8,658$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,003$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2(0,3-15,7)	1,3(0,2-9,1)	1,3(0,3-5,5)	2,0(0,3-12,9)	2,5(0,4-15,3)	1,7(0,7-4,1)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,1(0,3-3,1)	0,3(0,1-1,0)	0,3(0,1-1,0)	0,3(0,1-0,9)	0,0(0,0-0,3)	0,4(0,2-0,7)	
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES							$F=0,379$; $df1=1$; $df2=694$; $p=0,539$
CON ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2(0,3-15,7)	-	0,9(0,1-6,0)	-	-	0,5(0,1-1,8)	
SIN ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,9(0,3-3,1)	0,2(0,0-1,0)	0,2(0,1-0,7)	0,1(0,0-0,5)	-	0,3(0,1-0,6)	

ESTILOS DE CRIANZA Y EVENTOS DE VIDA

Se ha considerado para este reporte el informe de algunos estilos de crianza y su relación con la salud mental. Estudios posteriores tratarán este tema a profundidad. Se hace la advertencia de que la información sobre estilos de crianza se ha realizado en base a recuerdos de los encuestados, lo que conlleva ciertas limitaciones; sin embargo, aun así resulta de particular importancia su consideración (Tabla 47A). Nótese los porcentajes de las actitudes negativas como más castigos de los que merecía y por cosas pequeñas, exigencia mayor, preferencia a los hijos varones y el control sin afecto, así como las de sobreprotección relacionados con engreimiento y favorecimiento mayor al resto y cuidados excesivos. Estas condiciones generan impacto en la vida de las personas favoreciendo la aparición de trastornos mentales relacionados con la ansiedad y la depresión, entre otras.

TABLA 47A
ESTILOS DE CRIANZA REFERIDOS POR LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS
POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESTILOS DE CRIANZA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECEÍA							
	15,0(11,5-19,4)	20,0(16,9-23,4)	22,9(20,4-25,6)	20,9(18,0-24,2)	20,1(15,6-25,5)	20,0(18,6-21,6)	$F=2,559$; $df1=3,791$; $df2=2630,984$; $p=0,040$
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO							
	11,4(8,5-15,1)	12,6(10,2-15,5)	13,6(11,5-15,9)	15,7(13,4-18,3)	8,0(6,0-10,8)	12,8(11,6-14,0)	$F=3,264$; $df1=3,671$; $df2=2547,474$; $p=0,014$
SI LAS COSAS IBAN MAL, SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO(A) Y ANIMARLO(A)							
	81,9(77,2-85,9)	82,8(79,5-85,6)	73,1(70,2-75,7)	78,9(76,2-81,4)	80,1(74,7-84,6)	79,2(77,6-80,7)	$F=5,433$; $df1=3,683$; $df2=2555,727$; $p=0,00037$
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES							
	92,2(89,4-94,3)	92,0(89,8-93,9)	83,4(81,2-85,4)	88,4(86,0-90,4)	89,0(85,1-92,0)	88,9(87,7-89,9)	$F=9,463$; $df1=3,880$; $df2=2692,390$; $p=<0,00001$
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR							
	28,9(23,6-34,8)	29,5(25,8-33,5)	36,5(33,2-40,0)	39,8(35,4-44,7)	27,2(22,3-32,8)	33,0(31,0-35,1)	$F=5,186$; $df1=3,790$; $df2=2630,479$; $p=0,00049$
ERAN MUY EXIGENTES CON RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES							
	34,8(29,5-40,5)	39,0(34,6-43,6)	50,0(46,9-53,0)	59,3(55,4-63,2)	37,6(31,7-43,9)	45,0(42,9-47,1)	$F=18,458$; $df1=3,743$; $df2=2597,650$; $p=<0,00001$
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES, COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC.							
	58,8(53,7-63,7)	53,5(49,4-57,4)	41,1(37,8-44,5)	45,1(41,1-49,1)	48,7(43,1-54,3)	49,1(47,1-51,1)	$F=10,530$; $df1=3,923$; $df2=2722,573$; $p=<0,00001$

ESTILOS DE CRIANZA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES	65,6(60,4-70,5)	63,6(59,5-67,6)	59,5(56,2-62,8)	68,7(65,0-72,2)	60,9(55,3-66,2)	63,7(61,8-65,6)	$F=3,036$; $df1=3,844$; $df2=2668,042$; $p=0,018$
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE, ERA EXAGERADA	14,4(11,2-18,3)	21,7(18,3-25,7)	26,8(23,8-30,0)	27,8(23,4-32,7)	15,1(12,0-18,9)	22,2(20,5-24,1)	$F=9,277$; $df1=3,746$; $df2=2599,651$; $p=<0,00001$
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR	19,9(16,1-24,3)	23,6(20,1-27,5)	25,3(22,6-28,3)	26,1(23,1-29,3)	23,8(19,1-29,2)	23,9(22,3-25,6)	$F=1,513$; $df1=3,829$; $df2=2657,355$; $p=0,198$
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES	8,6(6,4-11,4)	12,0(9,6-14,9)	16,1(13,9-18,6)	14,5(11,9-17,6)	9,4(6,8-12,7)	12,6(11,4-13,9)	$F=5,157$; $df1=3,886$; $df2=2696,793$; $p=0,00045$
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS	8,5(6,4-11,3)	15,4(12,6-18,6)	18,2(16,1-20,6)	16,2(13,7-19,2)	12,5(9,9-15,8)	14,8(13,6-16,1)	$F=7,034$; $df1=3,764$; $df2=2612,434$; $p=0,00002$
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS)	11,9(9,1-15,4)	17,8(14,8-21,2)	17,5(15,2-20,1)	17,6(14,7-20,8)	12,4(9,5-16,1)	16,1(14,7-17,5)	$F=3,258$; $df1=3,871$; $df2=2686,428$; $p=0,012$
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES	81,9(77,9-85,4)	77,5(73,6-80,9)	70,9(67,6-74,1)	71,7(68,0-75,2)	69,8(64,0-75,1)	74,7(72,9-76,3)	$F=6,237$; $df1=3,922$; $df2=2721,967$; $p=0,00006$
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS	18,8(14,9-23,5)	26,2(22,4-30,2)	27,5(24,3-31,0)	28,5(24,4-33,0)	20,7(16,4-25,7)	25,1(23,3-27,0)	$F=3,784$; $df1=3,913$; $df2=2715,922$; $p=0,005$
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN.	91,7(88,5-94,1)	90,4(88,0-92,4)	83,6(80,8-86,0)	91,1(89,2-92,8)	87,1(82,5-90,6)	88,8(87,5-89,9)	$F=7,273$; $df1=3,824$; $df2=2653,601$; $p=0,00001$
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS)	10,3(7,7-13,6)	14,7(12,0-17,9)	15,9(13,6-18,4)	16,4(13,7-19,6)	8,6(6,1-11,9)	13,9(12,7-15,3)	$F=4,504$; $df1=3,886$; $df2=2697,033$; $p=0,001$
LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO	8,1(5,5-11,8)	8,2(6,1-10,9)	13,8(11,8-16,1)	10,5(8,3-13,2)	6,8(4,5-10,2)	9,9(8,8-11,1)	$F=4,177$; $df1=3,761$; $df2=2610,408$; $p=0,003$

En la tabla 47B se presentan los porcentajes de ciertos problemas entre los padres y con los padres mientras el adulto crecía. Es de notar la alta frecuencia de discusiones, embriaguez o ausencias prolongadas de los padres.

TABLA 47B
EVENTOS DE VIDA NEGATIVOS REFERIDOS POR LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ESTILOS DE VIDA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	23,9(19,2-29,3)	29,0(25,4-33,0)	33,9(30,8-37,0)	33,8(30,4-37,4)	25,6(20,8-31,1)	29,9(28,1-31,8)	$F=4,413$; $df1=3,721$; $df2=2582,563$; $p=0,002$
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	19,0(15,0-23,7)	25,7(22,2-29,5)	37,4(34,3-40,6)	31,2(27,6-35,0)	23,5(18,8-28,9)	28,3(26,5-30,1)	$F=12,405$; $df1=3,844$; $df2=2667,391$; $p=<0,00001$
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	22,2(17,1-28,1)	21,5(18,3-25,1)	35,0(31,7-38,4)	31,8(28,2-35,6)	22,1(17,1-28,0)	27,1(25,3-29,0)	$F=9,106$; $df1=3,652$; $df2=2534,316$; $p=<0,00001$
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	17,2(13,7-21,5)	19,1(15,9-22,8)	22,6(19,9-25,6)	23,8(20,8-26,9)	15,3(11,7-19,7)	20,2(18,7-21,8)	$F=3,394$; $df1=3,810$; $df2=2644,438$; $p=0,010$
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	2,0(1,2-3,5)	3,6(2,4-5,4)	3,7(2,7-5,1)	3,5(2,5-5,1)	2,4(1,3-4,3)	3,2(2,6-3,9)	$F=1,248$; $df1=3,840$; $df2=2664,925$; $p=0,289$
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	0,6(0,2-1,7)	1,5(0,8-2,8)	0,8(0,4-1,4)	0,3(0,1-0,9)	1,3(0,5-3,0)	0,9(0,6-1,3)	$F=2,191$; $df1=3,720$; $df2=2581,667$; $p=0,072$

ESTILOS DE VIDA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	2,1(1,2-3,8)	5,0(3,5-7,1)	5,2(4,0-6,6)	5,3(4,0-7,1)	3,9(2,4-6,2)	4,5(3,8-5,3)	$F=2,579$; $df1=3,815$; $df2=2647,602$; $p=0,038$
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	1,7(0,9-3,4)	3,4(2,3-5,0)	3,9(2,9-5,2)	3,0(2,0-4,5)	2,7(1,5-4,9)	3,1(2,5-3,7)	$F=1,494$; $df1=3,905$; $df2=2709,998$ $p=0,203$

Tomando en cuenta la prevalencia de vida de los trastornos mentales en general en la población adulta, la tabla 47C muestra un incremento de las prevalencias en las personas que recuerdan haber recibido estilos de crianza negativos, así como una disminución de las prevalencias ante estilos de crianza positivos. Tomando en consideración los efectos posibles de la memoria en la evaluación del propio pasado, cabe resaltar que actitudes negativas como haber recibido más castigos de los que se merecía y el haber sido castigado severamente por cosas pequeñas tienen un impacto notable en todos los trastornos; asimismo la actitud de ser controlado sin recibir afectos. La prevalencia de vida de trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos se asocian con recibir más castigos de los que merecían, castigos severos por cosas pequeñas, que los hijos hombres no deberían llorar y que las hijas mujeres se vieran en desventaja de preferencia en relación a sus hermanos. Además, para los trastornos de ansiedad, la demostración exagerada de ansiedad de los padres por algo malo que podía suceder se encontró con significancia estadística.

TABLA 47C
PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL SEGÚN ESTILOS DE CRIANZA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

PREVALENCIA DE VIDA DE ESTILOS DE CRIANZA	CUALQUIER TRASTORNO (PG: 26,1%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DE ANSIEDAD (PG: 10,5%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DEPRESIVOS (PG: 17,3%) % (P-VALOR)
LIMA CENTRO			
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECEÍA.	41,7($p=0,003$)	25,5($p<0,00001$)	25,4($p=0,289$)
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO.	30,1($p=0,625$)	11,3($p=0,962$)	24,6($p=0,434$)
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO(A) Y ANIMARLO(A).	23,8($p=0,00033$)	9,4($p=0,010$)	18,2($p=0,025$)
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES.	25,6($p=0,001$)	10,2($p=0,005$)	19,4($p=0,064$)
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR.	24,4($p=0,426$)	12,5($p=0,464$)	15,2($p=0,144$)
ERAN MUY EXIGENTES CON RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES.	27,7($p=0,958$)	11,1($p=0,973$)	22,0($p=0,582$)
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC.	20,0($p=0,00005$)	7,6($p=0,006$)	14,6($p=0,001$)
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES.	22,6($p=0,001$)	8,0($p=0,001$)	17,9($p=0,083$)
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA.	37,5($p=0,70$)	21,5($p=0,009$)	25,8($p=0,260$)
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR.	37,2($p=0,010$)	14,1($p=0,288$)	29,3($p=0,009$)
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES.	44,8($p=0,010$)	24,7($p=0,010$)	33,1($p=0,045$)
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS.	51,5($p=0,00009$)	33,1($p<0,00001$)	29,9($p=0,087$)
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS).	31,3($p=0,473$)	13,8($p=0,527$)	23,5($p=0,480$)
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES.	26,9($p=0,540$)	10,8($p=0,573$)	20,6($p=0,864$)
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS.	36,4($p=0,158$)	15,8($p=0,176$)	25,6($p=0,288$)
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN.	26,0($p=0,030$)	10,3($p=0,039$)	19,5($p=0,128$)
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS).	31,7($p=0,490$)	14,4($p=0,517$)	22,9($p=0,620$)
LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFFECTO.	65,4($p<0,00001$)	31,6($p<0,00001$)	50,0($p=0,00032$)
LIMA NORTE			
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECEÍA.	38,9($p=0,00001$)	25,5($p=0,00008$)	25,2($p=0,00001$)
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO.	26,0($p=0,517$)	16,2($p=0,046$)	14,5($p=0,857$)
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO(A) Y ANIMARLO(A).	20,7($p=0,00016$)	8,8($p=0,004$)	11,6($p=0,00032$)

PREVALENCIA DE VIDA DE ESTILOS DE CRIANZA	CUALQUIER TRASTORNO (PG: 26,1%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DE ANSIEDAD (PG: 10,5%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DEPRESIVOS (PG: 17,3%) % (P-VALOR)
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES.	21,2(p=<0,00001)	9,0(p=0,00028)	12,4(p=0,00026)
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR.	22,4(p=0,569)	6,8(p=0,048)	12,5(p=0,458)
ERAN MUY EXIGENTES CON RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES.	22,3(p=0,486)	9,0(p=0,436)	13,3(p=0,731)
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC.	16,0(p=<0,00001)	7,5(p=0,011)	9,4(p=0,00047)
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES.	15,9(p=<0,00001)	6,9(p=0,00015)	9,4(p=0,00003)
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA.	27,7(p=0,202)	12,9(p=0,254)	16,7(p=0,271)
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR.	28,7(p=0,088)	14,0(p=0,061)	17,2(p=0,127)
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES.	34,6(p=0,018)	19,4(p=0,005)	17,0(p=0,395)
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS.	41,6(p=<0,00001)	19,2(p=0,00030)	28,4(p=<0,00001)
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS).	20,6(p=0,440)	10,5(p=0,880)	12,3(p=0,564)
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES.	21,3(p=0,017)	9,7(p=0,363)	11,3(p=0,001)
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS.	21,5(p=0,510)	9,4(p=0,640)	10,9(p=0,212)
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN.	21,5(p=0,00003)	8,8(p=0,00018)	12,6(p=0,002)
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS).	23,8(p=0,856)	8,9(p=0,632)	18,0(p=0,161)
LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO.	44,3(p=0,001)	17,1(p=0,070)	27,4(p=0,005)
LIMA ESTE			
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MEREÍA.	37,4(p=0,00007)	18,5(p=0,001)	24,2(p=0,00027)
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO.	31,4(p=0,318)	11,1(p=0,838)	18,3(p=0,705)
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO(A) Y ANIMARLO(A).	25,8(p=0,061)	10,3(p=0,036)	15,9(p=0,062)
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES.	26,4(p=0,080)	10,5(p=0,029)	16,5(p=0,156)
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR.	28,5(p=0,586)	14,1(p=0,028)	16,0(p=0,0475)
ERAN MUY EXIGENTES CON RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES.	29,2(p=0,202)	12,2(p=0,567)	16,0(p=0,251)
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC.	27,4(p=0,992)	9,6(p=0,128)	16,4(p=0,559)
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES.	24,1(p=0,005)	9,5(p=0,022)	14,7(p=0,012)
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA.	32,4(p=0,038)	15,5(p=0,011)	16,0(p=0,596)
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR.	35,1(p=0,007)	14,5(p=0,075)	21,5(p=0,054)
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES.	33,8(p=0,036)	17,7(p=0,004)	20,0(p=0,286)
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS.	37,2(p=0,001)	20,1(p=0,00001)	24,0(p=0,005)
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS).	29,4(p=0,509)	9,0(p=0,233)	15,5(p=0,549)
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES.	27,2(p=0,848)	10,7(p=0,206)	16,7(p=0,598)
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS.	31,7(p=0,065)	15,9(p=0,010)	17,6(p=0,821)
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN.	27,2(p=0,542)	11,2(p=0,400)	16,9(p=0,540)
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS).	30,4(p=0,318)	13,3(p=0,399)	13,9(p=0,211)
LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO.	36,9(p=0,016)	19,7(p=0,001)	24,5(p=0,021)
LIMA SUR			
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MEREÍA.	47,4(p=<0,00001)	9,8(p=<0,00001)	32,3(p=0,00003)
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO.	34,1(p=0,083)	17,2(p=0,012)	22,4(p=0,369)
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO(A) Y ANIMARLO(A).	24,9(p=0,00005)	8,5(p=0,001)	17,6(p=0,001)
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES.	26,0(p=0,00031)	8,8(p=0,00023)	18,5(p=0,006)
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR.	30,6(p=0,307)	12,1(p=0,148)	22,3(p=0,263)
ERAN MUY EXIGENTES CON RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES.	27,9(p=0,751)	10,8(p=0,477)	19,3(p=0,619)
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC.	24,4(p=0,619)	8,7(p=0,155)	15,7(p=0,017)
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES.	23,1(p=0,00001)	8,7(p=0,011)	16,6(p=0,004)
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA.	31,6(p=0,237)	13,1(p=0,084)	19,8(p=0,992)
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR.	34,1(p=0,032)	13,3(p=0,098)	25,0(p=0,015)

PREVALENCIA DE VIDA DE ESTILOS DE CRIANZA	CUALQUIER TRASTORNO (PG: 26,1%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DE ANSIEDAD (PG: 10,5%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DEPRESIVOS (PG: 17,3%) % (P-VALOR)
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES.	41,6(p=0,002)	20,0(p=0,00039)	29,2(p=0,006)
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS.	51,9(p=<0,00001)	23,8(p=<0,00001)	36,8(p=<0,00001)
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS).	33,5(p=0,173)	15,7(p=0,022)	22,8(p=0,358)
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES.	26,2(p=0,070)	9,4(p=0,408)	18,6(p=0,144)
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS.	30,2(p=0,513)	12,3(p=0,233)	20,2(p=0,911)
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN.	26,1(p=<0,00001)	8,9(p=0,00003)	18,3(p=0,00022)
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS).	34,9(p=0,079)	16,5(p=0,010)	24,6(p=0,140)
LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO.	49,8(p=0,00001)	27,1(p=<0,00001)	33,4(p=0,003)
CALLAO			
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MEREÍA.	44,1(p=<0,00001)	17,5(p=0,00013)	27,0(p=0,002)
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO.	29,4(p=0,260)	18,2(p=0,065)	17,4(p=0,724)
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO(A) Y ANIMARLO(A).	19,2(p=0,001)	7,4(p=0,232)	13,2(p=0,005)
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES.	20,1(p=0,018)	7,7(p=0,163)	13,6(p=0,002)
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR.	17,6(p=0,232)	8,6(p=0,838)	12,1(p=0,258)
ERAN MUY EXIGENTES CON RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES.	23,2(p=0,573)	7,7(p=0,784)	16,7(p=0,563)
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC.	19,4(p=0,259)	7,2(p=0,440)	13,5(p=0,324)
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES.	17,0(p=0,003)	6,6(p=0,205)	13,2(p=0,063)
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA.	21,0(p=0,840)	9,2(p=0,721)	13,5(p=0,577)
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR.	26,5(p=0,160)	12,2(p=0,083)	17,9(p=0,373)
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES.	30,1(p=0,141)	19,3(p=0,010)	19,0(p=0,444)
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS.	39,4(p=0,006)	26,0(p=<0,00001)	25,6(p=0,085)
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS).	19,9(p=0,733)	10,2(p=0,530)	13,5(p=0,646)
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES.	20,1(p=0,154)	8,5(p=0,734)	14,0(p=0,119)
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS.	28,5(p=0,087)	15,9(p=0,003)	16,4(p=0,817)
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN.	20,6(p=0,071)	8,1(p=0,803)	14,2(p=0,032)
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS).	27,9(p=0,325)	13,2(p=0,172)	18,3(p=0,625)
LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO.	41,5(p=0,004)	15,3(p=0,170)	33,7(p=0,002)
TOTAL			
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MEREÍA.	41,2(p=<0,00001)	19,8(p=<0,00001)	26,7(p=<0,00001)
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO.	30,3(p=0,025)	14,5(p=0,006)	19,3(p=0,218)
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO(A) Y ANIMARLO(A).	23,1(p=<0,00001)	9,0(p=<0,00001)	15,1(p=<0,00001)
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES.	24,1(p=<0,00001)	9,4(p=<0,00001)	16,0(p=<0,00001)
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR.	26,0(p=0,955)	11,2(p=0,315)	16,2(p=0,299)
ERAN MUY EXIGENTES CON RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES.	26,5(p=0,640)	10,5(p=0,956)	17,1(p=0,861)
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC.	21,1(p=<0,00001)	8,2(p=0,00002)	13,5(p=<0,00001)
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES.	20,7(p=<0,00001)	8,1(p=<0,00001)	14,1(p=<0,00001)
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA.	30,7(p=0,002)	14,4(p=0,00011)	18,1(p=0,496)
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR.	32,5(p=<0,00001)	13,8(p=0,00040)	21,8(p=0,00002)
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES.	36,9(p=<0,00001)	19,6(p=<0,00001)	22,9(p=0,001)
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS.	43,4(p=<0,00001)	22,5(p=<0,00001)	28,9(p=<0,00001)
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS).	27,2(p=0,452)	11,7(p=0,317)	17,1(p=0,932)
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES.	24,6(p=0,004)	10,0(p=0,120)	16,0(p=0,003)
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS.	28,8(p=0,062)	13,2(p=0,004)	17,3(p=0,946)
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN.	24,5(p=<0,00001)	9,6(p=<0,00001)	16,2(p=<0,00001)
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS).	29,7(p=0,044)	13,0(p=0,054)	19,1(p=0,225)
LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO.	45,8(p=<0,00001)	22,1(p=<0,00001)	31,4(p=<0,00001)

La tabla 47D nos revela una asociación estadísticamente significativa entre todos los eventos de vida negativos incluidos en la encuesta, con el desarrollo ulterior de trastornos depresivos y ansiosos. Es de notar las altas prevalencias cuando se han recibido amenazas de muerte, de unos de los padres; así para el desarrollo de cualquier trastorno mental, esta relación se mostró hasta un 82,7% en Lima Centro, 63,5% en Lima Norte, 39,5% en Lima Este, 88,5% en Lima Sur y 48,3% en Callao. En el caso de no ser querido(a), tenemos que en Lima Centro fue 76,4%, en Lima Norte 62,1%, en Lima Este 39,7%, en Lima Sur 63,3% y en Callao 65,8%. Sobre amenaza de abandono, tenemos que en Lima Centro fue de 44,8%, en Lima Norte 51,9%, en Lima Este 33,4%, en Lima Sur 61,7% y en Callao 73,1%. El hacerle sentir culpable por desacuerdos o discusiones de la familia, encontramos que en Lima Centro fue de 51,0%, en Lima Norte 47,1%, Lima Este 42,8%, Lima Sur 67,0% y Callao 36,1%.

TABLA 47D
PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS MENTALES EN GENERAL SEGÚN EVENTOS DE VIDA NEGATIVOS EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

PREVALENCIA DE VIDA DE EVENTOS DE VIDA	CUALQUIER TRASTORNO (PG: 26,1%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DE ANSIEDAD (PG: 10,5%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DEPRESIVOS (PG: 17,3%) % (P-VALOR)
LIMA CENTRO			
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	45,4(p=<0,00001)	18,2(p=0,007)	36,4(p=<0,00001)
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	40,8(p=0,003)	15,3(p=0,123)	31,3(p=0,013)
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	38,5(p=0,006)	13,8(p=0,298)	29,5(p=0,028)
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	43,9(p=0,002)	19,4(p=0,004)	37,3(p=0,00048)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	76,4(p=0,00027)	47,5(p=0,00012)	41,3(p=0,073)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	82,7(p=0,007)	49,0(p=0,022)	55,3(p=0,096)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	51,0(p=0,058)	39,8(p=0,002)	30,1(p=0,372)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	44,8(p=0,265)	30,5(p=0,085)	6,8(p=0,088)
LIMA NORTE			
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	29,8(p=0,014)	15,3(p=0,003)	15,9(p=0,289)
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	27,6(p=0,164)	16,7(p=0,002)	14,8(p=0,638)
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	32,9(p=0,004)	13,9(p=0,116)	18,5(p=0,049)
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	34,7(p=0,002)	18,7(p=0,001)	17,1(p=0,190)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	62,1(p=<0,00001)	35,7(p=<0,00001)	31,9(p=0,008)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	63,5(p=0,006)	18,4(p=0,331)	37,3(p=0,031)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	47,1(p=0,001)	20,5(p=0,044)	28,1(p=0,014)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	51,9(p=0,001)	25,2(p=0,006)	28,7(p=0,020)
LIMA ESTE			
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	38,1(p=<0,00001)	16,7(p=0,00018)	23,2(p=0,001)
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	33,4(p=0,001)	12,6(p=0,310)	22,3(p=0,002)
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	35,8(p=0,00002)	15,6(p=0,002)	23,2(p=0,00009)
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	34,7(p=0,004)	14,3(p=0,093)	22,6(p=0,023)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	39,7(p=0,052)	28,0(p=0,001)	21,3(p=0,395)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	39,5(p=0,326)	34,2(p=0,005)	16,5(p=0,938)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	42,8(p=0,009)	27,6(p=0,00009)	24,7(p=0,139)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	33,4(p=0,283)	21,2(p=0,025)	20,2(p=0,511)
LIMA SUR			
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	39,2(p=<0,00001)	16,2(p=0,00005)	26,4(p=0,001)
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	34,7(p=0,006)	15,5(p=0,00029)	23,8(p=0,050)
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	39,0(p=<0,00001)	16,3(p=0,00001)	26,4(p=0,002)
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	35,8(p=0,010)	13,6(p=0,039)	23,2(p=0,174)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	63,3(p=0,00003)	38,8(p=<0,00001)	41,8(p=0,008)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	88,5(p=0,00035)	88,5(p=<0,00001)	52,8(p=0,098)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	67,0(p=<0,00001)	39,5(p=<0,00001)	42,4(p=0,00004)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	61,7(p=0,00046)	29,1(p=0,004)	41,8(p=0,020)

PREVALENCIA DE VIDA DE EVENTOS DE VIDA	CUALQUIER TRASTORNO (PG: 26,1%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DE ANSIEDAD (PG: 10,5%) % (P-VALOR)	TRASTORNOS DEPRESIVOS (PG: 17,3%) % (P-VALOR)
CALLAO			
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	36,5(p=0,00022)	12,2(p=0,107)	26,2(p=0,001)
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	35,4(p=0,00023)	11,7(p=0,106)	27,5(p=0,00018)
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	29,7(p=0,066)	10,7(p=0,376)	20,5(p=0,184)
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	32,5(p=0,017)	15,0(p=0,014)	23,5(p=0,035)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	65,8(p=0,00011)	29,7(p=0,009)	49,2(p=0,003)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	48,3(p=0,203)	7,2(p=0,904)	48,3(p=0,074)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	36,1(p=0,111)	18,8(p=0,069)	25,9(p=0,169)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	73,1(p=<0,00001)	37,5(p=0,001)	43,2(p=0,023)
TOTAL			
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	37,1(p=<0,00001)	16,0(p=<0,00001)	24,2(p=<0,00001)
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	33,3(p=<0,00001)	14,4(p=<0,00001)	22,4(p=<0,00001)
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	35,8(p=<0,00001)	14,7(p=<0,00001)	23,6(p=<0,00001)
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	36,1(p=<0,00001)	16,0(p=<0,00001)	23,6(p=<0,00001)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	57,8(p=<0,00001)	35,0(p=<0,00001)	33,5(p=0,00001)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	60,3(p=0,00003)	29,0(p=0,00027)	37,9(p=0,004)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	50,0(p=<0,00001)	28,6(p=<0,00001)	30,6(p=<0,00001)
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	49,4(p=<0,00001)	26,4(p=<0,00001)	27,9(p=0,003)

En la tabla 47E podemos ver los porcentajes de la población encuestada que refiere alguna experiencia negativa antes de los 18 años, específicamente en relación a amenazas a la integridad familiar y a experiencias de maltrato, observándose que es el género femenino el más afectado.

TABLA 47E
EXPERIENCIAS NEGATIVAS ANTES DE LOS 18 AÑOS EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

MIENTRAS CRECÍA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
SUS PADRES SE SEPARARON O DIVORCIARON							
TOTAL	18,9(15,4-23,1)	21,6(18,2-25,4)	21,4(19,0-24,0)	21,7(19,0-24,7)	19,2(15,2-23,9)	20,8(19,4-22,4)	$F=0,552$; $df1=3,768$; $df2=2614,766$; $p=0,687$
MASCULINO	18,8(13,7-25,3)	23,1(17,9-29,2)	19,9(16,7-23,5)	18,8(15,4-22,8)	20,0(14,6-26,7)	20,2(18,1-22,5)	
FEMENINO	19,0(14,7-24,2)	20,5(16,3-25,5)	22,9(19,6-26,4)	24,6(20,4-29,4)	18,3(13,3-24,5)	21,4(19,4-23,6)	
SUFRÍO ALGÚN TIPO DE ABUSO FÍSICO							
TOTAL	10,0(7,3-13,6)	13,1(10,6-16,1)	13,6(11,5-16,0)	9,9(7,9-12,2)	10,8(8,1-14,2)	11,8(10,6-13,0)	$F=1,839$; $df1=3,759$; $df2=2608,621$; $p=0,123$
MASCULINO	9,8(5,9-16,0)	12,1(8,4-17,1)	11,3(8,7-14,6)	8,2(5,7-11,5)	9,7(7,0-13,3)	10,3(8,8-12,2)	
FEMENINO	10,2(6,9-14,8)	13,8(10,6-17,9)	15,9(13,1-19,1)	11,6(9,0-14,9)	12,0(7,9-17,8)	13,1(11,5-14,8)	
SUFRÍO ALGÚN TIPO DE ABUSO SEXUAL							
TOTAL	3,0(1,9-4,7)	5,2(3,7-7,3)	5,4(4,3-6,8)	6,0(4,6-7,9)	3,4(2,1-5,6)	4,9(4,2-5,6)	$F=2,402$; $df1=3,829$; $df2=2657,608$; $p=0,051$
MASCULINO	0,9(0,2-3,8)	1,4(0,4-4,6)	0,6(0,2-1,5)	1,5(0,4-4,6)	1,7(0,5-5,2)	1,1(0,6-2,0)	
FEMENINO	5,0(3,1-7,8)	8,1(5,8-11,1)	10,2(8,1-12,6)	10,7(8,1-14,0)	5,4(3,0-9,4)	8,3(7,2-9,6)	
SU FAMILIA VIVIÓ EN PERMANENTE RIESGO O AMENAZA DE INTEGRIDAD FÍSICA DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS							
TOTAL	1,5(0,7-3,1)	3,1(2,0-4,7)	2,2(1,5-3,2)	2,3(1,5-3,6)	1,4(0,7-3,0)	2,3(1,8-2,8)	$F=1,493$; $df1=3,811$; $df2=2645,114$; $p=0,204$
MASCULINO	0,4(0,1-2,5)	3,9(2,0-7,4)	1,4(0,7-2,8)	2,5(1,2-5,1)	1,9(0,7-4,9)	2,1(1,4-3,1)	
FEMENINO	2,5(1,2-5,0)	2,6(1,5-4,2)	3,0(1,9-4,6)	2,1(1,3-3,5)	0,8(0,3-2,7)	2,4(1,8-3,1)	
SUFRÍO DE INSULTOS, AGRESIONES VERBALES U OFENSAS							
TOTAL	11,2(8,5-14,6)	14,4(11,6-17,8)	15,3(13,1-17,8)	10,5(8,5-12,8)	12,7(9,7-16,4)	13,1(11,9-14,4)	$F=2,381$; $df1=3,771$; $df2=2617,244$; $p=0,053$
MASCULINO	7,9(5,1-12,0)	12,2(8,4-17,4)	13,8(11,0-17,2)	6,5(4,3-9,9)	10,1(6,6-15,2)	10,4(8,8-12,1)	
FEMENINO	14,3(10,5-19,3)	16,1(12,4-20,6)	16,8(13,8-20,3)	14,5(11,7-17,7)	15,5(10,7-21,9)	15,6(13,9-17,5)	

MIENTRAS CRECÍA	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
SUFRIÓ DE CHANTAJES, MANIPULACIONES O HUMILLACIONES							
TOTAL	5,4(3,7-7,8)	6,8(5,0-9,1)	5,9(4,7-7,5)	4,9(3,5-6,7)	6,9(4,8-9,8)	5,9(5,2-6,8)	$F=0,799$; $df1=3,852$; $df2=2673,122$; $p=0,521$
MASCULINO	4,6(2,5-8,1)	5,1(2,9-8,7)	3,7(2,2-6,1)	3,2(1,7-6,1)	4,3(2,5-7,3)	4,1(3,2-5,4)	
FEMENINO	6,2(4,0-9,6)	8,0(5,7-11,2)	8,1(6,2-10,5)	6,6(4,7-9,1)	9,8(5,9-15,8)	7,6(6,5-9,0)	
SUFRIÓ DE SITUACIONES DE ABANDONO							
TOTAL	7,4(5,2-10,3)	11,6(9,3-14,3)	9,5(7,6-11,8)	7,8(5,9-10,3)	8,2(5,9-11,4)	9,2(8,2-10,4)	$F=2,233$; $df1=3,919$; $df2=2719,715$; $p=0,065$
MASCULINO	5,7(3,3-9,8)	10,4(7,3-14,7)	9,4(6,7-13,2)	5,3(3,2-8,6)	8,2(5,2-12,5)	8,0(6,6-9,6)	
FEMENINO	8,9(5,7-13,5)	12,4(9,5-16,1)	9,6(7,6-12,0)	10,5(7,6-14,2)	8,3(5,1-13,3)	10,4(9,0-12,0)	

ACCESO A SERVICIOS

El acceso a servicios de salud mental muestra particularidades distintas de las que presenta el acceso a servicios de salud física, debido entre otras cosas a los prejuicios existentes en torno a padecer problemas psiquiátricos; sin embargo, los factores que intervienen son similares, expresados en combinaciones diferentes. En este informe nos vamos a limitar a la presentación de los resultados desde el punto de vista de la morbilidad sentida, es decir, de aquellas personas que han percibido en sí mismas problemas de tipo emocional o de los “nervios”, y que son las que se encuentran ante la decisión de buscar o no servicios. Muchas de estas personas no necesariamente tendrán trastornos diagnosticables. Consideramos que en un primer momento, en términos de satisfacer la morbilidad, es el grupo con el cual los programas sociales pueden empezar a trabajar más rápidamente; de ahí la importancia de su consideración en particular.

Ante la pregunta sobre si alguna vez en su vida ha padecido algún problema de tipo emocional o de los “nervios” (morbilidad sentida), tenemos según áreas poblacionales de Lima Metropolitana que un 32,2% en Lima Centro, 28,8% en Lima Norte, 32,1% en Lima Este, 22,5% en Lima Sur, 27,9% en Callao y un 28,8% en total respondió afirmativamente; este porcentaje es relativamente menor al reportado en el 2002, cuando alcanzaba el 33,8% del total. Además, el 10,2% en Lima Centro, 10,5% en Lima Norte, 13,5% en Lima Este, 12,7% en Lima Sur, 11,4% en Callao y el 11,7% en total identificó su problema en los últimos 12 meses. Considerando este último período de referencia, se encontró que solo el 51,8% en Lima Centro, 29,6% en Lima Norte, 23,5% en Lima Este, 23,9% en Lima Sur, 39,7% en Callao y el 31,0% en total acudió en busca de algún tipo de ayuda para resolver la morbilidad sentida expresada (Tabla 48). En el año 2002 se encontró que un 24,3% en total acudió en busca de ayuda, sin embargo, este valor fue medido en las personas que identificaron su problema en los últimos 6 meses, a diferencia del 2012, cuyo valor se calculó en base a las personas que identificaron su problema en el último año. Sigue siendo las instituciones del MINSA, a las cuales acuden en mayor porcentaje para recibir ayuda, mostrándose que un 20,7% en Lima Centro, 40,0% en Lima Norte, 42,7% en Lima Este, 40,4% en Lima Sur, 38,2% en Callao y un 35,6 en total solicitan atención en dichos establecimientos. Es importante mencionar que en el Estudio Epidemiológico Metropolitano del 2002, la consulta privada atendió al 15,1% de la población; mientras que en el estudio actual esa cifra se ha duplicado. Además, la atención en los hospitales de la Solidaridad aparecen en el escenario de salud mental, a diferencia de años anteriores (Tabla 49).

De los atendidos, es la consejería con un 75,9% en Lima Centro, 74,7% en Lima Norte, 72,3% en Lima Este, 70,1% en Lima Sur, 71,4% en Callao y un 73,2% en total, la actividad más realizada. Sobre si recibió medicamentos, el 59,5% en Lima Centro, 51,7% en Lima Norte, 55,8% en Lima Este, 67,9% en Lima Sur, 56,7% en Callao y el 58,0% en total así le indicaron. Mientras que un 18,1% en Lima Centro, 39,3% en Lima Norte, 29,9% en Lima Este, 32,9% en Lima Sur, 44,9% en Callao y un 31,6% en total recibió psicoterapia. Solo un 7,2% en Lima Centro, 3,4% en Lima Norte, 10,2% en Lima Este, 3,0% en Lima Sur, 4,4% en Callao y un 5,9% en total estuvo en hospitalización, situación que indirectamente nos indica la gravedad del problema (Tabla 50).

TABLA 48
MORBILIDAD MENTAL SENTIDA Y EXPRESADA EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

MORBILIDAD	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
MORBILIDAD MENTAL SENTIDA ALGUNA VEZ EN LA VIDA (COMO PROBLEMAS EMOCIONALES O DE LOS NERVIOS)							
TOTAL	32,2(27,3-37,5)	28,8(25,1-32,8)	32,1(29,0-35,2)	22,5(19,6-25,7)	27,9(23,3-33,0)	28,8(27,1-30,6)	$F=4,036; df1=3,786;$ $df2=2627,147; p=0,003$
MASCULINO	23,4(17,3-30,8)	19,7(15,2-25,0)	25,3(21,2-29,9)	15,2(11,5-19,8)	26,8(20,0-34,9)	21,6(19,3-24,1)	
FEMENINO	40,5(33,9-47,5)	35,6(30,5-41,0)	38,7(34,7-42,9)	30,0(26,2-34,1)	29,1(23,5-35,5)	35,4(33,1-37,9)	
MORBILIDAD MENTAL SENTIDA A DOCE MESES							
TOTAL	10,2(7,5-13,7)	10,5(8,1-13,6)	13,5(11,5-15,8)	12,7(10,4-15,5)	11,4(8,7-14,8)	11,7(10,6-13,0)	$F=1,192; df1=3,718;$ $df2=2580,190; p=0,312$
MASCULINO	7,3(3,9-13,1)	6,3(3,8-10,2)	10,3(7,8-13,6)	7,1(4,7-10,6)	9,4(5,9-14,8)	8,0(6,6-9,7)	
FEMENINO	12,9(9,1-17,9)	13,7(10,4-17,8)	16,7(13,8-20,0)	18,4(15,2-22,2)	13,6(10,1-18,0)	15,2(13,6-17,0)	
MORBILIDAD MENTAL SENTIDA Y EXPRESADA EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (% DE LA DEMANDA SENTIDA)							
TOTAL	51,8(35,6-67,6)	29,6(19,9-41,6)	23,5(17,4-31,0)	23,9(16,6-33,1)	39,7(26,0-55,4)	31,0(26,3-36,1)	$F=4,015; df1=3,750;$ $df2=2602,264; p=0,004$
MASCULINO	52,8(23,2-80,6)	31,4(12,5-59,5)	14,7(7,3-27,5)	35,8(19,5-56,1)	29,7(12,7-55,1)	30,0(21,5-40,1)	
FEMENINO	51,2(33,2-68,8)	29,0(17,9-43,2)	28,9(20,9-38,4)	19,3(12,7-28,2)	47,6(31,2-64,5)	31,4(26,0-37,5)	

TABLA 49
LUGARES DE ATENCIÓN DE LA MORBILIDAD MENTAL SENTIDA Y EXPRESADA EN LA POBLACIÓN
ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

LUGAR DE ATENCIÓN	LIMA CENTRO		LIMA NORTE		LIMA ESTE	
	PARCIALES (95% IC)	TOTALES %	PARCIALES (95% IC)	TOTALES %	PARCIALES (95% IC)	TOTALES %
● MINSA						
- PUESTO O CENTRO DE SALUD	1,1 (0,2-7,2)		4,9 (1,5-14,7)		3,2 (1,0-9,4)	
- HOSPITAL GENERAL	3,8 (1,1-12,1)	(20,7% DE LO ATENDIDO)	7,0 (3,1-15,0)	(40,0% DE LO ATENDIDO)	4,9 (2,3-10,0)	(42,7% DE LO ATENDIDO)
- INSTITUTO U HOSPITAL ESPECIALIZADO	1,9 (0,3-12,9)		-		2,0 (0,7-5,5)	
- INSTITUTO NACIONAL MINSA	3,8 (0,5-22,7)		-		-	
● ESSALUD						
- POSTA O POLICLÍNICO	2,5 (0,5-11,0)		3,7 (1,2-10,4)		4,8 (2,4-9,4)	
- HOSPITAL GENERAL	2,2 (0,5-8,9)	(9,1% DE LO ATENDIDO)	-	(15,7% DE LO ATENDIDO)	1,7 (0,6-4,6)	(33,8% DE LO ATENDIDO)
- CONSULTORIO PAAD	-		1,0 (0,1-6,8)		-	
- CENTRO DE SALUD MENTAL DE ESSALUD	-		-		1,4 (0,3-6,3)	
● PRIVADA						
- CLÍNICA PARTICULAR	22,7 (11,0-41,0)		1,9 (0,5-7,4)		1,3 (0,3-5,5)	
- CONSULTORIO PARTICULAR	1,3 (0,2-9,2)	(46,5% DE LO ATENDIDO)	7,4 (2,5-20,3)	(31,6% DE LO ATENDIDO)	1,9 (0,7-5,1)	(19,8% DE LO ATENDIDO)
- CONSULTORIO DE INSTITUCIÓN ACADÉMICA	-		-		0,5 (0,1-3,7)	
- CONSULTORIO DE CENTRO PARROQUIAL	-		-		1,0 (0,3-3,0)	
● SOLIDARIDAD						
- HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD	5,4 (1,7-15,9)	(10,5% DE LO ATENDIDO)	1,8 (0,4-7,1)	(6,1% DE LO ATENDIDO)	0,7 (0,2-3,2)	(3,1% DE LO ATENDIDO)
● OTROS						
- OTROS	6,9 (1,0-35,4)	(13,3% DE LO ATENDIDO)	2,0 (0,4-8,9)	(6,6% DE LO ATENDIDO)	0,1 (0,0-1,0)	(0,6% DE LO ATENDIDO)

CONTINUA...

LUGAR DE ATENCIÓN	LIMA SUR		CALLAO		LIMA TOTAL	
	PARCIALES (95% IC)	TOTALES %	PARCIALES (95% IC)	TOTALES %	PARCIALES (95% IC)	TOTALES %
• MINSA						
- PUESTO O CENTRO DE SALUD	3,4 (1,3-8,9)		8,9 (3,9-19,2)		3,9 (2,4-6,5)	
- HOSPITAL GENERAL	6,2 (3,0-12,6)	(40,4% DE LO ATENDIDO)	6,3 (2,0-17,8)	(38,2% DE LO ATENDIDO)	5,7 (3,8-8,3)	(35,6% DE LO ATENDIDO)
- INSTITUTO U HOSPITAL ESPECIALIZADO	-		-		0,9 (0,3-2,2)	
- INSTITUTO NACIONAL MINSA	-		-		0,6 (0,1-3,9)	
• ESSALUD						
- POSTA O POLICLÍNICO	2,4 (0,9-5,9)		5,6 (2,3-13,2)		3,7 (2,4-5,7)	
- HOSPITAL GENERAL	2,4 (0,6-9,4)	(20,0% DE LO ATENDIDO)	8,7(3,1-22,1)	(45,1% DE LO ATENDIDO)	2,3 (1,2-4,1)	(22,6% DE LO ATENDIDO)
- CONSULTORIO PAAD	-		-		0,2 (0,0-1,7)	
- CENTRO DE SALUD MENTAL	-		3,6 (0,9-13,2)		0,8 (0,3-2,2)	
• PRIVADA						
- CLÍNICA PARTICULAR	2,9 (0,9-8,7)		1,3 (0,2-8,4)		5,0 (2,9-8,5)	
- CONSULTORIO PARTICULAR	4,3 (1,8-9,9)	(31,3% DE LO ATENDIDO)	-	(12,6% DE LO ATENDIDO)	3,5 (1,8-6,6)	(30,2% DE LO ATENDIDO)
- CONSULTORIO DE INSTITUCIÓN ACADÉMICA	-		3,7 (0,9-14,1)		0,5 (0,2-1,7)	
- CONSULTORIO DE CENTRO PARROQUIAL	0,3 (0,0-1,8)		-		0,3 (0,1-0,9)	
• SOLIDARIDAD						
- HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD	0,6 (0,1-4,0)	(2,4% DE LO ATENDIDO)	1,6 (0,2-11,0)	(4,1% DE LO ATENDIDO)	1,7 (0,9-3,5)	(5,6% DE LO ATENDIDO)
• FFAA						
- HOSPITAL DE LAS FFAA Y POLICÍA NACIONAL	1,4 (0,2-9,4)	(5,9% DE LO ATENDIDO)	-	-	0,3 (0,0-2,2)	(1,0% DE LO ATENDIDO)
• OTROS						
- OTROS	-	-	-	-	1,5 (0,4-6,0)	(4,9% DE LO ATENDIDO)

TABLA 50
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD MENTAL SENTIDA Y EXPRESADA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD MENTAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
RECIBIÓ MEDICAMENTOS							
TOTAL	59,5(35,4-79,8)	51,7(28,7-73,9)	55,8(40,3-70,3)	67,9(49,2-82,2)	56,7(34,5-76,4)	58,0(48,0-67,4)	F= 0,306; df1=3,496; df2=2425,884; p=0,850
MASCULINO	48,1(14,2-83,9)	41,5(9,8-82,3)	62,2(28,0-87,5)	77,9(38,7-95,2)	68,9(33,7-90,6)	58,8(38,6-76,5)	
FEMENINO	65,7(39,9-84,6)	55,4(28,8-79,2)	53,9(37,1-69,8)	60,6(38,5-79,1)	50,7(26,8-74,2)	57,6(46,3-68,1)	
PSICOTERAPIA							
TOTAL	18,1(7,8-36,7)	39,3(19,8-62,9)	29,9(17,9-45,6)	32,9(17,6-53,1)	44,9(27,1-64,1)	31,6(23,6-40,9)	F= 1,252; df1=3,649; df2=2532,475; p=0,288
MASCULINO	22,3(5,6-58,0)	62,2(22,3-90,5)	9,6(1,2-47,4)	48,3(18,4-79,4)	47,4(18,7-77,9)	37,3(21,6-56,1)	
FEMENINO	15,9(5,2-39,5)	31,0(12,5-58,4)	36,2(21,9-53,5)	22,2(8,3-47,3)	43,7(21,2-69,1)	29,0(20,2-39,8)	
CONSEJO							
TOTAL	75,9(54,5-89,3)	74,7(51,8-89,0)	72,3(55,9-84,3)	70,1(50,4-84,3)	71,4(48,0-87,1)	73,2(64,4-80,5)	F= 0,071; df1=3,782; df2=2624,564; p=0,989
MASCULINO	92,6(58,5-99,1)	81,1(44,1-95,9)	80,5(44,1-95,6)	73,9(39,1-92,6)	74,3(47,3-90,3)	81,6(67,8-90,4)	
FEMENINO	66,3(38,4-86,2)	72,3(44,4-89,5)	69,8(51,1-83,6)	67,1(42,2-85,1)	70,0(41,6-88,4)	69,3(58,1-78,5)	
HOSPITALIZACIÓN							
TOTAL	7,2(2,1-22,3)	3,4(0,5-20,0)	10,2(3,9-24,0)	3,0(0,7-12,3)	4,4(0,6-25,9)	5,9(3,1-10,7)	F= 0,596; df1=3,719; df2=2581,056; p=0,653
MASCULINO	17,3(3,6-54,2)	-	9,0(1,2-45,4)	4,6(0,6-28,1)	12,8(1,6-56,3)	9,1(3,5-21,5)	
FEMENINO	1,7(0,3-10,7)	4,6(0,7-25,5)	10,5(3,5-27,4)	1,7(0,2-11,7)	-	4,4(1,9-9,8)	
OTROS							
TOTAL	1,2(0,2-8,4)	5,1(0,7-28,9)	2,1(0,3-13,9)	-	-	1,9(0,5-6,9)	F= 0,728; df1=3,206; df2=2224,920; p=0,544
MASCULINO	-	18,9(2,4-69,3)	9,0(1,2-45,4)	-	-	5,1(1,1-20,4)	
FEMENINO	1,8(0,2-12,8)	-	-	-	-	0,4(0,1-3,1)	

Con relación a los motivos principales por los cuales la persona no buscó atención alguna para su problema emocional, tenemos que el 34,8% en Lima Centro, 58,2% en Lima Norte, 48,8% en Lima Este, 57,3% en Lima Sur, 33,6% en Callao y el 50,4% en total pensaba que lo debía superar solo(a). Otras razones fueron por falta de tiempo, porque no era serio, grave o muy importante, por falta de confianza y porque no tenía dinero. También tenemos que el 17,8% en Lima Centro, 32,4% en Lima Norte, 28,1% en Lima Este, 19,9% en Lima Sur, 33,1% en Callao y el 26,5% en total declaró que no sabía dónde ir. Es evidente que los factores culturales juegan un rol muy especial, así como los educativos y los económicos. Finalmente, un porcentaje bajo, indicó que la no búsqueda de atención médica, se debió por la experiencia previa de mala atención. (Tabla 51).

TABLA 51
MOTIVOS PRINCIPALES DE NO BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA EN LA POBLACIÓN ADULTA QUE PERCIBIÓ PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

MOTIVOS DE NO CONSULTA A CENTRO ASISTENCIAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
NO SABÍA A DÓNDE IR							
TOTAL	17,8(6,6-40,1)	32,4(22,3-44,6)	28,1(20,0-38,1)	19,9(12,4-30,4)	33,1(14,9-58,4)	26,5(21,5-32,3)	$F=0,960$; $df1=3,824$; $df2=2654,106$; $p=0,426$
MASCULINO	4,2(0,5-28,4)	24,3(8,6-52,2)	27,0(14,4-44,9)	10,5(2,5-34,7)	42,8(13,3-78,4)	23,4(14,4-35,7)	
FEMENINO	24,9(9,1-52,4)	35,1(23,9-48,3)	29,0(20,1-39,8)	22,9(13,4-36,2)	23,0(9,3-46,4)	28,1(22,5-34,6)	
NO TENÍA DINERO							
TOTAL	17,7(6,4-40,2)	35,6(24,4-48,7)	36,0(27,1-45,9)	24,3(16,8-33,8)	26,1(14,5-42,4)	30,2(25,2-35,7)	$F=1,487$; $df1=3,706$; $df2=2571,646$; $p=0,207$
MASCULINO	-	27,6(10,2-56,0)	26,5(13,3-45,7)	7,5(2,2-22,7)	23,6(8,0-52,2)	20,1(12,4-30,7)	
FEMENINO	26,8(10,3-54,0)	38,3(24,9-53,7)	42,9(32,1-54,4)	29,5(19,7-41,7)	28,8(13,1-52,0)	35,2(28,9-42,1)	
TENÍA DINERO, PERO PREFERÍA GASTARLO EN OTRA COSA							
TOTAL	5,6(0,8-31,2)	10,6(5,7-18,9)	6,2(2,7-14,0)	16,0(8,6-27,7)	2,9(0,7-11,9)	9,3(6,3-13,6)	$F=1,601$; $df1=3,402$; $df2=2360,776$; $p=0,181$
MASCULINO	-	9,7(2,7-29,2)	6,6(2,1-19,1)	24,1(9,8-48,2)	3,8(0,5-22,5)	9,2(4,9-16,6)	
FEMENINO	8,5(1,2-41,7)	10,8(5,1-21,4)	5,9(1,6-19,6)	13,4(6,9-24,6)	2,0(0,3-13,7)	9,4(6,0-14,6)	
NO CUBRÍA EL SEGURO MÉDICO							
TOTAL	1,4(0,2-9,9)	7,7(3,5-16,1)	6,2(3,4-11,1)	8,9(4,3-17,5)	3,8(0,9-14,5)	6,5(4,4-9,6)	$F=1,494$; $df1=6,851$; $df2=4754,623$; $p=0,166$
MASCULINO	4,2(0,5-28,4)	4,9(0,7-25,7)	5,6(2,1-13,9)	6,3(1,5-22,8)	7,5(1,8-26,9)	5,7(3,0-10,4)	
FEMENINO	-	8,7(4,0-17,7)	6,6(2,9-14,3)	9,7(3,9-21,9)	-	6,9(4,2-11,1)	
LARGAS LISTAS DE ESPERA							
TOTAL	4,7(1,0-19,9)	21,1(11,2-36,0)	7,6(4,3-13,1)	6,1(2,7-13,2)	8,4(3,4-19,6)	10,3(7,0-14,9)	$F=2,569$; $df1=6,747$; $df2=4682,146$; $p=0,013$
MASCULINO	10,1(1,2-51,3)	17,8(2,7-63,0)	8,9(3,6-20,4)	3,4(0,4-21,3)	8,0(1,9-28,4)	9,5(4,3-19,6)	
FEMENINO	1,9(0,3-12,9)	22,1(11,9-37,5)	6,7(3,1-13,9)	7,0(2,9-15,9)	8,9(2,8-25,0)	10,7(7,0-15,9)	
NO EXISTÍA SERVICIO DE SALUD MENTAL CERCANO							
TOTAL	-	16,5(8,8-28,9)	5,0(2,3-10,5)	5,6(2,2-13,4)	7,2(2,5-18,9)	7,6(5,0-11,5)	$F=3,200$; $df1=3,643$; $df2=2528,129$; $p=0,015$
MASCULINO	-	21,5(4,4-61,9)	6,8(2,1-19,5)	5,6(1,3-21,6)	4,0(0,5-25,3)	8,1(3,3-18,4)	
FEMENINO	-	14,9(7,8-26,5)	3,7(1,2-10,7)	5,6(1,9-15,8)	10,4(3,0-30,1)	7,4(4,6-11,6)	
FALTA DE CONFIANZA							
TOTAL	18,2(9,4-32,3)	34,1(23,8-46,0)	34,6(25,6-44,8)	31,8(23,0-42,0)	15,9(7,9-29,3)	30,3(25,4-35,7)	$F=1,924$; $df1=3,840$; $df2=2664,830$; $p=0,107$
MASCULINO	27,6(11,7-52,3)	31,2(11,0-62,4)	31,9(17,8-50,3)	23,0(10,9-42,2)	13,7(4,5-35,0)	27,2(18,6-37,8)	
FEMENINO	13,3(4,7-32,3)	35,0(23,5-48,6)	36,5(26,6-47,7)	34,5(24,1-46,7)	18,2(8,1-35,7)	31,9(26,2-38,2)	
DUDA DE MANEJO POR MÉDICOS							
TOTAL	10,2(3,1-28,8)	23,1(14,7-34,4)	11,7(5,8-22,2)	17,6(11,0-27,1)	9,9(4,0-22,6)	15,6(11,8-20,4)	$F=1,413$; $df1=3,729$; $df2=2588,096$; $p=0,230$
MASCULINO	10,1(1,2-51,3)	14,2(4,4-37,2)	14,6(4,5-38,0)	19,3(6,6-44,6)	11,9(3,3-34,8)	14,5(7,9-24,9)	
FEMENINO	10,3(2,5-34,5)	26,0(15,4-40,4)	9,6(4,5-19,1)	17,1(9,3-29,2)	7,9(2,2-25,0)	16,2(11,7-22,0)	
PENSABA QUE NO LE AYUDARÍA							
TOTAL	9,8(3,4-24,8)	21,8(13,6-33,0)	14,9(9,0-23,6)	18,4(11,9-27,4)	13,0(5,9-26,2)	16,7(13,1-21,2)	$F=0,907$; $df1=3,885$; $df2=2695,983$; $p=0,457$
MASCULINO	17,7(3,4-56,9)	19,0(7,5-40,7)	14,3(5,2-33,9)	15,1(4,5-40,3)	11,3(3,1-33,8)	15,3(9,0-24,6)	
FEMENINO	5,7(1,4-20,7)	22,7(13,0-36,6)	15,3(9,2-24,5)	19,4(11,5-31,0)	14,8(5,9-32,2)	17,5(13,1-22,9)	

MOTIVOS DE NO CONSULTA A CENTRO ASISTENCIAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
CREÍA QUE LO DEBÍA SUPERAR SOLO(A)							
TOTAL	34,8(19,2-54,5)	58,2(46,0-69,5)	48,8(38,5-59,3)	57,3(46,0-67,9)	33,6(17,9-54,0)	50,4(44,3-56,5)	$F=2,128$; $df1=3,987$; $df2=2767,189$; $p=0,075$
MASCULINO	38,9(9,7-79,0)	72,4(44,6-89,5)	50,1(34,0-66,2)	61,6(41,2-78,6)	21,2(6,2-52,4)	50,9(39,2-62,5)	
FEMENINO	32,6(16,6-54,2)	53,6(41,1-65,6)	47,9(36,6-59,5)	56,0(42,9-68,2)	46,7(26,9-67,6)	50,1(43,6-56,6)	
PREFERENCIA POR REMEDIOS CASEROS							
TOTAL	-	19,2(10,8-31,7)	5,9(2,9-11,5)	3,6(1,3-9,4)	9,3(3,8-21,2)	8,3(5,6-12,1)	$F=2,705$; $df1=6,741$; $df2=4677,988$; $p=0,009$
MASCULINO	-	13,9(4,5-35,7)	5,0(1,2-18,3)	6,0(0,8-33,2)	1,3(0,2-9,4)	5,8(2,6-12,1)	
FEMENINO	-	20,9(10,9-36,3)	6,5(3,0-13,4)	2,9(1,0-7,9)	17,7(7,6-36,0)	9,5(6,1-14,6)	
POR VERGÜENZA							
TOTAL	6,6(1,5-25,1)	17,1(10,0-27,7)	12,4(7,2-20,5)	20,2(11,9-32,0)	4,5(1,3-14,5)	14,2(10,6-18,7)	$F=1,424$; $df1=6,663$; $df2=4624,394$; $p=0,194$
MASCULINO	-	3,7(0,5-23,3)	9,6(3,7-22,8)	9,4(2,1-33,0)	1,3(0,2-9,4)	6,3(3,1-12,7)	
FEMENINO	10,0(2,3-34,7)	21,5(12,2-35,1)	14,5(8,4-23,9)	23,5(14,1-36,5)	7,9(2,2-25,0)	18,1(13,4-23,9)	
SU ESPOSO(A) O PAREJA LA(O) CRITICARÍA O NO LE GUSTARÍA							
TOTAL	-	7,0(3,4-14,1)	2,5(0,7-8,5)	5,3(2,0-13,4)	1,9(0,3-12,5)	4,0(2,4-6,7)	$F=0,730$; $df1=7,396$; $df2=5133,088$; $p=0,654$
MASCULINO	-	4,9(0,7-26,8)	2,1(0,3-13,9)	3,4(0,4-21,3)	3,8(0,5-22,5)	2,9(1,0-7,5)	
FEMENINO	-	7,7(3,3-17,1)	2,8(0,5-12,9)	6,0(1,8-17,7)	-	4,6(2,4-8,5)	
SU ESPOSO(A) O PAREJA SE BURLARÍA DE USTED							
TOTAL	-	2,2(0,6-8,1)	1,2(0,3-4,8)	3,4(1,2-9,3)	1,9(0,3-12,5)	1,9(1,0-3,7)	$F=0,424$; $df1=7,193$; $df2=4992,217$; $p=0,892$
MASCULINO	-	4,9(0,7-26,8)	1,2(0,2-8,2)	3,4(0,4-21,3)	3,8(0,5-22,5)	2,5(0,9-6,6)	
FEMENINO	-	1,3(0,2-8,8)	1,2(0,2-8,2)	3,4(1,0-10,9)	-	1,6(0,7-4,0)	
SU ESPOSO(A) O PAREJA NO LE AYUDARÍA ECONÓMICAMENTE PARA LA CONSULTA							
TOTAL	-	-	2,4(0,7-8,0)	4,2(1,2-13,3)	6,5(2,1-18,0)	2,4(1,1-4,9)	$F=0,793$; $df1=7,211$; $df2=5004,111$; $p=0,596$
MASCULINO	-	-	2,1(0,3-13,9)	-	3,8(0,5-22,5)	1,4(0,3-5,6)	
FEMENINO	-	-	2,6(0,5-11,9)	5,5(1,5-17,9)	9,3(2,6-27,8)	2,9(1,2-6,6)	
SU ESPOSO(A) O PAREJA LO PROHIBIRÍA							
TOTAL	-	1,0(0,1-6,4)	1,3(0,3-5,6)	1,9(0,4-7,5)	-	1,1(0,4-2,7)	$F=0,277$; $df1=7,229$; $df2=5017,126$; $p=0,966$
MASCULINO	-	-	2,1(0,3-13,9)	-	-	0,8(0,1-5,8)	
FEMENINO	-	1,3(0,2-8,8)	0,6(0,1-4,3)	2,5(0,6-9,7)	-	1,2(0,4-3,4)	
SUS VECINOS HABLARÍAN MAL DE USTED SI SE ENTERARAN							
TOTAL	2,2(0,3-14,5)	8,6(4,2-16,6)	5,7(2,8-11,5)	9,8(4,8-19,1)	11,3(5,1-23,2)	7,6(5,2-10,8)	$F=0,501$; $df1=6,539$; $df2=4538,411$; $p=0,823$
MASCULINO	-	9,9(2,5-32,2)	7,1(2,4-19,0)	2,3(0,3-15,2)	5,1(1,1-21,0)	5,7(2,8-11,4)	
FEMENINO	3,3(0,4-20,8)	8,2(3,6-17,5)	4,7(1,7-12,3)	12,2(5,6-24,8)	17,7(7,6-36,0)	8,5(5,5-13,0)	
POR TEMOR A QUE LO(A) VIERAN COMO ENFERMO(A) MENTAL							
TOTAL	-	14,2(7,6-24,9)	8,5(4,8-14,6)	4,4(1,9-9,7)	9,3(3,8-21,2)	8,1(5,6-11,4)	$F=2,385$; $df1=3,601$; $df2=2498,772$; $p=0,056$
MASCULINO	-	14,7(3,3-46,4)	12,0(5,3-24,9)	2,3(0,3-15,2)	1,3(0,2-9,4)	8,0(3,9-15,5)	
FEMENINO	-	14,0(7,0-26,0)	6,0(2,7-12,7)	5,0(2,0-11,9)	17,7(7,6-36,0)	8,1(5,3-12,2)	
EXPERIENCIA DE MALA ATENCIÓN ANTERIOR							
TOTAL	-	11,3(5,2-22,7)	3,7(1,8-7,7)	9,6(4,7-18,3)	3,4(0,8-13,7)	6,6(4,3-10,1)	$F=1,150$; $df1=6,868$; $df2=4766,314$; $p=0,329$
MASCULINO	-	-	1,4(0,2-8,5)	3,4(0,4-21,3)	4,0(0,5-25,3)	1,7(0,6-5,2)	
FEMENINO	-	15,0(7,0-29,3)	5,4(2,3-12,0)	11,5(5,5-22,4)	2,8(0,4-18,1)	9,1(5,7-14,0)	
POR FALTA DE TIEMPO							
TOTAL	23,8(11,2-43,5)	35,6(24,1-49,1)	36,0(26,9-46,3)	33,3(24,8-43,2)	26,6(14,4-43,9)	33,1(27,9-38,8)	$F=0,566$; $df1=3,871$; $df2=2686,362$; $p=0,682$
MASCULINO	16,8(3,7-51,3)	32,6(11,2-64,9)	36,1(22,7-52,1)	17,7(6,9-38,5)	15,4(4,6-41,0)	27,3(18,6-38,0)	
FEMENINO	27,4(12,1-51,0)	36,6(24,1-51,2)	36,0(25,4-48,2)	38,2(27,2-50,6)	38,3(20,9-59,4)	36,1(29,9-42,8)	
NO HAY CENTRO DE SALUD CERCANO							
TOTAL	-	6,6(2,7-15,1)	3,8(1,7-8,3)	3,6(1,0-12,4)	8,2(3,2-19,7)	4,4(2,7-7,2)	$F=0,956$; $df1=3,664$; $df2=2542,943$; $p=0,425$
MASCULINO	-	-	4,2(1,0-15,6)	-	8,5(1,9-31,2)	2,9(1,0-7,6)	
FEMENINO	-	8,8(3,7-19,5)	3,5(1,4-8,7)	4,8(1,3-15,8)	8,0(2,2-25,1)	5,2(3,0-9,0)	

MOTIVOS DE NO CONSULTA A CENTRO ASISTENCIAL	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)	ESTADÍSTICOS ENTRE ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA
PREFERÍA TRATAMIENTO CON NATURISTA O YERBERO							
TOTAL	-	5,1(1,9-13,1)	7,0(2,7-16,6)	5,2(2,3-11,1)	4,8(1,2-17,4)	5,2(3,1-8,5)	$F=0,598$; $df1=3,592$; $df2=2492,866$; $p=0,646$
MASCULINO	-	-	12,1(3,6-33,5)	6,0(0,8-33,2)	-	5,9(2,0-16,1)	
FEMENINO	-	6,9(2,6-16,9)	3,2(1,2-8,2)	4,9(2,1-10,9)	9,8(2,5-31,8)	4,8(2,9-7,9)	
PREFERÍA TRATAMIENTO CON CURANDERO O BRUJO							
TOTAL	-	3,7(1,2-10,7)	0,2(0,0-1,5)	1,6(0,2-10,7)	-	1,4(0,5-3,5)	$F=1,217$; $df1=5,258$; $df2=3648,978$; $p=0,297$
MASCULINO	-	4,9(0,7-26,8)	-	-	-	0,9(0,1-5,9)	
FEMENINO	-	3,3(0,8-12,5)	0,4(0,1-2,6)	2,1(0,3-13,5)	-	1,6(0,6-4,7)	
NO ERA SERIO, GRAVE O MUY IMPORTANTE							
TOTAL	25,7(10,1-51,5)	34,3(22,5-48,3)	26,8(18,6-36,9)	38,3(27,5-50,3)	24,8(11,6-45,4)	31,1(25,7-37,2)	$F=0,718$; $df1=7,021$; $df2=4872,354$; $p=0,658$
MASCULINO	55,6(27,6-80,5)	38,5(16,8-66,0)	34,4(20,3-51,9)	43,2(21,0-68,5)	36,8(13,0-69,3)	39,3(28,9-50,7)	
FEMENINO	10,2(2,4-34,6)	32,9(20,6-48,1)	21,2(13,6-31,6)	36,8(26,6-48,4)	12,2(2,6-42,5)	27,1(21,5-33,5)	
OTRO							
TOTAL	24,7(11,7-44,7)	3,2(0,9-10,5)	10,2(5,7-17,6)	13,6(7,6-22,9)	21,8(6,4-53,2)	11,9(8,3-16,7)	$F=1,623$; $df1=6,607$; $df2=4585,244$; $p=0,129$
MASCULINO	20,3(3,9-61,8)	5,0(0,7-29,3)	10,4(3,3-28,7)	8,8(2,0-31,7)	38,0(10,5-76,3)	14,1(7,0-26,4)	
FEMENINO	27,0(11,4-51,5)	2,7(0,6-11,8)	10,0(5,5-17,7)	15,1(8,1-26,2)	4,7(1,1-17,7)	10,8(7,36-15,6)	

SÍNDROMES SOCIOCULTURALES Y SALUD MENTAL

Los síndromes folklóricos, descritos desde antaño por los investigadores en medicina tradicional en el área de psiquiatría folklórica, tienen vigencia y son identificados y reconocidos por la población encuestada, siendo sus prevalencias de vida las que se presentan en la Tabla 52.

TABLA 52
PREVALENCIA DE VIDA DE SÍNDROMES FOLKLÓRICOS EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SÍNDROMES FOLKLÓRICOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)
DAÑO	4,3(2,7-6,8)	6,5(4,8-8,8)	6,4(5,1-8,1)	7,5(5,8-9,6)	5,5(3,6-8,4)	6,2(5,4-7,1)
SUSTO	4,1(2,7-6,2)	12,5(10,0-15,5)	10,9(9,2-12,9)	8,3(6,5-10,5)	4,8(3,0-7,7)	8,9(8,0-10,0)
MAL DE OJO	4,3(2,7-6,7)	6,0(4,4-8,0)	5,1(3,7-7,0)	5,1(3,6-7,0)	3,4(1,9-5,9)	5,0(4,3-5,9)
AIRE	1,9(1,0-3,7)	5,4(3,8-7,5)	6,1(4,7-7,8)	6,9(5,1-9,2)	2,4(1,3-4,4)	5,0(4,2-5,8)
CHUCAQUE	3,2(2,0-5,1)	17,2(14,3-20,5)	4,8(3,5-6,5)	5,8(4,2-8,1)	8,0(5,6-11,4)	8,4(7,4-9,6)
ATAQUE DE NERVIOS	0,3(0,1-0,9)	4,1(2,7-6,1)	2,6(1,8-3,8)	1,5(0,9-2,6)	0,7(0,3-1,6)	2,2(1,7-2,8)
EPILEPSIA	0,2(0,0-0,7)	1,2(0,7-2,3)	0,9(0,5-1,8)	1,0(0,4-2,3)	0,9(0,4-2,1)	0,9(0,6-1,3)
PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,6(0,2-2,0)	2,0(1,1-3,6)	1,8(1,0-3,4)	2,2(1,4-3,6)	1,3(0,5-3,2)	1,7(1,3-2,3)
ESTRÉS	6,6(4,3-9,9)	13,7(10,7-17,3)	15,6(13,1-18,5)	8,2(6,1-11,0)	7,6(4,7-12,1)	11,2(9,9-12,6)
TRAUMA	0,8(0,2-2,6)	1,4(0,7-2,6)	1,3(0,8-2,3)	0,6(0,3-1,5)	0,0(0,0-0,3)	1,0(0,7-1,4)

La Tabla 53 muestra una asociación mayor del “daño” y “ataque de nervios” con el episodio psicótico. El trastorno de ansiedad, como el episodio depresivo, presenta relación con todos los síndromes folklóricos descritos.

TABLA 53
ASOCIACIÓN DE LOS SÍNDROMES FOLKLÓRICOS CON LOS TRASTORNOS MENTALES EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SÍNDROMES PSIQUIÁTRICOS	SÍNDROMES FOLKLÓRICOS		
	TRASTORNOS DE ANSIEDAD (AL MENOS UNO)* OR (IC 95%)	EPISODIO DEPRESIVO OR (IC 95%)	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS) OR (IC 95%)
LIMA CENTRO			
DAÑO	35,8(17,2-60,1)	63,5(40,2-81,8)	27,2(8,7-59,4)
SUSTO	15,7(5,0-39,6)	41,9(23,6-62,7)	-
MAL DE OJO	26,8(11,5-50,9)	29,0(14,1-50,4)	13,9(3,3-42,9)
AIRE	19,2(4,1-57,4)	-	14,5(2,0-58,1)
CHUCAQUE	21,0(9,0-41,5)	37,4(18,7-61,0)	10,3(3,2-28,6)
ATAQUE DE NERVIOS	22,6(2,6-76,6)	100,0(100,0-100,0)	38,5(5,2-87,8)
LIMA NORTE			
DAÑO	14,7(7,9-25,7)	26,6(15,9-41,0)	7,3(2,9-17,3)
SUSTO	12,5(7,4-20,4)	15,7(9,4-24,9)	1,9(0,4-8,1)
MAL DE OJO	9,9(4,3-21,3)	20,8(11,6-34,4)	2,7(0,7-10,6)
AIRE	15,7(6,4-33,7)	15,9(8,4-27,9)	6,8(2,2-18,7)
CHUCAQUE	14,1(8,5-22,6)	22,7(16,1-31,1)	5,1(2,4-10,7)
ATAQUE DE NERVIOS	35,5(19,9-54,9)	43,2(26,4-61,7)	14,8(5,3-34,9)
LIMA ESTE			
DAÑO	19,5(11,8-30,5)	30,3(19,8-43,3)	1,7(0,2-11,3)
SUSTO	20,0(14,1-27,6)	28,1(20,3-37,5)	1,4(0,3-6,2)
MAL DE OJO	19,2(10,1-33,4)	33,5(21,5-48,1)	2,2(0,3-13,6)
AIRE	22,6(13,9-34,5)	34,4(21,4-50,1)	-
CHUCAQUE	19,8(11,7-31,4)	21,4(11,9-35,4)	1,5(0,2-10,2)
ATAQUE DE NERVIOS	32,1(17,3-51,7)	32,6(17,4-52,6)	4,2(0,6-24,7)
LIMA SUR			
DAÑO	25,6(16,3-37,7)	34,7(24,2-46,9)	14,3(7,4-25,9)
SUSTO	24,8(16,4-35,8)	29,5(19,8-41,6)	8,9(4,0-18,6)
MAL DE OJO	20,8(12,2-33,2)	25,9(15,7-39,7)	5,6(1,8-16,4)
AIRE	28,6(19,0-40,7)	38,2(28,1-49,4)	7,4(2,7-18,4)
CHUCAQUE	23,5(13,6-37,4)	47,5(34,0-61,4)	11,5(4,9-24,6)
ATAQUE DE NERVIOS	55,2(29,9-78,1)	60,5(34,5-81,7)	20,2(6,9-46,3)
CALLAO			
DAÑO	8,9(2,2-29,8)	31,0(15,1-53,2)	4,6(1,1-17,7)
SUSTO	9,6(3,2-25,3)	18,5(7,6-38,5)	3,8(0,9-14,8)
MAL DE OJO	42,8(20,3-68,8)	5,7(1,5-19,9)	-
AIRE	15,3(3,9-44,6)	13,6(4,4-35,3)	6,4(1,0-32,9)
CHUCAQUE	7,8(3,2-18,1)	13,3(5,5-28,7)	1,3(0,2-9,2)
ATAQUE DE NERVIOS	11,6(1,4-54,4)	55,9(17,8-88,0)	-
TOTAL			
DAÑO	20,6(15,8-26,4)	34,4(27,9-41,5)	9,8(5,8-15,9)
SUSTO	17,2(13,6-21,5)	24,3(19,7-29,5)	3,1(1,7-5,6)
MAL DE OJO	19,4(14,1-26,2)	25,2(19,3-32,1)	4,6(2,1-9,8)
AIRE	21,7(16,1-28,6)	26,7(20,6-33,8)	5,4(2,8-10,3)
CHUCAQUE	16,1(12,0-21,2)	26,1(21,1-31,8)	5,5(3,3-8,9)
ATAQUE DE NERVIOS	36,2(25,7-48,3)	44,3(33,1-56,1)	12,5(6,3-23,3)

* Trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia, trastorno de pánico, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de estrés postraumático.

Sobre las expresiones psicológicas y búsqueda de atención, la población estudiada manifestó que para las condiciones de angustia y tristeza o depresión acudió más del 50% al psicólogo, mientras que para la atención de la “locura” con un 47,0% en total y problemas de alcohol con un 43,9% en total, acudieron al médico. En relación a ser víctima de infidelidad, el 61,9% en Lima Centro, 60,4% en Lima Norte, 62,9% en Lima Este, 67,1% en Lima Sur, 68,1% en Callao y el 63,5% en total no acudió por ayuda (Tabla 54).

TABLA 54
EXPRESIONES PSICOLÓGICAS Y BÚSQUEDAS DE ATENCIÓN EN LA POBLACIÓN ADULTA,
SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

PERSONA A QUIEN ACUDE Y TIPOS DE PROBLEMAS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)
MÉDICO						
ANGUSTIA	32,6(27,2-38,6)	28,2(24,1-32,6)	30,5(27,5-33,8)	38,6(34,6-42,8)	32,0(26,3-38,2)	32,1(30,1-34,1)
TRISTEZA O DEPRESIÓN	27,2(22,8-32,2)	26,5(22,8-30,6)	22,7(20,1-25,7)	34,9(30,8-39,2)	28,0(23,0-33,6)	27,6(25,8-29,5)
LOCURA	51,8(46,1-57,4)	50,6(46,1-55,1)	41,5(38,3-44,8)	44,7(40,5-48,9)	47,6(41,5-53,8)	47,0(44,9-49,1)
PROBLEMAS DE ALCOHOL	49,8(43,8-55,8)	45,5(41,7-49,4)	42,1(38,8-45,4)	41,5(37,2-45,9)	38,9(33,2-44,9)	43,9(41,8-45,9)
VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,6(1,4-4,6)	2,2(1,2-3,9)	2,5(1,6-3,7)	2,1(1,2-3,4)	2,0(1,1-3,7)	2,3(1,8-2,9)
PSICÓLOGO						
ANGUSTIA	57,6(52,2-62,9)	56,2(51,7-60,7)	51,4(48,0-54,7)	39,4(35,5-43,4)	53,4(47,2-59,4)	51,5(49,4-53,5)
TRISTEZA O DEPRESIÓN	65,1(60,7-69,4)	58,9(54,7-62,9)	60,2(56,6-63,7)	47,2(42,9-51,5)	57,8(52,1-63,3)	57,8(55,8-59,7)
LOCURA	40,9(35,6-46,5)	37,7(33,3-42,3)	45,7(42,1-49,3)	37,1(33,2-41,1)	38,3(32,8-44,1)	40,1(38,1-42,2)
PROBLEMAS DE ALCOHOL	41,3(35,6-47,2)	37,1(33,3-41,2)	32,9(29,5-36,6)	23,3(20,3-26,6)	37,9(31,6-44,6)	34,0(32,1-36,0)
VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	26,3(21,9-31,1)	23,0(19,7-26,7)	25,0(21,6-28,7)	16,4(13,7-19,6)	18,8(14,4-24,1)	22,2(20,6-24,0)
BOTICARIO O FARMACÉUTICO						
ANGUSTIA	0,2(0,0-1,4)	0,3(0,1-1,1)	0,7(0,3-1,7)	0,5(0,2-1,3)	0,5(0,1-1,8)	0,5(0,3-0,8)
TRISTEZA O DEPRESIÓN	-	0,2(0,1-1,0)	0,4(0,1-1,5)	0,0(0,0-0,3)	0,4(0,1-1,8)	0,2(0,1-0,5)
LOCURA	-	0,2(0,0-0,7)	0,4(0,1-1,5)	-	-	0,2(0,1-0,4)
PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1(0,0-1,0)	-	0,2(0,0-0,7)	-	0,2(0,0-1,3)	0,1(0,0-0,2)
VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	-	0,3(0,1-1,1)	0,2(0,1-0,9)	0,0(0,0-0,3)	-	0,1(0,1-0,4)
CURANDERO						
ANGUSTIA	0,1(0,0-1,0)	0,8(0,4-1,8)	0,2(0,1-0,8)	0,5(0,2-1,2)	0,3(0,1-0,8)	0,4(0,3-0,7)
TRISTEZA O DEPRESIÓN	-	0,4(0,2-1,2)	0,2(0,1-0,5)	0,2(0,0-1,3)	0,1(0,0-0,7)	0,2(0,1-0,4)
LOCURA	0,1(0,0-0,9)	0,7(0,3-1,6)	0,4(0,2-0,8)	0,4(0,1-1,3)	0,2(0,1-0,8)	0,4(0,3-0,7)
PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1(0,0-0,8)	0,4(0,2-1,1)	0,3(0,0-1,3)	0,4(0,1-2,1)	1,2(0,5-2,9)	0,4(0,2-0,7)
VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,8(1,5-5,2)	2,0(1,2-3,2)	1,2(0,7-2,2)	1,7(1,1-2,8)	2,1(1,1-4,0)	1,9(1,5-2,5)
BRUJO						
ANGUSTIA	-	0,1(0,0-0,7)	0,1(0,0-0,4)	0,3(0,1-1,0)	-	0,1(0,0-0,2)
TRISTEZA O DEPRESIÓN	-	0,1(0,0-0,6)	0,2(0,0-1,6)	0,0(0,0-0,2)	-	0,1(0,0-0,4)
LOCURA	-	0,4(0,2-1,1)	0,3(0,1-0,6)	0,5(0,1-1,5)	-	0,3(0,1-0,5)
PROBLEMAS DE ALCOHOL	-	0,1(0,0-0,5)	-	0,2(0,0-1,1)	0,2(0,0-1,4)	0,1(0,0-0,2)
VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,9(0,5-1,7)	4,4(3,0-6,3)	1,9(1,2-3,0)	2,3(1,3-3,9)	1,1(0,5-2,8)	2,4(1,9-3,0)
SANTIGUADOR O REZADOR						
ANGUSTIA	0,1(0,0-0,5)	0,0(0,0-0,2)	0,2(0,0-0,7)	-	-	0,1(0,0-0,2)
TRISTEZA O DEPRESIÓN	-	0,4(0,1-2,0)	0,2(0,1-0,7)	-	-	0,2(0,1-0,5)
LOCURA	-	0,1(0,0-0,6)	-	-	-	0,0(0,0-0,2)
PROBLEMAS DE ALCOHOL	-	0,3(0,0-2,3)	0,0(0,0-0,3)	-	0,4(0,1-2,8)	0,1(0,0-0,5)
VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,1(0,0-0,5)	0,8(0,3-2,3)	0,1(0,0-0,4)	0,2(0,0-1,3)	0,8(0,2-3,2)	0,4(0,2-0,8)
YERBERO						
ANGUSTIA	-	1,1(0,5-2,2)	0,8(0,4-1,5)	0,2(0,0-1,1)	0,3(0,0-1,8)	0,6(0,3-0,9)
TRISTEZA O DEPRESIÓN	-	0,8(0,3-1,9)	0,6(0,3-1,1)	0,3(0,1-0,8)	0,3(0,0-1,8)	0,4(0,2-0,7)
LOCURA	-	0,1(0,0-0,9)	0,1(0,0-0,6)	0,1(0,0-0,8)	-	0,1(0,0-0,2)
PROBLEMAS DE ALCOHOL	-	0,1(0,0-0,4)	0,2(0,0-1,0)	-	-	0,1(0,0-0,2)
VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	-	0,2(0,0-1,0)	0,0(0,0-0,3)	-	-	0,1(0,0-0,3)
NINGUNA						
ANGUSTIA	7,0(5,0-9,6)	6,8(5,1-9,1)	12,5(10,4-14,9)	17,6(13,3-22,9)	9,0(6,3-12,7)	10,7(9,4-12,2)
TRISTEZA O DEPRESIÓN	5,0(3,4-7,4)	6,2(4,4-8,7)	11,3(9,3-13,8)	13,4(9,4-18,7)	8,2(5,4-12,2)	9,0(7,7-10,4)
LOCURA	4,7(3,1-7,1)	3,9(2,7-5,7)	6,9(5,6-8,5)	13,1(9,1-18,5)	11,4(8,3-15,4)	7,5(6,4-8,8)
PROBLEMAS DE ALCOHOL	3,8(2,4-5,8)	9,2(7,1-11,8)	12,0(9,9-14,5)	14,8(10,7-20,1)	9,9(7,2-13,6)	10,2(8,9-11,6)
VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	61,9(56,8-66,7)	60,4(56,0-64,7)	62,9(59,0-66,8)	67,1(62,6-71,2)	68,1(62,8-73,0)	63,5(61,4-65,5)

* Los informantes respondieron a la pregunta: ¿Dónde suele resolver o donde resolvería Ud. y su familia los siguientes problemas?

ESTIGMA HACIA LOS TRASTORNOS MENTALES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la necesidad imperiosa de pasar a la acción con el fin de reducir la carga que representan los trastornos mentales en todo el mundo y de mejorar la capacidad de los estados miembros para hacer frente a un problema que se agrava día a día.

Una de cada cuatro personas, es decir, el 25% de la población sufre en algún momento de la vida de al menos un trastorno mental. Actualmente hay 450 millones de personas con trastornos mentales en países tanto desarrollados como en desarrollo.

En el Estudio del Programa Mundial de Acción en Salud Mental de la OMS, se resalta que el sufrimiento, la discapacidad y las pérdidas económicas no desaparecerán mientras los enfermos sigan marcados por el estigma. En todo el mundo, muchas personas con trastornos mentales son víctimas de discriminación (acto de separación de una persona o un grupo de personas a partir de criterios determinados, como edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social, conocimientos o nivel económico); en este caso, por el simple motivo de padecer esos trastornos.

Con frecuencia las personas con discapacidad tienen dificultades para conseguir vivienda, empleo u otros servicios que forman parte de la vida normal en la sociedad, lo que a veces provoca la agudización de sus síntomas.

Además, la información equívoca sobre los trastornos mentales -por ejemplo, la idea de que esos enfermos suelen ser violentos o víctimas de algún tipo de maleficio, o de que esas dolencias son incurables- no hacen más que perpetuar el estigma y la discriminación.

Aproximadamente un tercio de la población no considera la tristeza excesiva o depresión, ni los “nervios” excesivos o fobias, como trastornos mentales, pasando, incluso, inadvertidos. Por otro lado, según áreas poblacionales de Lima Metropolitana, el 35,2% en Lima Centro, 46,4% en Lima Norte, 40,1% en Lima Este, 48,0% en Lima Sur, 41,4% en Callao y el 42,7% en Total no considera los problemas de la personalidad como patología mental. (Tabla 55).

TABLA 55
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS COMO TRASTORNOS MENTALES EN LA POBLACIÓN
ADULTA, SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

SÍNDROMES FOLKLÓRICOS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)
A) NERVIOS EXCESIVOS O FOBIAS	p=<0,00001					
No	19,0(14,7-24,2)	21,7(18,4-25,5)	24,8(22,1-27,7)	26,8(23,7-30,1)	18,3(14,2-23,2)	22,7(21,1-24,4)
Sí	76,4(71,3-81,0)	68,8(64,6-72,7)	63,2(60,0-66,4)	68,3(64,7-71,6)	74,2(68,4-79,2)	69,2(67,4-71,0)
B) TRISTEZA EXCESIVA O DEPRESIÓN	p=<0,00001					
No	17,8(13,9-22,5)	28,8(25,1-32,7)	29,1(26,0-32,3)	27,9(24,6-31,5)	21,8(17,3-27,1)	26,0(24,3-27,8)
Sí	79,0(74,1-83,1)	66,6(62,5-70,4)	62,6(59,2-65,9)	69,2(65,6-72,5)	71,1(65,5-76,1)	68,8(66,9-70,6)
C) PSICOSIS O LOCURA	p=<0,00001					
No	1,6(0,9-2,9)	5,9(4,2-8,3)	11,5(9,5-13,8)	11,1(9,1-13,5)	7,1(4,7-10,4)	7,7(6,8-8,7)
Sí	97,1(95,4-98,2)	91,8(89,2-93,8)	82,0(79,2-84,5)	86,7(84,2-88,9)	88,7(84,6-91,9)	88,9(87,7-90,1)
D) CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Y DROGAS	p=<0,00001					
No	17,4(13,7-21,8)	30,5(26,7-34,5)	29,8(26,7-33,0)	25,4(22,5-28,7)	24,9(20,4-30,0)	26,4(24,7-28,1)
Sí	79,1(74,8-82,9)	63,2(59,2-67,1)	62,6(59,1-66,0)	71,2(67,6-74,5)	66,0(61,0-70,7)	67,8(66,0-69,5)
E) PROBLEMAS DEL CARÁCTER O DE LA PERSONALIDAD	p=<0,00001					
No	35,2(30,5-40,2)	46,4(42,3-50,7)	40,1(36,6-43,8)	48,0(44,4-51,7)	41,4(35,1-48,0)	42,7(40,8-44,7)
Sí	58,0(53,3-62,6)	45,7(41,6-49,9)	46,9(43,4-50,4)	45,7(42,1-49,3)	49,8(43,7-55,8)	48,6(46,7-50,5)

La suma de porcentajes entre el “sí” y el “no”, restado del 100%, corresponde a las respuestas “no sabe”.

En la Tabla 56 se aprecia que un 66,6% en Lima Centro, 46,6% en Lima Norte, 37,2% en Lima Este, 40,6% en Lima Sur, 58,0% en Callao y un 47,8% en total acepta a las personas con enfermedades mentales, mientras que un 16,0% en Lima Centro, 30,2% en Lima Norte, 44,8% en Lima Este, 43,5% en Lima Sur, 20,9% en Callao y un 33,1% en total está dispuesto a brindarles algún tipo de ayuda. En el mismo sentido, tratándose de familiares con enfermedades mentales, el 47,4% en Lima Centro, 27,1% en Lima Norte, 32,1% en Lima Este, 27,9% en Lima Sur, 31,1% en Callao y el 32,4% en total tiende a aceptar la enfermedad en ellos. Por otro lado, un 22,5% en Lima Centro, 11,1% en Lima Norte, 8,9% en Lima Este, 17,4% en Lima Sur, 13,2% en Callao y un 14,0% en total piensa que, en el caso de sufrir una enfermedad mental, sería aceptado en su comunidad.

TABLA 56
ACTITUDES FRENTE AL TRASTORNO MENTAL EN LA POBLACIÓN ADULTA, SEGÚN
ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

PREGUNTAS Y RESPUESTAS	LIMA CENTRO (IC 95%)	LIMA NORTE (IC 95%)	LIMA ESTE (IC 95%)	LIMA SUR (IC 95%)	CALLAO (IC 95%)	TOTAL (IC 95%)
ANTE UNA PERSONA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL ¿CÓMO REACCIONA USTED? <i>p</i> = <0,00001						
LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	66,6(60,3-72,4)	46,6(41,8-51,5)	37,2(33,8-40,7)	40,6(36,6-44,8)	58,0(51,0-64,8)	47,8(45,5-50,0)
SE MUESTRA INDIFERENTE CON ELLA	2,1(1,0-4,3)	4,4(2,9-6,7)	1,5(0,9-2,6)	2,7(1,8-4,1)	5,5(3,3-9,1)	3,1(2,4-3,9)
SE ALEJA DE ELLA	6,7(4,5-10,0)	10,4(7,9-13,7)	6,1(4,7-7,8)	7,2(5,8-9,0)	8,4(6,0-11,7)	7,9(6,8-9,0)
LE OFRECE ALGUNA AYUDA	16,0(12,1-20,7)	30,2(26,3-34,4)	44,8(41,2-48,5)	43,5(39,1-47,9)	20,9(16,9-25,6)	33,1(31,1-35,0)
LA RECHAZA	0,5(0,2-1,3)	0,5(0,2-1,8)	1,1(0,7-2,0)	0,5(0,2-1,1)	0,4(0,1-1,7)	0,6(0,4-1,0)
LA OCULTARÍA	-	-	-	-	-	-
OTRA	0,6(0,2-2,2)	0,7(0,3-1,5)	0,2(0,0-0,7)	0,8(0,3-1,9)	1,2(0,5-2,9)	0,6(0,4-1,0)
SI USTED TUVIERA (TIENE) UNO O MÁS MIEMBROS DE SU FAMILIA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿USTED...? <i>p</i> = <0,00001						
LA ACEPTARÍA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	47,4(41,7-53,1)	27,1(23,1-31,5)	32,1(28,3-36,2)	27,9(24,0-32,1)	31,1(23,8-39,4)	32,4(30,3-34,6)
SE MOSTRARÍA INDIFERENTE CON ÉL O ELLA	0,1(0,0-0,9)	0,3(0,1-1,1)	-	0,3(0,1-1,0)	-	0,2(0,1-0,4)
SE ALEJARÍA DE ÉL O ELLA	0,9(0,3-2,3)	0,6(0,3-1,4)	0,9(0,5-1,5)	0,8(0,4-1,7)	1,0(0,4-2,3)	0,8(0,6-1,1)
LE OFRECERÍA ALGUNA AYUDA	50,6(44,9-56,3)	70,0(65,6-74,1)	66,1(62,0-69,9)	69,9(65,7-73,8)	64,3(56,6-71,4)	65,1(62,9-67,2)
LA RECHAZARÍA	-	0,2(0,0-1,4)	0,6(0,2-1,4)	0,3(0,1-1,0)	0,3(0,0-1,9)	0,3(0,2-0,6)
LA OCULTARÍA	0,1(0,0-0,9)	0,1(0,0-0,6)	-	-	-	0,0(0,0-0,2)
OTRA	0,9(0,3-2,2)	1,7(1,0-3,0)	0,3(0,1-0,9)	0,7(0,3-1,6)	3,3(1,9-5,7)	1,2(0,9-1,6)
SI USTED TUVIERA UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿CÓMO PIENSA QUE REACCIONARÍA SU COMUNIDAD...? <i>p</i> = <0,00001						
LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	22,5(18,5-27,1)	11,1(8,6-14,2)	8,9(7,1-11,0)	17,4(14,5-20,7)	13,2(9,7-17,7)	14,0(12,7-15,5)
SE MOSTRARÍA INDIFERENTE	14,5(11,2-18,7)	16,6(13,4-20,4)	9,6(7,6-12,1)	13,7(11,2-16,6)	16,1(12,1-21,0)	13,9(12,5-15,4)
SE ALEJARÍA DE USTED	5,4(3,6-8,0)	6,2(4,6-8,4)	7,0(5,5-9,0)	7,4(5,9-9,3)	5,4(3,6-7,9)	6,4(5,6-7,4)
LE OFRECERÍA ALGUNA AYUDA	6,9(4,7-10,0)	14,6(11,9-17,9)	15,3(13,1-17,9)	13,2(10,7-16,1)	11,4(8,6-14,9)	12,8(11,6-14,1)
LO(A) RECHAZARÍA	10,2(7,4-13,7)	8,3(6,4-10,6)	10,4(8,7-12,4)	9,3(7,4-11,6)	14,8(11,3-19,3)	10,0(9,0-11,2)
LA OCULTARÍA	-	-	-	-	-	-
OTRA	0,4(0,1-1,8)	0,1(0,0-0,5)	0,4(0,2-0,9)	1,6(0,9-2,8)	0,6(0,1-2,6)	0,6(0,4-0,9)

IV. HALLAZGOS GENERALES DEL ESTUDIO SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012



ADULTOS

1. La edad promedio de los adultos es de 42,56 años en total, siendo, según áreas poblacionales de Lima Metropolitana, 47,64 años en Lima Centro, 41,04 años en Lima Norte, 40,01 años en Lima Este, 41,92 años en Lima Sur y 45,23 años en Callao. Se observa un incremento de la edad promedio en relación al estudio del 2002, que se situaba en 38,3 años. En relación a la escolaridad, el 2,0% de Lima Centro, 2,8% de Lima Norte, 3,7% de Lima Este, 3,0% de Lima Sur, 4,4% de Callao y el 3,1% del total la muestra era analfabeta. Sin embargo, hace 10 años, el porcentaje de analfabetismo hallado fue de 2,3% del total. Para el año 2012, el 44,8% del total tiene por lo menos educación secundaria, y los niveles educativos superior universitario y no universitario suman el 38,5 %, valores bastantes menores a lo observado en el 2002. Los adultos con niveles educativos superior universitario y no universitario suman en Lima Centro 58,5%, Lima Norte 36,1%, Lima Este 30,3%, Lima Sur 38,3%, Callao 31,2%, dando como Total el 38,5% de la población. El estado civil para Lima Centro con un 53,6%, Lima Norte 54,6%, Lima Este 59,2%, Lima Sur 56,4%, Callao 61,6%, con un total de 56,6% estaba casado o conviviente, cifra similar a la encontrada en el 2002. Sin embargo, se observa que el porcentaje de adultos casados es relativamente menor a lo encontrado hace 10 años (31,4% vs. 39,1%). Una situación opuesta se observa en el porcentaje de adultos convivientes, que pasó del 19,4% de la población en el 2002, al 25,2% en total en el 2012. En cuanto a la situación laboral, el desempleo llegaba en Lima Centro al 1,3%, en Lima Norte al 3,0%, en Lima Este al 1,7%, en Lima Sur al 2,7%, en Callao al 2,5% y en total al 2,3%, lo que en el 2002 se llegó a encontrar en un 7,2%. Por otro lado, dos de cada diez mujeres tienen un ingreso promedio menor a 300 nuevos soles, cifra que duplica la hallada en el 2002.
2. El principal problema del país es la delincuencia con un 20,6% en total de la población adulta. Y según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, tenemos que un 17,2% en Lima Centro, 18,3% en Lima Norte, 26,1% en Lima Este, 16,3% en Lima Sur y un 27,4% en Callao lo percibe en primer lugar. Mientras que la corrupción y el desempleo, se encontraron en segundo y tercer lugar. Esto a diferencia de hace 10 años, cuando el principal problema identificado era el desempleo, seguido de la pobreza y la corrupción.
3. La desconfianza en las autoridades políticas se encuentra en primer lugar, y según áreas poblacionales, tenemos en Lima Centro un 91,6%, en Lima Norte 90,1%, en Lima Este 90,7%, en Lima Sur 88,9%, en Callao 91,2% y un 90,4% en total. Mientras que no sentirse protegido por el Estado se muestra en Lima Centro con un 72,4%, Lima Norte 69,8%, Lima Este 74,7%, Lima Sur 74,4%, Callao 69,6% y en total un 72,4%. En contraposición, el sentimiento de protección que genera la familia y la creencia en Dios es alto, dato similar al encontrado hace 10 años.
4. La delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo, la salud y el dinero generan un alto estrés en la población. Esta situación contrasta con la observada hace 10 años, en donde el principal estresor reportado era el dinero. En el caso de la población adulta, Lima Centro con un 28,7%, Lima Norte 27,8%, Lima Este 27,6%, Lima Sur 39,5%, Callao 34,5% y un 31,1% del Total ha sufrido alguna experiencia traumática, condición cercana a lo encontrado 10 años atrás. Tenemos, también que el 28,3% en Lima Centro, 45,6% en Lima Norte, 56,3% en Lima Este, 60,8% en Lima Sur, 46,3% en Callao y el 48,5% en total está afectado por un nivel alto de estrés ambiental proveniente del ruido, la falta de ventilación o espacio, malos olores, polvo y basura.
5. La condición económica o social y el nivel educativo son referidos como las principales causas de discriminación por la población estudiada. No muy lejanas se encuentran la discriminación por edad y por peso. Las mujeres perciben la discriminación por sexo en mayor porcentaje que los varones.
6. En la población general, entre el 10% y el 20% de las personas experimentan con mucha frecuencia estados anímicos negativos como tristeza, preocupación, tensión, aburrimiento, irritabilidad, angustia e inquietud, sin embargo, estos estados han experimentado un retroceso de casi 20 puntos porcentuales, comparados con los encontrados 10 años atrás. Las mujeres experimentan en mayor proporción que los hombres estos estados anímicos. Por otro lado, el 72,9% en total declara ser

feliz y estar interesado por la vida, y según áreas poblaciones, encontramos que este sentimiento se presenta en un 77,3% en Lima Centro, 71,9% en Lima Norte, 72,4% en Lima Este, 70,7% en Lima Sur y 73,8% en Callao.

7. La mayoría de encuestados manifiesta sentir satisfacción con la vida en general, siendo dicha expresión mayor en varones.
8. El grado de satisfacción personal referido como aspecto físico, color de piel, inteligencia, profesión y relaciones sociales alcanza un promedio del 80 %, en ambos sexos. Se pudo observar que en términos generales el grado de satisfacción percibido por la población adulta es mayor al reportado en el 2002 en prácticamente todos los aspectos, destacándose preponderantemente lo referente a la satisfacción con el nivel económico. Se observa que en áreas como nivel económico y nivel educativo alcanzado, el grado de satisfacción se encuentra en alrededor de un 40%; sin embargo, es en el mismo nivel educativo alcanzado donde el grado de insatisfacción es mayor, por lo que según áreas poblaciones en Lima Metropolitana y Callao, tenemos un 15,7% en Lima Centro, 23,5% en Lima Norte, 29,8% en Lima Este, 24,2% en Lima Sur, 21,4% en Callao y un 23,6% en total. Respecto a la remuneración que se percibe, un poco menos del 20% refiere ninguna o poca satisfacción.
9. La población que reconoció problemas del sueño que merecían atención médica representa el 26,4% en Lima Centro, 27,1% en Lima Norte, 22,7% en Lima Este, 23,1% en Lima Sur, 19,3% en Callao y el 24,2% en total. Así mismo, el 33% en Lima Centro, 31,5% en Lima Norte, 25,2% en Lima Este, 26,9% en Lima Sur, 29,1% en Callao y el 29% en total de la población ha manifestado presentar disfunción diurna en algún grado. Mientras que el 12% en Lima Centro, 11,2% en Lima Norte, 10,2% en Lima Este, 9,5% en Lima Sur, 7,9% en Callao y el 10,4% en total calificó su calidad de sueño como mala o bastante mala.
10. El índice de calidad de vida promedio desde la perspectiva de la propia persona se encontró en una media de 8,14 en Lima Centro, 7,98 en Lima Norte, 7,77 en Lima Este, 7,76 en Lima Sur, 8,06 en Callao y de 7,92 en total, sin diferencia significativa según el sexo; sin embargo, los componentes de bienestar físico y bienestar psicológico o emocional mostraron ser significativamente mayores en los varones. Estos datos no han mostrado variaciones con relación a los encontrados en el 2002.
11. La décima parte de la población adulta tiene al menos alguna discapacidad o inhabilidad; sin embargo, en comparación al 2002, este valor llegó a duplicarse, llegando hasta un 26,5% del total de la población.
12. La permisividad frente a la psicopatía se encontró en 4,5% en Lima Centro, 4,8% en Lima Norte, 4,6% en Lima Este, 5,2% en Lima Sur, 5,7% en Callao y en 4,9% en total; mientras que las tendencias psicopáticas se hallaron en alrededor de 4,1% en Lima Centro, 4,9% en Lima Norte, 6,7% en Lima Este, 5,3% en Lima Sur, 6,1% en Callao y de 5,4% en total, mostrando conductas como la mentira frecuente, la violencia o el robo. Se puede observar una disminución en el porcentaje encontrado en el 2002, cuando la permisividad frente a la psicopatía era del orden del 10,6%.
13. Sobre los indicadores suicidas, tenemos que un 5,7% en Lima Centro, 7,7% en Lima Norte, 11,1% en Lima Este, 10,1% en Lima Sur, 9,7% en Callao y un 8,9% en total, en algún momento de su vida ha tenido pensamientos o deseos de quitarse la vida, siendo este porcentaje mayor en mujeres con un 9,8% en Lima Centro, 8,9% en Lima Norte, 13,7% en Lima Este, 14,5% en Lima Sur, 13,9% en Callao y un 11,8% en total. Cuando se compara esta situación con la encontrada en el 2002, observamos que es una de las principales mejoras en lo que respecta a la salud mental de los adultos, siendo un 30,3% de los adultos encuestados que llegó a referir presentar estos pensamientos o deseos. En relación a los principales motivos de deseos, pensamientos y planes suicidas los constituyen los problemas de pareja y separación de la pareja o cónyuge, problemas con los padres, problemas con la salud física y experiencias traumáticas, mientras que en el 2002, el tema económico se encontraba entre los principales motivos.
14. La tendencia hacia la violencia, no estuvo ajena a nuestra sociedad, así el 18,8% en Lima Centro, 21,5% en Lima Norte, 23,7% en Lima Este, 24,3% en Lima Sur, 28,6% en Callao y el 22,9% en total de

la población adulta se ha visto involucrado en ella de alguna manera, cifra menor a la reportada en el 2002, que llegó alcanzar al 30,2% de la población. Sobre la participación en actividades violentas, el 16,8% en Lima Centro, 17,6% en Lima Norte, 19,4% en Lima Este, 20,4% en Lima Sur, 24,8% en Callao y el 19,2% en total ha participado en más de una pelea que acabó a golpes, conducta más presente en el sexo masculino.

15. Con respecto a la seguridad que las personas perciben en su entorno, la gran mayoría no se siente protegida por el Estado con un 72,4% en Lima Centro, 69,8% en Lima Norte, 74,7% en Lima Este, 74,4% en Lima Sur, 69,6% en Callao y un 72,4% en total. Esto contrasta con los sentimientos de protección que sí genera la familia con un 85,0% en Lima Centro, 79,1% en Lima Norte, 80,4% en Lima Este, 80,7% en Lima Sur, 82,9% en Callao y un 81,2% en total). Aun así, un 30% percibe poco o ningún apoyo familiar.
16. Más del 90% está de acuerdo con la participación política de la mujer, situación que expresaría un cambio en relación a la brecha de género.
17. Un hallazgo a mencionar es el hecho de que las tendencias religiosas tales como los sentimientos de protección de Dios con un 92,2% en total de la población adulta y la importancia del mismo en sus vidas con un 91,3% en total, se han visto incrementadas, en relación al estudio del año 2002. Sin embargo el porcentaje de personas que le transmite la religión a sus hijos solo alcanza un tercio de la población, situación considerablemente reducida en estos 10 años.
18. La cuarta parte de la población adulta según áreas poblacionales de Lima Metropolitana presentó alguna vez en su vida algún trastorno mental, siendo el trastorno depresivo en general el más frecuente con un 20,5% en Lima Centro, 14,0% en Lima Norte, 17,1% en Lima Este, 19,9% en Lima Sur, 15,6% en Callao y un 17,3% en total, seguido por el episodio depresivo con un 20,5% en Lima Centro, 14,0% en Lima Norte, 17,1% en Lima Este, 19,8% en Lima Sur, 15,5% en Callao y un 17,2% en total, el consumo perjudicial o dependencia de alcohol con un 6,0% en Lima Centro, 6,2% en Lima Norte, 10,0% en Lima Este, 7,5% en Lima Sur, 6,8% en Callao y un 7,5% en total, el episodio depresivo severo con un 9,2% en Lima Centro, 7,6% en Lima Norte, 8,2% en Lima Este, 11,7% en Lima Sur, 8,8% en Callao y un 9,0% en total, el episodio depresivo moderado con un 7,7% en Lima Centro, 5,2% en Lima Norte, 4,7% en Lima Este, 5,0% en Lima Sur, 5,2% en Callao y un 5,5% en total, el trastorno de estrés postraumático con un 5,8% en Lima Centro, 5,2% en Lima Norte, 5,0% en Lima Este, 4,5% en Lima Sur, 4,8% en Callao y un 5,1% en total, y el trastorno de ansiedad generalizada con un 4,2% en Lima Centro, 2,2% en Lima Norte, 3,2% en Lima Este, 3,4% en Lima Sur, 1,4% en Callao y un 3,0% en total. Estos porcentajes son menores a los encontrados en el 2002, cuando el 37,3% de las personas reportaba haber sufrido alguna vez en su vida de algún trastorno mental, y un 23,5% lo presentaba al momento de la encuesta. La prevalencia actual de cualquier trastorno mental es de 8,6% en Lima Centro, 7,6% en Lima Norte, 10,0% en Lima Este, 7,0% en Lima Sur, 4,1% en Callao y de 7,9% en total. La prevalencia de vida de trastornos mentales, en personas que han perdido a algún familiar por la violencia en la época del terrorismo, es de 32,1% en Lima Centro, 32,0% en Lima Norte, 38,7% en Lima Este, 37,2% en Lima Sur, 26,5% en Callao y de 34,8% en total.
19. La Agorafobia es la patología con mayor número de episodios en la población, seguida de la Fobia Social. Mientras que la Ansiedad Generalizada, es la patología que inicia más tardíamente con una media de 31,89 años, y la que inicia más tempranamente, con una media de 14,96 años, es la Fobia Social. Sin embargo, hay que resaltar que la Agorafobia es la patología más frecuente de inicio tardío en población de más de 60 años.
20. En relación a la búsqueda de atención de su trastorno mental, las personas con trastorno de pánico recibieron atención en un 58,8% en Lima Este, 43,0% en Lima Sur y un 26,5% en total, seguido por la atención brindada para el episodio depresivo leve moderado a severo con el 23,1% en total y la distimia con el 22,7% en total. Para el episodio psicótico, la demanda fue menor, encontrándose un 17,7% en Lima Centro, 18,2% en Lima Este, 4,1% en Lima Sur, 22,4% en Callao y un 12,7% en total. Las patologías que tuvieron poca demanda de atención fueron la fobia social, el uso perjudicial y dependencia de alcohol, la agorafobia y el trastorno de estrés postraumático.

21. La prevalencia de vida de consumo de sustancias nocivas legales se encuentra en 62,4% en Lima Centro, 60,4% en Lima Norte, 64,9% en Lima Este, 68,8% en Lima Sur, 67,8% en Callao y en 64,4% en Total, mientras que la prevalencia de vida de consumo de sustancias ilegales se halla en un 7,4% en Lima Centro, 5,7% en Lima Norte, 6,2% en Lima Este, 9,2% en Lima Sur, 8,1% en Callao y en un 7,1% en Total. La sustancia ilegal más consumida alguna vez es la marihuana, seguida de la cocaína en general (PBC o clorhidrato). Las prevalencias de consumo actual (en el último mes) corresponden al alcohol con un 42,6% en Lima Centro, 33,5% en Lima Norte, 39,5% en Lima Este, 42,8% en Lima Sur, 36,1% en Callao y un 38,7% en total y el tabaco con un 15,6% en Lima Centro, 13,4% en Lima Norte, 11,7% en Lima Este, 14,3% en Lima Sur, 11,4% en Callao y un 13,3% en total. Se observa en todas las prevalencias que las cifras son mayores en los varones que en las mujeres.
22. La prevalencia de vida de cualquier trastorno psiquiátrico, según áreas poblacionales de Lima Metropolitana y Callao, fue mayor en Lima Sur con un 28,3%, seguido de Lima Centro con un 27,6% y Lima Este con un 27,5%. Para los trastornos depresivos, se encontró mayor prevalencia de vida en Lima Centro, y para el consumo perjudicial o dependencia de alcohol en Lima Este. En comparación a lo hallado en el 2002, se observa una disminución en la prevalencia de trastornos clínicos, para el 2012, en el Callao.
23. En relación al acceso a servicios, siguen siendo los establecimientos del Ministerio de Salud a los que se acude en mayor porcentaje para recibir ayuda. Sin embargo, se observa un creciente aumento en la atención privada, la misma, que pasó de atenderse en un 15,1% de morbilidad sentida expresada, en el 2002, al 46,5% en Lima Centro, 31,6% en Lima Norte, 19,8% en Lima Este, 31,3% en Lima Sur, 12,6% en Callao y al 30,2% en total, en el 2012.
24. Siendo los factores culturales relevantes para la no búsqueda de atención, tenemos como motivos principales, el pensar que lo debía superar solo (a) con un 50,4%, la falta de tiempo 33,1%, no lo consideraba serio, grave o muy importante 31,1%, falta de confianza 30,3%, porque no tenía dinero 30,2%, y no sabía dónde ir con un 26,5, así como el pensar que no le ayudarían, duda de manejo por médicos, larga lista de espera, tener dinero y preferir gastarlo en otra cosa, preferencia de remedios caseros, entre otros.
25. Los síndromes folclóricos prevalentes en la población fueron el "daño", "susto" "mal de ojo" "chucaque" y "ataque de nervios". Se encontró que las personas que consultaron por algún síndrome folclórico presentaron en algún momento de su vida un trastorno de ansiedad o episodio depresivo.
26. Sobre los motivos que generaron expresiones psicológicas y por consiguiente dónde resolverían sus problemas, fueron las condiciones de angustia y tristeza o depresión que con más del 50% buscaron atención psicológica, mientras que la atención por "locura" con un 47,0% y problemas de alcohol con un 43,9% en total, acudieron al médico. Sin embargo, el ser víctima de infidelidad, fue considerada para la población encuestada, con más del 60%, no necesidad de ayuda.
27. La actitud de la población, frente a personas con patologías mentales, ha sido tema de análisis y políticas a desarrollar en la búsqueda de la disminución relacionado a la discriminación, estigma y exclusión; por lo que respecta a lo encontrado en el estudio, tenemos que, el 66,6% en Lima Centro, 46,6% en Lima Norte, 37,2% en Lima Este, 40,6% en Lima Sur, 58,0% en Callao y el 47,8% en total acepta a las personas con enfermedades mentales, así mismo un 16,0% en Lima Centro, 30,2% en Lima Norte, 44,8% en Lima Este, 43,5% en Lima Sur, 20,9% en Callao y un 33,1% en total está dispuesto a brindarles algún tipo de ayuda.

ANEXO: ERRORES MUESTRALES Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN



ERRORES MUESTRALES Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN

Una investigación con una encuesta por muestreo puede estar afectada por dos tipos de errores:

1. Aquellos que se producen durante el trabajo de campo, recolección y procesamiento de información, denominados errores no muestrales.
2. Los que resultan del hecho de haber trabajado solo con una muestra y no la población en su conjunto, denominados errores de muestreo.

La muestra de estudio es una de las tantas probables que pueden ser extraídas de la población utilizando diseños científicos de muestreo, y puede dar resultados diferentes a otras muestras que pudieran haber sido seleccionadas con los mismos procedimientos pero con diferentes unidades informantes. Esa variabilidad entre todas las muestras posibles constituye el error de muestreo, el cual no se conoce pero se estima a partir de los datos suministrados por la muestra seleccionada. El error de muestreo se mide por medio del error estándar, que se define como la raíz cuadrada de la varianza de la estadística estimada. El error estándar permite medir el grado de precisión alcanzado con la muestra y los intervalos de confianza.

Así, si se toma cierta estadística calculada de la muestra como un porcentaje y se le suma y resta dos veces su error estándar, obtenemos un intervalo al cual se le asigna un nivel de confianza del 95%.

Además del error estándar, es muy importante conocer el efecto del diseño (*deff* por sus siglas en inglés), el mismo que es definido como la razón entre el error estándar correspondiente al diseño empleado y el error estándar de la muestra, asumiendo muestreo aleatorio simple. El valor de *deff* igual a 1,0 indicaría que el diseño utilizado es tan eficiente como uno simple al azar del mismo tamaño, mientras que un valor superior a 1,0 indicaría que el uso de conglomerados produjo una varianza superior.

El coeficiente de variación (c.v.) es una medida de dispersión relativa que se utiliza para compararla dispersión o variabilidad de dos conjuntos de datos expresados en diferentes unidades. El c.v. no tiene unidades, y su valor es confiable y representativo si es menor al 15%.



ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE SALUD MENTAL SEGÚN ÁREAS POBLACIONALES DE LIMA METROPOLITANA 2012

ERRORES MUESTRALES

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
DATOS GENERALES: ADULTO						
EDAD PROMEDIO(DS) PONDERADA (MEDIA)	TOTAL	42,56	0,4	41,83; 43,29	1,95	0,9
	LIMA CENTRO	47,64	1,1	45,5 ; 49,8	2,59	2,3
	LIMA NORTE	41,04	0,8	39,6 ; 42,6	2,31	1,9
	LIMA ESTE	40,01	0,6	38,9 ; 41,1	1,25	1,4
	LIMA SUR	41,92	0,7	40,5 ; 43,3	1,56	1,7
	CALLAO	45,23	1,2	42,8 ; 47,6	2,09	2,6
GRADO DE ANALFABETISMO (PREVALENCIA)	TOTAL	3,1%	0,3	2,5 ; 3,8	1,49	10,2
	LIMA CENTRO	2,0%	0,8	0,9 ; 4,3	2,46	39,6
	LIMA NORTE	2,8%	0,6	1,9 ; 4,3	1,54	39,6
	LIMA ESTE	3,7%	0,6	2,7 ; 5,1	1,17	16,7
	LIMA SUR	3,0%	0,7	1,9 ; 4,7	1,50	23,1
	CALLAO	4,4%	1,0	2,7 ; 7,0	1,25	23,8
GRADO DE ESTUDIOS (TOTAL)	SIN NIVEL/NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA	1,5%	0,2	1,1 ; 2,0	1,28	13,8
	INICIAL / PREESCOLAR	0,1%	0,1	0,1 ; 0,3	1,10	44,6
	PRIMARIA	13,5%	0,6	12,3 ; 14,8	1,54	4,7
	SECUNDARIA	44,8%	1,0	42,8 ; 46,8	1,88	2,3
	BACHILLERATO	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,65	100,0
	SUPERIOR NO UNIVERSITARIO	20,0%	0,8	18,5 ; 21,5	1,64	3,8
	SUPERIOR UNIVERSITARIO	18,5%	0,8	16,9 ; 20,2	2,04	4,5
	POSTGRADO	1,5%	0,2	1,2 ; 2,1	1,49	14,6
GRADO DE ESTUDIOS (LIMA CENTRO)	SIN NIVEL/NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,70	99,3
	INICIAL / PREESCOLAR	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,56	100,0
	PRIMARIA	7,4%	1,7	4,8 ; 11,4	3,06	22,3
	SECUNDARIA	30,7%	2,6	25,8 ; 36,1	2,52	8,6
	BACHILLERATO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUPERIOR NO UNIVERSITARIO	21,7%	2,0	18,0 ; 26,0	1,87	9,4
	SUPERIOR UNIVERSITARIO	36,8%	2,8	31,6 ; 42,3	2,50	7,5
	POSTGRADO	3,2%	0,7	2,1 ; 5,0	1,26	22,2
GRADO DE ESTUDIOS (LIMA NORTE)	SIN NIVEL/NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA	1,2%	0,4	0,7 ; 2,2	1,30	30,1
	INICIAL / PREESCOLAR	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	1,47	71,5
	PRIMARIA	13,8%	1,3	11,4 ; 16,6	1,75	9,6
	SECUNDARIA	48,0%	2,2	43,6 ; 52,3	2,35	4,6
	BACHILLERATO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUPERIOR NO UNIVERSITARIO	21,1%	1,8	17,8 ; 24,9	2,36	8,6
	SUPERIOR UNIVERSITARIO	15,0%	1,6	12,1 ; 18,5	2,49	10,9
	POSTGRADO	0,7%	0,4	0,3 ; 1,9	2,22	51,6
GRADO DE ESTUDIOS (LIMA ESTE)	SIN NIVEL/NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA	1,9%	0,5	1,2 ; 3,1	1,30	24,7
	INICIAL / PREESCOLAR	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,49	100,2
	PRIMARIA	16,4%	1,1	14,3 ; 18,7	0,99	6,8
	SECUNDARIA	49,7%	1,7	46,4 ; 53,0	1,24	3,4
	BACHILLERATO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUPERIOR NO UNIVERSITARIO	16,2%	1,2	13,9 ; 18,7	1,20	7,5
	SUPERIOR UNIVERSITARIO	14,1%	1,2	11,9 ; 16,6	1,28	8,4
	POSTGRADO	1,7%	0,4	1,0 ; 2,8	1,32	26,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
GRADO DE ESTUDIOS (LIMA SUR)	SIN NIVEL / NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA	2,5%	0,6	1,6 ; 3,8	1,20	22,8
	INICIAL / PREESCOLAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PRIMARIA	13,5%	1,4	11,0 ; 16,4	1,48	10,2
	SECUNDARIA	44,2%	2,1	40,1 ; 48,4	1,68	4,8
	BACHILLERATO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SUPERIOR NO UNIVERSITARIO	22,2%	1,5	19,4 ; 25,4	1,25	6,9
	SUPERIOR UNIVERSITARIO	16,1%	1,7	13,1 ; 19,7	1,94	10,5
GRADO DE ESTUDIOS (CALLAO)	SIN NIVEL / NUNCA ASISTIÓ A LA ESCUELA	1,7%	0,7	0,7 ; 3,7	1,39	41,4
	INICIAL / PREESCOLAR	0,3%	0,2	0,1 ; 1,4	0,82	71,4
	PRIMARIA	16,4%	1,9	13,0 ; 20,4	1,23	11,5
	SECUNDARIA	49,4%	2,7	44,1 ; 54,7	1,41	5,5
	BACHILLERATO	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	0,65	100,0
	SUPERIOR NO UNIVERSITARIO	18,7%	1,6	15,8 ; 22,0	0,78	8,4
	SUPERIOR UNIVERSITARIO	12,5%	2,0	9,1 ; 16,9	1,73	15,9
ESTADO CIVIL (TOTAL)	POSTGRADO	0,8%	0,6	0,2 ; 3,3	2,01	70,7
	CONVIVIENTE	25,2%	0,9	23,6 ; 27,0	1,78	3,4
	SEPARADO	10,5%	0,5	9,5 ; 11,5	1,23	4,9
	DIVORCIADO	0,9%	0,1	0,7 ; 1,3	1,00	15,3
	VIUDO	5,0%	0,4	4,4 ; 5,8	1,28	7,4
	CASADO	31,4%	0,9	29,6 ; 33,2	1,69	2,9
	SOLTERO	26,9%	0,9	25,2 ; 28,7	1,77	3,3
ESTADO CIVIL (LIMA CENTRO)	CONVIVIENTE	13,7%	1,9	10,3 ; 17,9	2,43	14,1
	SEPARADO	10,5%	1,3	8,2 ; 13,3	1,36	12,3
	DIVORCIADO	1,7%	0,5	1,0 ; 3,0	1,11	28,9
	VIUDO	6,4%	1,1	4,6 ; 8,8	1,45	16,6
	CASADO	39,9%	2,7	34,6 ; 45,3	2,38	6,8
	SOLTERO	27,9%	2,6	23,2 ; 33,2	2,50	9,2
ESTADO CIVIL (LIMA NORTE)	CONVIVIENTE	27,0%	2,0	23,2 ; 31,2	2,45	7,5
	SEPARADO	12,2%	1,2	10,0 ; 14,8	1,63	10,0
	DIVORCIADO	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,51	41,7
	VIUDO	5,2%	0,8	3,8 ; 7,0	1,65	16,0
	CASADO	27,6%	1,8	24,2 ; 31,2	1,91	5,6
	SOLTERO	27,4%	2,1	23,5 ; 31,6	2,53	7,5
ESTADO CIVIL (LIMA ESTE)	CONVIVIENTE	32,0%	1,6	28,9 ; 35,2	1,31	5,0
	SEPARADO	10,4%	0,9	8,7 ; 12,3	0,99	8,9
	DIVORCIADO	0,5%	0,1	0,3 ; 0,9	0,49	30,8
	VIUDO	3,7%	0,6	2,7 ; 4,9	0,96	15,2
	CASADO	27,2%	1,5	24,3 ; 30,2	1,27	5,6
	SOLTERO	26,4%	1,4	23,7 ; 29,2	1,09	5,3
ESTADO CIVIL (LIMA SUR)	CONVIVIENTE	24,8%	1,8	21,5 ; 28,4	1,56	7,2
	SEPARADO	9,0%	0,9	7,4 ; 11,0	0,94	10,2
	DIVORCIADO	1,4%	0,4	0,8 ; 2,3	0,85	25,7
	VIUDO	4,8%	0,7	3,5 ; 6,4	1,09	15,4
	CASADO	31,6%	1,8	28,2 ; 35,2	1,32	5,6
	SOLTERO	28,5%	1,6	25,5 ; 31,7	1,13	5,5
ESTADO CIVIL (CALLAO)	CONVIVIENTE	24,8%	2,0	21,0 ; 29,0	1,05	8,2
	SEPARADO	9,6%	1,3	7,3 ; 12,5	0,96	13,7
	DIVORCIADO	0,5%	0,3	0,2 ; 1,3	0,57	46,6
	VIUDO	6,3%	1,1	4,5 ; 8,8	0,96	17,2
	CASADO	36,5%	2,5	31,7 ; 41,6	1,33	6,9
	SOLTERO	22,2%	2,3	18,1 ; 27,0	1,44	10,2
TRABAJÓ LA SEMANA ANTERIOR (PREVALENCIA)	TOTAL	63,7%	0,9	61,9 ; 65,4	1,59	1,4
	LIMA CENTRO	61,9%	2,6	56,6 ; 67,0	2,29	4,3
	LIMA NORTE	62,7%	1,9	59,1 ; 66,5	1,82	3,0
	LIMA ESTE	64,8%	1,5	61,8 ; 67,6	1,05	2,3
	LIMA SUR	67,0%	1,8	63,4 ; 70,5	1,39	2,7
	CALLAO	59,4%	2,6	54,2 ; 64,5	1,37	4,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ESTÁ BUSCANDO TRABAJO (PREVALENCIA)	TOTAL	2,3%	0,3	1,8 ; 2,9	1,49	12,0
	LIMA CENTRO	1,3%	0,4	0,7 ; 2,6	1,20	34,3
	LIMA NORTE	3,0%	0,7	1,9 ; 4,6	1,80	22,2
	LIMA ESTE	1,7%	0,4	1,0 ; 2,7	1,15	25,1
	LIMA SUR	2,7%	0,6	1,7 ; 4,2	1,34	23,0
	CALLAO	2,5%	0,9	1,3 ; 5,0	1,55	35,3
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL PERSONAL (TOTAL)	< DE 300	11,2%	0,7	9,9 ; 12,6	1,51	6,2
	301 A 600	18,1%	0,8	16,5 ; 19,8	1,46	4,6
	601A 1 200	44,1%	1,2	41,8 ; 46,4	1,78	2,7
	> DE 1 200	26,6%	1,2	24,5 ; 29,0	2,11	4,3
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL PERSONAL (LIMA CENTRO)	< DE 300	4,8%	1,3	2,8 ; 8,2	2,16	27,3
	301 A 600	16,4%	2,3	12,3 ; 21,4	2,23	14,1
	601A 1 200	32,6%	3,3	26,6 ; 39,3	2,76	10,0
	> DE 1 200	46,2%	3,7	39,0 ; 53,5	3,13	8,0
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL PERSONAL (LIMA NORTE)	< DE 300	12,3%	1,7	9,4 ; 16,0	2,28	13,6
	301 A 600	19,9%	1,9	16,5 ; 23,9	1,94	9,5
	601A 1 200	46,8%	2,6	41,8 ; 51,9	2,35	5,5
	> DE 1 200	21,0%	2,1	17,2 ; 25,4	2,31	10,0
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL PERSONAL (LIMA ESTE)	< DE 300	12,4%	1,2	10,3 ; 14,9	0,92	9,5
	301 A 600	20,7%	1,4	18,0 ; 23,6	0,89	6,9
	601A 1 200	47,7%	1,7	44,3 ; 51,0	0,85	3,6
	> DE 1 200	19,3%	1,7	16,2 ; 22,8	1,31	8,7
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL PERSONAL (LIMA SUR)	< DE 300	13,9%	1,4	11,3 ; 16,9	1,12	10,2
	301 A 600	15,0%	1,3	12,5 ; 17,8	0,95	9,0
	601A 1 200	45,8%	2,3	41,3 ; 50,4	1,44	5,1
	> DE 1 200	25,3%	2,4	21,0 ; 30,2	1,97	9,3
PROMEDIO DE INGRESO MENSUAL PERSONAL (CALLAO)	< DE 300	10,9%	2,0	7,5 ; 15,7	1,19	18,7
	301 A 600	16,4%	2,3	12,4 ; 21,4	1,04	13,8
	601A 1 200	45,8%	3,6	38,8 ; 53,0	1,48	8,0
	> DE 1 200	26,8%	3,3	20,8 ; 33,9	1,58	12,5
SALUD MENTAL DEL ADULTO						
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL PAÍS (TOTAL)	DESEMPLEO	16,0%	0,7	14,7 ; 17,4	1,54	4,3
	CORRUPCIÓN	17,5%	0,7	16,1 ; 19,0	1,63	4,2
	VIOLENCIA	11,6%	0,6	10,6 ; 12,8	1,35	4,8
	POBREZA	15,7%	0,7	14,3 ; 17,1	1,78	4,6
	FALTA DE CONFIANZA	1,4%	0,2	1,0 ; 1,8	1,42	15,2
	FALTA DE LIDERAZGO	0,8%	0,2	0,5 ; 1,1	1,41	20,5
	INESTABILIDAD POLÍTICA	1,9%	0,3	1,5 ; 2,5	1,48	13,0
	DELINCUENCIA	20,6%	0,8	19,2 ; 22,1	1,54	3,7
	TERRORISMO	1,0%	0,2	0,8 ; 1,4	1,14	15,6
	NARCOTRÁFICO	0,5%	0,1	0,3 ; 0,7	0,86	19,7
	MANEJO ECONÓMICO	2,3%	0,3	1,8 ; 2,9	1,45	11,9
	FALTA DE VALORES	7,6%	0,5	6,7 ; 8,7	1,68	6,8
	OTRO	2,6%	0,3	2,1 ; 3,2	1,54	11,4
	DESEMPLEO	10,6%	2,0	7,4 ; 15,1	3,08	18,4
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL PAÍS (LIMA CENTRO)	CORRUPCIÓN	24,5%	2,1	20,6 ; 28,9	1,86	8,6
	VIOLENCIA	11,5%	1,4	9,1 ; 14,4	1,39	11,8
	POBREZA	13,8%	1,7	10,8 ; 17,5	1,90	12,4
	FALTA DE CONFIANZA	0,8%	0,4	0,3 ; 2,0	1,32	45,8
	FALTA DE LIDERAZGO	1,3%	0,5	0,6 ; 2,8	1,57	39,3
	INESTABILIDAD POLÍTICA	2,7%	0,9	1,4 ; 5,1	2,28	32,6
	DELINCUENCIA	17,2%	1,9	13,7 ; 21,3	1,99	11,2
	TERRORISMO	1,3%	0,4	0,7 ; 2,5	1,13	33,5
	NARCOTRÁFICO	0,8%	0,3	0,3 ; 1,8	1,11	43,1
	MANEJO ECONÓMICO	1,8%	0,6	1,0 ; 3,5	1,49	32,1
	FALTA DE VALORES	9,4%	1,4	6,9 ; 12,6	1,86	15,3
	OTRO	4,0%	1,0	2,4 ; 6,6	2,12	25,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL PAÍS (LIMA NORTE)	DESEMPLEO	18,2%	1,5	15,5 ; 21,2	1,69	8,0
	CORRUPCIÓN	16,7%	1,6	13,9 ; 20,0	2,08	9,3
	VIOLENCIA	11,2%	1,2	9,0 ; 13,9	1,84	11,1
	POBREZA	18,7%	1,6	15,8 ; 21,9	1,93	8,4
	FALTA DE CONFIANZA	2,5%	0,6	1,5 ; 4,0	1,83	24,8
	FALTA DE LIDERAZGO	0,8%	0,4	0,4 ; 2,0	1,96	44,2
	INESTABILIDAD POLÍTICA	1,6%	0,5	0,9 ; 2,8	1,57	28,5
	DELINCUENCIA	18,3%	1,5	15,6 ; 21,5	1,79	8,2
	TERRORISMO	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,36	39,6
	NARCOTRÁFICO	0,3%	0,1	0,1 ; 0,7	0,83	51,8
	MANEJO ECONÓMICO	2,4%	0,6	1,5 ; 3,9	1,63	23,4
	FALTA DE VALORES	6,5%	1,1	4,6 ; 9,0	2,39	17,1
	OTRO	1,4%	0,4	0,8 ; 2,6	1,71	31,6
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL PAÍS (LIMA ESTE)	DESEMPLEO	17,1%	1,1	15,1 ; 19,3	0,89	6,3
	CORRUPCIÓN	17,8%	1,3	15,5 ; 20,4	1,19	7,1
	VIOLENCIA	12,5%	1,0	10,7 ; 14,5	0,91	7,7
	POBREZA	11,4%	1,1	9,5 ; 13,7	1,20	9,2
	FALTA DE CONFIANZA	0,9%	0,3	0,5 ; 1,8	1,08	32,3
	FALTA DE LIDERAZGO	0,3%	0,1	0,1 ; 0,7	0,63	46,6
	INESTABILIDAD POLÍTICA	1,6%	0,4	0,9 ; 2,7	1,25	26,9
	DELINCUENCIA	26,1%	1,5	23,2 ; 29,3	1,33	5,9
	TERRORISMO	0,6%	0,2	0,3 ; 1,2	0,77	34,2
	NARCOTRÁFICO	0,4%	0,2	0,2 ; 0,9	0,86	45,6
	MANEJO ECONÓMICO	2,2%	0,5	1,4 ; 3,4	1,20	22,3
	FALTA DE VALORES	6,5%	0,8	5,1 ; 8,4	1,22	12,7
	OTRO	1,9%	0,4	1,2 ; 3,0	1,09	22,7
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL PAÍS (LIMA SUR)	DESEMPLEO	16,1%	1,5	13,4 ; 19,2	1,45	9,0
	CORRUPCIÓN	14,5%	1,4	12,0 ; 17,5	1,44	9,6
	VIOLENCIA	11,3%	1,2	9,1 ; 13,9	1,38	10,8
	POBREZA	20,4%	1,8	17,1 ; 24,2	1,84	8,8
	FALTA DE CONFIANZA	1,3%	0,3	0,8 ; 2,2	0,84	26,1
	FALTA DE LIDERAZGO	0,5%	0,2	0,2 ; 1,3	1,23	53,2
	INESTABILIDAD POLÍTICA	2,4%	0,5	1,6 ; 3,6	0,96	20,8
	DELINCUENCIA	16,3%	1,3	13,9 ; 19,1	1,41	8,8
	TERRORISMO	1,8%	0,5	1,1 ; 3,0	1,12	25,8
	NARCOTRÁFICO	0,4%	0,2	0,2 ; 1,0	0,68	41,6
	MANEJO ECONÓMICO	1,9%	0,6	1,1 ; 3,3	1,52	29,3
	FALTA DE VALORES	9,1%	1,1	7,1 ; 11,6	1,46	12,6
	OTRO	3,5%	0,7	2,4 ; 5,2	1,28	19,5
PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS EN EL PAÍS (CALLAO)	DESEMPLEO	16,3%	1,8	13,0 ; 20,2	1,16	11,1
	CORRUPCIÓN	13,3%	1,7	10,2 ; 17,1	1,27	13,1
	VIOLENCIA	11,7%	1,5	9,0 ; 15,0	1,06	13,0
	POBREZA	11,5%	1,9	8,3 ; 15,8	1,65	16,3
	FALTA DE CONFIANZA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,6	0,76	53,1
	FALTA DE LIDERAZGO	1,3%	0,5	0,6 ; 2,6	0,78	35,2
	INESTABILIDAD POLÍTICA	1,4%	0,5	0,7 ; 2,9	0,91	36,3
	DELINCUENCIA	27,4%	2,4	22,9 ; 32,4	1,41	8,8
	TERRORISMO	1,0%	0,5	0,3 ; 2,8	1,35	53,8
	NARCOTRÁFICO	1,1%	0,4	0,5 ; 2,3	0,76	38,3
	MANEJO ECONÓMICO	3,4%	1,0	1,9 ; 5,9	1,37	28,5
	FALTA DE VALORES	7,5%	1,3	5,3 ; 10,4	1,12	17,0
	OTRO	2,8%	0,8	1,5 ; 5,0	1,25	30,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SENTIMIENTOS FRENTE A PROBLEMAS NACIONALES (TOTAL)	INDIFERENCIA	2,7%	0,3	2,2 ; 3,3	1,39	10,7
	RESIGNACIÓN	1,5%	0,2	1,2 ; 2,0	1,18	13,2
	DESILUSIÓN	7,9%	0,5	6,9 ; 9,0	1,61	6,5
	AMARGURA	6,2%	0,5	5,3 ; 7,2	1,78	7,8
	RABIA	5,3%	0,4	4,5 ; 6,1	1,56	8,0
	CÓLERA	13,1%	0,6	11,9 ; 14,4	1,52	4,8
	PENA, TRISTEZA O DEPRESIÓN	16,6%	0,7	15,2 ; 18,0	1,66	4,3
	PREOCUPACIÓN	19,6%	0,7	18,2 ; 21,1	1,54	3,8
	IMPOTENCIA	10,1%	0,5	9,1 ; 11,2	1,46	5,4
	FRUSTRACIÓN	2,9%	0,3	2,4 ; 3,5	1,32	10,1
	DESESPERACIÓN O ANGUSTIA	0,6%	0,1	0,4 ; 0,9	1,27	21,5
	INDIGNACIÓN	8,4%	0,5	7,4 ; 9,5	1,60	6,3
	MIEDO O TEMOR	3,9%	0,4	3,2 ; 4,7	1,60	9,5
SENTIMIENTOS FRENTE A PROBLEMAS NACIONALES (LIMA CENTRO)	OTRO	0,6%	0,1	0,4 ; 0,9	1,62	25,2
	INDIFERENCIA	1,3%	0,4	0,7 ; 2,5	1,18	34,4
	RESIGNACIÓN	2,2%	0,7	1,2 ; 4,0	1,64	31,0
	DESILUSIÓN	8,7%	1,3	6,4 ; 11,6	1,63	15,0
	AMARGURA	8,7%	1,7	5,9 ; 12,7	2,82	19,7
	RABIA	6,3%	1,2	4,3 ; 9,1	1,93	19,4
	CÓLERA	10,0%	1,5	7,4 ; 13,4	1,92	15,0
	PENA, TRISTEZA O DEPRESIÓN	11,8%	1,5	9,1 ; 15,0	1,66	12,7
	PREOCUPACIÓN	23,0%	2,0	19,4 ; 27,1	1,68	8,6
	IMPOTENCIA	10,7%	1,5	8,0 ; 14,2	1,90	14,4
	FRUSTRACIÓN	3,4%	0,8	2,1 ; 5,4	1,49	23,5
	DESESPERACIÓN O ANGUSTIA	0,3%	0,3	0,1 ; 1,7	1,85	86,5
	INDIGNACIÓN	8,6%	1,4	6,2 ; 11,7	1,89	16,2
	MIEDO O TEMOR	3,4%	1,0	2,0 ; 5,9	2,20	28,4
SENTIMIENTOS FRENTE A PROBLEMAS NACIONALES (LIMA NORTE)	OTRO	0,2%	0,1	0,0 ; 0,8	0,77	70,9
	INDIFERENCIA	4,0%	0,8	2,6 ; 5,9	1,99	20,3
	RESIGNACIÓN	0,8%	0,3	0,4 ; 1,5	1,08	33,6
	DESILUSIÓN	9,1%	1,2	7,0 ; 11,7	2,01	13,0
	AMARGURA	5,7%	0,9	4,1 ; 7,7	1,78	15,9
	RABIA	5,3%	1,0	3,7 ; 7,5	2,19	18,3
	CÓLERA	10,6%	1,3	8,3 ; 13,4	2,08	12,2
	PENA, TRISTEZA O DEPRESIÓN	15,8%	1,4	13,2 ; 18,8	1,79	9,0
	PREOCUPACIÓN	19,0%	1,6	16,0 ; 22,3	1,98	8,5
	IMPOTENCIA	9,9%	1,2	7,8 ; 12,6	1,97	12,3
	FRUSTRACIÓN	2,3%	0,6	1,4 ; 3,8	1,81	25,3
	DESESPERACIÓN O ANGUSTIA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,5	1,61	47,7
	INDIGNACIÓN	10,5%	1,3	8,2 ; 13,2	2,04	12,2
	MIEDO O TEMOR	6,0%	0,9	4,4 ; 8,2	1,85	15,6
SENTIMIENTOS FRENTE A PROBLEMAS NACIONALES (LIMA ESTE)	OTRO	0,5%	0,4	0,1 ; 2,2	3,43	79,9
	INDIFERENCIA	3,2%	0,5	2,3 ; 4,5	0,98	16,5
	RESIGNACIÓN	1,8%	0,4	1,2 ; 2,8	0,99	22,2
	DESILUSIÓN	5,4%	0,7	4,2 ; 7,0	1,09	13,2
	AMARGURA	4,6%	0,7	3,5 ; 6,2	1,11	14,6
	RABIA	5,3%	0,7	4,1 ; 6,9	1,07	13,3
	CÓLERA	18,8%	1,3	16,4 ; 21,5	1,15	6,8
	PENA, TRISTEZA O DEPRESIÓN	18,8%	1,3	16,4 ; 21,4	1,11	6,7
	PREOCUPACIÓN	18,3%	1,3	16,0 ; 21,0	1,18	7,0
	IMPOTENCIA	10,1%	0,9	8,4 ; 12,1	1,05	9,3
	FRUSTRACIÓN	2,6%	0,5	1,8 ; 3,7	0,90	17,7
	DESESPERACIÓN O ANGUSTIA	0,6%	0,3	0,3 ; 1,5	1,39	45,4
	INDIGNACIÓN	6,4%	0,8	5,0 ; 8,2	1,12	12,3
	MIEDO O TEMOR	2,5%	0,4	1,8 ; 3,5	0,85	17,5
	OTRO	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	1,47	56,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SENTIMIENTOS FRENTE A PROBLEMAS NACIONALES (LIMA SUR)	INDIFERENCIA	2,4%	0,5	1,6 ; 3,6	1,03	21,3
	RESIGNACIÓN	1,3%	0,4	0,7 ; 2,4	1,12	30,3
	DESILUSIÓN	8,1%	1,0	6,3 ; 10,4	1,29	12,6
	AMARGURA	6,4%	0,9	4,8 ; 8,5	1,27	14,2
	RABIA	4,4%	0,8	3,1 ; 6,2	1,33	17,8
	CÓLERA	11,8%	1,2	9,7 ; 14,4	1,23	10,0
	PENA, TRISTEZA O DEPRESIÓN	19,6%	1,9	16,0 ; 23,7	2,21	9,9
	PREOCUPACIÓN	20,0%	1,5	17,2 ; 23,1	1,31	7,6
	IMPOTENCIA	9,8%	1,0	8,0 ; 11,9	1,06	10,3
	FRUSTRACIÓN	3,3%	0,6	2,3 ; 4,8	1,15	19,0
	DESESPERACIÓN O ANGUSTIA	1,0%	0,3	0,6 ; 1,9	0,93	31,3
	INDIGNACIÓN	8,0%	1,0	6,3 ; 10,1	1,14	12,0
	MIEDO O TEMOR	2,0%	0,5	1,3 ; 3,2	0,96	22,5
	OTRO	1,0%	0,3	0,5 ; 1,8	0,95	32,2
SENTIMIENTOS FRENTE A PROBLEMAS NACIONALES (CALLAO)	INDIFERENCIA	0,9%	0,4	0,4 ; 2,1	0,80	42,5
	RESIGNACIÓN	1,9%	0,6	1,0 ; 3,5	0,93	31,9
	DESILUSIÓN	8,8%	1,8	5,9 ; 12,9	1,81	19,8
	AMARGURA	6,9%	1,4	4,5 ; 10,3	1,55	21,1
	RABIA	5,2%	0,9	3,6 ; 7,4	0,85	18,0
	CÓLERA	13,5%	1,7	10,4 ; 17,3	1,23	12,9
	PENA, TRISTEZA O DEPRESIÓN	15,4%	1,8	12,2 ; 19,4	1,20	11,8
	PREOCUPACIÓN	18,1%	2,0	14,6 ; 22,3	1,24	10,9
	IMPOTENCIA	10,0%	1,4	7,5 ; 13,2	1,10	14,5
	FRUSTRACIÓN	3,0%	0,9	1,7 ; 5,3	1,25	29,0
	DESESPERACIÓN O ANGUSTIA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,1	0,52	53,0
	INDIGNACIÓN	8,4%	1,5	5,9 ; 11,8	1,35	17,6
	MIEDO O TEMOR	5,9%	1,3	3,8 ; 8,9	1,38	21,6
	OTRO	1,0%	0,5	0,4 ; 2,9	1,34	51,6
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES FEMENINAS (TOTAL)	NADA O POCO	40,7%	1,0	38,8 ; 42,6	1,72	2,4
	REGULAR	37,3%	0,9	35,5 ; 39,1	1,63	2,5
	BASTANTE O MUCHO	22,0%	0,8	20,4 ; 23,7	1,77	3,8
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES FEMENINAS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	36,5%	2,9	31,1 ; 42,2	2,66	7,8
	REGULAR	43,3%	2,8	38,0 ; 48,8	2,33	6,3
	BASTANTE O MUCHO	20,2%	2,2	16,2 ; 24,8	2,26	10,9
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES FEMENINAS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	44,2%	2,0	40,2 ; 48,2	1,97	4,6
	REGULAR	34,5%	1,9	30,9 ; 38,3	1,84	5,5
	BASTANTE O MUCHO	21,3%	1,8	17,9 ; 25,2	2,38	8,7
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES FEMENINAS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	46,1%	1,6	42,9 ; 49,3	1,13	3,5
	REGULAR	35,3%	1,6	32,3 ; 38,5	1,19	4,5
	BASTANTE O MUCHO	18,6%	1,2	16,4 ; 21,1	1,02	6,5
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES FEMENINAS (LIMA SUR)	NADA O POCO	33,2%	1,8	29,7 ; 36,9	1,37	5,5
	REGULAR	38,5%	1,8	35,0 ; 42,2	1,26	4,7
	BASTANTE O MUCHO	28,2%	1,7	25,0 ; 31,7	1,31	6,1
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES FEMENINAS (CALLAO)	NADA O POCO	40,8%	2,7	35,6 ; 46,3	1,48	6,7
	REGULAR	36,6%	2,8	31,3 ; 42,3	1,62	7,7
	BASTANTE O MUCHO	22,5%	2,7	17,6 ; 28,3	2,00	12,1
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES MASCULINAS (TOTAL)	NADA O POCO	68,6%	0,9	66,9 ; 70,3	1,59	1,3
	REGULAR	24,1%	0,8	22,5 ; 25,7	1,60	3,4
	BASTANTE O MUCHO	7,3%	0,5	6,4 ; 8,4	1,76	7,1
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES MASCULINAS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	64,6%	2,5	59,5 ; 69,4	2,12	3,9
	REGULAR	29,6%	2,3	25,2 ; 34,4	2,00	7,9
	BASTANTE O MUCHO	5,8%	1,5	3,5 ; 9,6	3,18	26,0
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES MASCULINAS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	67,9%	1,9	64,0 ; 71,5	2,03	2,9
	REGULAR	23,5%	1,8	20,1 ; 27,3	2,19	7,8
	BASTANTE O MUCHO	8,6%	1,2	6,5 ; 11,3	2,17	14,0
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES MASCULINAS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	74,0%	1,5	71,1 ; 76,8	1,21	2,0
	REGULAR	20,2%	1,3	17,7 ; 22,9	1,20	6,6
	BASTANTE O MUCHO	5,8%	1,0	4,5 ; 7,5	1,12	13,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES MASCULINAS (LIMA SUR)	NADA O POCO	67,2%	1,7	63,7 ; 70,5	1,26	2,6
	REGULAR	24,5%	1,5	21,6 ; 27,6	1,19	6,3
	BASTANTE O MUCHO	8,4%	1,0	6,6 ; 10,6	1,25	12,2
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLICIALES MASCULINAS (CALLAO)	NADA O POCO	67,5%	2,2	63,2 ; 71,6	1,02	3,2
	REGULAR	24,6%	2,1	20,8 ; 28,9	1,11	8,4
	BASTANTE O MUCHO	7,8%	1,3	5,6 ; 10,8	1,15	16,8
CONFIANZA EN AUTORIDADES MILITARES (TOTAL)	NADA O POCO	61,2%	0,9	59,4 ; 63,0	1,54	1,5
	REGULAR	27,7%	0,8	26,0 ; 29,3	1,53	3,1
	BASTANTE O MUCHO	11,1%	0,6	10,0 ; 12,4	1,58	5,4
CONFIANZA EN AUTORIDADES MILITARES (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	60,4%	2,5	55,4 ; 65,1	1,90	4,1
	REGULAR	31,0%	2,4	26,5 ; 35,8	1,94	7,6
	BASTANTE O MUCHO	8,6%	1,5	6,1 ; 12,1	2,09	17,3
CONFIANZA EN AUTORIDADES MILITARES (LIMA NORTE)	NADA O POCO	61,8%	1,9	57,9 ; 65,5	1,81	3,1
	REGULAR	27,8%	1,8	24,4 ; 31,5	1,87	6,5
	BASTANTE O MUCHO	10,4%	1,3	8,1 ; 13,3	2,06	12,4
CONFIANZA EN AUTORIDADES MILITARES (LIMA ESTE)	NADA O POCO	64,0%	1,7	60,6 ; 67,3	1,29	1,6
	REGULAR	26,7%	1,5	23,8 ; 29,8	1,26	5,8
	BASTANTE O MUCHO	9,3%	0,9	7,7 ; 11,2	0,96	9,5
CONFIANZA EN AUTORIDADES MILITARES (LIMA SUR)	NADA O POCO	57,2%	1,8	53,5 ; 60,8	1,24	3,2
	REGULAR	26,0%	1,6	23,1 ; 29,2	1,15	6,1
	BASTANTE O MUCHO	16,8%	1,5	14,0 ; 19,9	1,44	9,0
CONFIANZA EN AUTORIDADES MILITARES (CALLAO)	NADA O POCO	62,5%	2,6	57,3 ; 67,5	1,37	4,2
	REGULAR	27,3%	2,4	22,9 ; 32,2	1,35	8,8
	BASTANTE O MUCHO	10,2%	1,6	7,5 ; 13,7	1,27	15,5
CONFIANZA EN RELIGIOSOS (TOTAL)	NADA O POCO	35,6%	0,9	33,8 ; 37,4	1,57	2,5
	REGULAR	32,6%	0,9	30,9 ; 34,3	1,52	2,7
	BASTANTE O MUCHO	31,8%	0,9	30,1 ; 33,6	1,62	2,8
CONFIANZA EN RELIGIOSOS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	34,0%	2,3	29,6 ; 38,6	1,79	6,8
	REGULAR	36,5%	2,6	31,5 ; 41,8	2,21	7,1
	BASTANTE O MUCHO	29,5%	2,5	24,9 ; 34,7	2,25	8,4
CONFIANZA EN RELIGIOSOS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	35,3%	1,8	31,8 ; 39,0	1,74	5,2
	REGULAR	32,1%	1,7	29,0 ; 35,5	1,49	5,2
	BASTANTE O MUCHO	32,6%	1,8	29,1 ; 36,3	1,80	5,6
CONFIANZA EN RELIGIOSOS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	39,3%	1,7	36,1 ; 42,6	1,23	4,2
	REGULAR	32,5%	1,4	29,8 ; 35,4	0,97	4,3
	BASTANTE O MUCHO	28,2%	1,6	25,0 ; 31,5	1,44	5,9
CONFIANZA EN RELIGIOSOS (LIMA SUR)	NADA O POCO	33,2%	1,8	29,7 ; 36,8	1,35	5,5
	REGULAR	28,6%	1,8	25,3 ; 32,2	1,37	6,1
	BASTANTE O MUCHO	38,2%	1,7	34,8 ; 41,7	1,17	4,6
CONFIANZA EN RELIGIOSOS (CALLAO)	NADA O POCO	35,3%	3,0	29,6 ; 41,4	1,90	8,6
	REGULAR	35,2%	3,0	29,5 ; 41,3	1,91	8,6
	BASTANTE O MUCHO	29,5%	2,6	24,7 ; 34,8	1,50	8,7
CONFIANZA EN MAESTROS (TOTAL)	NADA O POCO	26,5%	0,8	24,9 ; 28,1	1,45	3,0
	REGULAR	45,7%	0,9	43,9 ; 47,5	1,53	2,0
	BASTANTE O MUCHO	27,8%	0,9	26,1 ; 29,5	1,68	3,2
CONFIANZA EN MAESTROS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	25,2%	2,1	21,3 ; 29,6	1,80	8,4
	REGULAR	54,2%	2,7	48,8 ; 59,5	2,30	5,1
	BASTANTE O MUCHO	20,6%	2,1	16,9 ; 24,9	1,96	9,9
CONFIANZA EN MAESTROS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	27,5%	1,8	24,1 ; 31,1	1,88	6,5
	REGULAR	39,3%	2,0	35,4 ; 43,3	2,01	5,1
	BASTANTE O MUCHO	33,2%	2,2	29,1 ; 37,7	2,58	6,6
CONFIANZA EN MAESTROS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	28,5%	1,3	26,0 ; 31,2	0,94	4,7
	REGULAR	47,4%	1,6	44,3 ; 50,6	1,09	3,4
	BASTANTE O MUCHO	24,1%	1,3	21,5 ; 26,8	1,06	5,6
CONFIANZA EN MAESTROS (LIMA SUR)	NADA O POCO	24,3%	1,7	21,1 ; 27,9	1,49	7,1
	REGULAR	44,9%	1,7	41,5 ; 48,2	1,08	3,8
	BASTANTE O MUCHO	30,8%	1,6	27,7 ; 34,1	1,14	5,3
CONFIANZA EN MAESTROS (CALLAO)	NADA O POCO	25,7%	1,9	22,1 ; 29,7	0,94	7,6
	REGULAR	45,9%	2,4	41,3 ; 50,7	1,11	5,2
	BASTANTE O MUCHO	28,4%	2,4	23,8 ; 33,4	1,40	8,6

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONFIANZA EN MÉDICOS (TOTAL)	NADA O POCO	16,5%	0,7	15,2 ; 17,9	1,51	4,1
	REGULAR	40,4%	0,9	38,6 ; 42,3	1,64	2,3
	BASTANTE O MUCHO	43,1%	1,0	41,1 ; 45,0	1,74	2,3
CONFIANZA EN MÉDICOS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	14,9%	1,7	11,9 ; 18,6	1,74	11,4
	REGULAR	45,8%	2,6	40,7 ; 50,9	2,10	5,7
	BASTANTE O MUCHO	39,3%	2,7	34,1 ; 44,8	2,42	7,0
CONFIANZA EN MÉDICOS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	18,5%	1,6	15,6 ; 21,8	1,94	8,5
	REGULAR	36,5%	2,1	32,5 ; 40,7	2,24	5,7
	BASTANTE O MUCHO	44,9%	2,2	40,8 ; 49,2	2,22	4,8
CONFIANZA EN MÉDICOS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	16,3%	1,2	14,1 ; 18,7	1,07	7,1
	REGULAR	43,8%	1,5	40,8 ; 46,8	1,01	3,5
	BASTANTE O MUCHO	40,0%	1,6	36,8 ; 43,2	1,17	4,0
CONFIANZA EN MÉDICOS (LIMA SUR)	NADA O POCO	15,4%	1,4	12,8 ; 18,4	1,42	9,2
	REGULAR	36,6%	1,9	33,0 ; 40,5	1,46	5,2
	BASTANTE O MUCHO	48,0%	2,0	44,1 ; 51,9	1,45	4,1
CONFIANZA EN MÉDICOS (CALLAO)	NADA O POCO	17,1%	1,9	13,7 ; 21,1	1,19	11,0
	REGULAR	40,9%	2,6	36,0 ; 46,0	1,29	6,2
	BASTANTE O MUCHO	41,9%	2,6	36,9 ; 47,2	1,37	6,3
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLÍTICAS (TOTAL)	NADA O POCO	90,4%	0,6	89,2 ; 91,4	1,59	0,6
	REGULAR	8,2%	0,5	7,3 ; 9,3	1,44	6,0
	BASTANTE O MUCHO	1,4%	0,3	1,0 ; 2,0	2,10	18,5
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLÍTICAS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	91,6%	1,3	88,6 ; 93,9	1,81	1,5
	REGULAR	7,1%	1,3	4,9 ; 10,0	1,86	17,9
	BASTANTE O MUCHO	1,3%	0,6	0,6 ; 3,0	1,82	42,2
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLÍTICAS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	90,1%	1,3	87,3 ; 92,3	2,09	1,4
	REGULAR	7,6%	1,0	5,8 ; 9,8	1,74	13,4
	BASTANTE O MUCHO	2,3%	0,8	1,2 ; 4,4	2,95	32,4
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLÍTICAS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	90,7%	1,0	88,5 ; 92,6	1,36	1,1
	REGULAR	8,6%	1,0	6,9 ; 10,7	1,27	11,3
	BASTANTE O MUCHO	0,7%	0,3	0,3 ; 1,5	1,07	37,6
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLÍTICAS (LIMA SUR)	NADA O POCO	88,9%	1,1	86,5 ; 91,0	1,22	1,3
	REGULAR	9,7%	1,0	7,9 ; 11,9	1,10	10,6
	BASTANTE O MUCHO	1,4%	0,4	0,7 ; 2,5	1,17	30,5
CONFIANZA EN AUTORIDADES POLÍTICAS (CALLAO)	NADA O POCO	91,2%	1,5	87,8 ; 93,7	1,29	1,6
	REGULAR	8,2%	1,4	5,8 ; 11,5	1,30	17,5
	BASTANTE O MUCHO	0,6%	0,3	0,2 ; 1,7	0,85	54,8
CONFIANZA EN LÍDERES DE SINDICATOS (TOTAL)	NADA O POCO	56,5%	4,9	46,8 ; 65,8	1,53	8,6
	REGULAR	27,4%	4,5	19,4 ; 37,1	1,63	16,6
	BASTANTE O MUCHO	16,1%	3,4	10,5 ; 23,8	1,31	20,9
CONFIANZA EN LÍDERES DE SINDICATOS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	27,5%	17,3	6,5 ; 67,5	1,32	62,7
	REGULAR	63,3%	18,5	26,5 ; 89,2	1,31	29,3
	BASTANTE O MUCHO	9,2%	9,1	1,2 ; 46,3	0,88	99,1
CONFIANZA EN LÍDERES DE SINDICATOS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	60,8%	11,5	37,7 ; 80,0	2,34	18,8
	REGULAR	33,3%	11,4	15,4 ; 57,7	2,47	34,2
	BASTANTE O MUCHO	5,9%	3,6	1,7 ; 18,3	0,98	60,7
CONFIANZA EN LÍDERES DE SINDICATOS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	57,8%	8,1	41,6 ; 72,4	1,23	14,0
	REGULAR	22,7%	6,9	12,0 ; 38,8	1,22	30,2
	BASTANTE O MUCHO	19,5%	6,5	9,6 ; 35,4	1,25	33,6
CONFIANZA EN LÍDERES DE SINDICATOS (LIMA SUR)	NADA O POCO	51,0%	8,1	35,6 ; 66,3	0,92	15,8
	REGULAR	24,8%	8,0	12,4 ; 43,3	1,21	32,3
	BASTANTE O MUCHO	24,2%	7,9	12,0 ; 42,7	1,21	32,7
CONFIANZA EN LÍDERES DE SINDICATOS (CALLAO)	NADA O POCO	65,0%	11,4	40,9 ; 83,2	1,43	17,6
	REGULAR	17,0%	7,3	6,9 ; 36,1	0,94	42,9
	BASTANTE O MUCHO	18,1%	9,7	5,7 ; 44,5	1,60	53,9
CONFIANZA EN LÍDERES DE SU COMUNIDAD/ ALCALDES (TOTAL)	NADA O POCO	65,7%	1,0	63,7 ; 67,7	2,05	1,6
	REGULAR	25,5%	0,8	23,8 ; 27,2	1,66	3,3
	BASTANTE O MUCHO	8,8%	0,6	7,6 ; 10,2	2,27	7,3
CONFIANZA EN LÍDERES DE SU COMUNIDAD/ ALCALDES (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	58,1%	3,1	51,9 ; 64,1	3,05	5,4
	REGULAR	30,9%	2,5	26,2 ; 36,1	2,24	8,1
	BASTANTE O MUCHO	10,9%	2,1	7,4 ; 15,8	3,41	19,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONFIANZA EN LÍDERES DE SU COMUNIDAD/ ALCALDES (LIMA NORTE)	NADA O POCO	75,0%	1,9	71,1 ; 78,1	2,31	2,6
	REGULAR	19,5%	1,8	16,2 ; 23,1	2,31	9,1
	BASTANTE O MUCHO	5,5%	0,9	4,0 ; 7,6	1,91	16,7
CONFIANZA EN LÍDERES DE SU COMUNIDAD/ ALCALDES (LIMA ESTE)	NADA O POCO	69,2%	1,6	66,1 ; 72,2	1,22	2,2
	REGULAR	25,9%	1,4	23,2 ; 28,8	1,12	5,5
	BASTANTE O MUCHO	4,9%	0,7	3,6 ; 6,5	1,22	14,8
CONFIANZA EN LÍDERES DE SU COMUNIDAD/ ALCALDES (LIMA SUR)	NADA O POCO	62,9%	2,4	58,1 ; 67,4	2,22	3,8
	REGULAR	22,7%	1,6	19,7 ; 26,0	1,34	7,1
	BASTANTE O MUCHO	14,5%	1,9	11,1 ; 18,5	2,60	13,0
CONFIANZA EN LÍDERES DE SU COMUNIDAD/ ALCALDES (CALLAO)	NADA O POCO	52,2%	2,6	47,0 ; 57,4	1,33	5,1
	REGULAR	36,0%	2,3	31,5 ; 40,7	1,13	6,5
	BASTANTE O MUCHO	11,7%	1,7	8,8 ; 15,5	1,33	14,5
CONFIANZA EN SU JEFE DE TRABAJO (TOTAL)	NADA O POCO	24,2%	1,3	21,8 ; 26,8	1,47	5,2
	REGULAR	38,7%	1,4	36,0 ; 41,5	1,46	3,7
	BASTANTE O MUCHO	37,1%	1,5	34,3 ; 40,0	1,55	3,9
CONFIANZA EN SU JEFE DE TRABAJO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	21,3%	3,2	15,7 ; 28,1	1,53	14,8
	REGULAR	41,4%	4,2	33,5 ; 49,7	1,84	10,1
	BASTANTE O MUCHO	37,3%	4,4	29,1 ; 46,3	2,15	11,9
CONFIANZA EN SU JEFE DE TRABAJO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	30,9%	3,3	24,9 ; 37,6	2,20	10,5
	REGULAR	37,5%	3,5	30,8 ; 44,6	2,36	9,4
	BASTANTE O MUCHO	31,6%	3,2	25,7 ; 38,2	2,08	10,1
CONFIANZA EN SU JEFE DE TRABAJO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	22,0%	1,7	18,8 ; 25,6	0,77	7,8
	REGULAR	44,3%	2,2	40,1 ; 48,6	0,85	4,9
	BASTANTE O MUCHO	33,7%	2,3	29,4 ; 38,3	1,02	6,7
CONFIANZA EN SU JEFE DE TRABAJO (LIMA SUR)	NADA O POCO	19,5%	2,2	15,4 ; 24,2	1,22	11,4
	REGULAR	31,5%	2,5	26,9 ; 36,6	1,10	7,9
	BASTANTE O MUCHO	49,0%	2,9	43,3 ; 54,7	1,33	6,0
CONFIANZA EN SU JEFE DE TRABAJO (CALLAO)	NADA O POCO	27,8%	3,6	21,3 ; 35,3	1,14	12,9
	REGULAR	39,5%	3,7	32,4 ; 47,0	1,04	9,5
	BASTANTE O MUCHO	32,7%	4,0	25,5 ; 40,9	1,26	12,1
CONFIANZA EN SUS VECINOS (TOTAL)	NADA O POCO	57,5%	1,0	55,5 ; 59,4	1,73	1,7
	REGULAR	32,0%	0,9	30,3 ; 33,8	1,61	2,8
	BASTANTE O MUCHO	10,5%	0,6	9,4 ; 11,7	1,51	5,4
CONFIANZA EN SUS VECINOS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	54,8%	2,7	49,5 ; 59,9	2,18	4,9
	REGULAR	32,0%	2,4	27,5 ; 36,9	2,02	7,5
	BASTANTE O MUCHO	13,2%	1,8	10,1 ; 17,2	2,16	13,7
CONFIANZA EN SUS VECINOS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	59,7%	2,2	55,2 ; 63,9	2,39	3,7
	REGULAR	31,4%	2,1	27,5 ; 35,5	2,31	6,6
	BASTANTE O MUCHO	9,0%	1,1	7,0 ; 11,4	1,78	12,4
CONFIANZA EN SUS VECINOS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	59,0%	1,6	55,7 ; 62,2	1,21	2,8
	REGULAR	32,1%	1,5	29,3 ; 35,1	1,07	4,6
	BASTANTE O MUCHO	8,9%	0,9	7,4 ; 10,8	1,01	9,8
CONFIANZA EN SUS VECINOS (LIMA SUR)	NADA O POCO	54,8%	1,9	51,0 ; 58,5	1,32	3,5
	REGULAR	31,7%	1,7	28,5 ; 35,0	1,17	5,3
	BASTANTE O MUCHO	13,6%	1,3	11,3 ; 16,2	1,24	9,3
CONFIANZA EN SUS VECINOS (CALLAO)	NADA O POCO	58,1%	2,5	53,1 ; 63,0	1,27	4,4
	REGULAR	34,4%	2,4	29,8 ; 39,3	1,26	7,1
	BASTANTE O MUCHO	7,5%	1,2	5,4 ; 10,3	1,05	16,5
CONFIANZA EN PERIODISTAS (TOTAL)	NADA O POCO	60,7%	1,0	58,7 ; 62,6	1,84	1,6
	REGULAR	32,2%	0,9	30,4 ; 34,0	1,70	2,9
	BASTANTE O MUCHO	7,1%	0,5	6,2 ; 8,2	1,55	6,8
CONFIANZA EN PERIODISTAS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	57,7%	2,7	52,4 ; 62,8	2,22	4,6
	REGULAR	35,3%	2,5	30,6 ; 40,3	2,07	7,1
	BASTANTE O MUCHO	7,0%	1,3	4,9 ; 10,0	1,90	18,2
CONFIANZA EN PERIODISTAS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	66,7%	2,2	62,3 ; 70,9	2,55	3,3
	REGULAR	26,4%	1,9	22,9 ; 30,2	2,12	7,1
	BASTANTE O MUCHO	6,9%	1,1	5,0 ; 9,4	2,29	16,2
CONFIANZA EN PERIODISTAS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	57,6%	1,7	54,2 ; 60,9	1,27	3,0
	REGULAR	35,3%	1,8	31,9 ; 38,8	1,44	5,0
	BASTANTE O MUCHO	7,1%	0,8	5,6 ; 8,8	1,07	11,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONFIANZA EN PERIODISTAS (LIMA SUR)	NADA O POCO	59,7%	1,9	55,9 ; 63,5	1,44	3,3
	REGULAR	33,1%	1,8	29,7 ; 36,7	1,29	5,4
	BASTANTE O MUCHO	7,2%	0,9	5,7 ; 9,0	1,00	11,9
CONFIANZA EN PERIODISTAS (CALLAO)	NADA O POCO	59,3%	2,7	53,9 ; 64,4	1,42	4,5
	REGULAR	32,6%	2,5	27,9 ; 37,6	1,36	7,7
	BASTANTE O MUCHO	8,1%	1,5	5,6 ; 11,6	1,44	18,4
CONFIANZA EN LOS JUECES (TOTAL)	NADA O POCO	72,6%	0,9	70,9 ; 74,3	1,64	1,2
	REGULAR	23,8%	0,8	22,2 ; 25,4	1,61	3,4
	BASTANTE O MUCHO	3,6%	0,3	3,0 ; 4,3	1,52	9,7
CONFIANZA EN LOS JUECES (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	68,0%	2,5	62,9 ; 72,6	2,12	3,6
	REGULAR	28,2%	2,2	24,1 ; 32,8	1,87	7,9
	BASTANTE O MUCHO	3,8%	1,0	2,3 ; 6,4	2,15	26,6
CONFIANZA EN LOS JUECES (LIMA NORTE)	NADA O POCO	77,2%	1,7	73,7 ; 80,4	1,94	2,2
	REGULAR	18,9%	1,7	15,8 ; 22,5	2,16	8,9
	BASTANTE O MUCHO	3,8%	0,8	2,5 ; 5,8	2,10	21,2
CONFIANZA EN LOS JUECES (LIMA ESTE)	NADA O POCO	71,8%	1,6	68,7 ; 74,8	1,28	2,2
	REGULAR	26,3%	1,5	23,5 ; 29,4	1,24	5,7
	BASTANTE O MUCHO	1,8%	0,4	1,2 ; 2,9	1,10	23,5
CONFIANZA EN LOS JUECES (LIMA SUR)	NADA O POCO	72,9%	1,7	69,5 ; 76,2	1,33	2,3
	REGULAR	22,2%	1,5	19,4 ; 25,3	1,19	6,8
	BASTANTE O MUCHO	4,9%	0,7	3,7 ; 6,4	0,87	13,8
CONFIANZA EN LOS JUECES (CALLAO)	NADA O POCO	70,0%	2,4	65,1 ; 74,5	1,30	3,4
	REGULAR	25,9%	2,2	21,8 ; 30,6	1,23	8,6
	BASTANTE O MUCHO	4,1%	0,9	2,6 ; 6,4	1,08	23,1
CONFIANZA EN LOS SERENOS (TOTAL)	NADA O POCO	62,8%	1,0	60,8 ; 64,9	2,03	1,7
	REGULAR	29,6%	1,0	27,8 ; 31,5	1,91	3,2
	BASTANTE O MUCHO	7,5%	0,5	6,5 ; 8,6	1,75	7,0
CONFIANZA EN LOS SERENOS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	56,4%	2,8	50,8 ; 61,9	2,48	5,0
	REGULAR	35,5%	2,8	30,2 ; 41,0	2,54	7,8
	BASTANTE O MUCHO	8,1%	1,5	5,7 ; 11,5	2,16	17,9
CONFIANZA EN LOS SERENOS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	67,2%	2,3	62,6 ; 71,5	2,72	3,4
	REGULAR	24,7%	2,1	20,8 ; 29,0	2,73	8,4
	BASTANTE O MUCHO	8,1%	1,2	6,0 ; 10,9	2,45	15,4
CONFIANZA EN LOS SERENOS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	61,4%	1,6	58,1 ; 64,5	1,20	2,7
	REGULAR	32,2%	1,5	29,3 ; 35,2	1,12	4,7
	BASTANTE O MUCHO	6,5%	0,8	5,0 ; 8,3	1,20	12,8
CONFIANZA EN LOS SERENOS (LIMA SUR)	NADA O POCO	65,0%	2,3	60,5 ; 69,3	2,00	3,5
	REGULAR	26,5%	1,8	23,1 ; 30,3	1,57	7,0
	BASTANTE O MUCHO	8,4%	1,0	6,6 ; 10,7	1,22	12,2
CONFIANZA EN LOS SERENOS (CALLAO)	NADA O POCO	61,7%	2,7	56,4 ; 66,8	1,42	4,3
	REGULAR	32,6%	2,3	28,2 ; 37,3	1,17	7,1
	BASTANTE O MUCHO	5,7%	1,2	3,8 ; 8,5	1,19	20,2
SENTIMIENTOS DE PROTECCIÓN DEL ESTADO (TOTAL)	NADA O POCO	72,4%	0,9	70,5 ; 74,2	1,87	1,3
	REGULAR	23,1%	0,8	21,5 ; 24,7	1,63	3,5
	BASTANTE O MUCHO	4,6%	0,4	3,8 ; 5,5	1,80	9,2
SENTIMIENTOS DE PROTECCIÓN DEL ESTADO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	72,4%	2,3	67,6 ; 76,7	2,09	3,2
	REGULAR	23,0%	2,3	18,8 ; 27,8	2,31	10,1
	BASTANTE O MUCHO	4,6%	1,0	3,1 ; 6,9	1,62	20,9
SENTIMIENTOS DE PROTECCIÓN DEL ESTADO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	69,8%	2,2	65,4 ; 74,0	2,70	3,1
	REGULAR	24,3%	1,7	21,1 ; 27,9	1,93	7,1
	BASTANTE O MUCHO	5,8%	1,2	3,9 ; 8,6	2,98	20,2
SENTIMIENTOS DE PROTECCIÓN DEL ESTADO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	74,7%	1,4	71,8 ; 77,4	1,16	1,9
	REGULAR	22,9%	1,4	20,2 ; 25,8	1,21	6,2
	BASTANTE O MUCHO	2,4%	0,4	1,7 ; 3,3	0,75	16,9
SENTIMIENTOS DE PROTECCIÓN DEL ESTADO (LIMA SUR)	NADA O POCO	74,4%	1,6	71,0 ; 77,4	1,26	2,2
	REGULAR	21,4%	1,5	18,6 ; 24,5	1,22	7,0
	BASTANTE O MUCHO	4,3%	0,7	3,1 ; 5,8	1,03	15,9
SENTIMIENTOS DE PROTECCIÓN DEL ESTADO (CALLAO)	NADA O POCO	69,6%	2,8	63,8 ; 74,8	1,79	4,0
	REGULAR	23,6%	2,3	19,4 ; 28,4	1,39	9,7
	BASTANTE O MUCHO	6,8%	1,2	4,7 ; 9,5	1,09	17,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA (TOTAL)	NADA O POCO	7,0%	0,5	6,2 ; 8,0	1,39	6,5
	REGULAR	11,8%	0,6	10,6 ; 13,0	1,59	5,2
	BASTANTE O MUCHO	81,2%	0,8	79,6 ; 82,7	1,76	1,0
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	7,4%	1,2	5,3 ; 10,3	1,73	16,8
	REGULAR	7,6%	1,3	5,4 ; 10,4	1,71	16,5
	BASTANTE O MUCHO	85,0%	1,8	81,1 ; 88,3	2,00	2,1
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	6,7%	1,0	5,0 ; 8,9	1,84	14,7
	REGULAR	14,2%	1,4	11,6 ; 17,2	1,98	10,1
	BASTANTE O MUCHO	79,1%	1,7	75,5 ; 82,3	2,13	2,2
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	6,6%	0,8	5,2 ; 8,3	1,09	11,9
	REGULAR	13,0%	0,9	11,3 ; 15,0	0,86	7,3
	BASTANTE O MUCHO	80,4%	1,3	77,7 ; 82,8	1,10	1,6
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA (LIMA SUR)	NADA O POCO	8,6%	1,0	6,9 ; 10,8	1,14	11,4
	REGULAR	10,6%	1,4	8,2 ; 13,7	1,83	12,9
	BASTANTE O MUCHO	80,7%	1,8	76,9 ; 84,1	1,96	2,3
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA FAMILIA (CALLAO)	NADA O POCO	5,1%	1,0	3,4 ; 7,4	0,97	19,5
	REGULAR	12,0%	1,9	8,8 ; 16,1	1,56	15,5
	BASTANTE O MUCHO	82,9%	2,1	78,4 ; 86,7	1,51	2,5
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE SU SINDICATO (TOTAL)	NADA O POCO	52,6%	4,7	43,4 ; 61,6	1,52	8,9
	REGULAR	28,2%	4,2	20,7 ; 37,1	1,52	15,0
	BASTANTE O MUCHO	19,2%	3,4	13,5 ; 26,7	1,25	17,5
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE SU SINDICATO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	63,0%	18,6	26,3 ; 89,1	1,29	29,4
	REGULAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	BASTANTE O MUCHO	37,0%	18,6	10,9 ; 73,7	1,29	50,2
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE SU SINDICATO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	64,5%	9,8	44,0 ; 80,8	2,23	15,2
	REGULAR	27,6%	9,3	13,3 ; 48,6	2,29	33,5
	BASTANTE O MUCHO	7,9%	4,3	2,6 ; 21,3	1,34	54,1
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE SU SINDICATO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	42,3%	7,0	29,5 ; 56,3	0,97	16,5
	REGULAR	41,7%	6,9	29,0 ; 55,6	0,96	16,6
	BASTANTE O MUCHO	16,0%	5,1	8,3 ; 28,7	0,95	32,0
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE SU SINDICATO (LIMA SUR)	NADA O POCO	41,6%	8,5	26,3 ; 58,6	1,22	20,5
	REGULAR	31,6%	8,4	17,7 ; 49,7	1,33	26,6
	BASTANTE O MUCHO	26,9%	8,0	14,2 ; 45,0	1,33	29,8
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE SU SINDICATO (CALLAO)	NADA O POCO	63,2%	11,5	39,4 ; 81,9	1,22	18,2
	REGULAR	4,0%	4,0	0,5 ; 24,5	0,90	100,5
	BASTANTE O MUCHO	32,8%	11,1	15,4 ; 56,8	1,21	33,9
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DIOS (TOTAL)	NADA O POCO	2,8%	0,3	2,2 ; 3,5	1,74	11,8
	REGULAR	5,1%	0,4	4,3 ; 5,9	1,53	8,1
	BASTANTE O MUCHO	92,2%	0,5	91,1 ; 93,1	1,67	0,6
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DIOS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	5,0%	1,3	3,0 ; 8,2	2,60	25,7
	REGULAR	5,6%	1,1	3,8 ; 8,2	1,74	19,8
	BASTANTE O MUCHO	89,4%	1,8	85,4 ; 92,4	2,49	2,0
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DIOS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	1,8%	0,6	1,0 ; 3,3	2,05	31,0
	REGULAR	5,1%	0,9	3,6 ; 7,3	2,04	17,9
	BASTANTE O MUCHO	93,1%	1,1	90,6 ; 94,9	2,10	1,2
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DIOS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	2,8%	0,5	1,9 ; 4,0	1,10	18,9
	REGULAR	5,1%	0,7	3,8 ; 6,6	1,14	14,1
	BASTANTE O MUCHO	92,2%	0,9	90,3 ; 93,7	1,13	0,9
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DIOS (LIMA SUR)	NADA O POCO	2,7%	0,6	1,8 ; 4,2	1,23	22,0
	REGULAR	4,6%	0,8	3,3 ; 6,4	1,23	16,7
	BASTANTE O MUCHO	92,7%	1,0	90,5 ; 94,4	1,26	1,0
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DIOS (CALLAO)	NADA O POCO	1,7%	0,6	0,6 ; 3,2	0,93	33,8
	REGULAR	5,0%	1,1	3,2 ; 7,8	1,28	22,5
	BASTANTE O MUCHO	93,3%	1,1	90,6 ; 95,2	1,01	1,2
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD (TOTAL)	NADA O POCO	49,5%	1,0	47,6 ; 51,4	1,69	2,0
	REGULAR	35,3%	0,9	33,5 ; 37,1	1,62	2,6
	BASTANTE O MUCHO	15,2%	0,8	13,8 ; 16,8	1,92	4,9
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	44,7%	2,5	39,9 ; 49,6	1,88	5,6
	REGULAR	37,2%	2,6	32,3 ; 42,3	2,10	6,9
	BASTANTE O MUCHO	18,1%	2,4	13,9 ; 23,3	2,89	13,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD (LIMA NORTE)	NADA O POCO	52,1%	2,2	47,7 ; 56,5	2,33	4,3
	REGULAR	33,6%	2,0	29,8 ; 37,6	2,10	6,0
	BASTANTE O MUCHO	14,3%	1,6	11,4 ; 17,7	2,44	11,2
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD (LIMA ESTE)	NADA O POCO	51,2%	1,7	47,9 ; 54,5	1,24	3,3
	REGULAR	35,8%	1,6	32,8 ; 39,0	1,16	4,4
	BASTANTE O MUCHO	13,0%	1,1	11,0 ; 15,4	1,19	8,6
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD (LIMA SUR)	NADA O POCO	48,8%	2,1	44,7 ; 52,9	1,57	4,3
	REGULAR	35,1%	1,9	31,5 ; 38,8	1,39	5,3
	BASTANTE O MUCHO	16,2%	1,4	13,5 ; 19,2	1,39	8,9
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD (CALLAO)	NADA O POCO	48,3%	2,2	43,9 ; 52,7	0,94	4,6
	REGULAR	35,7%	2,4	31,1 ; 40,5	1,18	6,7
	BASTANTE O MUCHO	16,1%	1,9	12,6 ; 20,2	1,31	12,1
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE OTRA PERSONA NO MENCIONADA (TOTAL)	NADA O POCO	15,1%	3,7	9,2 ; 23,7	1,19	24,3
	REGULAR	16,4%	3,7	10,4 ; 25,0	1,13	22,5
	BASTANTE O MUCHO	68,5%	4,8	58,4 ; 77,1	1,21	7,0
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE OTRA PERSONA NO MENCIONADA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	REGULAR	34,7%	14,9	12,8 ; 65,8	1,27	42,9
	BASTANTE O MUCHO	65,3%	14,9	34,2 ; 87,2	1,27	22,7
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE OTRA PERSONA NO MENCIONADA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	6,6%	4,7	1,6 ; 24,1	1,27	71,2
	REGULAR	9,0%	5,4	2,7 ; 26,5	1,26	59,9
	BASTANTE O MUCHO	84,3%	6,8	66,2 ; 93,7	1,24	8,1
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE OTRA PERSONA NO MENCIONADA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	20,1%	7,3	9,3 ; 38,1	1,11	36,6
	REGULAR	26,2%	6,7	15,2 ; 41,3	0,78	25,8
	BASTANTE O MUCHO	53,8%	9,3	35,8 ; 70,8	1,16	17,3
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE OTRA PERSONA NO MENCIONADA (LIMA SUR)	NADA O POCO	32,9%	10,8	15,8 ; 56,3	1,30	32,9
	REGULAR	6,1%	6,0	0,8 ; 33,4	1,51	97,4
	BASTANTE O MUCHO	60,9%	11,4	37,8 ; 80,0	1,34	18,7
SENTIMIENTO DE PROTECCIÓN DE OTRA PERSONA NO MENCIONADA (CALLAO)	NADA O POCO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	REGULAR	10,1%	7,8	2,0 ; 37,7	0,48	77,3
	BASTANTE O MUCHO	89,9%	7,8	62,3 ; 98,0	0,48	8,6
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TRABAJO (TOTAL)	NADA O POCO	53,0%	1,1	50,8 ; 55,3	1,54	2,1
	REGULAR	30,6%	1,0	28,7 ; 32,7	1,45	3,3
	BASTANTE O MUCHO	16,3%	0,9	14,7 ; 18,1	1,58	5,2
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TRABAJO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	46,7%	3,0	40,9 ; 52,5	1,68	6,3
	REGULAR	37,7%	3,0	32,1 ; 43,7	1,80	7,9
	BASTANTE O MUCHO	15,6%	2,4	11,4 ; 21,0	2,16	15,6
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TRABAJO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	53,9%	2,6	48,8 ; 58,9	2,14	4,8
	REGULAR	28,6%	2,2	24,5 ; 33,2	1,91	7,7
	BASTANTE O MUCHO	17,5%	2,0	13,9 ; 21,8	2,22	11,4
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TRABAJO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	53,6%	1,8	50,0 ; 57,2	1,00	3,4
	REGULAR	32,4%	1,7	29,2 ; 35,7	0,93	5,1
	BASTANTE O MUCHO	14,0%	1,2	11,9 ; 16,5	0,84	8,3
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TRABAJO (LIMA SUR)	NADA O POCO	52,5%	2,3	48,1 ; 57,0	1,35	4,3
	REGULAR	28,4%	2,0	24,7 ; 32,3	1,23	6,9
	BASTANTE O MUCHO	19,1%	1,7	15,9 ; 22,7	1,26	9,0
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TRABAJO (CALLAO)	NADA O POCO	60,7%	3,4	53,8 ; 67,2	1,49	5,7
	REGULAR	25,3%	2,9	20,1 ; 31,3	1,31	11,3
	BASTANTE O MUCHO	14,0%	2,2	10,3 ; 18,8	1,17	15,5
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ESTUDIOS (TOTAL)	NADA O POCO	38,8%	2,6	33,9 ; 43,9	1,23	6,6
	REGULAR	36,4%	2,7	31,2 ; 41,9	1,42	7,5
	BASTANTE O MUCHO	24,8%	2,4	20,4 ; 29,9	1,39	9,8
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ESTUDIOS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	34,7%	6,9	22,6 ; 49,2	1,65	20,0
	REGULAR	41,8%	7,2	28,7 ; 56,3	1,67	17,3
	BASTANTE O MUCHO	23,5%	6,0	13,7 ; 37,1	1,56	25,5
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ESTUDIOS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	37,7%	5,6	27,4 ; 49,1	1,60	14,9
	REGULAR	36,7%	6,5	25,1 ; 50,1	2,18	17,7
	BASTANTE O MUCHO	25,6%	5,8	16,0 ; 38,5	2,10	22,6
MAGNITUD DE TENSIÓN FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ESTUDIOS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	41,6%	4,1	33,8 ; 49,9	0,87	9,9
	REGULAR	37,2%	4,2	29,4 ; 45,7	0,93	11,3
	BASTANTE O MUCHO	21,2%	3,7	14,8 ; 29,3	1,01	17,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ESTUDIOS (LIMA SUR)	NADA O POCO	37,0%	5,0	27,8 ; 47,2	0,99	13,6
	REGULAR	30,9%	4,6	22,6 ; 40,6	0,92	14,9
	BASTANTE O MUCHO	32,1%	4,6	23,8 ; 41,7	0,89	14,3
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ESTUDIOS (CALLAO)	NADA O POCO	48,7%	9,4	31,2 ; 66,5	0,95	19,3
	REGULAR	34,4%	10,2	17,8 ; 55,9	1,23	29,6
	BASTANTE O MUCHO	17,0%	9,1	5,4 ; 42,0	1,57	53,6
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: HIJOS Y PARIENTES (TOTAL)	NADA O POCO	61,5%	1,0	59,6 ; 63,4	1,74	1,6
	REGULAR	24,3%	0,9	22,6 ; 26,0	1,73	3,5
	BASTANTE O MUCHO	14,2%	0,6	13,0 ; 15,5	1,44	4,5
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: HIJOS Y PARIENTES (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	59,7%	3,0	53,8 ; 65,4	2,74	5,0
	REGULAR	26,8%	2,5	22,2 ; 31,9	2,28	9,2
	BASTANTE O MUCHO	13,5%	1,7	10,4 ; 17,2	1,89	12,8
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: HIJOS Y PARIENTES (LIMA NORTE)	NADA O POCO	59,4%	2,1	55,1 ; 63,6	2,18	3,6
	REGULAR	26,4%	2,0	22,7 ; 30,5	2,29	7,5
	BASTANTE O MUCHO	14,2%	1,4	11,7 ; 17,1	1,77	9,7
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: HIJOS Y PARIENTES (LIMA ESTE)	NADA O POCO	63,4%	1,4	60,6 ; 66,1	0,91	2,2
	REGULAR	22,7%	1,2	20,4 ; 25,3	0,95	5,5
	BASTANTE O MUCHO	13,9%	1,0	12,0 ; 16,0	0,94	7,4
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: HIJOS Y PARIENTES (LIMA SUR)	NADA O POCO	61,3%	2,0	57,4 ; 65,1	1,46	3,2
	REGULAR	22,1%	1,6	19,1 ; 25,5	1,38	7,4
	BASTANTE O MUCHO	16,6%	1,5	13,8 ; 19,7	1,43	9,0
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: HIJOS Y PARIENTES (CALLAO)	NADA O POCO	65,5%	2,7	60,0 ; 70,7	1,54	4,2
	REGULAR	22,4%	2,7	17,6 ; 28,1	1,93	11,9
	BASTANTE O MUCHO	12,0%	1,6	9,3 ; 15,4	1,07	12,9
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: PAREJA (TOTAL)	NADA O POCO	70,3%	1,0	68,2 ; 72,3	1,50	1,5
	REGULAR	18,8%	0,9	17,1 ; 20,7	1,51	4,8
	BASTANTE O MUCHO	10,8%	0,7	9,6 ; 12,2	1,29	6,1
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: PAREJA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	68,6%	3,4	61,7 ; 74,8	2,42	4,9
	REGULAR	21,6%	3,0	16,2 ; 28,1	2,48	13,9
	BASTANTE O MUCHO	9,9%	1,9	6,7 ; 14,3	1,94	19,6
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: PAREJA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	69,6%	2,3	65,0 ; 73,9	1,77	3,3
	REGULAR	20,3%	1,9	16,8 ; 24,3	1,64	9,4
	BASTANTE O MUCHO	10,1%	1,4	7,7 ; 13,1	1,48	13,5
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: PAREJA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	70,9%	1,5	67,9 ; 73,8	0,80	2,1
	REGULAR	18,6%	1,5	15,9 ; 21,7	1,04	7,9
	BASTANTE O MUCHO	10,4%	1,0	8,6 ; 12,6	0,81	9,7
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: PAREJA (LIMA SUR)	NADA O POCO	69,9%	2,1	65,6 ; 74,0	1,34	3,1
	REGULAR	15,7%	1,5	12,9 ; 18,9	1,08	9,7
	BASTANTE O MUCHO	14,3%	1,6	11,5 ; 17,8	1,27	11,1
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: PAREJA (CALLAO)	NADA O POCO	74,0%	2,9	68,0 ; 79,2	1,37	3,9
	REGULAR	17,9%	2,5	13,5 ; 23,5	1,41	14,2
	BASTANTE O MUCHO	8,1%	1,6	5,5 ; 11,9	1,13	20,0
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DINERO (TOTAL)	NADA O POCO	37,2%	0,9	35,4 ; 39,0	1,63	2,5
	REGULAR	34,6%	0,8	32,9 ; 36,3	1,41	2,5
	BASTANTE O MUCHO	28,3%	0,9	26,6 ; 30,1	1,74	3,2
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DINERO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	41,1%	2,3	36,7 ; 45,7	1,67	5,6
	REGULAR	37,3%	2,2	33,0 ; 41,7	1,63	6,0
	BASTANTE O MUCHO	21,6%	2,4	17,4 ; 26,6	2,50	10,9
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DINERO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	32,9%	1,9	29,2 ; 36,8	2,01	5,9
	REGULAR	36,4%	1,9	32,8 ; 40,1	1,78	5,1
	BASTANTE O MUCHO	30,8%	2,0	27,0 ; 34,8	2,20	6,5
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DINERO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	38,2%	1,6	35,0 ; 41,5	1,21	4,3
	REGULAR	35,6%	1,6	32,6 ; 38,7	1,16	4,4
	BASTANTE O MUCHO	26,2%	1,3	23,7 ; 28,9	0,97	5,0
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DINERO (LIMA SUR)	NADA O POCO	37,8%	2,0	33,9 ; 41,8	1,59	5,3
	REGULAR	29,5%	1,7	26,4 ; 32,9	1,20	5,6
	BASTANTE O MUCHO	32,7%	1,7	29,3 ; 36,2	1,26	5,3
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DINERO (CALLAO)	NADA O POCO	37,9%	2,6	32,8 ; 43,2	1,41	7,0
	REGULAR	33,2%	2,2	29,0 ; 37,6	1,05	6,6
	BASTANTE O MUCHO	29,0%	2,8	23,7 ; 34,9	1,88	9,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: SALUD (TOTAL)	NADA O POCO	39,6%	1,0	37,6 ; 41,7	2,00	2,6
	REGULAR	25,5%	0,8	23,9 ; 27,0	1,48	3,1
	BASTANTE O MUCHO	34,9%	1,0	33,1 ; 36,9	1,85	2,8
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: SALUD (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	47,7%	3,2	41,5 ; 54,0	3,18	6,7
	REGULAR	24,0%	2,3	19,7 ; 28,9	2,31	9,8
	BASTANTE O MUCHO	28,2%	2,7	23,2 ; 33,8	2,76	9,6
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: SALUD (LIMA NORTE)	NADA O POCO	34,7%	1,9	31,0 ; 38,5	1,93	5,5
	REGULAR	28,4%	1,8	25,1 ; 32,1	1,86	6,3
	BASTANTE O MUCHO	36,9%	2,0	33,0 ; 40,9	2,04	5,4
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: SALUD (LIMA ESTE)	NADA O POCO	39,4%	1,6	36,3 ; 42,6	1,16	4,1
	REGULAR	28,9%	1,3	26,4 ; 31,5	0,88	4,5
	BASTANTE O MUCHO	31,7%	1,4	28,9 ; 34,6	1,03	4,5
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: SALUD (LIMA SUR)	NADA O POCO	39,7%	2,4	35,2 ; 44,4	2,14	5,9
	REGULAR	19,7%	1,5	17,0 ; 22,8	1,28	7,5
	BASTANTE O MUCHO	40,5%	2,2	36,3 ; 44,9	1,86	5,4
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: SALUD (CALLAO)	NADA O POCO	39,0%	2,8	33,6 ; 44,6	1,57	7,2
	REGULAR	23,6%	1,8	20,2 ; 27,3	0,87	7,7
	BASTANTE O MUCHO	37,5%	3,0	31,7 ; 43,6	1,90	8,1
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ASUNTOS CON LA LEY (TOTAL)	NADA O POCO	84,4%	0,8	82,7 ; 86,0	2,27	1,0
	REGULAR	6,9%	0,5	5,9 ; 7,9	1,64	7,3
	BASTANTE O MUCHO	8,7%	0,7	7,5 ; 10,1	2,26	7,5
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ASUNTOS CON LA LEY (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	87,0%	2,0	82,6 ; 90,4	2,61	2,3
	REGULAR	6,2%	1,3	4,1 ; 9,2	2,10	20,5
	BASTANTE O MUCHO	6,8%	1,6	4,2 ; 10,8	3,16	23,9
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ASUNTOS CON LA LEY (LIMA NORTE)	NADA O POCO	81,3%	2,0	77,1 ; 84,9	2,89	2,4
	REGULAR	7,0%	1,1	5,2 ; 9,5	2,05	15,6
	BASTANTE O MUCHO	11,6%	1,5	9,0 ; 15,0	2,52	13,1
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ASUNTOS CON LA LEY (LIMA ESTE)	NADA O POCO	88,3%	1,2	85,8 ; 90,4	1,38	1,3
	REGULAR	6,6%	0,9	5,1 ; 8,5	1,24	13,0
	BASTANTE O MUCHO	5,1%	0,8	3,8 ; 6,8	1,24	14,9
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ASUNTOS CON LA LEY (LIMA SUR)	NADA O POCO	82,6%	1,9	78,6 ; 86,0	1,96	2,3
	REGULAR	8,8%	1,2	6,8 ; 11,3	1,34	13,1
	BASTANTE O MUCHO	8,6%	1,3	6,4 ; 11,5	1,69	14,9
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: ASUNTOS CON LA LEY (CALLAO)	NADA O POCO	82,1%	2,7	76,2 ; 86,8	2,26	3,3
	REGULAR	4,7%	1,1	2,9 ; 7,5	1,29	24,1
	BASTANTE O MUCHO	13,2%	2,6	8,9 ; 19,1	2,60	19,5
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TERRORISMO (TOTAL)	NADA O POCO	42,6%	1,0	40,6 ; 44,7	1,97	2,5
	REGULAR	15,5%	0,7	14,2 ; 17,0	1,58	4,4
	BASTANTE O MUCHO	41,8%	1,0	39,8 ; 43,8	1,88	2,4
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TERRORISMO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	47,7%	3,0	41,9 ; 53,6	2,75	6,3
	REGULAR	14,2%	1,8	11,1 ; 18,0	1,95	12,4
	BASTANTE O MUCHO	38,1%	2,9	32,5 ; 44,0	2,79	7,7
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TERRORISMO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	43,7%	2,3	39,3 ; 48,3	2,49	5,2
	REGULAR	17,1%	1,5	14,2 ; 20,3	1,96	9,1
	BASTANTE O MUCHO	39,2%	2,2	34,9 ; 43,7	2,46	5,7
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TERRORISMO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	47,0%	1,8	43,5 ; 50,6	1,44	3,9
	REGULAR	19,8%	1,3	17,3 ; 22,6	1,23	6,8
	BASTANTE O MUCHO	33,2%	1,6	30,2 ; 36,3	1,19	4,7
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TERRORISMO (LIMA SUR)	NADA O POCO	29,9%	1,9	26,4 ; 33,8	1,55	6,3
	REGULAR	12,9%	1,3	10,5 ; 15,6	1,39	10,1
	BASTANTE O MUCHO	57,2%	2,1	53,1 ; 61,2	1,63	3,7
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: TERRORISMO (CALLAO)	NADA O POCO	46,3%	2,7	41,0 ; 51,7	1,44	5,9
	REGULAR	9,4%	1,6	6,7 ; 12,9	1,35	16,6
	BASTANTE O MUCHO	44,3%	2,7	39,2 ; 49,6	1,36	6,0
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DELINCUENCIA (TOTAL)	NADA O POCO	26,5%	1,0	24,6 ; 28,6	2,33	3,8
	REGULAR	13,6%	0,7	12,4 ; 15,0	1,69	4,9
	BASTANTE O MUCHO	59,9%	1,1	57,7 ; 62,0	2,14	1,8
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DELINCUENCIA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	38,3%	3,2	32,3 ; 44,7	3,25	8,3
	REGULAR	14,8%	1,8	11,6 ; 18,6	1,91	12,0
	BASTANTE O MUCHO	46,9%	3,1	40,8 ; 53,1	3,03	6,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DELINCUENCIA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	29,7%	2,3	25,4 ; 34,3	2,92	7,7
	REGULAR	13,5%	1,5	10,8 ; 16,7	2,26	11,1
	BASTANTE O MUCHO	56,8%	2,4	52,0 ; 61,5	2,79	4,3
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DELINCUENCIA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	22,8%	1,7	19,7 ; 26,3	1,72	7,3
	REGULAR	16,1%	1,3	13,7 ; 18,9	1,36	8,1
	BASTANTE O MUCHO	61,1%	1,8	57,5 ; 64,5	1,46	2,9
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DELINCUENCIA (LIMA SUR)	NADA O POCO	17,3%	1,6	14,4 ; 20,8	1,72	9,5
	REGULAR	11,6%	1,3	9,5 ; 14,2	1,29	10,3
	BASTANTE O MUCHO	71,0%	2,0	66,9 ; 74,8	1,80	2,8
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: DELINCUENCIA (CALLAO)	NADA O POCO	26,0%	2,7	21,0 ; 31,6	1,81	10,4
	REGULAR	10,2%	1,7	7,2 ; 14,1	1,56	17,0
	BASTANTE O MUCHO	63,8%	2,9	58,0 ; 69,3	1,73	4,5
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: NARCOTRÁFICO (TOTAL)	NADA O POCO	37,7%	1,1	35,6 ; 39,9	2,18	2,9
	REGULAR	14,4%	0,7	13,0 ; 15,8	1,76	4,9
	BASTANTE O MUCHO	47,9%	1,1	45,8 ; 50,1	2,09	2,3
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: NARCOTRÁFICO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	44,6%	3,1	38,6 ; 50,7	2,93	6,9
	REGULAR	14,4%	1,7	11,4 ; 18,0	1,73	11,6
	BASTANTE O MUCHO	41,0%	2,9	35,5 ; 46,8	2,61	7,0
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: NARCOTRÁFICO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	37,0%	2,3	32,5 ; 41,7	2,74	6,3
	REGULAR	15,1%	1,7	12,1 ; 18,7	2,59	11,2
	BASTANTE O MUCHO	47,9%	2,5	43,0 ; 52,9	2,99	5,3
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: NARCOTRÁFICO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	43,8%	2,0	40,0 ; 47,7	1,68	4,5
	REGULAR	17,3%	1,3	14,9 ; 20,2	1,34	7,7
	BASTANTE O MUCHO	38,9%	1,7	35,6 ; 42,3	1,33	4,4
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: NARCOTRÁFICO (LIMA SUR)	NADA O POCO	24,6%	1,7	21,3 ; 28,1	1,51	7,1
	REGULAR	13,2%	1,3	10,8 ; 16,1	1,42	10,1
	BASTANTE O MUCHO	62,2%	2,1	57,9 ; 66,3	1,79	3,5
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: NARCOTRÁFICO (CALLAO)	NADA O POCO	40,3%	3,1	34,4 ; 46,5	1,89	7,7
	REGULAR	8,0%	1,4	5,6 ; 11,2	1,27	17,5
	BASTANTE O MUCHO	51,7%	3,1	45,6 ; 57,7	1,82	6,0
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: OTROS PROBLEMAS (TOTAL)	NADA O POCO	23,1%	6,9	12,2 ; 39,2	1,92	30,0
	REGULAR	5,3%	2,4	2,1 ; 12,5	0,82	45,6
	BASTANTE O MUCHO	71,7%	7,1	56,0 ; 83,4	1,77	9,9
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: OTROS PROBLEMAS (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	REGULAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	BASTANTE O MUCHO	100,0%	0,0	100,0 ; 100,0	0,00	0,0
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: OTROS PROBLEMAS (LIMA NORTE)	NADA O POCO	13,9%	10,4	2,8 ; 47,0	1,75	74,9
	REGULAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	BASTANTE O MUCHO	86,1%	10,4	53,0 ; 97,2	1,75	12,0
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: OTROS PROBLEMAS (LIMA ESTE)	NADA O POCO	15,6%	8,0	5,3 ; 37,9	0,68	51,3
	REGULAR	4,2%	4,2	0,6 ; 25,3	0,61	99,7
	BASTANTE O MUCHO	80,2%	9,0	57,2 ; 92,5	0,72	11,2
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: OTROS PROBLEMAS (LIMA SUR)	NADA O POCO	46,0%	14,0	22,0 ; 72,1	1,82	30,4
	REGULAR	11,6%	6,4	3,7 ; 31,0	0,93	55,5
	BASTANTE O MUCHO	42,4%	12,6	21,0 ; 67,0	1,51	29,8
MAGNITUD DE Tensión FRENTE A ESTRESORES COTIDIANOS: OTROS PROBLEMAS (CALLAO)	NADA O POCO	6,9%	6,9	0,9 ; 38,0	1,02	100,4
	REGULAR	3,5%	3,7	0,4 ; 23,3	0,54	103,7
	BASTANTE O MUCHO	89,6%	7,9	62,0 ; 97,8	0,92	8,8
EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	31,1%	0,9	29,3 ; 32,9	1,79	3,0
	LIMA CENTRO	28,7%	2,1	24,8 ; 33,1	1,67	7,4
	LIMA NORTE	27,8%	1,9	24,2 ; 31,8	2,22	7,0
	LIMA ESTE	27,6%	1,6	24,6 ; 30,8	1,32	5,7
	LIMA SUR	39,5%	2,3	35,2 ; 44,1	1,97	5,7
	CALLAO	34,5%	2,5	29,7 ; 39,7	1,37	7,4
RUIDO (TOTAL)	NADA O POCO	64,8%	1,1	62,6 ; 66,8	2,22	1,7
	REGULAR	15,8%	0,7	14,4 ; 17,3	1,77	4,6
	BASTANTE O MUCHO	19,5%	0,8	18,0 ; 21,1	1,79	4,1
RUIDO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	69,8%	3,1	63,3 ; 75,5	3,54	4,5
	REGULAR	13,6%	1,9	10,4 ; 17,7	2,28	13,7
	BASTANTE O MUCHO	16,6%	2,2	12,7 ; 21,3	2,66	13,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
RUIDO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	64,6%	2,2	60,3 ; 68,8	2,47	3,4
	REGULAR	17,0%	1,6	14,1 ; 20,4	2,20	13,7
	BASTANTE O MUCHO	18,3%	1,6	15,4 ; 21,6	1,96	8,6
RUIDO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	65,4%	1,8	61,8 ; 68,8	1,52	2,7
	REGULAR	16,6%	1,3	14,3 ; 19,3	1,26	7,6
	BASTANTE O MUCHO	18,0%	1,3	15,5 ; 20,8	1,32	7,4
RUIDO (LIMA SUR)	NADA O POCO	63,3%	2,0	59,2 ; 67,2	1,63	3,2
	REGULAR	14,4%	1,2	12,3 ; 16,8	0,98	8,0
	BASTANTE O MUCHO	22,3%	1,5	19,4 ; 25,5	1,26	6,9
RUIDO (CALLAO)	NADA O POCO	58,5%	3,3	51,9 ; 64,7	2,11	5,6
	REGULAR	16,8%	2,7	12,2 ; 22,7	2,42	15,8
	BASTANTE O MUCHO	24,7%	2,9	19,6 ; 30,8	2,10	11,5
FALTA DE VENTILACIÓN (TOTAL)	NADA O POCO	79,9%	0,9	78,1 ; 81,5	2,01	1,1
	REGULAR	11,5%	0,6	10,3 ; 12,8	1,80	5,6
	BASTANTE O MUCHO	8,7 %	0,5	7,7 ; 9,8	1,60	6,2
FALTA DE VENTILACIÓN (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	82,4%	2,3	77,5 ; 86,5	2,76	2,8
	REGULAR	9,8%	1,4	7,3 ; 13,0	1,81	14,7
	BASTANTE O MUCHO	7,8 %	1,6	5,2 ; 11,5	2,60	20,0
FALTA DE VENTILACIÓN (LIMA NORTE)	NADA O POCO	76,5%	2,0	72,4 ; 80,2	2,58	2,6
	REGULAR	14,3%	1,6	11,4 ; 17,8	2,48	11,2
	BASTANTE O MUCHO	9,2 %	1,1	7,3 ; 11,5	1,64	11,7
FALTA DE VENTILACIÓN (LIMA ESTE)	NADA O POCO	81,5%	1,3	78,7 ; 83,9	1,25	1,6
	REGULAR	11,8%	1,1	9,9 ; 14,0	1,16	8,9
	BASTANTE O MUCHO	6,7 %	0,8	5,4 ; 8,4	1,02	11,4
FALTA DE VENTILACIÓN (LIMA SUR)	NADA O POCO	80,1%	1,6	76,7 ; 83,0	1,51	2,0
	REGULAR	9,3%	1,0	7,6 ; 11,3	0,99	10,3
	BASTANTE O MUCHO	10,7 %	1,3	8,5 ; 13,4	1,51	11,7
FALTA DE VENTILACIÓN (CALLAO)	NADA O POCO	80,0%	2,4	74,8 ; 84,3	1,76	3,0
	REGULAR	10,8%	2,2	7,2 ; 15,9	2,41	20,4
	BASTANTE O MUCHO	9,3 %	1,5	6,7 ; 12,7	1,32	16,4
FALTA DE ESPACIO (TOTAL)	NADA O POCO	72,7%	1,0	70,7 ; 74,6	2,15	1,4
	REGULAR	14,2%	0,7	12,9 ; 15,7	1,76	4,9
	BASTANTE O MUCHO	13,1%	0,6	11,9 ; 14,4	1,59	4,9
FALTA DE ESPACIO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	78,3%	2,7	72,5 ; 83,1	3,29	3,4
	REGULAR	10,1%	1,6	7,4 ; 13,6	2,06	15,5
	BASTANTE O MUCHO	11,7%	1,8	8,5 ; 15,8	2,51	15,7
FALTA DE ESPACIO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	68,7%	2,2	64,2 ; 72,9	2,72	3,2
	REGULAR	16,9%	1,7	13,9 ; 20,5	2,40	10,0
	BASTANTE O MUCHO	14,4%	1,4	11,8 ; 17,3	1,84	9,6
FALTA DE ESPACIO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	72,7%	1,6	69,5 ; 75,7	1,35	2,2
	REGULAR	15,9%	1,2	13,8 ; 18,4	1,11	7,4
	BASTANTE O MUCHO	11,4%	1,0	9,6 ; 13,5	1,05	8,7
FALTA DE ESPACIO (LIMA SUR)	NADA O POCO	72,1%	1,9	68,3 ; 75,6	1,57	2,6
	REGULAR	12,2%	1,2	10,0 ; 14,9	1,27	10,0
	BASTANTE O MUCHO	15,7%	1,4	13,2 ; 18,5	1,26	8,6
FALTA DE ESPACIO (CALLAO)	NADA O POCO	74,6%	2,7	68,8 ; 79,6	1,90	3,7
	REGULAR	14,2%	2,2	10,4 ; 19,2	1,95	15,7
	BASTANTE O MUCHO	11,2%	1,7	8,4 ; 14,9	1,32	14,7
OLOR (TOTAL)	NADA O POCO	68,8%	1,1	66,6 ; 70,9	2,44	1,6
	REGULAR	13,1%	0,7	11,9 ; 14,5	1,73	5,1
	BASTANTE O MUCHO	18,1%	0,8	16,5 ; 19,8	2,14	4,7
OLOR (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	77,6%	2,9	71,5 ; 82,7	3,65	3,7
	REGULAR	9,1%	1,7	6,3 ; 13,0	2,58	18,3
	BASTANTE O MUCHO	13,3%	2,3	9,4 ; 18,4	3,45	17,1
OLOR (LIMA NORTE)	NADA O POCO	67,5%	2,3	62,8 ; 71,9	2,89	3,4
	REGULAR	15,0%	1,5	12,4 ; 18,2	2,04	9,9
	BASTANTE O MUCHO	17,5%	1,6	14,5 ; 20,9	2,19	9,3
OLOR (LIMA ESTE)	NADA O POCO	68,0%	1,9	64,2 ; 71,7	1,85	2,8
	REGULAR	13,6%	1,1	11,5 ; 16,0	1,18	8,3
	BASTANTE O MUCHO	18,3%	1,5	15,6 ; 21,5	1,62	8,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
OLOR (LIMA SUR)	NADA O POCO	63,9%	2,0	59,9 ; 67,7	1,56	3,1
	REGULAR	13,2%	1,3	10,8 ; 16,1	1,43	10,1
	BASTANTE O MUCHO	22,9%	1,8	19,5 ; 26,6	1,70	7,9
OLOR (CALLAO)	NADA O POCO	69,1%	3,4	62,0 ; 75,4	2,66	5,0
	REGULAR	13,6%	1,9	10,2 ; 17,8	1,52	14,2
	BASTANTE O MUCHO	17,3%	2,7	12,6 ; 23,3	2,45	15,7
POLVO (TOTAL)	NADA O POCO	52,0%	1,2	49,6 ; 54,4	2,65	2,3
	REGULAR	17,1%	0,8	15,7 ; 18,6	1,82	4,5
	BASTANTE O MUCHO	30,9%	1,1	28,7 ; 33,1	2,70	3,7
POLVO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	70,8%	3,1	64,4 ; 76,6	3,59	4,4
	REGULAR	13,6%	1,9	10,2 ; 17,9	2,47	14,3
	BASTANTE O MUCHO	15,5%	2,5	11,3 ; 21,0	3,58	15,9
POLVO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	48,6%	2,5	43,7 ; 53,5	2,96	5,1
	REGULAR	20,9%	1,8	17,6 ; 24,6	2,25	8,5
	BASTANTE O MUCHO	30,5%	2,3	26,1 ; 35,2	3,02	7,6
POLVO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	42,1%	2,1	38,0 ; 46,3	2,00	5,0
	REGULAR	17,8%	1,3	15,4 ; 20,5	1,25	7,3
	BASTANTE O MUCHO	40,1%	2,3	35,7 ; 44,6	2,30	5,6
POLVO (LIMA SUR)	NADA O POCO	50,1%	2,2	45,7 ; 54,4	1,81	4,4
	REGULAR	14,6%	1,4	12,1 ; 17,6	1,43	9,5
	BASTANTE O MUCHO	35,3%	2,1	31,3 ; 39,6	1,80	6,0
POLVO (CALLAO)	NADA O POCO	56,7%	4,0	48,6 ; 64,4	3,19	7,1
	REGULAR	16,3%	2,1	12,6 ; 20,9	1,52	12,8
	BASTANTE O MUCHO	27,0%	3,9	20,0 ; 35,3	3,74	14,5
BASURA (TOTAL)	NADA O POCO	52,1%	1,3	49,6 ; 54,5	2,81	2,4
	REGULAR	15,4%	0,7	14,0 ; 16,9	1,86	4,8
	BASTANTE O MUCHO	32,6%	1,1	30,4 ; 34,8	2,47	3,4
BASURA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	70,4%	3,2	63,8 ; 76,3	3,73	4,5
	REGULAR	9,5%	1,6	6,8 ; 13,1	2,22	16,6
	BASTANTE O MUCHO	20,1%	2,8	15,2 ; 26,1	3,72	13,9
BASURA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	51,9%	2,7	46,6 ; 57,1	3,35	5,1
	REGULAR	17,3%	1,8	14,1 ; 21,0	2,57	10,2
	BASTANTE O MUCHO	30,9%	2,2	26,7 ; 35,4	2,78	7,2
BASURA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	46,6%	1,9	42,9 ; 50,3	1,53	4,0
	REGULAR	17,8%	1,3	15,3 ; 20,6	1,33	7,5
	BASTANTE O MUCHO	35,6%	1,8	32,1 ; 39,5	1,57	5,1
BASURA (LIMA SUR)	NADA O POCO	40,5%	2,4	35,9 ; 45,4	2,23	6,0
	REGULAR	15,3%	1,4	12,7 ; 18,4	1,45	9,4
	BASTANTE O MUCHO	44,1%	2,2	39,9 ; 48,4	1,76	4,9
BASURA (CALLAO)	NADA O POCO	57,5%	4,0	49,5 ; 65,2	3,20	7,0
	REGULAR	14,8%	2,0	11,4 ; 19,1	1,48	13,3
	BASTANTE O MUCHO	27,6%	3,7	21,0 ; 35,4	3,28	13,4
PRESENCIA DE ALTO NIVEL DE ESTRÉS AMBIENTAL (TOTAL)	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES) SIN POLVO O BASURA	32,6%	1,0	30,7 ; 34,6	2,07	3,1
	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES) INCLUYENDO POLVO Y BASURA	48,5%	1,2	46,1 ; 50,8	2,51	2,5
PRESENCIA DE ALTO NIVEL DE ESTRÉS AMBIENTAL (LIMA CENTRO)	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES) SIN POLVO O BASURA	23,5%	2,8	18,5 ; 29,4	3,29	11,8
	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES) INCLUYENDO POLVO Y BASURA	28,3%	3,0	22,7 ; 34,6	3,51	10,8
PRESENCIA DE ALTO NIVEL DE ESTRÉS AMBIENTAL (LIMA NORTE)	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES) SIN POLVO O BASURA	31,9%	2,0	28,1 ; 35,9	2,12	6,2
	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES) INCLUYENDO POLVO Y BASURA	45,6%	2,4	41,0 ; 50,3	2,72	5,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PRESENCIA DE ALTO NIVEL DE ESTRÉS AMBIENTAL (LIMA ESTE)	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES)SIN POLVO O BASURA	31,9%	1,8	28,5 ; 35,5	1,58	5,6
	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES) INCLUYENDO POLVO Y BASURA	56,3%	2,0	52,2 ; 60,2	1,85	3,6
PRESENCIA DE ALTO NIVEL DE ESTRÉS AMBIENTAL (LIMA SUR)	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES)SIN POLVO O BASURA	40,4%	2,1	36,4 ; 44,7	1,71	5,2
	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES) INCLUYENDO POLVO Y BASURA	60,8%	2,3	56,3 ; 65,2	1,95	3,7
PRESENCIA DE ALTO NIVEL DE ESTRÉS AMBIENTAL (CALLAO)	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES)SIN POLVO O BASURA	35,6%	3,2	29,7 ; 42,1	2,10	8,9
	TOTAL(RUIDO, FALTA DE VENTILACIÓN ESPACIO O MALOS OLORES) INCLUYENDO POLVO Y BASURA	46,3%	3,7	39,2 ; 53,6	2,64	8,0
DISCRIMINACIÓN POR SEXO (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	3,6%	0,3	3,0 ; 4,3	1,55	9,7
	LIMA CENTRO	3,3%	1,0	1,8 ; 6,0	2,48	30,7
	LIMA NORTE	4,2%	0,8	2,9 ; 6,1	1,78	18,4
	LIMA ESTE	2,9%	0,5	2,0 ; 4,1	1,03	17,9
	LIMA SUR	3,8%	0,7	2,7 ; 5,4	1,12	17,5
	CALLAO	3,6%	1,0	2,1 ; 6,0	1,27	26,9
DISCRIMINACIÓN POR EDAD (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	6,0%	0,4	5,2 ; 6,9	1,56	7,4
	LIMA CENTRO	4,5%	0,9	3,0 ; 6,9	1,47	20,2
	LIMA NORTE	6,1%	1,0	4,5 ; 8,3	1,90	15,7
	LIMA ESTE	5,2%	0,9	3,7 ; 7,2	1,64	16,6
	LIMA SUR	7,2%	0,9	5,6 ; 9,3	1,21	13,0
	CALLAO	7,3%	1,4	5,0 ; 10,7	1,46	19,6
DISCRIMINACIÓN POR PESO (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	5,2%	0,4	4,5 ; 6,2	1,64	8,2
	LIMA CENTRO	4,9%	1,2	3,0 ; 7,8	2,37	24,6
	LIMA NORTE	5,7%	0,9	4,1 ; 7,7	1,78	15,8
	LIMA ESTE	4,5%	0,7	3,4 ; 6,1	1,12	14,7
	LIMA SUR	6,9%	1,0	5,1 ; 9,2	1,51	15,9
	CALLAO	3,3%	1,0	1,8 ; 6,0	1,54	30,7
DISCRIMINACIÓN POR COLOR DE PIEL (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	2,7%	0,3	2,2 ; 3,3	1,27	10,1
	LIMA CENTRO	2,7%	0,7	1,6 ; 4,5	1,49	26,6
	LIMA NORTE	2,1%	0,6	1,2 ; 3,5	1,80	26,7
	LIMA ESTE	2,7%	0,5	1,8 ; 3,9	1,08	19,0
	LIMA SUR	3,5%	0,6	2,5 ; 5,0	1,07	17,8
	CALLAO	2,9%	0,7	1,7 ; 4,7	0,91	25,3
DISCRIMINACIÓN POR FORMA DE VESTIR (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	3,5%	0,3	2,9 ; 4,2	1,29	8,9
	LIMA CENTRO	2,4%	0,7	1,3 ; 4,2	1,60	29,1
	LIMA NORTE	3,6%	0,8	2,4 ; 5,4	1,92	20,8
	LIMA ESTE	3,7%	0,6	2,7 ; 4,9	0,93	15,0
	LIMA SUR	4,8%	0,7	3,6 ; 6,4	1,02	14,9
	CALLAO	2,1%	0,5	1,3 ; 3,4	0,64	24,9
DISCRIMINACIÓN POR CONDICIÓN ECONÓMICA O SOCIAL (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	7,1%	0,5	6,1 ; 8,2	1,91	7,5
	LIMA CENTRO	3,7%	1,5	1,7 ; 8,0	4,77	40,2
	LIMA NORTE	8,2%	1,1	6,3 ; 10,7	1,97	13,6
	LIMA ESTE	6,5%	0,9	5,0 ; 8,4	1,31	13,3
	LIMA SUR	8,2%	1,1	6,2 ; 10,6	1,48	13,4
	CALLAO	8,8%	1,7	6,0 ; 12,6	1,63	18,8
DISCRIMINACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	6,3%	0,5	5,4 ; 7,3	1,68	7,5
	LIMA CENTRO	3,3%	0,9	1,9 ; 5,6	1,98	27,4
	LIMA NORTE	8,4%	1,1	6,4 ; 10,9	2,03	13,7
	LIMA ESTE	5,2%	0,7	4,0 ; 6,7	1,05	13,3
	LIMA SUR	6,4%	1,0	4,6 ; 8,7	1,61	16,0
	CALLAO	8,2%	1,6	5,6 ; 11,9	1,61	19,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
DISCRIMINACIÓN POR RELIGIÓN (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	2,2%	0,3	1,7 ; 2,7	1,35	11,7
	LIMA CENTRO	2,1%	0,7	1,0 ; 4,1	2,05	35,7
	LIMA NORTE	1,8%	0,5	1,0 ; 3,0	1,52	26,8
	LIMA ESTE	1,8%	0,5	1,1 ; 2,9	1,27	25,5
	LIMA SUR	3,2%	0,6	2,2 ; 4,6	1,07	18,8
	CALLAO	2,3%	0,6	1,3 ; 3,9	0,90	28,6
DISCRIMINACIÓN POR AMISTADES (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	2,0%	0,3	1,5 ; 2,5	1,54	13,2
	LIMA CENTRO	0,8%	0,4	0,3 ; 2,2	1,68	51,8
	LIMA NORTE	2,9%	0,7	1,8 ; 4,6	2,04	23,9
	LIMA ESTE	1,7%	0,4	1,1 ; 2,7	1,03	23,5
	LIMA SUR	2,2%	0,5	1,4 ; 3,5	1,16	23,9
	CALLAO	1,6%	0,7	0,7 ; 3,5	1,29	40,7
DISCRIMINACIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	2,4%	0,3	2,0 ; 3,0	1,33	11,0
	LIMA CENTRO	0,9%	0,3	0,4 ; 1,9	1,05	38,9
	LIMA NORTE	2,6%	0,7	1,5 ; 4,2	2,03	25,6
	LIMA ESTE	3,3%	0,5	2,4 ; 4,4	0,88	15,5
	LIMA SUR	2,5%	0,6	1,5 ; 3,9	1,35	24,1
	CALLAO	2,6%	0,7	1,5 ; 4,5	1,02	28,4
DISCRIMINACIÓN POR SU TALLA (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	2,6%	0,3	2,1 ; 3,2	1,41	11,0
	LIMA CENTRO	1,5%	0,6	0,7 ; 3,1	1,72	38,6
	LIMA NORTE	2,8%	0,6	1,8 ; 4,4	1,73	22,5
	LIMA ESTE	3,1%	0,5	2,2 ; 4,2	0,88	16,0
	LIMA SUR	2,9%	0,7	1,8 ; 4,7	1,71	24,9
	CALLAO	1,9%	0,6	1,1 ; 3,4	0,83	29,7
DISCRIMINACIÓN POR OTROS (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	1,8%	0,2	1,4 ; 2,3	1,25	12,3
	LIMA CENTRO	1,3%	0,5	0,7 ; 2,7	1,35	36,3
	LIMA NORTE	1,5%	0,5	0,8 ; 2,7	1,68	30,6
	LIMA ESTE	1,8%	0,4	1,2 ; 2,7	0,94	21,9
	LIMA SUR	2,6%	0,6	1,6 ; 4,0	1,31	23,3
	CALLAO	2,1%	0,6	1,2 ; 3,7	0,80	27,7
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU SEXO (TOTAL)	NINGUNA VEZ	98,4%	0,2	97,8 ; 98,8	1,71	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,5%	0,2	1,1 ; 2,0	1,73	16,1
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	1,48	50,1
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU SEXO (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	98,1%	0,8	95,5 ; 99,2	2,87	0,9
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,9%	0,8	0,8 ; 4,5	2,87	43,5
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU SEXO (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	98,4%	0,5	97,0 ; 99,1	2,01	0,5
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,4%	0,5	0,7 ; 2,8	1,98	34,0
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	2,32	100,2
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU SEXO (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	98,2%	0,5	97,0 ; 98,9	1,27	0,5
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,6%	0,4	0,9 ; 2,7	1,35	27,8
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,2%	0,1	0,1 ; 0,8	1,04	64,4
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU SEXO (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	98,5%	0,4	97,5 ; 99,1	0,95	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,4%	0,4	0,8 ; 2,3	0,90	26,5
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,71	80,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU SEXO (CALLAO)	NINGUNA VEZ	99,0%	0,4	97,6 ; 99,6	0,94	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,0%	0,4	0,4 ; 2,4	0,94	43,9
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU EDAD (TOTAL)	NINGUNA VEZ	96,7%	0,3	95,9 ; 97,3	1,60	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,0%	0,3	2,5 ; 3,7	1,55	10,6
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,1	0,2 ; 0,5	0,89	25,1
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU EDAD (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	97,3%	0,7	95,6 ; 98,4	1,36	0,7
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,2%	0,6	1,3 ; 3,9	1,39	28,2
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,5%	0,3	0,1 ; 1,6	1,40	62,8
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU EDAD (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	96,7%	0,7	95,0 ; 97,8	1,77	0,7
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,2%	0,7	2,1 ; 4,9	1,82	21,4
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,72	72,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU EDAD (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	96,5%	0,8	94,6 ; 97,7	1,85	0,8
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,0%	0,7	2,0 ; 4,6	1,59	21,7
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,5%	0,2	0,3 ; 1,1	0,77	36,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU EDAD (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	96,3%	0,7	94,7 ; 97,5	1,28	0,7
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,3%	0,7	2,3 ; 4,9	1,24	19,8
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,2	0,1 ; 0,8	0,67	46,4
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU EDAD (CALLAO)	NINGUNA VEZ	96,8%	1,0	94,1 ; 98,2	1,52	1,0
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,2%	1,0	1,7 ; 5,8	1,56	31,6
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,40	99,7
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU PESO (TOTAL)	NINGUNA VEZ	96,9%	0,3	96,2 ; 97,5	1,40	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,8%	0,3	2,3 ; 3,4	1,36	10,3
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,1	0,2 ; 0,5	1,23	30,4
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU PESO (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	97,9%	0,6	96,3 ; 98,8	1,32	0,6
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,9%	0,5	1,1 ; 3,3	1,21	28,7
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,3	0,0 ; 1,9	2,11	100,2
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU PESO (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	96,4%	0,7	94,6 ; 97,6	1,79	0,8
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,4%	0,7	2,2 ; 5,0	1,69	20,2
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,1	0,1 ; 0,8	0,91	52,8
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU PESO (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	97,1%	0,6	95,8 ; 98,0	1,22	0,6
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,4%	0,5	1,5 ; 3,6	1,27	22,0
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,5%	0,2	0,2 ; 1,2	1,13	44,6
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU PESO (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	96,0%	0,7	94,4 ; 97,1	1,13	0,7
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,8%	0,6	2,7 ; 5,3	1,06	17,2
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	1,12	70,6
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU PESO (CALLAO)	NINGUNA VEZ	98,1%	0,8	95,9 ; 99,1	1,43	0,8
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,9%	0,8	0,9 ; 4,1	1,43	38,9
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU COLOR DE PIEL (TOTAL)	NINGUNA VEZ	99,2%	0,1	98,8 ; 99,4	1,18	0,1
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,8%	0,1	0,5 ; 1,1	1,17	18,7
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,07	58,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU COLOR DE PIEL (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	99,0%	0,4	97,8 ; 99,6	1,26	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,8%	0,4	0,4 ; 1,9	1,19	42,5
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,90	100,1
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU COLOR DE PIEL (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	99,5%	0,3	98,4 ; 99,8	1,92	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,5%	0,3	0,2 ; 1,6	1,92	54,4
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU COLOR DE PIEL (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	98,8%	0,3	98,1 ; 99,3	0,86	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,9%	0,3	0,5 ; 1,6	0,82	28,2
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,2%	0,1	0,1 ; 0,8	1,15	70,8
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU COLOR DE PIEL (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	99,0%	0,3	98,0 ; 99,5	1,13	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,0%	0,3	0,5 ; 2,0	1,13	35,3
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU COLOR DE PIEL (CALLAO)	NINGUNA VEZ	99,7%	0,2	99,1 ; 99,9	0,47	0,2
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,47	61,6
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU FORMA DE VESTIR (TOTAL)	NINGUNA VEZ	97,9%	0,3	97,3 ; 98,3	1,41	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,9%	0,2	1,5 ; 2,4	1,48	13,2
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	0,83	29,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU FORMA DE VESTIR (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	99,1%	0,4	97,8 ; 99,6	1,33	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,8%	0,4	0,3 ; 2,1	1,47	48,9
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,61	72,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU FORMA DE VESTIR (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	97,6%	0,7	95,8 ; 98,6	2,33	0,7
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,4%	0,7	1,3 ; 4,1	2,40	29,0
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	1,14	99,4
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU FORMA DE VESTIR (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	97,8%	0,4	96,7 ; 98,5	0,99	0,5
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,0%	0,4	1,3 ; 2,9	0,95	21,0
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,1	0,1 ; 0,8	0,85	54,1
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU FORMA DE VESTIR (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	96,8%	0,6	95,4 ; 97,7	0,95	0,6
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,9%	0,5	2,0 ; 4,2	1,00	19,2
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,4%	0,2	0,1 ; 1,0	0,85	49,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU FORMA DE VESTIR (CALLAO)	NINGUNA VEZ	99,3%	0,3	98,4 ; 99,7	0,60	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,5%	0,3	0,2 ; 1,4	0,65	52,9
	FRECIENTE O MUY FRECUENTE	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	0,55	72,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU CONDICIÓN ECONÓMICA (TOTAL)	NINGUNA VEZ	96,1%	0,4	95,1 ; 96,8	2,08	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,5%	0,4	2,9 ; 4,3	1,75	10,4
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,4%	0,1	0,2 ; 0,8	1,84	30,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU CONDICIÓN ECONÓMICA (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	97,3%	1,4	92,7 ; 99,0	5,69	1,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,1%	1,0	0,9 ; 5,1	3,37	45,1
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,6%	0,6	0,1 ; 3,6	3,94	90,7
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU CONDICIÓN ECONÓMICA (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	95,9%	0,9	93,8 ; 97,3	2,25	0,9
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,8%	0,8	2,5 ; 5,9	2,31	22,2
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,57	67,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU CONDICIÓN ECONÓMICA (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	96,5%	0,6	95,1 ; 97,5	1,13	0,6
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,2%	0,6	2,2 ; 4,5	1,20	18,4
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,4%	0,1	0,2 ; 0,8	0,63	39,8
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU CONDICIÓN ECONÓMICA (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	95,0%	0,8	93,1 ; 96,4	1,34	0,9
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	4,3%	0,7	3,1 ; 6,0	1,16	16,7
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,7%	0,3	0,3 ; 1,7	1,28	44,6
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU CONDICIÓN ECONÓMICA (CALLAO)	NINGUNA VEZ	95,5%	1,1	92,7 ; 97,3	1,46	1,2
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	4,3%	1,1	2,7 ; 7,0	1,31	24,6
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	0,69	100,2
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU NIVEL EDUCATIVO (TOTAL)	NINGUNA VEZ	96,7%	0,3	95,9 ; 97,3	1,58	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,0%	0,3	2,4 ; 3,7	1,63	10,9
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,1	0,2 ; 0,6	1,11	27,1
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU NIVEL EDUCATIVO (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	98,6%	0,6	96,9 ; 99,4	1,90	0,6
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,4%	0,6	0,6 ; 3,1	1,90	41,9
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU NIVEL EDUCATIVO (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	95,3%	0,9	93,3 ; 96,8	2,02	0,9
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	4,2%	0,8	2,8 ; 6,2	2,08	20,0
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,5%	0,3	0,2 ; 1,4	1,74	55,7
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU NIVEL EDUCATIVO (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	96,7%	0,5	95,5 ; 97,6	1,01	0,6
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,9%	0,5	2,0 ; 4,1	1,06	18,0
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,4%	0,2	0,2 ; 0,9	0,77	43,1
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU NIVEL EDUCATIVO (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	96,1%	0,8	94,3 ; 97,4	1,44	0,8
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	3,4%	0,7	2,2 ; 5,1	1,43	21,1
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,5%	0,2	0,2 ; 1,0	0,68	39,1
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU NIVEL EDUCATIVO (CALLAO)	NINGUNA VEZ	97,8%	0,8	95,6 ; 98,9	1,31	0,8
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	2,0%	0,8	1,0 ; 4,2	1,37	37,1
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	0,90	99,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU RELIGIÓN (TOTAL)	NINGUNA VEZ	99,0%	0,2	98,6 ; 99,2	1,13	0,2
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,0%	0,2	0,7 ; 1,3	1,16	16,4
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	0,76	48,2
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU RELIGIÓN (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	99,3%	0,3	98,3 ; 99,7	1,11	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,7%	0,3	0,3 ; 1,7	1,11	45,5
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU RELIGIÓN (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	99,5%	0,2	98,7 ; 99,8	1,26	0,2
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,5%	0,2	0,2 ; 1,3	1,26	45,2
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU RELIGIÓN (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	98,9%	0,4	97,8 ; 99,4	1,41	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,0%	0,4	0,5 ; 2,1	1,45	36,3
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,52	70,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU RELIGIÓN (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	98,2%	0,5	97,0 ; 98,9	1,09	0,5
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,7%	0,4	1,0 ; 2,8	1,09	26,4
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	1,17	99,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU RELIGIÓN (CALLAO)	NINGUNA VEZ	98,7%	0,4	97,6 ; 99,3	0,66	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,0%	0,4	0,5 ; 2,2	0,70	37,6
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	0,56	71,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SUS AMISTADES (TOTAL)	NINGUNA VEZ	98,9%	0,2	98,5 ; 99,2	1,40	0,2
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,0%	0,2	0,7 ; 1,4	1,43	17,9
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,3	1,09	48,2
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SUS AMISTADES (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	99,4%	0,3	98,2 ; 99,8	1,54	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,6%	0,3	0,2 ; 1,8	1,54	57,8
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SUS AMISTADES (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	98,4%	0,5	97,0 ; 99,1	1,94	0,5
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,5%	0,5	0,8 ; 2,9	1,99	33,3
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,62	100,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SUS AMISTADES (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	99,3%	0,2	98,8 ; 99,6	0,65	0,2
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,6%	0,2	0,3 ; 1,1	0,68	32,6
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,55	66,3
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SUS AMISTADES (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	98,4%	0,4	97,3 ; 99,1	1,10	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,4%	0,4	0,8 ; 2,5	1,10	28,8
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	1,17	99,9
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SUS AMISTADES (CALLAO)	NINGUNA VEZ	99,4%	0,3	98,2 ; 99,8	0,89	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,5%	0,3	0,2 ; 1,3	0,61	50,5
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	0,64	100,4
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU LUGAR DE NACIMIENTO (TOTAL)	NINGUNA VEZ	99,2%	0,2	98,8 ; 99,5	1,38	0,2
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,7%	0,1	0,4 ; 1,0	1,40	21,4
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	0,81	40,6
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU LUGAR DE NACIMIENTO (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	99,9%	0,1	99,2 ; 100,0	0,82	0,1
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,82	100,4
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU LUGAR DE NACIMIENTO (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	99,5%	0,4	97,6 ; 99,9	3,92	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,5%	0,4	0,1 ; 2,4	3,92	83,7
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU LUGAR DE NACIMIENTO (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	98,8%	0,3	98,1 ; 99,3	0,76	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,0%	0,3	0,6 ; 1,7	0,76	26,5
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,2%	0,1	0,0 ; 0,7	0,91	70,5
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU LUGAR DE NACIMIENTO (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	99,1%	0,3	98,1 ; 99,5	1,09	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,8%	0,3	0,4 ; 1,6	0,91	35,2
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	0,82	78,8
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU LUGAR DE NACIMIENTO (CALLAO)	NINGUNA VEZ	98,4%	0,6	96,8 ; 99,2	1,00	0,6
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,2%	0,5	0,6 ; 2,6	0,90	38,9
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	0,71	63,5
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU TALLA (TOTAL)	NINGUNA VEZ	98,8%	0,2	98,4 ; 99,1	1,21	0,2
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,2%	0,2	0,9 ; 1,6	1,22	15,3
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	0,81	50,8
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU TALLA (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	99,6%	0,3	98,6 ; 99,9	1,25	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,4%	0,3	0,1 ; 1,4	1,25	61,4
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU TALLA (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	98,6%	0,4	97,6 ; 99,2	1,36	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,3%	0,4	0,7 ; 2,3	1,37	29,7
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	1,17	100,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU TALLA (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	98,6%	0,4	97,7 ; 99,1	0,97	0,4
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,4%	0,4	0,8 ; 2,3	0,99	25,6
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	0,28	100,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU TALLA (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	98,2%	0,5	96,8 ; 99,0	1,37	0,5
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	1,7%	0,5	1,0 ; 3,0	1,35	29,2
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,58	70,4
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR SU TALLA (CALLAO)	NINGUNA VEZ	99,5%	0,3	98,7 ; 99,8	0,57	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,4%	0,2	0,2 ; 1,3	0,60	52,7
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,44	100,2
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR OTRA CONDICIÓN (TOTAL)	NINGUNA VEZ	99,2%	0,1	98,9 ; 99,5	1,23	0,1
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,5%	0,1	0,3 ; 0,8	1,02	21,5
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,1	0,1 ; 0,6	1,63	36,6
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR OTRA CONDICIÓN (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ	99,8%	0,1	99,2 ; 100,0	0,86	0,1
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,2%	0,1	0,0 ; 0,8	0,86	84,1
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR OTRA CONDICIÓN (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ	99,3%	0,3	98,4 ; 99,7	1,29	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,6%	0,3	0,3 ; 1,4	1,40	43,8
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,73	72,7
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR OTRA CONDICIÓN (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ	99,4%	0,2	98,8 ; 99,7	0,80	0,2
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,5%	0,2	0,2 ; 1,1	0,84	39,0
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,66	76,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR OTRA CONDICIÓN (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ	98,4%	0,5	97,0 ; 99,2	1,54	0,5
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,6%	0,2	0,3 ; 1,4	0,86	37,9
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,9%	0,5	0,4 ; 2,4	2,04	48,8
EN EL ÚLTIMO AÑO CON QUÉ FRECUENCIA HA SIDO DISCRIMINADO(A) POR OTRA CONDICIÓN (CALLAO)	NINGUNA VEZ	99,3%	0,3	98,3 ; 99,7	0,70	0,3
	RARA VEZ U OCASIONALMENTE	0,4%	0,3	0,1 ; 1,4	0,75	59,5
	FRECUENTE O MUY FRECUENTE	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	0,63	71,9
CIERTAS RAZAS SON MEJORES QUE OTRAS (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	4,9%	0,4	4,2 ; 5,7	1,32	7,6
	INDIFERENTE	1,2%	0,2	0,8 ; 1,6	1,46	16,7
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	93,9%	0,4	93,0 ; 94,7	1,41	0,5
CIERTAS RAZAS SON MEJORES QUE OTRAS (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	5,1%	1,0	3,4 ; 7,5	1,62	19,9
	INDIFERENTE	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,06	45,9
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	94,3%	1,0	91,9 ; 96,0	1,52	1,1
CIERTAS RAZAS SON MEJORES QUE OTRAS (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	4,0%	0,7	2,9 ; 5,6	1,42	17,0
	INDIFERENTE	1,8%	0,5	0,9 ; 3,2	2,06	31,4
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	94,2%	0,9	92,2 ; 95,8	1,78	1,0
CIERTAS RAZAS SON MEJORES QUE OTRAS (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	6,0%	0,8	4,6 ; 7,8	1,16	13,0
	INDIFERENTE	1,1%	0,3	0,6 ; 1,9	0,91	27,6
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	92,9%	0,9	91,0 ; 94,4	1,17	0,9
CIERTAS RAZAS SON MEJORES QUE OTRAS (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	5,5%	0,8	4,1 ; 7,4	1,20	15,0
	INDIFERENTE	1,0%	0,4	0,5 ; 2,1	1,28	36,7
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	93,4%	0,9	91,3 ; 95,1	1,30	1,0
CIERTAS RAZAS SON MEJORES QUE OTRAS (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	3,1%	0,8	1,8 ; 5,0	0,98	25,6
	INDIFERENTE	1,0%	0,4	0,4 ; 2,3	0,85	42,1
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	95,9%	0,9	93,8 ; 97,3	0,92	0,9
LA GENTE QUE HABLA CASTELLANO TIENE MAYOR NIVEL CULTURAL (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	8,9%	0,6	7,9 ; 10,1	1,69	6,3
	INDIFERENTE	1,3%	0,2	1,0 ; 1,8	1,51	16,1
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	89,8%	0,6	88,5 ; 90,9	1,69	0,7
LA GENTE QUE HABLA CASTELLANO TIENE MAYOR NIVEL CULTURAL (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	10,8%	1,7	7,9 ; 14,6	2,27	15,7
	INDIFERENTE	0,9%	0,6	0,2 ; 3,4	3,15	66,7
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	88,3%	1,8	84,4 ; 91,4	2,31	2,0
LA GENTE QUE HABLA CASTELLANO TIENE MAYOR NIVEL CULTURAL (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	7,5%	1,1	5,6 ; 10,1	2,21	15,2
	INDIFERENTE	1,2%	0,4	0,6 ; 2,5	1,91	36,3
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	91,2%	1,2	88,5 ; 93,3	2,17	1,3
LA GENTE QUE HABLA CASTELLANO TIENE MAYOR NIVEL CULTURAL (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	9,8%	1,0	8,0 ; 11,8	1,15	10,0
	INDIFERENTE	1,4%	0,4	0,9 ; 2,3	0,95	25,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	88,8%	1,1	86,6 ; 90,8	1,22	1,2
LA GENTE QUE HABLA CASTELLANO TIENE MAYOR NIVEL CULTURAL (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	9,9%	1,2	7,8 ; 12,5	1,39	11,8
	INDIFERENTE	2,0%	0,5	1,2 ; 3,3	1,13	24,6
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	88,1%	1,3	85,4 ; 90,3	1,36	1,4
LA GENTE QUE HABLA CASTELLANO TIENE MAYOR NIVEL CULTURAL (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	5,6%	1,2	3,7 ; 8,4	1,21	20,7
	INDIFERENTE	0,6%	0,3	0,2 ; 1,7	0,85	57,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	93,8%	1,2	91,0 ; 95,8	1,17	1,3
LAS PERSONAS DE HABLAR MOTOSO SON MENOS EDUCADAS (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	7,5%	0,5	6,6 ; 8,6	1,67	6,9
	INDIFERENTE	1,9%	0,3	1,4 ; 2,5	1,74	14,3
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	90,6%	0,6	89,4 ; 91,7	1,76	0,6

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
LAS PERSONAS DE HABLAR MOTOSO SON MENOS EDUCADAS (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	8,2%	1,5	5,7 ; 11,6	2,15	17,9
	INDIFERENTE	0,7%	0,4	0,3 ; 1,9	1,42	51,3
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	91,1%	1,5	87,6 ; 93,7	2,17	1,7
LAS PERSONAS DE HABLAR MOTOSO SON MENOS EDUCADAS (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	6,6%	1,0	4,8 ; 8,9	2,08	15,9
	INDIFERENTE	2,7%	0,7	1,6 ; 4,6	2,42	27,3
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	90,7%	1,3	87,8 ; 93,0	2,45	1,5
LAS PERSONAS DE HABLAR MOTOSO SON MENOS EDUCADAS (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	8,3%	0,9	6,6 ; 10,4	1,26	11,4
	INDIFERENTE	1,8%	0,5	1,1 ; 3,0	1,35	26,2
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	89,9%	1,0	87,6 ; 91,8	1,21	1,1
LAS PERSONAS DE HABLAR MOTOSO SON MENOS EDUCADAS (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	7,9%	1,1	6,0 ; 10,3	1,44	13,7
	INDIFERENTE	2,7%	0,6	1,7 ; 4,2	1,28	22,5
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	89,4%	1,3	86,7 ; 91,6	1,50	1,4
LAS PERSONAS DE HABLAR MOTOSO SON MENOS EDUCADAS (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	6,3%	1,2	4,3 ; 9,2	1,18	19,2
	INDIFERENTE	0,5%	0,3	0,2 ; 1,6	0,80	57,7
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	93,2%	1,2	90,4 ; 95,2	1,11	1,3
LOS HOMOSEXUALES SON DEGENERADOS (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	18,3%	0,8	16,8 ; 19,9	1,79	4,3
	INDIFERENTE	15,8%	0,7	14,5 ; 17,2	1,56	4,4
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	65,9%	1,0	64,0 ; 67,8	1,73	1,5
LOS HOMOSEXUALES SON DEGENERADOS (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	16,8%	2,0	13,2 ; 21,1	2,12	11,9
	INDIFERENTE	13,4%	1,6	10,6 ; 16,9	1,65	11,9
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	69,7%	2,4	64,9 ; 74,2	1,97	3,4
LOS HOMOSEXUALES SON DEGENERADOS (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	16,2%	1,6	13,3 ; 19,7	2,22	10,0
	INDIFERENTE	19,0%	1,7	15,9 ; 22,4	2,01	8,7
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	64,8%	2,1	60,6 ; 68,8	2,20	3,2
LOS HOMOSEXUALES SON DEGENERADOS (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	22,2%	1,6	19,2 ; 25,5	1,53	7,2
	INDIFERENTE	17,4%	1,2	15,1 ; 19,9	1,06	7,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	60,4%	1,4	56,9 ; 63,8	1,33	2,9
LOS HOMOSEXUALES SON DEGENERADOS (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	19,5%	1,6	16,5 ; 22,8	1,44	8,2
	INDIFERENTE	11,9%	1,3	9,6 ; 14,7	1,43	10,9
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	68,6%	2,0	64,6 ; 72,4	1,61	2,9
LOS HOMOSEXUALES SON DEGENERADOS (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	14,5%	1,9	11,2 ; 18,5	1,28	12,8
	INDIFERENTE	15,8%	2,1	12,1 ; 20,4	1,55	13,4
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	69,7%	2,3	64,9 ; 74,1	1,20	3,4
LAS PERSONAS DE MEJOR SITUACIÓN ECONÓMICA MERECE MEJOR TRATO (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	7,2%	0,5	6,3 ; 8,3	1,69	7,0
	INDIFERENTE	1,1%	0,2	0,8 ; 1,5	1,29	16,1
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	91,7%	0,5	90,6 ; 92,7	1,67	0,6
LAS PERSONAS DE MEJOR SITUACIÓN ECONÓMICA MERECE MEJOR TRATO (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	4,7%	1,1	3,1 ; 7,3	1,86	22,1
	INDIFERENTE	1,3%	0,4	0,7 ; 2,5	1,12	33,5
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	94,0%	1,2	91,2 ; 95,9	1,90	1,3
LAS PERSONAS DE MEJOR SITUACIÓN ECONÓMICA MERECE MEJOR TRATO (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	6,3%	1,0	4,6 ; 8,6	1,97	15,8
	INDIFERENTE	0,9%	0,3	0,5 ; 1,7	1,10	32,4
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	92,8%	1,0	90,5 ; 94,6	1,86	1,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
LAS PERSONAS DE MEJOR SITUACIÓN ECONÓMICA MERECE MEJOR TRATO (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	10,2%	1,1	8,1 ; 12,9	1,53	11,2
	INDIFERENTE	1,5%	0,4	0,9 ; 2,6	1,25	27,5
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	88,3%	1,2	85,7 ; 90,4	1,48	1,4
LAS PERSONAS DE MEJOR SITUACIÓN ECONÓMICA MERECE MEJOR TRATO (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	7,9%	1,1	6,1 ; 10,3	1,41	13,4
	INDIFERENTE	1,0%	0,5	0,4 ; 2,4	1,86	44,7
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	91,0%	1,2	88,5 ; 93,1	1,49	1,3
LAS PERSONAS DE MEJOR SITUACIÓN ECONÓMICA MERECE MEJOR TRATO (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	5,0%	1,1	3,3 ; 7,6	1,18	21,7
	INDIFERENTE	0,7%	0,4	0,2 ; 2,1	1,02	55,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	94,3%	1,1	91,6 ; 96,2	1,14	1,2
ALGUNAS RELIGIONES SON MEJORES QUE OTRAS (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	11,9%	0,7	10,6 ; 13,3	1,93	5,8
	INDIFERENTE	8,8%	0,5	7,8 ; 9,9	1,52	6,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	79,3%	0,8	77,6 ; 80,9	1,86	1,1
ALGUNAS RELIGIONES SON MEJORES QUE OTRAS (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	10,5%	1,9	7,3 ; 14,9	2,95	18,4
	INDIFERENTE	10,1%	1,5	7,5 ; 13,5	1,83	14,8
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	79,4%	2,3	74,5 ; 83,5	2,38	2,9
ALGUNAS RELIGIONES SON MEJORES QUE OTRAS (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	8,9%	1,2	6,9 ; 11,5	1,99	13,2
	INDIFERENTE	8,2%	1,2	6,2 ; 10,8	2,06	14,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	82,8%	1,6	79,5 ; 85,7	2,02	1,9
ALGUNAS RELIGIONES SON MEJORES QUE OTRAS (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	15,3%	1,3	12,8 ; 18,1	1,39	8,6
	INDIFERENTE	8,7%	0,9	7,0 ; 10,7	1,11	10,6
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	76,0%	1,5	73,1 ; 78,8	1,22	1,9
ALGUNAS RELIGIONES SON MEJORES QUE OTRAS (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	13,4%	1,5	10,8 ; 16,5	1,64	10,9
	INDIFERENTE	9,3%	1,1	7,3 ; 11,7	1,35	12,1
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	77,3%	2,0	73,3 ; 80,9	1,96	2,5
ALGUNAS RELIGIONES SON MEJORES QUE OTRAS (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	11,0%	2,0	7,7 ; 15,5	1,88	18,0
	INDIFERENTE	7,4%	1,2	5,4 ; 10,1	0,96	16,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	81,6%	2,4	76,5 ; 85,8	1,76	2,9
TODAS LAS IDEAS POLÍTICAS DEBEN EXPRESARSE LIBREMENTE (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	94,0%	0,4	93,1 ; 94,7	1,22	0,4
	INDIFERENTE	2,4%	0,3	1,9 ; 2,9	1,29	11,1
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	3,7%	0,3	3,1 ; 4,4	1,30	8,9
TODAS LAS IDEAS POLÍTICAS DEBEN EXPRESARSE LIBREMENTE (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	95,1%	0,9	93,0 ; 96,6	1,28	0,9
	INDIFERENTE	2,5%	0,7	1,3 ; 4,4	1,74	30,3
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	2,5%	0,6	1,5 ; 4,0	1,16	24,6
TODAS LAS IDEAS POLÍTICAS DEBEN EXPRESARSE LIBREMENTE (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	94,3%	0,9	92,3 ; 95,8	1,67	0,9
	INDIFERENTE	2,4%	0,5	1,6 ; 3,7	1,36	21,7
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	3,3%	0,8	2,1 ; 5,2	2,11	22,9
TODAS LAS IDEAS POLÍTICAS DEBEN EXPRESARSE LIBREMENTE (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	93,2%	0,7	91,6 ; 94,5	0,92	0,8
	INDIFERENTE	2,3%	0,5	1,5 ; 3,5	1,10	21,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	4,5%	0,6	3,4 ; 5,9	0,97	14,0
TODAS LAS IDEAS POLÍTICAS DEBEN EXPRESARSE LIBREMENTE (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	92,8%	0,9	90,8 ; 94,4	1,10	1,0
	INDIFERENTE	2,5%	0,5	1,6 ; 3,8	1,07	21,5
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	4,7%	0,7	3,4 ; 6,4	1,08	15,6

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
TODAS LAS IDEAS POLÍTICAS DEBEN EXPRESARSE LIBREMENTE (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	95,4%	1,0	92,9 ; 97,1	1,19	1,1
	INDIFERENTE	2,0%	0,7	1,0 ; 3,9	1,15	35,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	2,6%	0,7	1,5 ; 4,4	0,90	26,7
LAS MUJERES DEBERÍAN ACCEDER A PUESTOS PÚBLICOS IMPORTANTES (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	95,0%	0,4	94,2 ; 95,7	1,38	0,4
	INDIFERENTE	2,3%	0,3	1,8 ; 2,9	1,46	12,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	2,7%	0,3	2,2 ; 3,4	1,39	10,6
LAS MUJERES DEBERÍAN ACCEDER A PUESTOS PÚBLICOS IMPORTANTES (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	95,9%	1,0	93,5 ; 97,5	1,89	1,0
	INDIFERENTE	2,0%	0,7	1,1 ; 3,9	1,71	32,9
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	2,1%	0,8	1,0 ; 4,3	2,27	37,6
LAS MUJERES DEBERÍAN ACCEDER A PUESTOS PÚBLICOS IMPORTANTES (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	94,8%	0,8	93,0 ; 96,2	1,61	0,9
	INDIFERENTE	3,0%	0,7	2,0 ; 4,7	1,81	22,2
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	2,1%	0,5	1,3 ; 3,3	1,41	23,6
LAS MUJERES DEBERÍAN ACCEDER A PUESTOS PÚBLICOS IMPORTANTES (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	94,7%	0,7	93,1 ; 95,9	1,07	0,8
	INDIFERENTE	1,8%	0,4	1,2 ; 2,7	0,84	20,5
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	3,5%	0,7	2,4 ; 5,1	1,41	19,1
LAS MUJERES DEBERÍAN ACCEDER A PUESTOS PÚBLICOS IMPORTANTES (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	94,7%	0,8	92,9 ; 96,0	1,14	0,8
	INDIFERENTE	2,2%	0,6	1,3 ; 3,7	1,43	26,5
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	3,1%	0,6	2,1 ; 4,5	1,06	19,0
LAS MUJERES DEBERÍAN ACCEDER A PUESTOS PÚBLICOS IMPORTANTES (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	95,2%	1,1	92,4 ; 97,0	1,30	1,2
	INDIFERENTE	1,8%	0,6	1,0 ; 3,3	0,87	31,6
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	3,0%	0,8	1,8 ; 5,1	1,06	26,7
LAS PERSONAS MAYORES SON UNA CARGA PARA LA SOCIEDAD (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	7,2%	0,5	6,3 ; 8,2	1,41	6,4
	INDIFERENTE	1,4%	0,2	1,0 ; 1,9	1,54	15,8
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	91,4%	0,5	90,4 ; 92,3	1,42	0,6
LAS PERSONAS MAYORES SON UNA CARGA PARA LA SOCIEDAD (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	5,5%	1,0	3,8 ; 7,9	1,60	19,0
	INDIFERENTE	1,1%	0,4	0,5 ; 2,2	1,17	37,6
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	93,5%	1,1	90,9 ; 95,3	1,55	1,2
LAS PERSONAS MAYORES SON UNA CARGA PARA LA SOCIEDAD (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	7,2%	1,0	5,5 ; 9,5	1,80	14,0
	INDIFERENTE	1,6%	0,5	0,8 ; 3,1	2,27	34,9
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	91,2%	1,1	88,8 ; 93,2	1,82	1,2
LAS PERSONAS MAYORES SON UNA CARGA PARA LA SOCIEDAD (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	8,6%	0,9	7,0 ; 10,6	1,15	10,7
	INDIFERENTE	1,4%	0,3	0,9 ; 2,2	0,83	23,7
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	90,0%	1,0	88,0 ; 91,8	1,11	1,1
LAS PERSONAS MAYORES SON UNA CARGA PARA LA SOCIEDAD (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	6,9%	0,9	5,3 ; 9,0	1,18	13,2
	INDIFERENTE	1,5%	0,5	0,7 ; 3,0	1,74	35,8
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	91,6%	1,0	89,4 ; 93,4	1,23	1,1
LAS PERSONAS MAYORES SON UNA CARGA PARA LA SOCIEDAD (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	7,3%	1,3	5,1 ; 10,3	1,22	18,1
	INDIFERENTE	1,4%	0,6	0,6 ; 3,1	1,10	40,5
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	91,3%	1,5	88,0 ; 93,8	1,32	1,6
POLÍTICOS QUE NO CREEN EN DIOS NO ESTÁN APTOS PARA UN CARGO PÚBLICO (TOTAL)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	32,4%	1,0	30,4 ; 34,5	2,09	3,2
	INDIFERENTE	16,9%	0,8	15,4 ; 18,5	1,84	4,6
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	50,7%	1,1	48,5 ; 52,8	2,03	2,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
POLÍTICOS QUE NO CREEN EN DIOS NO ESTÁN APTOS PARA UN CARGO PÚBLICO (LIMA CENTRO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	26,7%	2,6	21,9 ; 32,1	2,55	9,8
	INDIFERENTE	17,6%	2,0	13,9 ; 22,0	2,11	11,6
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	55,7%	2,9	49,9 ; 61,3	2,52	5,2
POLÍTICOS QUE NO CREEN EN DIOS NO ESTÁN APTOS PARA UN CARGO PÚBLICO (LIMA NORTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	27,3%	2,0	23,5 ; 31,3	2,21	7,3
	INDIFERENTE	20,9%	1,8	17,5 ; 24,6	2,16	8,6
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	51,9%	2,2	47,6 ; 56,2	2,11	4,2
POLÍTICOS QUE NO CREEN EN DIOS NO ESTÁN APTOS PARA UN CARGO PÚBLICO (LIMA ESTE)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	39,4%	1,9	35,8 ; 43,2	1,57	4,8
	INDIFERENTE	13,8%	1,2	11,6 ; 16,4	1,29	8,9
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	46,8%	2,0	43,0 ; 50,7	1,61	4,2
POLÍTICOS QUE NO CREEN EN DIOS NO ESTÁN APTOS PARA UN CARGO PÚBLICO (LIMA SUR)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	35,2%	2,4	30,6 ; 40,0	2,24	6,8
	INDIFERENTE	17,5%	1,5	14,7 ; 20,7	1,42	8,6
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	47,3%	2,4	42,5 ; 52,1	2,15	5,2
POLÍTICOS QUE NO CREEN EN DIOS NO ESTÁN APTOS PARA UN CARGO PÚBLICO (CALLAO)	DE ACUERDO O TOTALMENTE DE ACUERDO	33,1%	2,7	28,0 ; 38,7	1,559	8,3
	INDIFERENTE	11,9%	2,1	8,3 ; 16,8	2,02	18,0
	EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO	54,9%	2,9	49,2 ; 60,5	1,55	5,3
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRISTE (TOTAL)	NUNCA	14,3%	0,8	12,9 ; 15,9	2,05	5,3
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	76,5%	0,8	74,9 ; 78,1	1,68	1,1
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	9,1%	0,5	8,2 ; 10,2	1,36	5,5
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRISTE (LIMA CENTRO)	NUNCA	21,9%	2,7	17,1 ; 27,6	3,21	12,2
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	71,6%	2,7	66,1 ; 76,6	2,73	3,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,5%	1,1	4,6 ; 9,0	1,49	16,8
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRISTE (LIMA NORTE)	NUNCA	14,6%	1,4	12,0 ; 17,7	1,99	9,9
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	76,0%	1,6	72,7 ; 79,0	1,64	2,1
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	9,4%	1,2	7,4 ; 12,0	1,89	12,4
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRISTE (LIMA ESTE)	NUNCA	9,9%	1,0	8,1 ; 12,2	1,32	10,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	79,6%	1,3	77,0 ; 82,0	1,09	1,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	10,5%	0,9	8,9 ; 12,4	0,94	8,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRISTE (LIMA SUR)	NUNCA	9,9%	1,3	7,7 ; 12,7	1,66	12,8
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	80,0%	1,6	76,8 ; 82,9	1,40	2,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	10,1%	1,1	8,1 ; 12,5	1,23	10,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRISTE (CALLAO)	NUNCA	20,1%	2,3	15,9 ; 25,0	1,59	11,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	72,3%	2,6	67,0 ; 77,1	1,58	3,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,6%	1,3	5,3 ; 10,7	1,24	17,7
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TENSO (TOTAL)	NUNCA	21,3%	0,8	19,8 ; 22,9	1,64	3,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	68,8%	0,8	67,1 ; 70,4	1,48	1,2
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	10,0%	0,5	9,0 ; 11,0	1,27	5,1
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TENSO (LIMA CENTRO)	NUNCA	19,5%	2,1	15,8 ; 24,0	2,13	10,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	70,7%	2,1	66,4 ; 74,7	1,68	3,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	9,8%	1,4	7,3 ; 13,0	1,83	14,8
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TENSO (LIMA NORTE)	NUNCA	20,8%	1,6	17,8 ; 24,2	1,93	7,9
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	71,4%	1,9	67,5 ; 74,9	2,06	2,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,8%	1,0	6,0 ; 10,0	1,65	12,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TENSO (LIMA ESTE)	NUNCA	20,6%	1,4	18,0 ; 23,4	1,26	6,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	67,8%	1,5	64,8 ; 70,7	1,15	2,2
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	11,6%	0,9	10,0 ; 13,5	0,83	7,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TENSO (LIMA SUR)	NUNCA	19,3%	1,5	16,5 ; 22,5	1,38	7,9
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	67,5%	1,6	64,4 ; 70,5	1,02	2,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	13,2%	1,2	11,1 ; 15,7	1,08	8,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TENSO (CALLAO)	NUNCA	30,4%	2,7	25,5 ; 35,9	1,59	8,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	63,8%	2,6	58,6 ; 68,7	1,38	4,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,7%	1,0	4,0 ; 8,1	0,95	18,0
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ANGUSTIADO (TOTAL)	NUNCA	40,2%	1,0	38,3 ; 42,2	1,82	2,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	53,3%	1,0	51,4 ; 55,2	1,68	1,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,5%	0,4	5,7 ; 7,4	1,28	6,5
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ANGUSTIADO (LIMA CENTRO)	NUNCA	45,5%	2,8	40,2 ; 51,0	2,34	6,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	49,0%	2,5	44,1 ; 54,0	1,95	5,1
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,4%	1,1	3,7 ; 8,0	1,77	20,0
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ANGUSTIADO (LIMA NORTE)	NUNCA	37,9%	2,0	34,0 ; 42,0	2,08	5,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	55,6%	2,0	51,6 ; 59,5	1,96	3,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,5%	0,9	5,0 ; 8,5	1,56	13,7
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ANGUSTIADO (LIMA ESTE)	NUNCA	37,3%	1,8	33,9 ; 40,8	1,45	4,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	55,3%	1,7	51,9 ; 58,7	1,34	3,2
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,4%	0,8	6,0 ; 9,1	0,95	10,4
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ANGUSTIADO (LIMA SUR)	NUNCA	37,4%	2,0	33,5 ; 41,4	1,61	5,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	55,4%	2,1	51,4 ; 59,4	1,58	3,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,2%	0,9	5,6 ; 9,2	1,19	12,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ANGUSTIADO (CALLAO)	NUNCA	49,7%	2,9	44,1 ; 55,3	1,57	5,8
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	45,7%	2,7	40,4 ; 51,1	1,45	6,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	4,6%	0,9	3,1 ; 6,8	0,93	20,0
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: IRRITABLE (TOTAL)	NUNCA	34,0%	1,0	32,0 ; 36,1	2,18	3,1
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	58,3%	1,0	56,3 ; 60,3	1,94	1,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,7%	0,5	6,8 ; 8,6	1,30	5,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: IRRITABLE (LIMA CENTRO)	NUNCA	40,9%	3,2	34,8 ; 47,3	3,28	7,9
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	52,5%	2,9	46,9 ; 58,1	2,55	5,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,6%	1,1	4,7 ; 9,2	1,58	17,1
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: IRRITABLE (LIMA NORTE)	NUNCA	32,1%	2,1	28,1 ; 36,4	2,44	6,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	59,8%	2,2	55,4 ; 64,1	2,40	3,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	8,1%	1,0	6,3 ; 10,3	1,67	12,7
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: IRRITABLE (LIMA ESTE)	NUNCA	33,6%	1,6	30,5 ; 36,8	1,26	4,8
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	59,0%	1,6	55,9 ; 62,1	1,13	2,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,4%	0,8	6,0 ; 9,2	1,00	10,7
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: IRRITABLE (LIMA SUR)	NUNCA	29,5%	1,9	25,9 ; 33,4	1,62	6,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	61,6%	1,9	57,8 ; 65,3	1,41	3,1
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	8,9%	1,0	7,1 ; 11,1	1,17	11,4
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: IRRITABLE (CALLAO)	NUNCA	37,3%	3,5	30,7 ; 44,5	2,57	9,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	55,9%	3,6	48,9 ; 62,7	2,44	6,4
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,8%	1,1	4,9 ; 9,3	0,92	16,3
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: PREOCUPADO (TOTAL)	NUNCA	10,8%	0,6	9,7 ; 12,0	1,61	5,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	69,1%	0,9	67,4 ; 70,8	1,56	1,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	20,1%	0,7	18,7 ; 21,6	1,45	3,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: PREOCUPADO (LIMA CENTRO)	NUNCA	11,5%	1,7	8,6 ; 15,3	2,16	14,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	72,0%	2,3	67,2 ; 76,4	2,09	3,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	16,5%	1,8	13,3 ; 20,2	1,72	10,7
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: PREOCUPADO (LIMA NORTE)	NUNCA	10,0%	1,3	7,7 ; 12,8	2,14	12,8
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	71,1%	1,8	67,4 ; 74,5	1,88	2,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	18,9%	1,5	16,1 ; 22,0	1,72	7,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: PREOCUPADO (LIMA ESTE)	NUNCA	9,8%	1,0	8,1 ; 11,9	1,12	9,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	67,5%	1,5	64,5 ; 70,4	1,13	2,2
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	22,7%	1,3	20,2 ; 25,4	1,10	5,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: PREOCUPADO (LIMA SUR)	NUNCA	11,3%	1,1	9,2 ; 13,7	1,16	10,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	66,3%	1,8	62,6 ; 69,8	1,39	2,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	22,4%	1,6	19,4 ; 25,7	1,34	7,1
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: PREOCUPADO (CALLAO)	NUNCA	12,9%	1,8	9,7 ; 17,0	1,43	14,2
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	68,5%	2,2	64,0 ; 72,8	1,11	3,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	18,5%	2,0	15,0 ; 22,7	1,23	10,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRANQUILO (TOTAL)	NUNCA	2,0%	0,3	1,5 ; 2,6	1,60	13,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	26,9%	0,8	25,4 ; 28,5	1,45	3,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	71,1%	0,8	69,5 ; 72,7	1,47	1,2
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRANQUILO (LIMA CENTRO)	NUNCA	2,7%	0,8	1,4 ; 4,9	2,08	31,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	26,1%	1,9	22,5 ; 30,1	1,51	7,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	71,2%	2,1	67,0 ; 75,2	1,62	2,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRANQUILO (LIMA NORTE)	NUNCA	2,1%	0,5	1,3 ; 3,4	1,55	24,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	31,7%	1,8	28,4 ; 35,3	1,69	5,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	66,2%	1,8	62,6 ; 69,6	1,68	2,7
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRANQUILO (LIMA ESTE)	NUNCA	1,6%	0,5	0,8 ; 3,0	1,84	32,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	24,0%	1,4	21,4 ; 26,9	1,16	5,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	74,4%	1,4	71,5 ; 77,1	1,15	1,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRANQUILO (LIMA SUR)	NUNCA	1,8%	0,5	1,1 ; 2,9	1,08	25,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	26,8%	1,7	23,6 ; 30,3	1,37	6,4
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	71,4%	1,8	67,8 ; 74,8	1,44	2,5
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TRANQUILO (CALLAO)	NUNCA	1,8%	0,6	0,9 ; 3,6	1,07	34,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	23,0%	2,3	18,8 ; 27,9	1,44	10,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	75,2%	2,4	70,2 ; 79,5	1,43	3,1
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ALEGRE (TOTAL)	NUNCA	1,0%	0,2	0,6 ; 1,4	1,85	20,8
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	21,7%	0,8	20,2 ; 23,3	1,60	3,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	77,3%	0,8	75,7 ; 78,8	1,58	1,0
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ALEGRE (LIMA CENTRO)	NUNCA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,8	1,51	57,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	24,0%	2,1	20,2 ; 28,3	1,79	8,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	75,4%	2,1	70,9 ; 79,3	1,89	2,8
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ALEGRE (LIMA NORTE)	NUNCA	1,2%	0,5	0,5 ; 2,5	2,23	40,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	23,4%	1,8	20,1 ; 27,2	2,16	7,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	75,4%	1,8	71,6 ; 78,8	2,17	2,4
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ALEGRE (LIMA ESTE)	NUNCA	1,3%	0,5	0,6 ; 2,7	2,00	37,2
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	20,5%	1,2	18,3 ; 23,0	0,98	5,9
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	78,1%	1,2	75,6 ; 80,5	0,97	1,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ALEGRE (LIMA SUR)	NUNCA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,12	41,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	21,7%	1,6	18,8 ; 24,9	1,34	7,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	77,6%	1,6	74,3 ; 80,6	1,37	2,1
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ALEGRE (CALLAO)	NUNCA	0,7%	0,5	0,2 ; 2,6	1,54	69,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	16,5%	1,8	13,2 ; 20,5	1,18	11,2
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	82,8%	1,8	78,9 ; 86,1	1,11	2,2
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ABURRIDO (TOTAL)	NUNCA	36,3%	1,0	34,4 ; 38,3	1,92	2,8
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	56,7%	1,0	54,8 ; 58,6	1,73	1,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,0%	0,4	6,2 ; 7,9	1,37	6,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ABURRIDO (LIMA CENTRO)	NUNCA	43,6%	2,7	38,3 ; 49,0	2,34	6,3
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	51,2%	2,6	46,1 ; 56,3	2,10	5,1
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,2%	1,2	3,4 ; 8,0	2,07	22,1
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ABURRIDO (LIMA NORTE)	NUNCA	35,9%	2,1	31,9 ; 40,1	2,27	5,9
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	56,7%	2,0	52,7 ; 60,6	1,97	3,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,4%	1,0	5,7 ; 9,5	1,58	12,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ABURRIDO (LIMA ESTE)	NUNCA	32,4%	1,6	29,3 ; 35,7	1,31	5,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	60,7%	1,7	57,4 ; 64,0	1,27	2,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,9%	0,8	5,5 ; 8,6	1,06	11,5
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ABURRIDO (LIMA SUR)	NUNCA	31,3%	2,0	27,5 ; 35,4	1,70	6,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	59,9%	1,9	56,0 ; 63,6	1,43	3,2
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	8,8%	1,0	7,0 ; 11,1	1,24	11,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: ABURRIDO (CALLAO)	NUNCA	44,0%	2,9	38,3 ; 49,8	1,66	6,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	50,4%	3,1	44,3 ; 56,5	1,85	6,2
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,6%	1,0	3,9 ; 8,0	0,95	18,3
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: OTRO (TOTAL)	NUNCA	78,2%	5,1	66,6 ; 86,6	1,41	6,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	10,7%	3,7	5,3 ; 20,2	1,29	34,2
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	11,1%	4,0	5,3 ; 21,7	1,49	36,0
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: OTRO (LIMA CENTRO)	NUNCA	72,0%	24,0	19,9 ; 96,4	2,17	33,3
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	28,0%	24,0	3,6 ; 80,1	2,17	85,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: OTRO (LIMA NORTE)	NUNCA	60,1%	14,4	31,7 ; 83,0	1,69	23,9
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	13,2%	8,9	3,2 ; 41,2	1,36	67,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	26,7%	13,7	8,4 ; 59,1	1,89	51,4
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: OTRO (LIMA ESTE)	NUNCA	79,3%	10,2	53,1 ; 92,8	0,95	12,9
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	5,4%	5,3	0,7 ; 30,7	0,83	98,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	15,3%	9,0	4,4 ; 41,5	0,94	58,8
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: OTRO (LIMA SUR)	NUNCA	89,0%	4,6	76,3 ; 95,3	0,90	5,2
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	10,4%	4,6	4,2 ; 23,3	0,94	44,1
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	0,6%	0,6	0,1 ; 4,3	1,02	26,2
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: OTRO (CALLAO)	NUNCA	70,1%	18,5	29,3 ; 93,0	1,33	26,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	29,9%	18,5	7,0 ; 70,7	1,33	61,8
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: NERVIOSO(A) (TOTAL)	NUNCA	47,9%	1,1	45,8 ; 50,0	1,97	2,2
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	47,3%	1,0	45,2 ; 49,3	1,91	2,2
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	4,8%	0,4	4,2 ; 5,6	1,28	7,5
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: NERVIOSO(A) (LIMA CENTRO)	NUNCA	54,8%	3,2	48,5 ; 60,9	3,13	5,8
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	40,0%	3,0	34,2 ; 46,0	2,91	7,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,2%	1,0	3,5 ; 7,6	1,64	19,7
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: NERVIOSO(A) (LIMA NORTE)	NUNCA	44,8%	2,1	40,8 ; 48,9	2,03	4,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	50,6%	2,1	46,5 ; 54,6	2,00	4,1
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	4,6%	0,8	3,3 ; 6,5	1,67	17,0
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: NERVIOSO(A) (LIMA ESTE)	NUNCA	44,7%	1,9	41,0 ; 48,6	1,66	4,3
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	51,2%	1,9	47,5 ; 54,8	1,51	3,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	4,1%	0,5	3,2 ; 5,3	0,81	13,2
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: NERVIOSO(A) (LIMA SUR)	NUNCA	41,5%	1,9	37,8 ; 45,4	1,40	4,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	51,7%	2,0	47,7 ; 55,7	1,54	4,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,8%	0,9	5,3 ; 8,7	1,07	12,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: NERVIOSO(A) (CALLAO)	NUNCA	63,9%	2,8	58,2 ; 69,3	1,67	4,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	33,4%	2,8	28,1 ; 39,2	1,72	8,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,6%	0,7	1,5 ; 4,5	0,98	27,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: SIN ESPERANZA (TOTAL)	NUNCA	80,1%	0,8	78,6 ; 81,6	1,65	1,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	17,7%	0,7	16,4 ; 19,2	1,61	4,1
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,1%	0,3	1,7 ; 2,7	1,43	12,1
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: SIN ESPERANZA (LIMA CENTRO)	NUNCA	83,5%	1,9	79,4 ; 86,9	2,01	2,3
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	15,1%	1,9	11,8 ; 19,2	2,08	12,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,4%	0,7	0,5 ; 3,5	2,41	47,2
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: SIN ESPERANZA (LIMA NORTE)	NUNCA	77,9%	1,6	74,7 ; 80,8	1,68	2,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	19,1%	1,5	16,4 ; 22,2	1,69	12,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,9%	0,6	1,9 ; 4,5	1,69	21,7
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: SIN ESPERANZA (LIMA ESTE)	NUNCA	79,0%	1,4	76,2 ; 81,6	1,28	1,8
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	18,9%	1,3	16,4 ; 21,6	1,22	7,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,1%	0,4	1,4 ; 3,1	0,88	19,4
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: SIN ESPERANZA (LIMA SUR)	NUNCA	78,6%	1,8	74,9 ; 81,9	1,72	2,3
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	19,0%	1,6	16,1 ; 22,2	1,47	8,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,4%	0,6	1,5 ; 3,8	1,26	23,5
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: SIN ESPERANZA (CALLAO)	NUNCA	85,5%	2,3	80,4 ; 89,4	1,98	2,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	13,6%	2,2	9,8 ; 18,6	2,06	16,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	0,9%	0,4	0,4 ; 2,1	0,79	41,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INQUIETO(A) O INTRANQUILO(A) (TOTAL)	NUNCA	54,1%	1,1	52,0 ; 56,3	2,16	2,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	40,9%	1,0	38,9 ; 42,9	1,96	2,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,0%	0,4	4,2 ; 5,8	1,50	8,0
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INQUIETO(A) O INTRANQUILO(A) (LIMA CENTRO)	NUNCA	60,0%	3,1	53,8 ; 66,0	3,11	5,2
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	35,9%	3,0	30,3 ; 41,9	2,98	8,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	4,1%	0,9	2,6 ; 6,2	1,56	21,8
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INQUIETO(A) O INTRANQUILO(A) (LIMA NORTE)	NUNCA	49,5%	2,2	45,2 ; 53,9	2,32	4,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	44,6%	2,1	40,6 ; 48,7	2,07	4,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,9%	0,9	4,3 ; 8,0	1,87	15,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INQUIETO(A) O INTRANQUILO(A) (LIMA ESTE)	NUNCA	54,5%	2,0	50,7 ; 58,3	1,67	3,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	40,1%	1,8	36,7 ; 43,6	1,40	4,4
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,3%	0,7	4,2 ; 6,8	0,98	12,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INQUIETO(A) O INTRANQUILO(A) (LIMA SUR)	NUNCA	48,3%	2,2	44,0 ; 52,7	1,81	4,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	46,6%	2,1	42,5 ; 50,8	1,65	4,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	5,1%	0,8	3,6 ; 7,0	1,34	16,5
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INQUIETO(A) O INTRANQUILO(A) (CALLAO)	NUNCA	66,3%	3,0	60,2 ; 72,0	1,93	4,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	30,5%	2,8	25,2 ; 36,4	1,83	9,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	3,1%	1,2	1,5 ; 6,5	2,17	37,5
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TAN DEPRIMIDO(A) QUE NADA PODÍA ANIMARLE (TOTAL)	NUNCA	79,3%	0,8	77,8 ; 80,7	1,54	1,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	18,6%	0,7	17,2 ; 20,0	1,50	3,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,1%	0,3	1,7 ; 2,7	1,47	12,3
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TAN DEPRIMIDO(A) QUE NADA PODÍA ANIMARLE (LIMA CENTRO)	NUNCA	81,5%	1,8	77,6 ; 84,8	1,74	2,3
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	16,4%	1,7	13,2 ; 20,1	1,70	10,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,2%	0,7	1,1 ; 4,1	1,86	33,2
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TAN DEPRIMIDO(A) QUE NADA PODÍA ANIMARLE (LIMA NORTE)	NUNCA	76,6%	1,6	73,3 ; 79,6	1,69	2,1
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	21,1%	1,5	18,2 ; 24,3	1,70	7,3
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,3%	0,6	1,4 ; 4,0	2,07	27,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TAN DEPRIMIDO(A) QUE NADA PODÍA ANIMARLE (LIMA ESTE)	NUNCA	78,3%	1,4	75,5 ; 80,9	1,20	1,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	19,7%	1,3	17,4 ; 22,3	1,10	6,4
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,9%	0,4	1,2 ; 3,0	1,07	22,4
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TAN DEPRIMIDO(A) QUE NADA PODÍA ANIMARLE (LIMA SUR)	NUNCA	79,2%	1,7	75,7 ; 82,3	1,57	2,1
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	18,4%	1,6	15,5 ; 21,7	1,49	8,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,4%	0,5	1,6 ; 3,6	1,05	21,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: TAN DEPRIMIDO(A) QUE NADA PODÍA ANIMARLE (CALLAO)	NUNCA	84,8%	2,1	80,2 ; 88,4	1,59	2,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	13,7%	2,0	10,2 ; 18,1	1,60	14,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,5%	0,5	0,8 ; 2,8	0,71	31,0
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: QUE TODO LE SUPONÍA UN GRAN ESFUERZO (TOTAL)	NUNCA	72,3%	1,0	70,4 ; 74,2	2,03	1,3
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	21,6%	0,8	20,1 ; 23,3	1,67	3,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,0%	0,5	5,2 ; 7,0	1,73	7,8
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: QUE TODO LE SUPONÍA UN GRAN ESFUERZO (LIMA CENTRO)	NUNCA	78,3%	2,0	74,2 ; 82,0	1,79	2,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	20,0%	2,0	16,4 ; 24,1	1,84	9,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,7%	0,5	1,0 ; 3,0	1,06	28,1
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: QUE TODO LE SUPONÍA UN GRAN ESFUERZO (LIMA NORTE)	NUNCA	70,7%	1,9	66,9 ; 74,3	2,02	2,7
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	22,5%	1,8	19,2 ; 26,1	2,11	7,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	6,8%	1,1	5,0 ; 9,1	2,07	15,5
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: QUE TODO LE SUPONÍA UN GRAN ESFUERZO (LIMA ESTE)	NUNCA	68,3%	1,8	64,5 ; 71,8	1,56	2,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	24,0%	1,4	21,4 ; 26,9	1,16	5,8
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,7%	1,0	5,9 ; 9,9	1,50	12,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: QUE TODO LE SUPONÍA UN GRAN ESFUERZO (LIMA SUR)	NUNCA	69,4%	2,5	64,3 ; 74,1	2,73	3,6
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	22,9%	1,8	19,6 ; 26,5	1,61	7,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	7,7%	1,2	5,7 ; 10,4	1,81	15,4
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: QUE TODO LE SUPONÍA UN GRAN ESFUERZO (CALLAO)	NUNCA	81,6%	2,4	76,3 ; 85,9	1,88	3,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	14,4%	2,0	10,9 ; 18,8	1,57	14,0
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	4,1%	1,0	2,5 ; 6,6	1,25	24,9
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INÚTIL (TOTAL)	NUNCA	85,5%	0,7	84,1 ; 86,8	1,69	0,8
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	12,8%	0,6	11,5 ; 14,1	1,67	5,1
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,7%	0,2	1,3 ; 2,2	1,44	13,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INÚTIL (LIMA CENTRO)	NUNCA	85,8%	1,8	81,9 ; 89,0	2,07	2,1
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	11,9%	1,7	8,9 ; 15,8	2,22	14,6
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	2,2%	0,7	1,2 ; 4,3	1,94	33,2
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INÚTIL (LIMA NORTE)	NUNCA	88,1%	1,3	85,3 ; 90,4	1,92	1,5
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	10,5%	1,2	8,3 ; 13,2	1,91	11,7
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,4%	0,4	0,8 ; 2,4	1,38	28,7
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INÚTIL (LIMA ESTE)	NUNCA	85,1%	1,2	82,6 ; 87,2	1,18	1,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	13,2%	1,1	11,1 ; 15,6	1,19	8,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,7%	0,4	1,1 ; 2,8	1,15	24,6
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INÚTIL (LIMA SUR)	NUNCA	81,5%	1,6	78,1 ; 84,5	1,62	2,0
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	16,7%	1,5	14,0 ; 19,8	1,46	8,9
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,8%	0,5	1,0 ; 3,1	1,33	28,3
PREVALENCIA DE SENTIMIENTO ANÍMICO: INÚTIL (CALLAO)	NUNCA	87,3%	2,1	82,6 ; 90,9	1,90	2,4
	RARAS VECES U OCASIONALMENTE	11,1%	2,1	7,6 ; 15,8	2,04	18,5
	SIEMPRE O CASI SIEMPRE	1,6%	0,7	0,7 ; 3,6	1,39	42,3
SE DESCRIBIRÍA USTED MISMO COMO: (TOTAL)	FELIZ E INTERESADO POR LA VIDA	72,9%	0,9	71,1 ; 74,6	1,77	1,2
	ALGO FELIZ	24,3%	0,8	22,6 ; 26,0	1,72	3,5
	ALGO INFELIZ	1,9%	0,2	1,4 ; 2,4	1,49	13,3
	INFELIZ Y CON POCO INTERÉS EN LA VIDA	0,8%	0,2	0,6 ; 1,3	1,84	22,0
	TAN INFELIZ QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO	0,1%	0,0	0,0 ; 0,3	0,90	42,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SE DESCRIBIRÍA USTED MISMO COMO: (LIMA CENTRO)	FELIZ E INTERESADO POR LA VIDA	77,3%	2,2	72,8 ; 81,3	2,03	2,8
	ALGO FELIZ	19,5%	1,9	16,0 ; 23,6	1,84	10,0
	ALGO INFELIZ	2,0%	0,6	1,1 ; 3,7	1,57	31,9
	INFELIZ Y CON POCO INTERÉS EN LA VIDA	1,0%	0,6	0,3 ; 3,2	2,90	62,3
	TAN INFELIZ QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,03	71,4
SE DESCRIBIRÍA USTED MISMO COMO: (LIMA NORTE)	FELIZ E INTERESADO POR LA VIDA	71,9%	1,9	67,9 ; 75,5	2,22	2,7
	ALGO FELIZ	25,3%	1,9	21,8 ; 29,2	2,22	7,4
	ALGO INFELIZ	1,5%	0,4	0,9 ; 2,7	1,51	28,7
	INFELIZ Y CON POCO INTERÉS EN LA VIDA	1,2%	0,5	0,6 ; 2,5	2,13	38,6
	TAN INFELIZ QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO	0,1%	0,1	0,0 ; 0,3	0,47	71,0
SE DESCRIBIRÍA USTED MISMO COMO: (LIMA ESTE)	FELIZ E INTERESADO POR LA VIDA	72,4%	1,5	69,3 ; 75,2	1,22	2,1
	ALGO FELIZ	24,9%	1,4	22,2 ; 27,8	1,19	5,8
	ALGO INFELIZ	2,1%	0,6	1,3 ; 3,6	1,68	26,5
	INFELIZ Y CON POCO INTERÉS EN LA VIDA	0,5%	0,2	0,3 ; 1,0	0,71	35,7
	TAN INFELIZ QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,98	99,9
SE DESCRIBIRÍA USTED MISMO COMO: (LIMA SUR)	FELIZ E INTERESADO POR LA VIDA	70,7%	2,0	66,7 ; 74,4	1,69	2,8
	ALGO FELIZ	26,2%	1,8	22,8 ; 30,0	1,61	7,0
	ALGO INFELIZ	1,9%	0,5	1,1 ; 3,2	1,27	26,5
	INFELIZ Y CON POCO INTERÉS EN LA VIDA	1,0%	0,4	0,5 ; 2,1	1,29	37,2
	TAN INFELIZ QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	1,01	99,9
SE DESCRIBIRÍA USTED MISMO COMO: (CALLAO)	FELIZ E INTERESADO POR LA VIDA	73,8%	2,5	68,6 ; 78,4	1,55	3,4
	ALGO FELIZ	24,0%	2,4	19,6 ; 29,0	1,49	9,9
	ALGO INFELIZ	1,9%	0,7	0,9 ; 3,8	1,21	36,1
	INFELIZ Y CON POCO INTERÉS EN LA VIDA	0,3%	0,3	0,0 ; 2,0	1,36	99,7
	TAN INFELIZ QUE LA VIDA NO TIENE SENTIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
ASPECTOS DE SALUD MENTAL POSITIVA: AUTOESTIMA DE ROSENBERG (MEDIA)	TOTAL	30,35	0,1	30,2 ; 30,5	2,99	0,3
	LIMA CENTRO	31,61	0,3	31,1 ; 32,2	3,88	0,9
	LIMA NORTE	30,71	0,2	30,4 ; 31,0	2,72	0,5
	LIMA ESTE	29,37	0,1	29,2 ; 29,6	1,74	0,4
	LIMA SUR	30,26	0,2	30,0 ; 30,5	2,28	0,5
	CALLAO	29,82	0,2	29,3 ; 30,3	3,81	0,8
ASPECTOS DE SALUD MENTAL POSITIVA: SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER (MEDIA)	TOTAL	17,73	0,1	17,6 ; 17,8	1,84	0,3
	LIMA CENTRO	18,32	0,1	18,0 ; 18,6	1,99	0,8
	LIMA NORTE	17,81	0,1	17,6 ; 18,1	1,95	0,7
	LIMA ESTE	17,30	0,1	17,1 ; 17,5	1,60	0,7
	LIMA SUR	17,60	0,1	17,3 ; 17,9	1,81	0,8
	CALLAO	17,77	0,2	17,5 ; 18,1	1,66	0,8
ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER (CATEGÓRICO) (TOTAL)	MUY INSATISFECHO	0,4%	0,1	0,2 ; 0,7	1,42	27,6
	INSATISFECHO	14,0%	0,6	12,8 ; 15,2	1,42	4,4
	NI SATISFECHO NI INSATISFECHO	8,7%	0,5	7,7 ; 9,8	1,56	6,1
	SATISFECHO	66,7%	0,9	65,0 ; 68,4	1,50	1,3
	MUY SATISFECHO	10,2%	0,6	9,0 ; 11,5	1,93	6,2
ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER (CATEGÓRICO) (LIMA CENTRO)	MUY INSATISFECHO	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	1,40	99,3
	INSATISFECHO	10,4%	1,5	7,9 ; 13,6	1,73	13,9
	NI SATISFECHO NI INSATISFECHO	4,4%	1,0	2,8 ; 6,8	1,86	23,0
	SATISFECHO	68,8%	2,4	63,9 ; 73,3	2,03	3,5
	MUY SATISFECHO	16,2%	2,0	12,7 ; 20,5	2,26	12,3
ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER (CATEGÓRICO) (LIMA NORTE)	MUY INSATISFECHO	0,5%	0,3	0,2 ; 1,7	2,20	59,4
	INSATISFECHO	14,2%	1,3	11,9 ; 16,9	1,53	8,9
	NI SATISFECHO NI INSATISFECHO	7,8%	1,1	5,9 ; 10,2	1,99	14,1
	SATISFECHO	64,7%	1,8	61,1 ; 68,2	1,72	2,8
	MUY SATISFECHO	12,7%	1,4	10,2 ; 15,8	2,11	11,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER (CATEGÓRICO) (LIMA ESTE)	MUY INSATISFECHO	0,5%	0,2	0,2 ; 1,2	1,05	44,7
	INSATISFECHO	16,1%	1,1	14,0 ; 18,5	1,04	7,1
	Ni SATISFECHO Ni INSATISFECHO	13,3%	1,2	11,2 ; 15,8	1,29	8,8
	SATISFECHO	63,1%	1,6	60,0 ; 66,2	1,17	2,5
	MUY SATISFECHO	6,9%	0,9	5,4 ; 8,8	1,24	12,4
ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER (CATEGÓRICO) (LIMA SUR)	MUY INSATISFECHO	0,6%	0,2	0,3 ; 1,3	0,97	42,3
	INSATISFECHO	16,1%	1,5	13,4 ; 19,3	1,51	9,3
	Ni SATISFECHO Ni INSATISFECHO	6,1%	1,0	4,5 ; 8,3	1,48	15,8
	SATISFECHO	69,2%	1,7	65,7 ; 72,4	1,27	2,5
	MUY SATISFECHO	8,0%	1,1	6,1 ; 10,5	1,55	13,9
ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA DE DIENER (CATEGÓRICO) (CALLAO)	MUY INSATISFECHO	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,38	100,6
	INSATISFECHO	10,1%	1,6	7,5 ; 13,6	1,27	15,4
	Ni SATISFECHO Ni INSATISFECHO	12,2%	1,7	9,2 ; 16,1	1,35	14,3
	SATISFECHO	71,5%	2,4	66,6 ; 76,0	1,35	3,4
	MUY SATISFECHO	6,1%	1,5	3,7 ; 9,9	1,96	25,2
ASPECTOS DE SALUD MENTAL POSITIVA: AUTOEFICACIA DE SCHWARZER Y JERUSALEM (MEDIA)	TOTAL	34,30	0,1	34,1 ; 34,5	2,15	0,3
	LIMA CENTRO	34,35	0,3	33,9 ; 34,8	1,88	0,7
	LIMA NORTE	33,73	0,2	33,3 ; 34,2	2,31	0,7
	LIMA ESTE	33,85	0,2	33,4 ; 34,3	2,05	0,7
	LIMA SUR	35,20	0,3	34,7 ; 35,7	2,35	0,7
	CALLAO	34,90	0,3	34,2 ; 35,6	2,10	1,0
ASPECTOS DE SALUD MENTAL POSITIVA: RESILIENCIA DEL YO DE BLOCK (MEDIA)	TOTAL	47,10	0,2	46,8 ; 47,4	2,53	0,3
	LIMA CENTRO	46,64	0,4	45,9 ; 47,3	2,18	0,8
	LIMA NORTE	46,67	0,4	46,0 ; 47,3	2,80	0,7
	LIMA ESTE	46,39	0,3	45,8 ; 47,0	2,24	0,7
	LIMA SUR	48,46	0,4	47,8 ; 49,1	2,83	0,7
	CALLAO	47,92	0,5	47,0 ; 48,8	2,43	1,0
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL (MEDIA)	TOTAL	17,75	0,1	17,7 ; 17,8	1,86	0,3
	LIMA CENTRO	18,24	0,1	18,0 ; 18,5	2,15	0,6
	LIMA NORTE	17,48	0,1	17,3 ; 17,7	2,25	0,6
	LIMA ESTE	17,55	0,1	17,4 ; 17,7	1,36	0,5
	LIMA SUR	17,91	0,1	17,7 ; 18,1	1,89	0,6
	CALLAO	17,81	0,1	17,5 ; 18,1	1,78	0,8
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: ASPECTO FÍSICO (TOTAL)	NADA O POCO	4,6%	0,4	3,9 ; 5,4	1,45	8,3
	REGULAR	20,1%	0,7	18,8 ; 21,6	1,44	3,6
	BASTANTE O MUCHO	75,3%	0,8	73,7 ; 76,9	1,57	1,1
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: ASPECTO FÍSICO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	3,5%	0,9	2,2 ; 5,7	1,70	24,6
	REGULAR	17,6%	1,8	14,3 ; 21,4	1,70	10,2
	BASTANTE O MUCHO	78,9%	2,0	74,6 ; 82,6	1,88	2,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: ASPECTO FÍSICO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	3,9%	0,8	2,6 ; 5,7	1,79	19,4
	REGULAR	21,1%	1,7	17,9 ; 24,7	2,11	8,2
	BASTANTE O MUCHO	75,1%	1,9	71,1 ; 78,6	2,34	2,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: ASPECTO FÍSICO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	4,8%	0,7	3,6 ; 6,2	1,04	13,9
	REGULAR	24,4%	1,2	22,1 ; 26,9	0,85	4,9
	BASTANTE O MUCHO	70,8%	1,3	68,2 ; 73,3	0,85	1,8
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: ASPECTO FÍSICO (LIMA SUR)	NADA O POCO	5,9%	0,9	4,3 ; 8,0	1,48	16,1
	REGULAR	17,7%	1,5	15,0 ; 20,7	1,33	8,2
	BASTANTE O MUCHO	76,4%	1,7	72,8 ; 79,7	1,56	2,3
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: ASPECTO FÍSICO (CALLAO)	NADA O POCO	4,9%	1,1	3,1 ; 7,7	1,31	23,0
	REGULAR	16,9%	1,7	13,9 ; 20,5	0,96	9,9
	BASTANTE O MUCHO	78,2%	1,8	74,5 ; 81,5	0,87	2,3
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: COLOR DE PIEL (TOTAL)	NADA O POCO	2,2%	0,3	1,7 ; 2,8	1,63	12,8
	REGULAR	11,5%	0,6	10,4 ; 12,7	1,46	5,1
	BASTANTE O MUCHO	86,3%	0,6	85,0 ; 87,5	1,45	0,7
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: COLOR DE PIEL (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	0,9%	0,6	0,2 ; 3,3	3,07	67,4
	REGULAR	9,8%	1,5	7,2 ; 13,1	1,93	15,3
	BASTANTE O MUCHO	89,3%	1,5	85,9 ; 92,0	1,90	1,7
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: COLOR DE PIEL (LIMA NORTE)	NADA O POCO	2,6%	0,7	1,6 ; 4,4	2,16	26,0
	REGULAR	11,8%	1,2	9,6 ; 14,5	1,74	10,5
	BASTANTE O MUCHO	85,6%	1,4	82,7 ; 88,0	1,74	1,6

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: COLOR DE PIEL (LIMA ESTE)	NADA O POCO	3,0%	0,5	2,1 ; 4,3	1,12	18,4
	REGULAR	12,9%	1,0	11,0 ; 15,1	1,03	8,0
	BASTANTE O MUCHO	84,2%	1,1	81,8 ; 86,2	1,01	1,3
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: COLOR DE PIEL (LIMA SUR)	NADA O POCO	2,3%	0,5	1,4 ; 3,6	1,25	24,3
	REGULAR	12,2%	1,2	9,9 ; 14,8	1,32	10,2
	BASTANTE O MUCHO	85,6%	1,3	82,8 ; 88,0	1,31	1,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: COLOR DE PIEL (CALLAO)	NADA O POCO	1,4%	0,6	0,6 ; 3,2	1,23	43,1
	REGULAR	8,9%	1,5	6,4 ; 12,3	1,30	16,7
	BASTANTE O MUCHO	89,7%	1,6	86,1 ; 92,5	1,33	1,8
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: INTELIGENCIA (TOTAL)	NADA O POCO	4,6%	0,4	3,9 ; 5,5	1,48	8,3
	REGULAR	14,8%	0,6	13,6 ; 16,1	1,37	4,2
	BASTANTE O MUCHO	80,5%	0,7	79,1 ; 81,9	1,50	0,9
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: INTELIGENCIA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	2,4%	0,7	1,3 ; 4,2	1,58	29,1
	REGULAR	12,1%	1,5	9,5 ; 15,3	1,54	12,1
	BASTANTE O MUCHO	85,5%	1,6	82,0 ; 88,4	1,66	1,9
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: INTELIGENCIA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	5,3%	0,9	3,8 ; 7,5	2,03	17,5
	REGULAR	17,1%	1,5	14,4 ; 20,3	1,87	8,8
	BASTANTE O MUCHO	77,6%	1,7	74,0 ; 80,7	1,96	2,2
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: INTELIGENCIA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	4,6%	0,6	3,6 ; 5,9	0,83	12,6
	REGULAR	18,0%	1,1	15,9 ; 20,4	0,95	6,3
	BASTANTE O MUCHO	77,4%	1,3	74,7 ; 79,8	1,03	1,7
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: INTELIGENCIA (LIMA SUR)	NADA O POCO	5,5%	0,9	3,9 ; 7,6	1,60	17,4
	REGULAR	12,6%	1,1	10,5 ; 15,1	1,09	9,1
	BASTANTE O MUCHO	81,9%	1,5	78,7 ; 84,7	1,43	1,9
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: INTELIGENCIA (CALLAO)	NADA O POCO	5,2%	1,0	3,5 ; 7,7	1,07	20,3
	REGULAR	10,6%	1,5	8,0 ; 13,9	1,12	14,1
	BASTANTE O MUCHO	84,2%	1,8	80,4 ; 87,5	1,18	2,1
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA (TOTAL)	NADA O POCO	15,4%	0,7	14,1 ; 16,8	1,59	4,4
	REGULAR	41,6%	1,0	39,7 ; 43,5	1,64	2,3
	BASTANTE O MUCHO	43,0%	1,0	41,0 ; 45,0	1,91	2,4
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	8,5%	1,4	6,2 ; 11,7	1,87	16,2
	REGULAR	35,3%	2,9	29,8 ; 41,2	2,85	8,3
	BASTANTE O MUCHO	56,2%	3,2	49,9 ; 62,3	3,10	5,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	16,9%	1,5	14,2 ; 19,9	1,82	8,7
	REGULAR	45,4%	2,1	41,3 ; 49,6	2,11	4,6
	BASTANTE O MUCHO	37,7%	2,2	33,6 ; 42,0	2,33	5,7
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	17,8%	1,3	15,4 ; 20,5	1,27	7,4
	REGULAR	44,6%	1,5	41,7 ; 47,5	0,94	3,3
	BASTANTE O MUCHO	37,6%	1,7	34,3 ; 41,0	1,33	4,5
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA (LIMA SUR)	NADA O POCO	16,1%	1,6	13,2 ; 19,5	1,71	9,8
	REGULAR	38,3%	1,7	34,9 ; 41,7	1,17	4,5
	BASTANTE O MUCHO	45,6%	2,0	41,8 ; 49,5	1,45	4,3
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA (CALLAO)	NADA O POCO	16,3%	1,9	12,9 ; 20,4	1,28	11,7
	REGULAR	41,8%	2,7	36,6 ; 47,1	1,40	6,4
	BASTANTE O MUCHO	41,9%	2,8	36,6 ; 47,4	1,51	6,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: PROFESIÓN U OFICIO QUE ESTUDIÓ(A) (TOTAL)	NADA O POCO	7,0%	0,7	5,7 ; 8,5	1,36	10,2
	REGULAR	18,8%	1,1	16,7 ; 21,2	1,48	6,1
	BASTANTE O MUCHO	74,2%	1,3	71,6 ; 76,7	1,53	1,8
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: PROFESIÓN U OFICIO QUE ESTUDIÓ(A) (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	7,1%	1,5	4,7 ; 10,6	1,45	20,6
	REGULAR	12,2%	2,0	8,8 ; 16,6	1,61	16,1
	BASTANTE O MUCHO	80,7%	2,3	75,9 ; 84,8	1,46	2,8
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: PROFESIÓN U OFICIO QUE ESTUDIÓ(A) (LIMA NORTE)	NADA O POCO	8,7%	1,7	5,9 ; 12,7	1,61	19,6
	REGULAR	23,7%	2,8	18,5 ; 29,7	1,96	12,0
	BASTANTE O MUCHO	67,7%	3,2	61,1 ; 73,5	2,02	4,7
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: PROFESIÓN U OFICIO QUE ESTUDIÓ(A) (LIMA ESTE)	NADA O POCO	4,2%	1,0	2,6 ; 6,5	0,81	23,1
	REGULAR	19,8%	2,2	15,9 ; 24,4	1,02	10,9
	BASTANTE O MUCHO	76,0%	2,4	71,0 ; 80,3	1,07	3,1
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: PROFESIÓN U OFICIO QUE ESTUDIÓ(A) (LIMA SUR)	NADA O POCO	8,1%	1,7	5,3 ; 12,1	1,36	20,8
	REGULAR	18,7%	2,2	14,8 ; 23,4	1,10	11,6
	BASTANTE O MUCHO	73,1%	2,7	67,5 ; 78,1	1,34	3,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: PROFESIÓN U OFICIO QUE ESTUDIO(A) (CALLAO)	NADA O POCO	5,1%	1,7	2,6 ; 9,6	0,88	33,2
	REGULAR	22,7%	3,8	16,0 ; 31,1	1,24	16,9
	BASTANTE O MUCHO	72,2%	4,1	63,6 ; 79,5	1,21	5,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (TOTAL)	NADA O POCO	23,6%	0,8	22,0 ; 25,3	1,74	3,6
	REGULAR	32,5%	0,9	30,7 ; 34,3	1,69	2,8
	BASTANTE O MUCHO	43,9%	1,0	41,9 ; 46,0	1,91	2,4
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	15,7%	2,0	12,2 ; 20,0	2,29	12,7
	REGULAR	30,4%	2,5	25,7 ; 35,4	2,23	8,2
	BASTANTE O MUCHO	53,9%	3,0	48,0 ; 59,7	2,77	5,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	23,5%	1,7	20,3 ; 27,0	1,94	7,3
	REGULAR	38,8%	2,1	34,7 ; 43,1	2,22	5,5
	BASTANTE O MUCHO	37,7%	1,9	34,0 ; 41,6	1,90	5,2
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	29,8%	1,6	26,8 ; 33,1	1,31	5,3
	REGULAR	29,8%	1,6	26,8 ; 32,9	1,24	5,2
	BASTANTE O MUCHO	40,4%	1,9	36,8 ; 44,1	1,56	4,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (LIMA SUR)	NADA O POCO	24,2%	1,8	20,8 ; 28,0	1,64	7,5
	REGULAR	28,7%	1,7	25,5 ; 32,1	1,25	5,8
	BASTANTE O MUCHO	47,1%	2,3	42,6 ; 51,6	1,95	4,9
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO (CALLAO)	NADA O POCO	21,4%	2,5	16,9 ; 26,7	1,74	11,6
	REGULAR	33,4%	2,4	28,8 ; 38,3	1,24	7,2
	BASTANTE O MUCHO	45,2%	2,6	40,2 ; 50,3	1,27	5,7
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELIGIÓN (TOTAL)	NADA O POCO	7,3%	0,5	6,4 ; 8,4	1,52	6,7
	REGULAR	16,9%	0,7	15,5 ; 18,4	1,70	4,4
	BASTANTE O MUCHO	75,8%	0,9	74,0 ; 77,4	1,78	1,1
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELIGIÓN (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	5,3%	1,0	3,6 ; 7,7	1,48	19,0
	REGULAR	14,6%	1,7	11,6 ; 18,2	1,66	11,6
	BASTANTE O MUCHO	80,1%	1,9	76,1 ; 83,6	1,66	2,4
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELIGIÓN (LIMA NORTE)	NADA O POCO	9,4%	1,2	7,3 ; 12,1	2,02	12,9
	REGULAR	24,1%	1,9	20,6 ; 28,0	2,30	7,9
	BASTANTE O MUCHO	66,5%	2,2	62,1 ; 70,6	2,47	3,3
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELIGIÓN (LIMA ESTE)	NADA O POCO	8,7%	0,9	7,0 ; 10,7	1,14	10,6
	REGULAR	15,8%	1,3	13,4 ; 18,4	1,29	8,0
	BASTANTE O MUCHO	75,6%	1,6	72,3 ; 78,5	1,45	2,1
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELIGIÓN (LIMA SUR)	NADA O POCO	5,7%	0,9	4,2 ; 7,8	1,35	15,7
	REGULAR	11,8%	1,2	9,6 ; 14,3	1,22	10,1
	BASTANTE O MUCHO	82,5%	1,5	79,5 ; 85,2	1,32	1,8
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELIGIÓN (CALLAO)	NADA O POCO	5,4%	1,1	3,6 ; 7,9	1,08	20,0
	REGULAR	14,8%	1,8	11,7 ; 18,7	1,19	12,0
	BASTANTE O MUCHO	79,8%	2,1	75,3 ; 83,6	1,30	2,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELACIONES SOCIALES (TOTAL)	NADA O POCO	9,8%	0,5	8,8 ; 10,9	1,42	5,4
	REGULAR	25,6%	0,8	24,1 ; 27,3	1,55	3,2
	BASTANTE O MUCHO	64,5%	0,9	62,7 ; 66,3	1,57	1,4
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELACIONES SOCIALES (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	8,6%	1,3	6,4 ; 11,6	1,70	15,3
	REGULAR	22,6%	2,0	18,9 ; 26,7	1,72	8,8
	BASTANTE O MUCHO	68,8%	2,4	63,9 ; 73,3	2,02	3,5
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELACIONES SOCIALES (LIMA NORTE)	NADA O POCO	11,6%	1,2	9,5 ; 14,1	1,61	10,2
	REGULAR	32,7%	1,8	29,2 ; 36,3	1,79	5,6
	BASTANTE O MUCHO	55,7%	1,9	51,9 ; 59,5	1,76	3,4
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELACIONES SOCIALES (LIMA ESTE)	NADA O POCO	11,5%	1,1	9,6 ; 13,8	1,21	9,3
	REGULAR	25,9%	1,5	23,1 ; 29,0	1,27	5,8
	BASTANTE O MUCHO	62,5%	1,6	59,3 ; 65,7	1,24	2,6
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELACIONES SOCIALES (LIMA SUR)	NADA O POCO	7,1%	0,9	5,5 ; 9,2	1,22	13,2
	REGULAR	20,0%	1,5	17,2 ; 23,2	1,33	7,6
	BASTANTE O MUCHO	72,9%	1,6	69,5 ; 76,0	1,24	2,2
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: RELACIONES SOCIALES (CALLAO)	NADA O POCO	8,7%	1,5	6,2 ; 12,1	1,34	17,1
	REGULAR	23,3%	2,5	18,7 ; 28,6	1,68	10,8
	BASTANTE O MUCHO	68,0%	3,0	61,8 ; 73,5	1,96	4,4
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: LUGAR DE RESIDENCIA (TOTAL)	NADA O POCO	12,4%	0,6	11,2 ; 13,7	1,64	5,1
	REGULAR	29,9%	0,8	28,3 ; 31,6	1,49	2,8
	BASTANTE O MUCHO	57,7%	1,0	55,8 ; 59,6	1,74	1,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: LUGAR DE RESIDENCIA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	12,0%	1,9	8,8 ; 16,2	2,54	15,6
	REGULAR	24,3%	2,1	20,4 ; 28,6	1,83	8,6
	BASTANTE O MUCHO	63,7%	2,7	58,3 ; 68,9	2,41	4,2
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: LUGAR DE RESIDENCIA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	11,5%	1,3	9,3 ; 14,2	1,83	10,9
	REGULAR	39,7%	1,9	36,1 ; 43,4	1,76	4,7
	BASTANTE O MUCHO	48,8%	1,9	45,0 ; 52,5	1,74	3,9
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: LUGAR DE RESIDENCIA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	14,7%	1,1	12,6 ; 17,1	1,13	7,8
	REGULAR	29,0%	1,5	26,2 ; 32,0	1,13	5,1
	BASTANTE O MUCHO	56,3%	1,8	52,7 ; 59,9	1,45	3,2
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: LUGAR DE RESIDENCIA (LIMA SUR)	NADA O POCO	10,5%	1,1	8,4 ; 12,9	1,25	10,8
	REGULAR	24,0%	1,5	21,2 ; 27,2	1,17	6,3
	BASTANTE O MUCHO	65,5%	1,9	61,7 ; 69,1	1,45	2,9
GRADO DE SATISFACCIÓN PERSONAL: LUGAR DE RESIDENCIA (CALLAO)	NADA O POCO	13,5%	2,0	10,0 ; 17,9	1,63	14,8
	REGULAR	28,4%	2,5	23,7 ; 33,6	1,52	9,0
	BASTANTE O MUCHO	58,1%	3,2	51,8 ; 64,2	1,98	5,5
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL (MEDIA)	TOTAL	17,42	0,1	17,3 ; 17,5	1,51	0,3
	LIMA CENTRO	17,72	0,2	17,4 ; 18,0	1,93	0,8
	LIMA NORTE	17,15	0,1	16,9 ; 17,4	1,87	0,7
	LIMA ESTE	17,25	0,1	17,1 ; 17,5	1,16	0,6
	LIMA SUR	17,60	0,1	17,4 ; 17,8	1,27	0,6
	CALLAO	17,66	0,2	17,3 ; 18,0	1,44	1,0
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LAS ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE REALIZA (TOTAL)	NADA O POCO	4,8%	0,4	4,0 ; 5,8	1,30	9,3
	REGULAR	24,7%	1,0	22,8 ; 26,7	1,60	4,1
	BASTANTE O MUCHO	70,4%	1,1	68,3 ; 72,5	1,63	1,5
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LAS ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE REALIZA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	3,5%	1,0	2,0 ; 6,0	1,39	28,4
	REGULAR	23,3%	2,7	18,5 ; 29,0	1,94	11,5
	BASTANTE O MUCHO	73,2%	2,7	67,5 ; 78,2	1,85	3,7
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LAS ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE REALIZA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	4,8%	1,0	3,2 ; 7,1	1,62	20,2
	REGULAR	27,2%	2,4	22,8 ; 32,1	2,22	8,7
	BASTANTE O MUCHO	68,0%	2,5	62,9 ; 72,7	2,25	3,7
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LAS ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE REALIZA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	5,6%	0,9	4,0 ; 7,7	1,21	16,6
	REGULAR	28,4%	1,8	25,0 ; 32,0	1,17	6,3
	BASTANTE O MUCHO	66,0%	1,9	62,2 ; 69,7	1,22	2,9
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LAS ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE REALIZA (LIMA SUR)	NADA O POCO	5,5%	0,9	3,9 ; 7,6	1,05	16,7
	REGULAR	18,5%	1,7	15,4 ; 22,1	1,22	9,1
	BASTANTE O MUCHO	76,0%	1,9	72,1 ; 79,5	1,28	2,5
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LAS ACTIVIDADES O FUNCIONES QUE REALIZA (CALLAO)	NADA O POCO	3,9%	1,2	2,2 ; 6,9	1,08	29,8
	REGULAR	24,5%	2,6	19,8 ; 29,9	1,08	10,5
	BASTANTE O MUCHO	71,6%	2,9	65,6 ; 76,8	1,21	4,0
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL AMBIENTE FÍSICO DONDE LABORA (TOTAL)	NADA O POCO	6,0%	0,5	5,0 ; 7,1	1,43	8,8
	REGULAR	27,1%	1,1	25,0 ; 29,4	1,88	4,1
	BASTANTE O MUCHO	66,9%	1,2	64,6 ; 69,2	1,83	1,8
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL AMBIENTE FÍSICO DONDE LABORA (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	4,2%	1,3	2,3 ; 7,8	2,10	31,5
	REGULAR	26,9%	2,8	21,7 ; 32,8	1,96	10,6
	BASTANTE O MUCHO	68,9%	3,0	62,8 ; 74,4	1,96	4,3
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL AMBIENTE FÍSICO DONDE LABORA (LIMA NORTE)	NADA O POCO	5,9%	1,2	4,0 ; 8,8	1,99	20,0
	REGULAR	31,6%	2,9	26,2 ; 37,5	3,06	9,2
	BASTANTE O MUCHO	62,5%	3,0	56,5 ; 68,1	2,94	4,7
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL AMBIENTE FÍSICO DONDE LABORA (LIMA ESTE)	NADA O POCO	7,3%	1,0	5,6 ; 9,4	1,02	13,2
	REGULAR	29,6%	1,7	26,3 ; 33,1	1,07	5,9
	BASTANTE O MUCHO	63,1%	1,8	59,6 ; 66,6	1,00	2,8
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL AMBIENTE FÍSICO DONDE LABORA (LIMA SUR)	NADA O POCO	6,5%	1,0	4,8 ; 8,9	1,11	15,8
	REGULAR	19,9%	1,7	16,7 ; 23,6	1,21	8,8
	BASTANTE O MUCHO	73,6%	2,0	69,4 ; 77,4	1,36	2,8
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL AMBIENTE FÍSICO DONDE LABORA (CALLAO)	NADA O POCO	4,2%	1,2	2,4 ; 7,4	1,12	29,0
	REGULAR	25,1%	2,8	20,0 ; 31,0	1,26	11,2
	BASTANTE O MUCHO	70,7%	3,1	64,3 ; 76,3	1,36	4,3
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO (TOTAL)	NADA O POCO	4,9%	0,6	3,9 ; 6,2	1,38	12,1
	REGULAR	24,6%	1,2	22,2 ; 27,1	1,50	5,0
	BASTANTE O MUCHO	70,5%	1,3	68,0 ; 72,9	1,38	1,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	2,0%	1,0	0,8 ; 5,2	1,38	48,2
	REGULAR	20,4%	2,7	15,6 ; 26,3	1,29	13,3
	BASTANTE O MUCHO	77,5%	2,8	71,5 ; 82,5	1,28	3,6
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO (LIMA NORTE)	NADA O POCO	6,7%	1,6	4,2 ; 10,6	1,96	23,5
	REGULAR	27,9%	2,7	22,9 ; 33,5	1,80	9,7
	BASTANTE O MUCHO	65,4%	2,7	59,9 ; 70,4	1,56	4,1
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO (LIMA ESTE)	NADA O POCO	5,3%	1,0	3,6 ; 7,8	0,97	19,7
	REGULAR	26,6%	2,3	22,3 ; 31,4	1,23	8,7
	BASTANTE O MUCHO	68,1%	2,4	63,2 ; 72,6	1,19	3,5
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO (LIMA SUR)	NADA O POCO	4,8%	1,1	3,0 ; 7,5	1,17	23,4
	REGULAR	20,5%	2,4	16,1 ; 25,7	1,55	11,9
	BASTANTE O MUCHO	74,7%	2,5	69,6 ; 79,3	1,39	3,3
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO (CALLAO)	NADA O POCO	3,9%	1,2	2,1 ; 7,0	0,71	30,3
	REGULAR	26,4%	3,6	19,9 ; 34,2	1,30	13,8
	BASTANTE O MUCHO	69,7%	3,7	61,9 ; 76,4	1,24	5,3
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA CARGA DE TRABAJO QUE DESARROLLA DIARIAMENTE (TOTAL)	NADA O POCO	8,5%	0,6	7,3 ; 9,8	1,54	7,5
	REGULAR	34,5%	1,1	32,4 ; 36,8	1,62	3,2
	BASTANTE O MUCHO	56,9%	1,2	54,7 ; 59,2	1,61	2,0
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA CARGA DE TRABAJO QUE DESARROLLA DIARIAMENTE (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	5,9%	1,6	3,4 ; 10,0	2,32	27,7
	REGULAR	35,5%	2,2	29,4 ; 42,0	2,18	9,1
	BASTANTE O MUCHO	58,6%	3,0	52,6 ; 64,4	1,79	5,1
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA CARGA DE TRABAJO QUE DESARROLLA DIARIAMENTE (LIMA NORTE)	NADA O POCO	9,2%	1,5	6,7 ; 12,5	2,01	15,9
	REGULAR	37,8%	2,5	33,0 ; 42,7	2,04	6,6
	BASTANTE O MUCHO	53,1%	2,6	48,0 ; 58,1	2,09	4,8
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA CARGA DE TRABAJO QUE DESARROLLA DIARIAMENTE (LIMA ESTE)	NADA O POCO	8,5%	1,1	6,5 ; 11,1	1,26	13,4
	REGULAR	37,3%	1,7	33,9 ; 40,8	0,98	4,7
	BASTANTE O MUCHO	54,2%	1,9	50,4 ; 57,9	1,10	3,5
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA CARGA DE TRABAJO QUE DESARROLLA DIARIAMENTE (LIMA SUR)	NADA O POCO	10,1%	1,3	7,9 ; 12,9	1,12	12,4
	REGULAR	31,3%	2,3	27,1 ; 35,9	1,53	7,2
	BASTANTE O MUCHO	58,5%	2,4	53,8 ; 63,1	1,49	4,1
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA CARGA DE TRABAJO QUE DESARROLLA DIARIAMENTE (CALLAO)	NADA O POCO	7,5%	1,6	4,9 ; 11,3	1,11	21,4
	REGULAR	24,6%	2,7	19,7 ; 30,3	1,19	11,0
	BASTANTE O MUCHO	67,9%	3,1	61,5 ; 73,7	1,36	4,6
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBE (TOTAL)	NADA O POCO	9,6%	0,8	8,2 ; 11,3	1,24	8,1
	REGULAR	33,2%	1,5	30,3 ; 36,1	1,73	4,4
	BASTANTE O MUCHO	57,2%	1,5	54,3 ; 60,1	1,54	2,6
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBE (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	8,2%	2,0	5,0 ; 13,2	1,47	24,8
	REGULAR	31,3%	4,2	23,7 ; 40,1	2,17	13,4
	BASTANTE O MUCHO	60,5%	4,0	52,3 ; 68,0	1,82	6,7
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBE (LIMA NORTE)	NADA O POCO	9,6%	1,8	6,5 ; 13,7	1,73	18,9
	REGULAR	43,4%	3,4	36,8 ; 50,2	2,18	7,9
	BASTANTE O MUCHO	47,0%	3,4	40,5 ; 53,7	2,07	7,1
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBE (LIMA ESTE)	NADA O POCO	10,0%	1,3	7,7 ; 12,9	0,90	13,3
	REGULAR	35,4%	2,5	30,6 ; 40,5	1,30	7,2
	BASTANTE O MUCHO	54,6%	2,6	49,5 ; 59,6	1,24	4,7
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBE (LIMA SUR)	NADA O POCO	10,1%	1,5	7,5 ; 13,4	1,01	14,9
	REGULAR	21,3%	2,3	17,2 ; 26,1	1,24	10,6
	BASTANTE O MUCHO	68,6%	2,3	63,9 ; 73,0	1,01	3,4
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON EL RECONOCIMIENTO QUE RECIBE (CALLAO)	NADA O POCO	9,8%	2,4	6,0 ; 15,6	1,14	24,2
	REGULAR	31,0%	4,4	23,0 ; 40,2	1,63	14,3
	BASTANTE O MUCHO	59,2%	4,3	50,5 ; 67,3	1,38	7,3
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE (TOTAL)	NADA O POCO	18,7%	0,9	17,0 ; 20,5	1,54	4,8
	REGULAR	44,8%	1,2	42,5 ; 47,2	1,68	2,6
	BASTANTE O MUCHO	36,5%	1,1	34,4 ; 38,6	1,48	3,0
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	10,8%	2,0	7,5 ; 15,3	1,92	18,3
	REGULAR	52,8%	3,4	46,1 ; 59,4	2,24	6,5
	BASTANTE O MUCHO	36,4%	3,3	30,2 ; 43,2	2,28	9,1
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE (LIMA NORTE)	NADA O POCO	21,1%	1,9	17,6 ; 25,1	1,73	9,1
	REGULAR	46,0%	2,7	40,8 ; 51,3	2,30	5,9
	BASTANTE O MUCHO	32,9%	2,2	28,7 ; 37,3	1,74	6,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE (LIMA ESTE)	NADA O POCO	21,6%	1,6	18,6 ; 25,0	1,15	7,5
	REGULAR	41,9%	1,7	38,6 ; 45,3	0,88	4,0
	BASTANTE O MUCHO	36,4%	1,9	32,9 ; 40,2	1,12	5,1
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE (LIMA SUR)	NADA O POCO	19,0%	1,9	15,5 ; 23,0	1,50	10,0
	REGULAR	40,1%	2,3	35,8 ; 44,7	1,39	5,7
	BASTANTE O MUCHO	40,9%	2,1	36,9 ; 45,1	1,17	5,1
GRADO DE SATISFACCIÓN LABORAL: CON LA REMUNERACIÓN QUE RECIBE (CALLAO)	NADA O POCO	17,5%	2,8	12,7 ; 23,6	1,58	15,8
	REGULAR	46,1%	3,5	39,4 ; 53,0	1,44	7,5
	BASTANTE O MUCHO	36,4%	3,0	30,8 ; 42,4	1,13	8,1
CALIDAD DE SUEÑO (TOTAL)	BASTANTE BUENO	14,9%	0,7	13,6 ; 16,4	1,87	4,9
	BUENO	74,7%	0,8	73,0 ; 76,3	1,66	1,1
	MALO	9,9%	0,5	8,9 ; 11,0	1,49	5,5
	BASTANTE MALO	0,5%	0,1	0,3 ; 0,8	1,25	23,3
CALIDAD DE SUEÑO (LIMA CENTRO)	BASTANTE BUENO	25,7%	2,2	21,5 ; 30,3	2,01	8,7
	BUENO	62,3%	2,4	57,5 ; 66,9	1,86	3,8
	MALO	10,9%	1,5	8,3 ; 14,2	1,72	13,5
	BASTANTE MALO	1,1%	0,5	0,5 ; 2,7	1,76	45,3
CALIDAD DE SUEÑO (LIMA NORTE)	BASTANTE BUENO	13,9%	1,6	11,1 ; 17,3	2,42	11,2
	BUENO	74,9%	1,9	71,0 ; 78,3	2,16	2,5
	MALO	10,8%	1,2	8,7 ; 13,5	1,79	11,1
	BASTANTE MALO	0,4%	0,2	0,1 ; 0,9	0,99	48,4
CALIDAD DE SUEÑO (LIMA ESTE)	BASTANTE BUENO	13,0%	1,1	11,0 ; 15,3	1,18	8,5
	BUENO	76,8%	1,5	73,8 ; 79,5	1,28	1,9
	MALO	9,8%	1,0	8,0 ; 12,0	1,25	10,3
	BASTANTE MALO	0,4%	0,2	0,2 ; 1,0	0,86	44,3
CALIDAD DE SUEÑO (LIMA SUR)	BASTANTE BUENO	8,0%	1,0	6,2 ; 10,2	1,26	12,6
	BUENO	82,5%	1,3	79,9 ; 84,9	1,06	1,6
	MALO	9,1%	1,0	7,3 ; 11,3	1,16	11,2
	BASTANTE MALO	0,4%	0,2	0,1 ; 1,0	0,83	49,1
CALIDAD DE SUEÑO (CALLAO)	BASTANTE BUENO	18,0%	2,6	13,5 ; 23,6	2,14	14,3
	BUENO	74,1%	2,4	69,0 ; 78,6	1,49	3,3
	MALO	7,4%	1,4	5,2 ; 10,6	1,30	18,4
	BASTANTE MALO	0,5%	0,4	0,1 ; 2,1	1,28	72,1
LATENCIA DEL SUEÑO (TOTAL)	APROPIADA	52,4%	1,1	50,3 ; 54,5	2,10	2,1
	LEVE ALTERACIÓN	32,9%	1,0	30,9 ; 34,9	2,16	3,2
	MODERADA ALTERACIÓN	11,1%	0,6	10,0 ; 12,4	1,58	5,3
	SEVERA ALTERACIÓN	3,6%	0,4	3,0 ; 4,4	1,62	9,9
LATENCIA DEL SUEÑO (LIMA CENTRO)	APROPIADA	40,1%	3,1	34,3 ; 46,2	2,97	7,6
	LEVE ALTERACIÓN	43,7%	2,9	38,2 ; 49,4	2,57	6,6
	MODERADA ALTERACIÓN	11,6%	1,6	8,8 ; 15,1	1,94	13,9
	SEVERA ALTERACIÓN	4,5%	1,0	2,9 ; 7,0	1,87	22,7
LATENCIA DEL SUEÑO (LIMA NORTE)	APROPIADA	48,9%	2,4	44,3 ; 53,5	2,63	4,8
	LEVE ALTERACIÓN	32,2%	2,4	27,7 ; 37,0	3,04	7,3
	MODERADA ALTERACIÓN	13,5%	1,4	11,0 ; 16,5	1,92	10,2
	SEVERA ALTERACIÓN	5,3%	0,9	3,8 ; 7,5	2,00	17,3
LATENCIA DEL SUEÑO (LIMA ESTE)	APROPIADA	59,2%	1,7	55,8 ; 62,5	1,26	2,8
	LEVE ALTERACIÓN	28,6%	1,6	25,6 ; 31,8	1,33	5,5
	MODERADA ALTERACIÓN	10,2%	0,9	8,5 ; 12,2	1,06	9,3
	SEVERA ALTERACIÓN	2,0%	0,4	1,4 ; 3,0	0,86	19,5
LATENCIA DEL SUEÑO (LIMA SUR)	APROPIADA	56,1%	2,2	51,8 ; 60,4	1,77	3,9
	LEVE ALTERACIÓN	31,4%	1,9	27,8 ; 35,2	1,52	6,0
	MODERADA ALTERACIÓN	9,1%	1,1	7,2 ; 11,5	1,31	12,0
	SEVERA ALTERACIÓN	3,3%	0,7	2,2 ; 5,0	1,30	20,4
LATENCIA DEL SUEÑO (CALLAO)	APROPIADA	58,2%	3,0	52,2 ; 64,0	1,78	5,2
	LEVE ALTERACIÓN	29,5%	3,1	23,8 ; 36,0	2,25	10,6
	MODERADA ALTERACIÓN	10,4%	1,6	7,6 ; 14,0	1,35	15,6
	SEVERA ALTERACIÓN	1,9%	0,6	1,0 ; 3,4	0,88	31,2
DURACIÓN DEL SUEÑO (TOTAL)	MÁS DE 7 HORAS	41,1%	0,9	39,4 ; 42,6	1,42	2,1
	ENTRE 6 Y 7 HORAS	28,3%	0,8	26,7 ; 29,9	1,46	2,9
	ENTRE 5 Y 6 HORAS	24,6%	0,8	23,1 ; 26,1	1,45	3,2
	MENOS DE 5 HORAS	6,0%	0,5	5,2 ; 7,1	1,82	8,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
DURACIÓN DEL SUEÑO (LIMA CENTRO)	MÁS DE 7 HORAS	44,7%	2,4	40,0 ; 49,5	1,83	5,4
	ENTRE 6 Y 7 HORAS	24,9%	1,9	21,4 ; 28,8	1,46	7,6
	ENTRE 5 Y 6 HORAS	24,7%	2,1	20,9 ; 29,1	1,80	8,5
	MENOS DE 5 HORAS	5,7%	1,6	3,2 ; 9,9	3,88	29,0
DURACIÓN DEL SUEÑO (LIMA NORTE)	MÁS DE 7 HORAS	33,7%	1,9	30,1 ; 37,6	1,93	5,7
	ENTRE 6 Y 7 HORAS	31,4%	2,0	27,7 ; 35,4	2,12	6,2
	ENTRE 5 Y 6 HORAS	26,7%	1,8	23,4 ; 30,3	1,88	6,6
	MENOS DE 5 HORAS	8,1%	1,1	6,2 ; 10,4	1,79	13,1
DURACIÓN DEL SUEÑO (LIMA ESTE)	MÁS DE 7 HORAS	42,7%	1,4	39,9 ; 45,6	0,92	3,4
	ENTRE 6 Y 7 HORAS	25,9%	1,4	23,3 ; 28,7	1,04	5,2
	ENTRE 5 Y 6 HORAS	25,0%	1,3	22,5 ; 27,7	1,03	5,3
	MENOS DE 5 HORAS	6,4%	0,8	4,9 ; 8,2	1,23	12,9
DURACIÓN DEL SUEÑO (LIMA SUR)	MÁS DE 7 HORAS	43,8%	1,7	40,4 ; 47,3	1,14	4,0
	ENTRE 6 Y 7 HORAS	27,9%	1,5	25,0 ; 31,0	1,07	5,5
	ENTRE 5 Y 6 HORAS	23,4%	1,5	20,5 ; 26,4	1,17	6,5
	MENOS DE 5 HORAS	4,9%	0,7	3,6 ; 6,6	1,05	14,9
DURACIÓN DEL SUEÑO (CALLAO)	MÁS DE 7 HORAS	44,7%	2,6	39,7 ; 49,9	1,31	5,8
	ENTRE 6 Y 7 HORAS	31,8%	2,5	27,1 ; 36,9	1,38	7,9
	ENTRE 5 Y 6 HORAS	20,4%	2,1	16,6 ; 24,8	1,30	10,3
	MENOS DE 5 HORAS	3,1%	0,8	1,8 ; 5,2	1,11	27,1
EFICIENCIA DEL SUEÑO (TOTAL)	MAS DEL 85%	82,7%	0,8	81,1 ; 84,1	1,81	0,9
	DEL 75 AL 84%	11,6%	0,6	10,5 ; 12,8	1,49	5,1
	DEL 65 AL 74%	3,5%	0,3	2,8 ; 4,2	1,59	10,0
	MENOS DEL 65%	2,2%	0,3	1,7 ; 3,0	2,02	14,1
EFICIENCIA DEL SUEÑO (LIMA CENTRO)	MAS DEL 85%	84,0%	2,0	79,7 ; 87,5	2,24	2,4
	DEL 75 AL 84%	10,6%	1,7	7,7 ; 14,4	2,30	15,9
	DEL 65 AL 74%	3,0%	0,8	1,7 ; 5,1	1,75	27,3
	MENOS DEL 65%	2,5%	0,7	1,4 ; 4,4	1,69	29,4
EFICIENCIA DEL SUEÑO (LIMA NORTE)	MAS DEL 85%	77,2%	1,8	73,4 ; 80,6	2,22	2,4
	DEL 75 AL 84%	14,5%	1,3	12,1 ; 17,2	1,64	9,1
	DEL 65 AL 74%	5,2%	0,9	3,7 ; 7,3	1,96	17,4
	MENOS DEL 65%	3,1%	0,7	2,0 ; 4,9	1,92	22,4
EFICIENCIA DEL SUEÑO (LIMA ESTE)	MAS DEL 85%	84,1%	1,2	81,6 ; 86,3	1,17	1,4
	DEL 75 AL 84%	10,6%	0,9	8,9 ; 12,6	1,01	8,8
	DEL 65 AL 74%	3,4%	0,6	2,4 ; 4,8	1,16	17,3
	MENOS DEL 65%	1,9%	0,5	1,1 ; 3,2	1,53	27,3
EFICIENCIA DEL SUEÑO (LIMA SUR)	MAS DEL 85%	84,2%	1,6	80,8 ; 87,0	1,71	1,9
	DEL 75 AL 84%	10,7%	1,2	8,6 ; 13,3	1,39	11,3
	DEL 65 AL 74%	2,8%	0,6	1,8 ; 4,2	1,19	21,4
	MENOS DEL 65%	2,4%	0,9	1,1 ; 4,8	3,01	36,9
EFICIENCIA DEL SUEÑO (CALLAO)	MAS DEL 85%	88,4%	1,6	84,9 ; 91,1	1,17	1,8
	DEL 75 AL 84%	9,9%	1,3	7,7 ; 12,8	0,88	12,9
	DEL 65 AL 74%	1,4%	0,7	0,5 ; 3,5	1,50	47,3
	MENOS DEL 65%	0,3%	0,2	0,1 ; 1,2	0,68	67,3
PERTURBACIONES DEL SUEÑO (TOTAL)	NINGUNA	45,2%	1,1	43,1 ; 47,4	2,16	2,4
	ENTRE 1 Y 9	52,0%	1,1	50,0 ; 54,1	1,99	2,0
	ENTRE 10 Y 18	2,7%	0,3	2,2 ; 3,4	1,59	11,3
	ENTRE 19 Y 27	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PERTURBACIONES DEL SUEÑO (LIMA CENTRO)	NINGUNA	42,8%	2,8	37,5 ; 48,3	2,41	6,5
	ENTRE 1 Y 9	55,4%	2,7	50,1 ; 60,6	2,23	4,8
	ENTRE 10 Y 18	1,7%	0,5	1,0 ; 3,1	1,19	29,6
	ENTRE 19 Y 27	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PERTURBACIONES DEL SUEÑO (LIMA NORTE)	NINGUNA	38,4%	2,2	34,3 ; 42,8	2,35	5,6
	ENTRE 1 Y 9	57,5%	2,1	53,3 ; 61,6	2,14	3,6
	ENTRE 10 Y 18	4,1%	0,9	2,6 ; 6,2	2,36	21,7
	ENTRE 19 Y 27	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PERTURBACIONES DEL SUEÑO (LIMA ESTE)	NINGUNA	48,2%	2,0	44,3 ; 52,1	1,75	4,2
	ENTRE 1 Y 9	48,8%	1,9	45,2 ; 52,5	1,54	3,9
	ENTRE 10 Y 18	3,0%	0,5	2,1 ; 4,2	1,11	18,3
	ENTRE 19 Y 27	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PERTURBACIONES DEL SUEÑO (LIMA SUR)	NINGUNA	49,7%	2,4	44,9 ; 54,4	2,16	4,9
	ENTRE 1 Y 9	48,3%	2,3	43,8 ; 52,8	1,96	4,8
	ENTRE 10 Y 18	2,1%	0,5	1,3 ; 3,2	1,02	22,9
	ENTRE 19 Y 27	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PERTURBACIONES DEL SUEÑO (CALLAO)	NINGUNA	50,8%	3,5	44,0 ; 57,5	2,28	6,8
	ENTRE 1 Y 9	47,4%	3,5	40,7 ; 54,2	2,30	7,3
	ENTRE 10 Y 18	1,8%	0,6	0,9 ; 3,5	1,00	33,9
	ENTRE 19 Y 27	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
MEDICACIÓN PARA DORMIR (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN ÚLTIMAS 4 SEMANA	94,9%	0,4	94,0 ; 95,7	1,78	0,5
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1,6%	0,2	1,2 ; 2,1	1,51	14,5
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,5%	0,2	1,1 ; 2,0	1,67	15,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	2,0%	0,3	1,5 ; 2,6	1,63	13,4
MEDICACIÓN PARA DORMIR (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN ÚLTIMAS 4 SEMANA	90,9%	1,6	87,2 ; 93,5	2,32	1,7
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2,4%	0,7	1,4 ; 4,1	1,42	27,5
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	2,0%	0,7	1,1 ; 3,9	1,75	33,1
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	4,7%	1,1	3,0 ; 7,4	2,03	23,1
MEDICACIÓN PARA DORMIR (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN ÚLTIMAS 4 SEMANA	95,1%	0,9	93,0 ; 96,6	1,97	0,7
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1,7%	0,5	0,9 ; 3,1	1,87	30,1
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	2,1%	0,6	1,1 ; 3,6	2,14	29,4
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,2%	0,5	0,5 ; 2,5	2,11	39,1
MEDICACIÓN PARA DORMIR (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN ÚLTIMAS 4 SEMANA	96,6%	0,6	95,2 ; 97,5	1,09	0,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1,1%	0,4	0,6 ; 2,1	1,32	33,4
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	0,8%	0,3	0,4 ; 1,5	0,86	30,8
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,5%	0,4	0,9 ; 2,5	1,01	24,4
MEDICACIÓN PARA DORMIR (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN ÚLTIMAS 4 SEMANA	95,7%	0,8	93,9 ; 97,0	1,37	0,8
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1,0%	0,3	0,5 ; 1,7	0,80	29,9
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,3%	0,5	0,6 ; 2,6	1,57	35,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	2,0%	0,5	1,3 ; 3,1	1,01	23,4
MEDICACIÓN PARA DORMIR (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN ÚLTIMAS 4 SEMANA	95,9%	1,0	93,4 ; 97,5	1,26	1,1
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2,4%	0,9	1,1 ; 5,0	1,72	38,2
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	0,9%	0,4	0,4 ; 2,0	0,78	43,0
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,8%	0,4	0,3 ; 1,9	0,77	44,8
DISFUNCIÓN DIURNA (TOTAL)	NINGUNA	71,0%	0,9	69,1 ; 72,7	1,80	1,3
	LEVE	25,5%	0,9	23,9 ; 27,2	1,71	3,4
	MODERADA	3,1%	0,3	2,5 ; 3,9	1,67	10,8
	SEVERA	0,4%	0,1	0,2 ; 0,7	1,15	25,2
DISFUNCIÓN DIURNA (LIMA CENTRO)	NINGUNA	66,9%	2,7	61,5 ; 71,9	2,44	4,0
	LEVE	28,4%	2,3	24,0 ; 33,2	2,09	8,3
	MODERADA	4,2%	1,1	2,6 ; 6,9	2,16	25,2
	SEVERA	0,4%	0,2	0,2 ; 1,2	0,95	52,6
DISFUNCIÓN DIURNA (LIMA NORTE)	NINGUNA	68,4%	1,8	64,8 ; 71,8	1,75	2,6
	LEVE	27,8%	1,8	24,5 ; 31,4	1,83	6,3
	MODERADA	3,0%	0,7	1,9 ; 4,7	2,01	23,4
	SEVERA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,5	1,20	37,3
DISFUNCIÓN DIURNA (LIMA ESTE)	NINGUNA	74,8%	1,5	71,6 ; 77,7	1,38	2,1
	LEVE	22,2%	1,4	19,6 ; 25,2	1,29	6,4
	MODERADA	2,7%	0,6	1,8 ; 4,1	1,31	20,8
	SEVERA	0,3%	0,1	0,1 ; 0,7	0,74	50,1
DISFUNCIÓN DIURNA (LIMA SUR)	NINGUNA	73,1%	1,9	69,2 ; 76,6	1,68	2,6
	LEVE	23,1%	1,7	19,9 ; 26,6	1,50	7,4
	MODERADA	3,5%	0,7	2,3 ; 5,1	1,29	19,8
	SEVERA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,4	1,61	71,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
DISFUNCIÓN DIURNA (CALLAO)	NINGUNA	71,0%	2,8	65,0 ; 76,1	1,88	4,0
	LEVE	27,3%	2,7	22,1 ; 33,2	1,95	10,4
	MODERADA	1,8%	0,6	1,0 ; 3,5	1,00	33,4
	SEVERA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PUNTAJE TOTAL(N=2,504) (TOTAL)	SIN PROBLEMA DE SUEÑO (SCORE <5)	67,7%	1,0	65,7 ; 69,7	2,02	1,5
	MERECE ATENCIÓN MÉDICA	24,2%	0,9	22,6 ; 26,0	1,79	3,6
	MERECE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO	7,9%	0,5	6,9 ; 8,9	1,58	6,5
	SE TRATA DE UN PROBLEMA DE SUEÑO GRAVE	0,2%	0,1	0,1 ; 0,3	1,02	38,4
PUNTAJE TOTAL(N=2,504) (LIMA CENTRO)	SIN PROBLEMA DE SUEÑO (SCORE <5)	63,7%	2,7	58,2 ; 68,9	2,48	4,3
	MERECE ATENCIÓN MÉDICA	26,4%	2,2	22,2 ; 30,9	1,93	8,4
	MERECE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO	9,5%	1,4	7,1 ; 12,7	1,82	15,0
	SE TRATA DE UN PROBLEMA DE SUEÑO GRAVE	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	1,11	58,5
PUNTAJE TOTAL(N=2,504) (LIMA NORTE)	SIN PROBLEMA DE SUEÑO (SCORE <5)	61,5%	2,2	57,1 ; 65,6	2,36	3,5
	MERECE ATENCIÓN MÉDICA	27,1%	1,9	23,5 ; 31,1	2,24	7,1
	MERECE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO	11,2%	1,3	9,0 ; 13,9	1,88	11,2
	SE TRATA DE UN PROBLEMA DE SUEÑO GRAVE	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	1,26	70,3
PUNTAJE TOTAL(N=2,504) (LIMA ESTE)	SIN PROBLEMA DE SUEÑO (SCORE <5)	71,1%	1,7	67,6 ; 74,3	1,54	2,4
	MERECE ATENCIÓN MÉDICA	22,7%	1,5	19,9 ; 25,8	1,40	6,6
	MERECE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO	6,1%	0,7	4,8 ; 7,8	1,02	12,0
	SE TRATA DE UN PROBLEMA DE SUEÑO GRAVE	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	0,33	73,6
PUNTAJE TOTAL(N=2,504) (LIMA SUR)	SIN PROBLEMA DE SUEÑO (SCORE <5)	70,2%	2,1	65,8 ; 74,2	1,99	3,1
	MERECE ATENCIÓN MÉDICA	23,1%	1,8	19,8 ; 26,9	1,67	7,8
	MERECE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO	6,7%	1,0	5,0 ; 8,8	1,36	14,5
	SE TRATA DE UN PROBLEMA DE SUEÑO GRAVE	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,35	100,4
PUNTAJE TOTAL(N=2,504) (CALLAO)	SIN PROBLEMA DE SUEÑO (SCORE <5)	77,4%	2,2	72,8 ; 81,4	1,31	2,8
	MERECE ATENCIÓN MÉDICA	19,3%	2,1	15,4 ; 23,8	1,41	11,2
	MERECE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO	3,3%	0,9	2,0 ; 5,5	1,11	26,1
	SE TRATA DE UN PROBLEMA DE SUEÑO GRAVE	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,22	100,2
DESPERTARSE DURANTE LA NOCHE (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	68,4%	1,1	66,2 ; 70,4	2,40	1,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	17,9%	0,8	16,3 ; 19,6	2,13	4,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	9,4%	0,6	8,4 ; 10,6	1,74	6,1
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	4,3%	0,4	3,6 ; 5,1	1,48	8,6
DESPERTARSE DURANTE LA NOCHE (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	65,7%	3,3	59,0 ; 71,8	3,65	5,0
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	21,8%	2,4	17,5 ; 26,9	2,55	10,9
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	9,9%	1,6	7,1 ; 13,6	2,28	16,4
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	2,5%	0,8	1,4 ; 4,5	1,79	30,0
DESPERTARSE DURANTE LA NOCHE (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	58,4%	2,2	54,1 ; 62,7	2,32	3,7
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	24,4%	1,8	21,0 ; 28,2	2,18	7,6
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	11,9%	1,3	9,5 ; 14,7	1,95	11,1
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	5,3%	0,9	3,8 ; 7,3	1,90	17,0
DESPERTARSE DURANTE LA NOCHE (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	71,8%	1,9	68,0 ; 75,4	1,90	2,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	12,9%	1,4	10,4 ; 15,8	1,82	10,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	9,7%	1,1	7,8 ; 12,0	1,37	10,8
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	5,6%	0,8	4,3 ; 7,3	1,15	13,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
DESPERTARSE DURANTE LA NOCHE (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	77,1%	2,0	72,9 ; 80,9	2,15	2,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	11,7%	1,3	9,3 ; 14,5	1,55	11,3
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	7,1%	1,1	5,3 ; 9,6	1,62	15,2
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	4,1%	0,8	2,8 ; 5,9	1,33	18,4
DESPERTARSE DURANTE LA NOCHE (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	72,5%	2,5	67,4 ; 77,1	1,47	3,4
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	18,7%	2,2	14,8 ; 23,4	1,52	11,8
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	6,6%	1,2	4,5 ; 9,4	1,19	18,8
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	2,2%	0,6	1,3 ; 3,8	0,85	28,0
TENER QUE LEVANTARSE PARA IR AL BAÑO (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	67,9%	1,1	65,7 ; 69,9	2,31	1,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	16,8%	0,8	15,4 ; 18,4	1,92	4,6
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	9,7%	0,6	8,5 ; 11,1	2,08	6,6
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	5,6%	0,5	4,7 ; 6,6	1,92	8,6
TENER QUE LEVANTARSE PARA IR AL BAÑO (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	64,2%	3,3	57,5 ; 70,4	3,61	5,1
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	21,4%	2,0	17,7 ; 25,7	1,88	9,5
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	10,6%	2,1	7,2 ; 15,4	3,50	19,6
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	3,8%	1,0	2,2 ; 6,4	2,17	26,8
TENER QUE LEVANTARSE PARA IR AL BAÑO (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	62,6%	2,3	58,0 ; 66,9	2,57	3,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	20,1%	1,7	16,9 ; 23,7	2,23	8,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	11,1%	1,3	8,8 ; 13,8	1,96	11,5
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	6,3%	1,1	4,4 ; 8,9	2,57	18,0
TENER QUE LEVANTARSE PARA IR AL BAÑO (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	68,7%	1,8	65,1 ; 72,0	1,56	2,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	12,5%	1,3	10,2 ; 15,2	1,65	10,3
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	11,3%	1,2	9,2 ; 13,9	1,51	10,4
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	7,5%	0,9	6,0 ; 9,3	1,15	11,4
TENER QUE LEVANTARSE PARA IR AL BAÑO (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	75,2%	1,9	71,3 ; 78,8	1,84	2,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	13,3%	1,3	11,0 ; 16,0	1,28	9,5
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	6,7%	1,1	4,9 ; 9,2	1,70	16,0
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	4,7%	1,0	3,0 ; 7,2	2,22	22,1
TENER QUE LEVANTARSE PARA IR AL BAÑO (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	71,0%	2,8	65,1 ; 76,2	1,86	4,0
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	18,1%	2,6	13,6 ; 23,6	2,11	14,2
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	7,1%	1,5	4,6 ; 10,7	1,74	21,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	3,9%	1,1	2,3 ; 6,6	1,46	27,4
NO PODER RESPIRAR BIEN (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	94,5%	0,5	93,5 ; 95,3	1,87	0,5
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	3,9%	0,4	3,2 ; 4,8	1,98	10,5
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,2%	0,2	0,9 ; 1,7	1,24	14,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,4%	0,1	0,3 ; 0,6	0,98	23,3
NO PODER RESPIRAR BIEN (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	93,0%	1,6	89,2 ; 95,5	2,98	1,7
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	6,3%	1,6	3,8 ; 10,1	3,15	24,8
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,9	1,47	54,8
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,87	100,3
NO PODER RESPIRAR BIEN (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	93,1%	1,1	90,8 ; 94,9	2,05	1,1
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	5,0%	0,8	3,7 ; 6,9	1,65	16,2
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,5%	0,5	0,8 ; 2,7	1,79	31,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,1	1,51	59,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
NO PODER RESPIRAR BIEN (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	95,3%	0,7	93,8 ; 96,5	1,11	0,7
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	1,8%	0,4	1,1 ; 2,9	1,16	24,1
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	2,1%	0,4	1,4 ; 3,2	0,94	19,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,7%	0,2	0,4 ; 1,4	0,78	30,9
NO PODER RESPIRAR BIEN (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	95,1%	0,8	93,1 ; 96,5	1,41	0,9
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	3,8%	0,8	2,5 ; 5,7	1,57	20,9
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	0,6%	0,2	0,3 ; 1,3	0,79	37,0
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,5%	0,2	0,2 ; 1,2	0,88	42,7
NO PODER RESPIRAR BIEN (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	96,9%	0,8	95,0 ; 98,1	0,96	0,8
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2,3%	0,7	1,2 ; 4,1	1,07	31,1
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	0,8%	0,4	0,3 ; 2,0	0,86	47,3
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TOSER O RONCAR RUIDOSAMENTE (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	93,5%	0,5	92,5 ; 94,4	1,79	0,5
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	4,3%	0,4	3,6 ; 5,2	1,84	9,6
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,5%	0,2	1,2 ; 2,1	1,46	14,5
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,6%	0,1	0,4 ; 0,9	1,05	19,5
TOSER O RONCAR RUIDOSAMENTE (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	92,2%	1,5	88,6 ; 94,7	2,45	1,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	6,5%	1,5	4,1 ; 10,1	2,79	22,9
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,2%	0,5	0,6 ; 2,5	1,36	38,0
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	1,00	99,9
TOSER O RONCAR RUIDOSAMENTE (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	92,0%	1,1	89,6 ; 93,9	1,90	1,2
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	5,7%	0,9	4,2 ; 7,8	1,79	15,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,6%	0,5	0,9 ; 2,8	1,66	29,5
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,6%	0,3	0,3 ; 1,5	1,46	43,6
TOSER O RONCAR RUIDOSAMENTE (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	93,3%	0,9	91,3 ; 94,8	1,37	1,0
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	3,6%	0,6	2,5 ; 5,1	1,31	18,0
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	2,0%	0,5	1,3 ; 3,1	1,15	22,7
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,1%	0,3	0,7 ; 1,8	0,76	24,9
TOSER O RONCAR RUIDOSAMENTE (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	95,2%	0,8	93,2 ; 96,6	1,44	0,9
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2,7%	0,5	1,8 ; 4,0	0,99	19,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,4%	0,5	0,6 ; 2,9	1,86	38,3
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,07	39,8
TOSER O RONCAR RUIDOSAMENTE (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	96,6%	1,0	94,0 ; 98,1	1,39	1,0
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2,1%	0,7	1,1 ; 4,2	1,25	34,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,3%	0,6	0,5 ; 3,1	1,26	44,7
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
SENTIR FRÍO (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	81,1%	0,9	79,2 ; 82,8	2,43	1,1
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	10,9%	0,7	9,7 ; 12,2	1,96	6,0
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	6,0%	0,5	5,1 ; 7,1	2,18	8,8
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	2,0%	0,3	1,6 ; 2,6	1,54	13,0
SENTIR FRÍO (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	77,3%	2,7	71,6 ; 82,1	3,16	3,5
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	12,3%	1,8	9,2 ; 16,3	2,26	14,5
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	9,8%	1,9	6,7 ; 14,3	3,16	19,4
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,5%	0,3	0,2 ; 1,7	1,45	59,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SENTIR FRÍO (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	75,8%	2,1	71,5 ; 79,6	2,75	2,7
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	14,8%	1,6	11,9 ; 18,3	2,48	11,0
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	7,0%	1,1	5,2 ; 9,4	2,02	15,0
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	2,3%	0,6	1,5 ; 3,7	1,59	23,8
SENTIR FRÍO (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	82,8%	1,5	79,6 ; 85,5	1,72	1,8
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	8,4%	0,9	6,8 ; 10,5	1,24	11,0
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	5,4%	0,8	3,9 ; 7,3	1,53	15,8
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	3,4%	0,7	2,3 ; 5,1	1,61	20,4
SENTIR FRÍO (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	83,5%	1,8	79,8 ; 86,7	2,04	2,1
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	10,4%	1,2	8,2 ; 13,0	1,51	12,0
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	4,4%	0,8	3,1 ; 6,3	1,38	18,1
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,7%	0,5	1,0 ; 3,0	1,22	27,3
SENTIR FRÍO (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	92,0%	1,4	88,7 ; 94,4	1,31	1,5
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	5,3%	1,1	3,5 ; 7,9	1,17	20,9
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,9%	0,6	1,0 ; 3,5	0,94	32,1
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,9%	0,5	0,3 ; 3,0	1,64	61,8
SENTIR DEMASIADO CALOR (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	93,7%	0,5	92,7 ; 94,6	1,73	0,5
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	3,8%	0,4	3,2 ; 4,6	1,68	9,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,9%	0,3	1,5 ; 2,5	1,63	13,6
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,5%	0,1	0,3 ; 0,8	1,18	23,2
SENTIR DEMASIADO CALOR (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	93,7%	1,3	90,6 ; 95,9	2,25	1,4
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	5,9%	1,3	3,8 ; 9,0	2,33	22,1
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	0,4%	0,3	0,1 ; 1,6	1,54	71,7
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
SENTIR DEMASIADO CALOR (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	92,3%	1,2	89,6 ; 94,3	2,34	1,3
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	3,8%	0,8	2,5 ; 5,7	2,01	20,8
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	3,4%	0,8	2,2 ; 5,2	2,11	22,5
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,5%	0,3	0,2 ; 1,3	1,43	47,8
SENTIR DEMASIADO CALOR (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	95,5%	0,6	94,2 ; 96,6	0,97	0,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2,5%	0,5	1,7 ; 3,6	0,96	18,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,6%	0,4	1,0 ; 2,6	1,07	24,4
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,4%	0,2	0,2 ; 0,9	0,76	43,9
SENTIR DEMASIADO CALOR (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	92,7%	1,0	90,6 ; 94,3	1,22	1,0
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	4,5%	0,7	3,3 ; 6,0	1,01	15,3
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	2,2%	0,6	1,3 ; 3,6	1,34	25,4
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,6%	0,3	0,3 ; 1,5	1,13	44,2
SENTIR DEMASIADO CALOR (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	95,2%	1,1	92,4 ; 97,0	1,36	1,2
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	2,6%	0,9	1,3 ; 4,9	1,42	33,5
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,0%	0,4	0,4 ; 2,3	0,91	43,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,2%	0,6	0,5 ; 3,0	1,27	45,9
TENER PESADILLAS (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	86,8%	0,7	85,4 ; 88,1	1,80	0,8
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	8,6%	0,5	7,6 ; 9,7	1,70	6,4
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	3,7%	0,4	3,0 ; 4,5	1,73	10,1
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,9%	0,1	0,6 ; 1,2	1,02	16,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
TENER PESADILLAS (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	86,1%	1,7	82,5 ; 89,1	1,76	1,9
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	9,8%	1,4	7,3 ; 12,9	1,74	14,5
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	3,5%	0,8	2,2 ; 5,5	1,58	23,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,6%	0,4	0,2 ; 1,9	1,56	57,2
TENER PESADILLAS (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	86,1%	1,6	82,7 ; 88,9	2,45	1,8
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	9,0%	1,3	6,8 ; 11,9	2,39	14,3
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	4,5%	1,0	2,9 ; 6,8	2,58	21,5
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,0	1,09	51,3
TENER PESADILLAS (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	86,0%	1,3	83,1 ; 88,5	1,64	1,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	8,1%	0,9	6,4 ; 10,1	1,31	11,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	4,7%	0,7	3,5 ; 6,4	1,30	15,6
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,2%	0,3	0,7 ; 2,0	0,85	25,3
TENER PESADILLAS (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	87,2%	1,2	84,5 ; 89,4	1,23	1,4
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	8,9%	1,0	7,2 ; 11,0	1,04	10,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	2,5%	0,5	1,7 ; 3,8	1,09	21,3
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,4%	0,4	0,8 ; 2,4	1,04	28,4
TENER PESADILLAS (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	91,0%	1,7	87,0 ; 93,9	1,75	1,9
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	6,3%	1,6	3,7 ; 10,4	2,17	26,1
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	1,9%	0,6	1,0 ; 3,7	1,08	34,4
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	0,8%	0,14	0,3 ; 1,9	0,79	45,2
SUFRIR DOLORS (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	88,4%	0,6	87,0 ; 89,6	1,81	0,7
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	5,8%	0,4	5,0 ; 6,7	1,40	7,2
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	4,0%	0,4	3,3 ; 4,8	1,65	9,4
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,8%	0,2	1,4 ; 2,3	1,13	11,8
SUFRIR DOLORS (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	89,1%	1,6	85,6 ; 91,8	1,90	1,7
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	5,6%	1,0	4,0 ; 8,0	1,46	17,8
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	3,9%	0,8	2,5 ; 5,9	1,47	21,8
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,4%	0,5	0,7 ; 2,8	1,40	36,0
SUFRIR DOLORS (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	86,0%	1,5	82,7 ; 88,7	2,29	1,8
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	6,2%	0,9	4,6 ; 8,3	1,77	15,0
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	5,7%	1,0	4,1 ; 7,9	2,05	16,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	2,1%	0,5	1,3 ; 3,4	1,57	25,0
SUFRIR DOLORS (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	89,9%	1,1	87,6 ; 91,8	1,32	1,2
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	4,9%	0,7	3,7 ; 6,5	1,23	14,8
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	3,1%	0,6	2,1 ; 4,7	1,50	20,7
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	2,1%	0,4	1,5 ; 3,0	0,80	18,5
SUFRIR DOLORS (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	87,6%	1,4	84,6 ; 90,1	1,63	1,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	7,0%	0,9	5,4 ; 9,1	1,20	13,2
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	3,6%	0,7	2,5 ; 5,2	1,15	18,3
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,7%	0,4	1,1 ; 2,7	0,83	22,5
SUFRIR DOLORS (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	91,0%	1,6	87,3 ; 93,7	1,56	1,8
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	4,8%	1,0	3,1 ; 7,3	1,12	21,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	2,8%	0,9	1,5 ; 5,4	1,54	33,2
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	1,4%	0,5	0,6 ; 2,9	0,99	38,7
OTRAS RAZONES (TOTAL)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	52,7%	4,9	43,2 ; 62,0	2,35	9,2
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	9,9%	2,5	6,0 ; 16,0	1,72	25,2
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	14,3%	2,7	9,8 ; 20,4	1,44	18,7
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	23,1%	3,5	16,9 ; 30,7	1,74	15,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
OTRAS RAZONES (LIMA CENTRO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	4,5%	4,4	0,6 ; 26,4	1,48	99,2
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	29,9%	12,7	11,4 ; 58,5	2,50	42,6
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	28,1%	10,3	12,6 ; 51,4	1,68	36,5
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	37,5%	11,4	18,8 ; 61,0	1,79	30,4
OTRAS RAZONES (LIMA NORTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	72,9%	7,0	57,3 ; 84,4	2,67	9,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	0,5%	0,5	0,1 ; 3,8	1,02	0,58
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	7,8%	3,8	2,9 ; 19,4	2,18	48,9
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	18,7%	5,9	9,7 ; 33,1	2,45	31,5
OTRAS RAZONES (LIMA ESTE)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	43,1%	8,8	27,2 ; 60,6	1,10	20,5
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	10,8%	4,1	5,0 ; 21,9	0,61	38,2
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	11,8%	5,1	4,8 ; 25,9	0,87	43,4
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	34,3%	7,8	20,9 ; 50,8	0,94	22,8
OTRAS RAZONES (LIMA SUR)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	63,4%	7,4	48,1 ; 76,4	1,30	11,7
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	12,3%	4,5	5,8 ; 24,1	1,04	36,7
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	8,9%	3,2	4,3 ; 17,6	0,71	36,3
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	15,4%	4,8	8,2 ; 27,2	0,96	30,8
OTRAS RAZONES (CALLAO)	NINGUNA VEZ EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS	4,2%	4,1	0,6 ; 25,0	0,77	99,6
	MENOS DE UNA VEZ A LA SEMANA	20,9%	9,5	7,9 ; 45,1	0,99	45,6
	UNA O DOS VECES A LA SEMANA	50,0%	10,8	30,0 ; 70,0	0,83	21,6
	TRES O MÁS VECES A LA SEMANA	24,9%	9,5	11,0 ; 47,3	0,86	38,0
CALIDAD DE VIDA GLOBAL DE LA POBLACIÓN (MEDIA) (TOTAL)	PUNTAJE TOTAL	7,92	0,0	7,87 ; 7,97	2,39	0,3
	BIENESTAR FÍSICO	7,59	0,0	7,51 ; 7,66	2,30	0,5
	BIENESTAR PSICOLÓGICO EMOCIONAL	7,98	0,0	7,92 ; 8,05	2,01	0,4
	AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO	8,50	0,0	8,45 ; 8,56	1,88	0,3
	FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL	8,47	0,0	8,41 ; 8,52	1,94	0,3
	FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL	8,30	0,0	8,24 ; 8,35	1,90	0,4
	APOYO SOCIAL-EMOCIONAL	7,77	0,0	7,69 ; 7,84	2,11	0,5
	APOYO DE COMUNITARIO Y DE SERVICIOS	6,43	0,1	6,34 ; 6,53	2,09	0,7
	PLENITUD PERSONAL	7,81	0,0	7,74 ; 7,88	2,05	0,4
	SATISFACCIÓN ESPIRITUAL	8,13	0,0	8,07 ; 8,19	1,77	0,4
	CALIDAD DE VIDA GLOBAL	8,24	0,0	8,18 ; 8,30	1,92	0,4
	PUNTAJE TOTAL	8,14	0,1	8,02 ; 8,27	2,67	0,8
	BIENESTAR FÍSICO	7,92	0,1	7,74 ; 8,10	2,64	1,2
CALIDAD DE VIDA GLOBAL DE LA POBLACIÓN (MEDIA) (LIMA CENTRO)	BIENESTAR PSICOLÓGICO EMOCIONAL	8,23	0,1	8,06 ; 8,39	2,54	1,0
	AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO	8,66	0,1	8,53 ; 8,78	2,14	0,7
	FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL	8,54	0,1	8,40 ; 8,68	2,07	0,8
	FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL	8,53	0,1	8,39 ; 8,68	2,26	0,9
	APOYO SOCIAL-EMOCIONAL	8,12	0,1	7,92 ; 8,32	2,94	1,2
	APOYO DE COMUNITARIO Y DE SERVICIOS	6,43	0,1	6,21 ; 6,65	1,80	1,8
	PLENITUD PERSONAL	8,16	0,1	8,00 ; 8,32	2,57	1,0
	SATISFACCIÓN ESPIRITUAL	8,39	0,1	8,24 ; 8,54	2,33	0,9
	CALIDAD DE VIDA GLOBAL	8,44	0,1	8,29 ; 8,59	2,55	0,9
	PUNTAJE TOTAL	7,98	0,1	7,88 ; 8,08	2,56	0,6
	BIENESTAR FÍSICO	7,64	0,1	7,47 ; 7,80	2,97	1,1
	BIENESTAR PSICOLÓGICO EMOCIONAL	8,08	0,1	7,95 ; 8,21	2,27	0,8
	AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO	8,59	0,1	8,48 ; 8,69	1,92	0,6
CALIDAD DE VIDA GLOBAL DE LA POBLACIÓN (MEDIA) (LIMA NORTE)	FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL	8,58	0,1	8,47 ; 8,69	1,97	0,7
	FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL	8,31	0,1	8,20 ; 8,43	2,11	0,7
	APOYO SOCIAL-EMOCIONAL	7,84	0,1	7,69 ; 7,99	2,45	1,0
	APOYO DE COMUNITARIO Y DE SERVICIOS	6,53	0,1	6,34 ; 6,73	2,74	1,5
	PLENITUD PERSONAL	7,88	0,1	7,74 ; 8,02	2,31	0,9
	SATISFACCIÓN ESPIRITUAL	8,02	0,1	7,89 ; 8,15	2,26	0,8
	CALIDAD DE VIDA GLOBAL	8,35	0,1	8,23 ; 8,47	2,15	0,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CALIDAD DE VIDA GLOBAL DE LA POBLACIÓN (MEDIA) (LIMA ESTE)	PUNTAJE TOTAL	7,77	0,0	7,68 ; 7,86	1,87	0,6
	BIENESTAR FÍSICO	7,40	0,1	7,29 ; 7,51	1,39	0,7
	BIENESTAR PSICOLÓGICO EMOCIONAL	7,82	0,1	7,72 ; 7,92	1,41	0,7
	AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO	8,36	0,1	8,26 ; 8,47	1,66	0,6
	FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL	8,36	0,1	8,25 ; 8,46	1,60	0,6
	FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL	8,16	0,1	8,06 ; 8,27	1,42	0,6
	APOYO SOCIAL-EMOCIONAL	7,65	0,1	7,51 ; 7,78	1,64	0,9
	APOYO DE COMUNITARIO Y DE SERVICIOS	6,34	0,1	6,15 ; 6,53	2,03	1,5
	PLENITUD PERSONAL	7,51	0,1	7,39 ; 7,63	1,55	0,8
	SATISFACCIÓN ESPIRITUAL	8,06	0,1	7,95 ; 8,16	1,32	0,7
CALIDAD DE VIDA GLOBAL DE LA POBLACIÓN (MEDIA) (LIMA SUR)	PUNTAJE TOTAL	7,76	0,1	7,65 ; 7,87	2,30	0,7
	BIENESTAR FÍSICO	7,36	0,1	7,21 ; 7,51	2,08	1,0
	BIENESTAR PSICOLÓGICO EMOCIONAL	7,77	0,1	7,63 ; 7,90	1,85	0,9
	AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO	8,40	0,1	8,27 ; 8,53	2,00	0,8
	FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL	8,36	0,1	8,22 ; 8,50	2,09	0,9
	FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL	8,18	0,1	8,05 ; 8,30	1,90	0,8
	APOYO SOCIAL-EMOCIONAL	7,43	0,1	7,27 ; 7,59	1,70	0,1
	APOYO DE COMUNITARIO Y DE SERVICIOS	6,26	0,1	6,08 ; 6,45	1,80	1,5
	PLENITUD PERSONAL	7,71	0,1	7,58 ; 7,84	1,63	0,8
	SATISFACCIÓN ESPIRITUAL	8,04	0,1	7,92 ; 8,16	1,27	0,8
CALIDAD DE VIDA GLOBAL DE LA POBLACIÓN (MEDIA) (CALLAO)	PUNTAJE TOTAL	8,06	0,1	7,92 ; 8,20	2,17	0,9
	BIENESTAR FÍSICO	7,78	0,1	7,58 ; 7,98	1,98	1,3
	BIENESTAR PSICOLÓGICO EMOCIONAL	8,13	0,1	7,96 ; 8,30	1,71	1,1
	AUTOCUIDADO Y FUNCIONAMIENTO	8,58	0,1	8,45 ; 8,70	1,25	0,7
	FUNCIONAMIENTO OCUPACIONAL	8,51	0,1	8,37 ; 8,66	1,63	0,9
	FUNCIONAMIENTO INTERPERSONAL	8,42	0,1	8,27 ; 8,56	1,60	0,9
	APOYO SOCIAL-EMOCIONAL	7,94	0,1	7,74 ; 8,14	1,92	1,3
	APOYO COMUNITARIO Y DE SERVICIOS	6,75	0,1	6,46 ; 7,03	2,15	2,1
	PLENITUD PERSONAL	7,94	0,1	7,76 ; 8,11	1,74	1,1
	SATISFACCIÓN ESPIRITUAL	8,30	0,1	8,14 ; 8,47	1,86	1,0
NIVEL GENERAL DE DISCAPACIDAD (MEDIA)	TOTAL	5,30	0,0	5,26 ; 5,35	1,43	0,4
	LIMA CENTRO	5,22	0,0	5,14 ; 5,31	1,20	0,8
	LIMA NORTE	5,30	0,1	5,20 ; 5,39	1,65	0,9
	LIMA ESTE	5,30	0,0	5,24 ; 5,37	1,08	0,6
	LIMA SUR	5,40	0,1	5,29 ; 5,52	1,53	1,1
	CALLAO	5,27	0,1	5,12 ; 5,41	1,49	1,4
POBLACIÓN GENERAL ADULTA CON AL MENOS ALGUNA DISCAPACIDAD O INHABILIDAD	TOTAL	10,3%	0,6	9,2 ; 11,5	1,64	5,7
	LIMA CENTRO	6,4%	1,1	4,6 ; 9,0	1,58	17,3
	LIMA NORTE	8,9%	1,2	6,8 ; 11,4	1,96	13,1
	LIMA ESTE	12,3%	1,2	10,2 ; 14,7	1,35	9,4
	LIMA SUR	15,0%	1,5	12,2 ; 18,3	1,70	10,3
	CALLAO	6,6%	1,4	4,3 ; 9,9	1,56	21,5
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA MANTENER REGULARMENTE EL ASEO DE SU CUERPO, SU ALIÑO O ARREGLO PERSONAL (TOTAL)	NINGUNA	96,7%	0,3	96,0 ; 97,3	1,47	0,3
	LEVE	2,0%	0,2	1,6 ; 2,6	1,37	12,2
	MODERADA	1,0%	0,2	0,7 ; 1,4	1,38	17,3
	SEVERA O ABSOLUTA	0,3%	0,1	0,1 ; 0,5	1,33	33,8
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA MANTENER REGULARMENTE EL ASEO DE SU CUERPO, SU ALIÑO O ARREGLO PERSONAL (LIMA CENTRO)	NINGUNA	97,2%	0,7	95,6 ; 98,3	1,22	0,7
	LEVE	2,2%	0,6	1,3 ; 3,7	1,26	27,0
	MODERADA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	0,82	59,4
	SEVERA O ABSOLUTA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,07	71,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA MANTENER REGULARMENTE EL ASEO DE SU CUERPO, SU ALIÑO O ARREGLO PERSONAL (LIMA NORTE)	NINGUNA	95,9%	0,8	94,1 ; 97,1	1,70	0,8
	LEVE	2,5%	0,6	1,6 ; 4,0	1,66	23,2
	MODERADA	1,4%	0,4	0,8 ; 2,6	1,58	30,4
	SEVERA O ABSOLUTA	0,2%	0,2	0,0 ; 1,2	1,93	100,1
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA MANTENER REGULARMENTE EL ASEO DE SU CUERPO, SU ALIÑO O ARREGLO PERSONAL (LIMA ESTE)	NINGUNA	97,5%	0,5	96,4 ; 98,3	1,04	0,5
	LEVE	1,7%	0,4	1,0 ; 2,7	1,18	25,5
	MODERADA	0,8%	0,3	0,4 ; 1,5	0,90	32,7
	SEVERA O ABSOLUTA	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,38	100,0
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA MANTENER REGULARMENTE EL ASEO DE SU CUERPO, SU ALIÑO O ARREGLO PERSONAL (LIMA SUR)	NINGUNA	96,0%	0,8	94,0 ; 97,4	1,67	0,9
	LEVE	2,2%	0,5	1,3 ; 3,5	1,26	25,0
	MODERADA	1,5%	0,5	0,7 ; 2,9	1,73	35,7
	SEVERA O ABSOLUTA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,0	0,92	52,8
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA MANTENER REGULARMENTE EL ASEO DE SU CUERPO, SU ALIÑO O ARREGLO PERSONAL (CALLAO)	NINGUNA	97,1%	0,9	94,9 ; 98,4	1,28	0,9
	LEVE	1,0%	0,5	0,4 ; 2,5	1,02	44,9
	MODERADA	1,0%	0,4	0,4 ; 2,3	0,89	43,2
	SEVERA O ABSOLUTA	0,8%	0,5	0,2 ; 0,5	1,60	63,4
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE SUS OCUPACIONES (ESTUDIOS, TRABAJOS, O CASA) (TOTAL)	NINGUNA	94,7%	0,4	93,8 ; 95,4	1,58	0,4
	LEVE	3,0%	0,3	2,4 ; 3,7	1,50	10,5
	MODERADA	1,8%	0,2	1,4 ; 2,3	1,47	13,5
	SEVERA O ABSOLUTA	0,6%	0,1	0,4 ; 0,9	1,30	22,8
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE SUS OCUPACIONES (ESTUDIOS, TRABAJOS, O CASA) (LIMA CENTRO)	NINGUNA	95,8%	0,9	93,7 ; 97,2	1,51	0,9
	LEVE	2,6%	0,8	1,5 ; 4,6	1,75	29,2
	MODERADA	1,3%	0,4	0,7 ; 2,4	1,02	31,6
	SEVERA O ABSOLUTA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,07	71,5
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE SUS OCUPACIONES (ESTUDIOS, TRABAJOS, O CASA) (LIMA NORTE)	NINGUNA	94,2%	1,0	92,0 ; 95,8	2,00	1,0
	LEVE	3,1%	0,7	2,0 ; 4,8	1,88	22,2
	MODERADA	2,0%	0,6	1,2 ; 3,5	1,99	28,4
	SEVERA O ABSOLUTA	0,6%	0,3	0,3 ; 1,7	1,81	48,3
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE SUS OCUPACIONES (ESTUDIOS, TRABAJOS, O CASA) (LIMA ESTE)	NINGUNA	94,9%	0,7	93,3 ; 96,2	1,22	0,8
	LEVE	3,3%	0,6	2,3 ; 4,7	1,20	18,1
	MODERADA	1,5%	0,4	0,9 ; 2,5	1,06	25,1
	SEVERA O ABSOLUTA	0,3%	0,1	0,1 ; 0,7	0,71	48,1
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE SUS OCUPACIONES (ESTUDIOS, TRABAJOS, O CASA) (LIMA SUR)	NINGUNA	94,2%	0,9	92,1 ; 95,8	1,42	1,0
	LEVE	3,0%	0,7	1,9 ; 4,6	1,38	22,1
	MODERADA	2,1%	0,6	1,2 ; 3,6	1,60	28,7
	SEVERA O ABSOLUTA	0,7%	0,3	0,4 ; 1,5	0,88	35,8
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA DESEMPEÑAR EFICIENTEMENTE SUS OCUPACIONES (ESTUDIOS, TRABAJOS, O CASA) (CALLAO)	NINGUNA	94,5%	1,4	91,1 ; 96,6	1,68	1,4
	LEVE	2,5%	0,7	1,4 ; 4,5	1,10	29,9
	MODERADA	1,9%	0,7	1,0 ; 3,8	1,16	35,1
	SEVERA O ABSOLUTA	1,1%	0,6	0,4 ; 3,1	1,52	53,2
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA ASUMIR Y DESEMPEÑAR SATISFACTORIA -MENTE SUS FUNCIONES COMO MADRE, PADRE, ESPOSO(A) O HIJO(A) (TOTAL)	NINGUNA	95,5%	0,4	94,7 ; 96,2	1,58	0,4
	LEVE	2,8%	0,3	2,3 ; 3,5	1,53	10,9
	MODERADA	1,1%	0,2	0,8 ; 1,5	1,34	16,7
	SEVERA O ABSOLUTA	0,6%	0,1	0,4 ; 0,9	1,16	21,3
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA ASUMIR Y DESEMPEÑAR SATISFACTORIA -MENTE SUS FUNCIONES COMO MADRE, PADRE, ESPOSO(A) O HIJO(A) (LIMA CENTRO)	NINGUNA	96,8%	0,8	94,7 ; 98,1	1,66	0,8
	LEVE	1,9%	0,7	0,9 ; 3,8	1,95	36,4
	MODERADA	0,8%	0,4	0,3 ; 2,2	1,78	55,2
	SEVERA O ABSOLUTA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,5	1,08	49,8
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA ASUMIR Y DESEMPEÑAR SATISFACTORIA -MENTE SUS FUNCIONES COMO MADRE, PADRE, ESPOSO(A) O HIJO(A) (LIMA NORTE)	NINGUNA	96,6%	0,7	95,0 ; 97,7	1,71	0,7
	LEVE	2,1%	0,5	1,2 ; 3,5	1,76	26,6
	MODERADA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,7	1,69	44,2
	SEVERA O ABSOLUTA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,5	1,63	47,4
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA ASUMIR Y DESEMPEÑAR SATISFACTORIA -MENTE SUS FUNCIONES COMO MADRE, PADRE, ESPOSO(A) O HIJO(A) (LIMA ESTE)	NINGUNA	94,8%	0,8	92,9 ; 96,2	1,50	0,9
	LEVE	3,8%	0,7	2,7 ; 5,4	1,30	17,4
	MODERADA	0,9%	0,3	0,5 ; 1,7	1,04	32,8
	SEVERA O ABSOLUTA	0,5%	0,2	0,2 ; 1,1	0,94	42,9
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA ASUMIR Y DESEMPEÑAR SATISFACTORIA -MENTE SUS FUNCIONES COMO MADRE, PADRE, ESPOSO(A) O HIJO(A) (LIMA SUR)	NINGUNA	93,0%	1,1	90,6 ; 94,8	1,56	1,1
	LEVE	4,2%	0,8	2,9 ; 6,1	1,49	19,2
	MODERADA	2,1%	0,5	1,2 ; 3,4	1,30	26,0
	SEVERA O ABSOLUTA	0,7%	0,3	0,4 ; 1,5	0,84	34,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA ASUMIR Y DESEMPEÑAR SATISFACTORIAMENTE SUS FUNCIONES COMO MADRE, PADRE, ESPOSO(A) O HIJO(A) (CALLAO)	NINGUNA	97,1%	0,9	94,6 ; 94,8	1,56	1,1
	LEVE	1,5%	0,6	0,7 ; 3,2	1,15	39,9
	MODERADA	1,0%	0,5	0,4 ; 2,5	1,05	46,7
	SEVERA O ABSOLUTA	0,4%	0,3	0,1 ; 2,0	1,27	80,5
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA RELACIONARSE CON SUS FAMILIARES, AMIGOS, VECINOS Y PERSONAS EN GENERAL (TOTAL)	NINGUNA	97,0%	0,3	96,4 ; 97,5	1,25	0,3
	LEVE	2,0%	0,2	1,6 ; 2,5	1,22	11,6
	MODERADA	0,8%	0,1	0,5 ; 1,1	1,05	17,6
	SEVERA O ABSOLUTA	0,3%	0,1	0,1 ; 0,5	1,21	32,2
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA RELACIONARSE CON SUS FAMILIARES, AMIGOS, VECINOS Y PERSONAS EN GENERAL (LIMA CENTRO)	NINGUNA	98,0%	0,6	96,4 ; 98,9	1,38	0,6
	LEVE	1,4%	0,5	0,7 ; 2,9	1,49	36,8
	MODERADA	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,77	60,1
	SEVERA O ABSOLUTA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,2	1,20	70,8
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA RELACIONARSE CON SUS FAMILIARES, AMIGOS, VECINOS Y PERSONAS EN GENERAL (LIMA NORTE)	NINGUNA	98,2%	0,5	97,1 ; 98,9	1,39	0,5
	LEVE	1,1%	0,4	0,6 ; 2,0	1,38	32,9
	MODERADA	0,5%	0,2	0,2 ; 1,2	1,28	48,4
	SEVERA O ABSOLUTA	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	1,60	75,3
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA RELACIONARSE CON SUS FAMILIARES, AMIGOS, VECINOS Y PERSONAS EN GENERAL (LIMA ESTE)	NINGUNA	96,3%	0,6	94,9 ; 97,3	1,05	0,6
	LEVE	2,6%	0,5	1,7 ; 3,7	1,60	32,8
	MODERADA	0,9%	0,3	0,5 ; 1,6	0,92	30,5
	SEVERA O ABSOLUTA	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	1,16	61,2
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA RELACIONARSE CON SUS FAMILIARES, AMIGOS, VECINOS Y PERSONAS EN GENERAL (LIMA SUR)	NINGUNA	94,5%	0,9	92,5 ; 96,0	1,31	0,9
	LEVE	3,7%	0,7	2,6 ; 5,3	1,19	18,4
	MODERADA	1,4%	0,4	0,8 ; 2,5	1,08	28,4
	SEVERA O ABSOLUTA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,0	0,95	52,6
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA RELACIONARSE CON SUS FAMILIARES, AMIGOS, VECINOS Y PERSONAS EN GENERAL (CALLAO)	NINGUNA	98,7%	0,6	97,0 ; 99,4	1,12	0,6
	LEVE	0,7%	0,4	0,2 ; 2,3	1,21	59,7
	MODERADA	0,6%	0,4	0,2 ; 2,0	1,07	59,4
	SEVERA O ABSOLUTA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA PLANIFICAR SUS ACTIVIDADES, LUEGO ORGANIZARLAS Y EJECUTARLAS (TOTAL)	NINGUNA	95,8%	0,3	95,1 ; 96,5	1,32	0,4
	LEVE	2,6%	0,3	2,1 ; 3,2	1,28	10,4
	MODERADA	1,3%	0,2	1,0 ; 1,7	1,17	14,3
	SEVERA O ABSOLUTA	0,3%	0,1	0,2 ; 0,5	1,10	28,1
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA PLANIFICAR SUS ACTIVIDADES, LUEGO ORGANIZARLAS Y EJECUTARLAS (LIMA CENTRO)	NINGUNA	97,5%	0,6	96,0 ; 98,4	1,15	0,6
	LEVE	1,5%	0,5	0,8 ; 2,8	1,23	32,5
	MODERADA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,7	1,30	52,5
	SEVERA O ABSOLUTA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	1,08	57,8
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA PLANIFICAR SUS ACTIVIDADES, LUEGO ORGANIZARLAS Y EJECUTARLAS (LIMA NORTE)	NINGUNA	95,6%	0,8	93,8 ; 96,9	1,75	0,8
	LEVE	2,7%	0,6	1,7 ; 4,2	1,77	23,4
	MODERADA	1,5%	0,4	0,8 ; 2,6	1,62	30,3
	SEVERA O ABSOLUTA	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	1,60	75,3
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA PLANIFICAR SUS ACTIVIDADES, LUEGO ORGANIZARLAS Y EJECUTARLAS (LIMA ESTE)	NINGUNA	94,5%	0,7	92,9 ; 95,7	1,10	0,8
	LEVE	3,8%	0,6	2,8 ; 5,2	1,04	15,6
	MODERADA	1,5%	0,3	1,0 ; 2,3	0,81	22,3
	SEVERA O ABSOLUTA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,6	0,74	57,5
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA PLANIFICAR SUS ACTIVIDADES, LUEGO ORGANIZARLAS Y EJECUTARLAS (LIMA SUR)	NINGUNA	95,7%	0,7	93,9 ; 96,9	1,24	0,8
	LEVE	2,7%	0,6	1,7 ; 4,1	1,24	22,2
	MODERADA	1,2%	0,3	0,7 ; 2,1	0,95	29,3
	SEVERA O ABSOLUTA	0,5%	0,2	0,2 ; 1,1	0,83	44,5
DIFICULTADES O LIMITACIONES PARA PLANIFICAR SUS ACTIVIDADES, LUEGO ORGANIZARLAS Y EJECUTARLAS (CALLAO)	NINGUNA	97,0%	0,8	94,8 ; 98,3	1,19	0,9
	LEVE	1,1%	0,4	0,6 ; 2,2	0,62	33,6
	MODERADA	1,5%	0,6	0,7 ; 3,2	1,11	38,7
	SEVERA O ABSOLUTA	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,52	99,7
PERMISIVIDAD FRENTE A LA PSICOPATÍA (PREVALENCIA)	TOTAL	4,9%	0,4	4,2 ; 5,7	1,43	7,9
	LIMA CENTRO	4,5%	0,9	3,0 ; 6,8	1,58	20,8
	LIMA NORTE	4,8%	0,8	3,4 ; 6,7	1,81	17,4
	LIMA ESTE	4,6%	0,6	3,5 ; 6,1	1,00	13,8
	LIMA SUR	5,2%	0,9	3,7 ; 7,2	1,42	16,9
	CALLAO	5,7%	1,2	3,8 ; 8,5	1,24	20,7
ANTE ROBO, NO LE IMPORTA Y NO HACE NADA (PREVALENCIA)	TOTAL	2,2%	0,3	1,7 ; 2,8	1,55	12,5
	LIMA CENTRO	2,6%	0,7	1,5 ; 4,5	1,61	28,0
	LIMA NORTE	1,9%	0,6	1,0 ; 3,5	2,16	30,7
	LIMA ESTE	1,7%	0,4	1,1 ; 2,7	0,99	22,8
	LIMA SUR	2,4%	0,6	1,4 ; 3,9	1,48	25,7
	CALLAO	2,8%	0,9	1,5 ; 5,2	1,37	31,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONSIDERA PERMITIDO ANTE DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS EL ROBO (PREVALENCIA)	TOTAL	2,9%	0,3	2,3 ; 3,5	1,41	10,4
	LIMA CENTRO	2,3%	0,6	1,3 ; 3,9	1,33	27,2
	LIMA NORTE	3,1%	0,7	2,0 ; 4,7	1,80	21,9
	LIMA ESTE	3,1%	0,6	2,2 ; 4,5	1,20	18,5
	LIMA SUR	2,8%	0,7	1,8 ; 4,4	1,44	23,4
	LIMA CALLAO	2,9%	0,7	1,7 ; 4,8	0,94	25,6
OBTENCIÓN DE OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (TOTAL)	NUNCA	90,9%	0,6	89,7 ; 92,0	1,83	0,6
	RARA VEZ	7,5%	0,5	6,5 ; 8,6	1,78	7,1
	OCASIONALMENTE	1,4%	0,2	1,0 ; 1,9	1,45	15,2
	FRECUENTE	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	1,51	37,8
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,75	100,1
OBTENCIÓN DE OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (LIMA CENTRO)	NUNCA	94,0%	1,3	91,0 ; 96,1	2,18	1,3
	RARA VEZ	5,1%	1,2	3,2 ; 8,0	2,19	23,0
	OCASIONALMENTE	0,9%	0,4	0,4 ; 2,0	1,21	42,8
	FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
OBTENCIÓN DE OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (LIMA NORTE)	NUNCA	89,5%	1,4	86,4 ; 91,9	2,39	1,5
	RARA VEZ	9,0%	1,3	6,8 ; 11,8	2,31	14,1
	OCASIONALMENTE	1,4%	0,5	0,7 ; 2,8	2,17	36,2
	FRECUENTE	0,2%	0,2	0,0 ; 1,2	2,07	99,4
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
OBTENCIÓN DE OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (LIMA ESTE)	NUNCA	90,4%	1,0	88,1 ; 92,2	1,33	1,1
	RARA VEZ	7,4%	0,9	5,7 ; 9,5	1,43	12,8
	OCASIONALMENTE	2,2%	0,5	1,4 ; 3,3	1,06	21,1
	FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	0,28	100,5
	MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,75	100,1
OBTENCIÓN DE OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (LIMA SUR)	NUNCA	91,5%	1,0	89,3 ; 93,2	1,18	1,1
	RARA VEZ	7,4%	0,9	5,7 ; 9,4	1,15	12,5
	OCASIONALMENTE	0,8%	0,3	0,4 ; 1,8	1,15	38,5
	FRECUENTE	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	1,00	57,8
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
OBTENCIÓN DE OBJETOS DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (CALLAO)	NUNCA	89,3%	2,0	84,7 ; 92,7	2,01	2,2
	RARA VEZ	7,9%	1,6	5,3 ; 11,5	1,63	20,0
	OCASIONALMENTE	1,7%	0,8	0,7 ; 4,0	1,61	43,7
	FRECUENTE	1,1%	0,6	0,4 ; 3,2	1,61	55,2
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
MENTIRA FRECUENTE EN LA ADULTEZ (TOTAL)	NUNCA	35,5%	0,9	33,7 ; 37,4	1,70	2,6
	RARA VEZ	54,1%	0,9	52,3 ; 56,0	1,58	1,7
	OCASIONALMENTE	9,1%	0,6	8,1 ; 10,3	1,64	6,1
	FRECUENTEMENTE	1,1%	0,2	0,8 ; 1,5	1,31	16,5
	MUY FRECUENTE	0,2%	0,1	0,1 ; 0,3	1,23	42,8
MENTIRA FRECUENTE EN LA ADULTEZ (LIMA CENTRO)	NUNCA	35,8%	2,6	30,9 ; 41,0	2,21	7,2
	RARA VEZ	53,4%	2,5	48,5 ; 58,2	1,88	4,6
	OCASIONALMENTE	9,4%	1,3	7,1 ; 12,4	1,62	14,3
	FRECUENTEMENTE	1,3%	0,5	0,6 ; 2,6	1,30	36,3
	MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	0,80	100,0
MENTIRA FRECUENTE EN LA ADULTEZ (LIMA NORTE)	NUNCA	32,6%	2,0	28,8 ; 36,6	2,12	6,1
	RARA VEZ	57,9%	2,0	53,9 ; 61,8	1,97	3,5
	OCASIONALMENTE	8,5%	1,1	6,5 ; 10,9	1,89	13,1
	FRECUENTEMENTE	0,9%	0,4	0,4 ; 2,1	1,91	41,8
	MUY FRECUENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	1,05	99,9
MENTIRA FRECUENTE EN LA ADULTEZ (LIMA ESTE)	NUNCA	32,4%	1,5	29,6 ; 35,5	1,12	4,6
	RARA VEZ	57,4%	1,6	54,3 ; 60,5	1,09	2,7
	OCASIONALMENTE	8,9%	0,9	7,3 ; 10,8	1,07	10,1
	FRECUENTEMENTE	1,2%	0,3	0,7 ; 2,1	1,07	27,9
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	0,33	99,9
MENTIRA FRECUENTE EN LA ADULTEZ (LIMA SUR)	NUNCA	40,7%	2,0	36,8 ; 44,7	1,56	5,0
	RARA VEZ	49,4%	2,0	45,5 ; 53,3	1,47	4,1
	OCASIONALMENTE	8,6%	1,3	6,3 ; 11,5	1,96	15,1
	FRECUENTEMENTE	1,0%	0,3	0,5 ; 1,9	0,97	32,5
	MUY FRECUENTE	0,4%	0,3	0,1 ; 1,4	1,53	65,9
MENTIRA FRECUENTE EN LA ADULTEZ (CALLAO)	NUNCA	39,3%	2,6	34,3 ; 44,6	1,38	6,7
	RARA VEZ	47,5%	2,7	42,2 ; 52,8	1,41	5,7
	OCASIONALMENTE	12,0%	1,9	8,7 ; 16,3	1,67	16,0
	FRECUENTEMENTE	1,0%	0,5	0,3 ; 2,7	1,29	52,5
	MUY FRECUENTE	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	0,98	99,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
VENTA DE OBJETO DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (TOTAL)	NUNCA	96,0%	0,4	95,2 ; 96,7	1,68	0,4
	RARA VEZ	3,2%	0,3	2,6 ; 3,9	1,60	10,5
	OCASIONALMENTE	0,6%	0,1	0,3 ; 0,9	1,49	24,5
	FRECUENTEMENTE	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	1,30	36,4
	MUY FRECUENTE	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,39	75,4
VENTA DE OBJETO DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (LIMA CENTRO)	NUNCA	96,6%	0,7	94,8 ; 97,8	1,31	0,8
	RARA VEZ	3,1%	0,7	2,0 ; 4,8	1,26	22,8
	OCASIONALMENTE	0,3%	0,3	0,0 ; 1,9	2,10	100,0
	FRECUENTEMENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTA DE OBJETO DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (LIMA NORTE)	NUNCA	93,9%	1,1	91,4 ; 95,6	2,36	1,1
	RARA VEZ	5,4%	0,9	3,8 ; 7,6	2,06	17,4
	OCASIONALMENTE	0,2%	0,1	0,1 ; 0,8	1,23	70,7
	FRECUENTEMENTE	0,5%	0,3	0,2 ; 1,4	1,63	51,6
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTA DE OBJETO DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (LIMA ESTE)	NUNCA	96,9%	0,5	95,8 ; 97,8	0,94	0,5
	RARA VEZ	2,1%	0,4	1,5 ; 3,2	0,93	19,8
	OCASIONALMENTE	0,8%	0,3	0,4 ; 1,6	1,02	33,4
	FRECUENTEMENTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,48	71,3
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
VENTA DE OBJETO DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (LIMA SUR)	NUNCA	97,2%	0,6	95,8 ; 98,2	1,22	0,6
	RARA VEZ	1,7%	0,5	1,0 ; 2,9	1,26	28,1
	OCASIONALMENTE	0,5%	0,3	0,1 ; 1,6	1,66	61,2
	FRECUENTEMENTE	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,84	54,6
	MUY FRECUENTE	0,3%	0,2	0,1 ; 1,2	1,38	75,0
VENTA DE OBJETO DE DUDOSA PROCEDENCIA O ROBADAS (CALLAO)	NUNCA	95,5%	1,1	92,8 ; 97,2	1,34	1,1
	RARA VEZ	3,1%	0,9	1,7 ; 5,4	1,30	29,3
	OCASIONALMENTE	1,4%	0,7	0,5 ; 3,9	1,91	53,1
	FRECUENTEMENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	MUY FRECUENTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TENDENCIAS PSICOPÁTICAS (PREVALENCIA ACTUAL)	TOTAL	5,4%	0,4	4,6 ; 6,3	1,57	7,9
	LIMA CENTRO	4,1%	0,9	2,7 ; 6,2	1,51	21,5
	LIMA NORTE	4,9%	1,0	3,3 ; 7,3	2,44	19,9
	LIMA ESTE	6,7%	0,9	5,1 ; 8,6	1,30	12,9
	LIMA SUR	5,3%	0,8	4,0 ; 7,0	1,08	14,5
	CALLAO	6,1%	1,3	4,0 ; 9,1	1,35	20,9
INDICADORES SUICIDAS						
DESEOS DE MORIR (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	23,4%	0,8	21,9 ; 25,0	1,55	3,4
	PREVALENCIA MENSUAL	1,3%	0,2	1,0 ; 1,8	1,40	15,3
	PREVALENCIA ANUAL	4,6%	0,4	3,9 ; 5,4	1,52	8,4
DESEOS DE MORIR (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	16,7%	2,0	13,1 ; 21,0	2,21	12,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,6%	0,3	0,3 ; 1,5	0,96	45,0
	PREVALENCIA ANUAL	4,2%	1,2	2,4 ; 7,3	2,74	28,4
DESEOS DE MORIR (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	22,7%	1,8	19,3 ; 26,4	2,18	7,9
	PREVALENCIA MENSUAL	1,3%	0,5	0,6 ; 2,8	2,38	38,8
	PREVALENCIA ANUAL	4,1%	0,8	2,8 ; 5,9	1,74	18,6
DESEOS DE MORIR (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	26,9%	1,5	24,1 ; 29,8	1,17	5,4
	PREVALENCIA MENSUAL	2,3%	0,5	1,5 ; 3,4	1,15	21,4
	PREVALENCIA ANUAL	5,1%	0,7	3,9 ; 6,7	1,08	13,6
DESEOS DE MORIR (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	26,8%	1,6	23,8 ; 30,0	1,15	5,9
	PREVALENCIA MENSUAL	1,1%	0,3	0,6 ; 1,9	0,90	30,2
	PREVALENCIA ANUAL	5,1%	0,8	3,8 ; 6,9	1,11	14,9
DESEOS DE MORIR (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	21,3%	1,7	18,2 ; 24,8	0,81	7,9
	PREVALENCIA MENSUAL	1,0%	0,4	0,4 ; 2,4	0,93	43,5
	PREVALENCIA ANUAL	4,4%	1,0	2,8 ; 7,0	1,23	23,5
PENSAMIENTOS DE QUITARSE LA VIDA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	8,9%	0,5	7,9 ; 10,0	1,48	5,8
	PREVALENCIA MENSUAL	0,6%	0,2	0,4 ; 1,0	1,84	25,6
	PREVALENCIA ANUAL	2,2%	0,3	1,7 ; 2,7	1,46	12,2
PENSAMIENTOS DE QUITARSE LA VIDA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	5,7%	1,2	3,8 ; 8,5	1,98	20,7
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	0,88	70,8
	PREVALENCIA ANUAL	1,5%	0,6	0,7 ; 3,5	2,12	42,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PENSAMIENTOS DE QUITARSE LA VIDA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	7,7%	1,1	5,8 ; 10,2	2,03	14,3
	PREVALENCIA MENSUAL	1,0%	0,5	0,4 ; 2,7	3,13	50,7
	PREVALENCIA ANUAL	2,1%	0,6	1,2 ; 3,7	2,17	29,3
PENSAMIENTOS DE QUITARSE LA VIDA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	11,1%	1,0	9,3 ; 13,3	1,12	9,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,9%	0,3	0,5 ; 1,6	0,82	28,8
	PREVALENCIA ANUAL	2,9%	0,5	2,0 ; 4,1	1,06	18,2
PENSAMIENTOS DE QUITARSE LA VIDA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	10,1%	1,1	8,2 ; 12,5	1,19	10,7
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	1,17	72,8
	PREVALENCIA ANUAL	1,9%	0,5	1,1 ; 3,0	1,08	24,9
PENSAMIENTOS DE QUITARSE LA VIDA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	9,7%	1,5	7,2 ; 13,1	1,21	15,3
	PREVALENCIA MENSUAL	0,5%	0,3	0,1 ; 1,6	0,85	61,7
	PREVALENCIA ANUAL	2,3%	0,6	1,4 ; 3,8	0,79	26,6
PLANES DE ÍNDOLE SUICIDA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	3,5%	0,3	2,9 ; 4,2	1,36	9,2
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	1,96	44,5
	PREVALENCIA ANUAL	0,8%	0,2	0,6 ; 1,2	1,44	19,6
PLANES DE ÍNDOLE SUICIDA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	2,4%	0,7	1,4 ; 4,1	1,41	27,4
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,89	100,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,7%	0,4	0,2 ; 2,0	1,57	55,6
PLANES DE ÍNDOLE SUICIDA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	3,3%	0,7	2,2 ; 5,0	1,82	21,2
	PREVALENCIA MENSUAL	0,4%	0,3	0,1 ; 1,8	2,78	72,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,4	0,4 ; 2,3	2,32	45,4
PLANES DE ÍNDOLE SUICIDA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	3,9%	0,7	2,8 ; 5,4	1,24	16,8
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,7	0,84	60,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,3	0,5 ; 1,6	0,83	28,5
PLANES DE ÍNDOLE SUICIDA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	4,4%	0,7	3,2 ; 6,0	1,10	16,2
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,1	1,37	100,2
	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,3	0,5 ; 1,9	1,02	33,9
PLANES DE ÍNDOLE SUICIDA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	3,1%	0,8	1,9 ; 5,2	1,07	26,2
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA ANUAL	0,4%	0,3	0,1 ; 1,7	1,09	74,6
CONDUCTAS SUICIDAS (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	2,8%	0,3	2,3 ; 3,5	1,36	10,2
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,83	79,9
	PREVALENCIA ANUAL	0,4%	0,1	0,2 ; 0,7	1,28	26,7
CONDUCTAS SUICIDAS (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	2,1%	0,6	1,2 ; 3,7	1,28	27,6
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA ANUAL	0,4%	0,3	0,1 ; 1,8	1,80	76,5
CONDUCTAS SUICIDAS (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	3,4%	0,7	2,3 ; 4,9	1,54	19,3
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	1,37	71,2
CONDUCTAS SUICIDAS (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	2,9%	0,6	1,9 ; 4,2	1,27	19,9
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	1,00	99,9
	PREVALENCIA ANUAL	0,5%	0,2	0,2 ; 1,2	0,96	40,7
CONDUCTAS SUICIDAS (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	2,6%	0,6	1,6 ; 4,2	1,49	24,5
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA ANUAL	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,33	46,9
CONDUCTAS SUICIDAS (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	3,0%	0,8	1,8 ; 4,9	0,94	25,2
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,31	99,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,31	99,7
POTENCIALIDAD SUICIDA (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	0,1%	0,1	0,1 ; 0,3	1,00	40,8
	LIMA CENTRO	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,51	100,4
	LIMA NORTE	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	1,26	58,0
	LIMA ESTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,58	70,2
	LIMA SUR	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,60	100,4
	CALLAO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
MOTIVOS QUE LLEVAN A LOS DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS (TOTAL)	AUTOIMAGEN	1,2%	0,3	0,7 ; 2,1	1,16	28,8
	PADRES	19,0%	1,4	16,5 ; 21,8	1,40	7,2
	HIJOS	3,9%	0,7	2,7 ; 5,7	1,70	18,9
	OTROS PARIENTES	6,6%	0,9	5,0 ; 8,6	1,62	14,2
	PAREJA	29,3%	1,6	26,3 ; 32,5	1,38	5,4
	AMIGOS	0,6%	0,3	0,3 ; 1,5	1,41	44,1
	LABORALES	2,6%	0,5	1,7 ; 3,8	1,21	19,9
	ESTUDIOS	2,8%	0,7	1,7 ; 4,5	2,13	25,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MOTIVOS QUE LLEVAN A LOS DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS (TOTAL)	COMPAÑEROS(AS) DE ESTUDIOS	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,48	62,3
	ECONÓMICOS	12,5%	1,2	10,3 ; 15,1	1,58	9,8
	SALUD FÍSICA	10,4%	1,1	8,4 ; 12,8	1,57	10,8
	SALUD FAMILIAR	3,5%	0,8	2,3 ; 5,4	2,03	22,0
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	2,0%	0,5	1,2 ; 3,3	1,51	25,0
	MUERTE DE PAREJA	2,3%	0,5	1,6 ; 3,5	1,14	20,3
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	12,2%	1,2	10,0 ; 14,8	1,58	9,9
	MUERTE DE UN HIJO	2,5%	0,5	1,7 ; 3,8	1,35	21,3
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	5,4%	0,7	4,1 ; 7,0	1,22	13,6
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	4,0%	0,8	2,6 ; 5,9	1,96	20,3
	SIN MOTIVO	2,6%	0,6	1,6 ; 4,2	1,88	24,8
	OTROS	10,3%	1,1	8,4 ; 12,6	1,41	10,3
MOTIVOS QUE LLEVAN A LOS DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS (LIMA CENTRO)	APARIENCIA FÍSICA	2,7%	1,4	1,0 ; 7,4	1,10	52,6
	PADRES	19,3%	4,3	12,2 ; 29,1	1,70	22,3
	HIJOS	7,3%	3,3	3,0 ; 16,9	2,27	44,9
	OTROS PARIENTES	6,8%	2,6	3,2 ; 14,0	1,50	37,8
	PAREJA	27,3%	5,1	18,5 ; 38,2	1,85	18,5
	AMIGOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LABORALES	1,3%	1,0	0,3 ; 5,6	1,10	77,7
	ESTUDIOS	9,2%	4,1	3,7 ; 20,9	2,85	44,3
	COMPAÑEROS(AS) DE ESTUDIOS	1,3%	0,9	0,3 ; 5,2	0,98	72,1
	ECONÓMICOS	11,7%	4,4	5,5 ; 23,3	2,62	37,1
	SALUD FÍSICA	18,1%	4,4	11,1 ; 28,3	1,84	24,1
	SALUD FAMILIAR	7,4%	3,9	2,6 ; 19,5	3,15	52,5
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	MUERTE DE PAREJA	1,2%	0,7	0,4 ; 3,6	0,57	57,4
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	7,8%	2,5	4,0 ; 14,5	1,31	32,8
	MUERTE DE UN HIJO	5,9%	2,4	2,6 ; 12,9	1,51	40,9
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	2,0%	1,1	0,7 ; 5,5	0,80	51,7
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	6,5%	4,0	1,8 ; 20,3	3,84	62,3
	SIN MOTIVO	7,5%	3,0	3,3 ; 16,0	1,89	40,7
	OTROS	5,2%	1,8	2,6 ; 10,2	0,95	34,8
	APARIENCIA FÍSICA	1,5%	0,9	0,5 ; 4,6	1,50	57,7
MOTIVOS QUE LLEVAN A LOS DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS (LIMA NORTE)	PADRES	19,1%	3,3	13,4 ; 26,3	2,06	17,1
	HIJOS	3,0%	1,2	1,3 ; 6,7	1,58	41,3
	OTROS PARIENTES	10,2%	2,7	6,0 ; 16,7	2,32	26,2
	PAREJA	27,9%	3,6	21,3 ; 35,5	1,98	13,1
	AMIGOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LABORALES	3,7%	1,2	2,0 ; 6,9	1,17	32,0
	ESTUDIOS	3,4%	1,4	1,6 ; 7,4	1,67	39,5
	COMPAÑEROS(AS) DE ESTUDIOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	ECONÓMICOS	16,1%	2,9	11,2 ; 22,7	1,89	18,1
	SALUD FÍSICA	10,1%	2,6	6,0 ; 16,5	2,21	25,7
	SALUD FAMILIAR	4,4%	1,7	2,0 ; 9,1	2,02	38,5
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	1,9%	1,0	0,7 ; 5,5	1,72	54,2
	MUERTE DE PAREJA	2,2%	1,0	0,8 ; 5,5	1,51	47,7
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	14,1%	3,2	8,9 ; 21,6	2,52	22,7
	MUERTE DE UN HIJO	2,7%	1,2	1,1 ; 6,3	1,58	43,8
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	5,7%	1,7	3,2 ; 10,0	1,54	29,1
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	3,6%	1,4	1,7 ; 7,5	1,61	38,2
	SIN MOTIVO	1,0%	0,7	0,2 ; 4,0	1,55	72,9
	OTROS	11,0%	2,5	6,9 ; 17,0	1,91	22,8
	APARIENCIA FÍSICA	1,3%	0,6	0,5 ; 3,3	1,02	49,5
	PADRES	20,3%	2,2	16,4 ; 24,9	0,95	10,7
MOTIVOS QUE LLEVAN A LOS DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS (LIMA ESTE)	HIJOS	2,0%	0,7	1,0 ; 4,2	0,91	36,9
	OTROS PARIENTES	5,0%	1,1	3,2 ; 7,6	0,84	22,4
	PAREJA	31,5%	2,6	26,6 ; 36,8	1,02	8,3
	AMIGOS	0,9%	0,6	0,2 ; 3,5	1,46	71,2
	LABORALES	2,1%	0,9	0,9 ; 4,6	1,15	40,7
	ESTUDIOS	1,3%	0,6	0,5 ; 3,2	0,93	47,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MOTIVOS QUE LLEVAN A LOS DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS (LIMA ESTE)	ECONÓMICOS	10,0%	1,8	7,0 ; 14,2	1,19	18,2
	SALUD FÍSICA	7,6%	1,4	5,3 ; 10,8	0,90	18,4
	SALUD FAMILIAR	1,3%	0,6	0,5 ; 3,0	0,81	44,1
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	2,4%	1,0	5,1 ; 40,4	1,27	40,4
	MUERTE DE PAREJA	2,2%	0,7	1,2 ; 4,1	0,73	31,4
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	14,2%	2,1	10,5 ; 18,8	1,19	14,9
	MUERTE DE UN HIJO	2,2%	0,8	1,1 ; 4,3	0,89	35,2
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	5,9%	1,3	3,8 ; 9,2	1,03	22,5
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	5,5%	1,6	3,1 ; 9,6	1,53	28,4
	SIN MOTIVO	0,7%	0,5	0,2 ; 2,7	1,11	71,1
MOTIVOS QUE LLEVAN A LOS DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS (LIMA SUR)	OTROS	11,6%	2,0	8,1 ; 16,2	1,30	17,6
	APARIENCIA FÍSICA	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	0,56	99,5
	PADRES	21,7%	2,7	16,9 ; 27,3	1,14	12,3
	HIJOS	4,2%	1,3	2,3 ; 7,7	1,15	30,9
	OTROS PARIENTES	6,0%	1,6	3,5 ; 10,2	1,30	27,2
	PAREJA	28,7%	2,8	23,6 ; 34,5	1,04	9,7
	AMIGOS	1,1%	0,8	0,3 ; 4,7	1,68	73,3
	LABORALES	3,4%	1,3	1,6 ; 7,0	1,34	37,4
	ESTUDIOS	1,6%	0,9	0,5 ; 4,6	1,34	55,7
	COMPAÑEROS(AS) DE ESTUDIOS	0,7%	0,7	0,1 ; 4,8	1,93	99,6
	ECONÓMICOS	11,3%	2,1	7,8 ; 16,2	1,21	18,6
	SALUD FÍSICA	8,0%	1,7	5,3 ; 12,0	1,06	21,0
	SALUD FAMILIAR	2,9%	1,2	1,3 ; 6,5	1,41	41,4
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	2,0%	1,0	0,8 ; 5,1	1,29	48,1
	MUERTE DE PAREJA	2,5%	1,0	1,1 ; 5,4	1,10	39,6
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	11,1%	2,1	7,6 ; 15,9	1,21	18,8
	MUERTE DE UN HIJO	2,0%	0,9	0,9 ; 4,8	1,10	44,0
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	5,6%	1,5	3,3 ; 9,3	1,12	26,2
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	2,0%	0,9	0,8 ; 4,7	1,10	44,7
	SIN MOTIVO	4,2%	1,8	1,8 ; 9,5	2,19	42,7
MOTIVOS QUE LLEVAN A LOS DESEOS, PENSAMIENTOS, PLANES SUICIDAS (CALLAO)	OTROS	9,7%	2,0	6,4 ; 14,3	1,22	20,4
	APARIENCIA FÍSICA	0,7%	0,6	0,1 ; 4,5	0,75	99,3
	PADRES	8,7%	2,9	4,5 ; 16,4	1,23	33,3
	HIJOS	6,8%	3,8	2,2 ; 19,1	2,62	55,6
	OTROS PARIENTES	2,5%	1,1	1,0 ; 6,0	0,61	44,8
	PAREJA	30,9%	4,7	22,4 ; 40,9	1,22	15,4
	AMIGOS	1,1%	0,8	0,3 ; 4,4	0,65	70,9
	LABORALES	0,7%	0,7	0,1 ; 4,8	0,80	101,0
	ESTUDIOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	COMPAÑEROS(AS) DE ESTUDIOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	ECONÓMICOS	14,0%	3,5	8,3 ; 22,4	1,21	25,3
	SALUD FÍSICA	14,9%	4,0	8,6 ; 8,6	24,5	145,2
	SALUD FAMILIAR	4,1%	1,9	1,6 ; 9,8	1,04	46,0
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	4,1%	2,5	1,2 ; 13,1	1,89	61,8
	MUERTE DE PAREJA	4,1%	2,3	1,3 ; 11,7	1,52	55,6
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	9,8%	2,6	5,8 ; 16,2	0,88	26,4
	MUERTE DE UN HIJO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	6,4%	2,6	2,8 ; 13,6	1,27	40,2
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	2,2%	1,1	0,8 ; 6,0	0,71	52,8
	SIN MOTIVO	2,4%	1,8	0,5 ; 10,1	1,61	75,5
MOTIVOS QUE LLEVAN AL INTENTO SUICIDA (TOTAL)	OTROS	12,9%	3,1	7,9 ; 20,5	1,01	24,3
	AUTOIMAGEN	3,0%	1,7	1,0 ; 8,7	1,26	55,1
	PADRES	27,8%	4,4	20,0 ; 37,3	1,30	15,9
	HIJOS	3,3%	1,3	1,5 ; 7,2	0,76	40,8
	OTROS PARIENTES	6,5%	2,6	2,9 ; 13,7	1,44	39,5
	PAREJA	36,8%	4,7	28,1 ; 46,5	1,29	12,9
	AMIGOS	1,1%	0,8	0,3 ; 4,5	0,79	72,9
	LABORALES	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	0,42	100,4
	ESTUDIOS	4,8%	2,3	1,8 ; 12,0	1,58	48,6
	ECONÓMICOS	5,1%	2,1	2,2 ; 11,1	1,20	41,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MOTIVOS QUE LLEVAN AL INTENTO SUICIDA (TOTAL)	SALUD FÍSICA	5,7%	2,5	2,3 ; 13,3	1,62	45,0
	SALUD FAMILIAR	1,1%	0,8	0,2 ; 4,9	0,90	79,0
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	2,1%	1,1	0,7 ; 5,7	0,77	52,6
	MUERTE DE PAREJA	2,4%	1,5	0,7 ; 8,2	1,29	63,0
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	19,2%	4,5	11,8 ; 29,6	1,75	23,6
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	4,0%	2,1	1,4 ; 11,1	1,56	53,1
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	5,6%	2,3	2,5 ; 12,2	1,31	40,8
MOTIVOS QUE LLEVAN AL INTENTO SUICIDA (LIMA CENTRO)	OTROS	14,2%	3,5	8,6 ; 22,6	1,32	24,6
	APARIENCIA FÍSICA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PADRES	30,8%	12,0	12,9 ; 57,4	1,13	38,9
	HIJOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	OTROS PARIENTES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PAREJA	22,7%	12,8	6,6 ; 55,1	1,56	56,3
	AMIGOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LABORALES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	ESTUDIOS	12,6%	8,2	3,2 ; 38,4	1,03	65,4
	ECONÓMICOS	5,8%	5,7	0,8 ; 32,5	1,01	98,9
	SALUD FÍSICA	13,6%	9,3	3,2 ; 42,8	1,24	68,4
	SALUD FAMILIAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	MUERTE DE PAREJA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	15,7%	10,1	4,0 ; 45,6	1,29	64,7
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	5,6%	5,6	0,8 ; 31,9	0,97	99,0
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	11,2%	8,5	2,3 ; 40,2	1,20	75,6
	OTROS	13,8%	9,4	3,3 ; 43,1	1,25	68,4
MOTIVOS QUE LLEVAN AL INTENTO SUICIDA (LIMA NORTE)	APARIENCIA FÍSICA	6,1%	4,1	1,6 ; 20,9	1,24	67,1
	PADRES	27,6%	8,4	14,3 ; 46,4	1,50	30,4
	HIJOS	2,5%	2,5	0,3 ; 15,8	1,07	99,8
	OTROS PARIENTES	10,9%	6,1	3,4 ; 29,6	1,64	56,2
	PAREJA	43,2%	9,4	26,4 ; 61,7	1,53	21,7
	AMIGOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LABORALES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	ESTUDIOS	5,9%	5,7	0,8 ; 31,9	2,48	96,2
	ECONÓMICOS	7,8%	5,3	1,9 ; 26,5	1,67	68,2
	SALUD FÍSICA	3,5%	3,3	0,5 ; 19,9	1,39	95,1
	SALUD FAMILIAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	2,3%	2,3	0,3 ; 15,0	1,01	99,9
	MUERTE DE PAREJA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	10,7%	7,8	2,4 ; 37,3	2,69	72,9
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	8,8%	6,0	2,2 ; 29,3	1,87	67,5
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	6,7%	4,7	1,6 ; 24,0	1,50	70,1
	OTROS	16,2%	6,7	6,8 ; 33,6	1,39	41,2
MOTIVOS QUE LLEVAN AL INTENTO SUICIDA (LIMA ESTE)	APARIENCIA FÍSICA	4,4%	3,8	0,8 ; 21,3	1,13	86,6
	PADRES	23,9%	6,2	13,8 ; 38,1	0,71	26,1
	HIJOS	4,7%	2,8	1,4 ; 14,6	0,59	60,0
	OTROS PARIENTES	2,9%	2,1	0,7 ; 11,5	0,52	73,0
	PAREJA	41,9%	8,4	26,7 ; 58,8	0,97	20,1
	AMIGOS	2,8%	2,7	0,4 ; 17,4	0,92	99,4
	LABORALES	1,3%	1,3	0,2 ; 8,6	0,43	100,9
	ESTUDIOS	2,8%	2,7	0,4 ; 17,4	0,92	99,4
	ECONÓMICOS	1,5%	1,5	0,2 ; 10,3	0,51	100,7
	SALUD FÍSICA	3,5%	2,7	0,8 ; 14,5	0,68	75,1
	SALUD FAMILIAR	1,1%	1,1	0,2 ; 7,1	0,35	98,5
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	1,1%	1,1	0,2 ; 7,1	0,35	98,5
	MUERTE DE PAREJA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNYUGE	22,9%	9,4	9,5 ; 45,7	1,62	40,9
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	6,4%	5,0	1,3 ; 26,3	1,38	78,7
	OTROS	16,2%	6,9	6,7 ; 34,3	1,13	42,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MOTIVOS QUE LLEVAN AL INTENTO SUICIDA (LIMA SUR)	APARIENCIA FÍSICA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PADRES	36,7%	12,2	17,1 ; 61,9	1,64	33,3
	HIJOS	3,6%	3,6	0,5 ; 22,2	0,95	100,2
	OTROS PARIENTES	10,1%	7,6	2,1 ; 36,7	1,62	75,2
	PAREJA	29,3%	9,8	14,0 ; 51,3	1,20	33,6
	AMIGOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LABORALES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	ESTUDIOS	3,3%	3,3	0,4 ; 20,9	0,88	100,4
	ECONÓMICOS	5,1%	3,6	1,2 ; 19,0	0,70	71,5
	SALUD FÍSICA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SALUD FAMILIAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	5,5%	3,9	1,3 ; 20,4	0,76	71,6
	MUERTE DE PAREJA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNUGE	35,0%	12,2	15,8 ; 60,8	1,68	35,0
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	2,6%	2,6	0,3 ; 17,0	1,01	69,1
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
MOTIVOS QUE LLEVAN AL INTENTO SUICIDA (CALLAO)	OTROS	16,0%	9,3	4,7 ; 42,6	1,64	58,2
	APARIENCIA FÍSICA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PADRES	19,2%	9,8	6,4 ; 45,2	0,95	51,3
	HIJOS	5,7%	4,2	1,3 ; 22,1	0,51	74,7
	OTROS PARIENTES	3,1%	3,2	0,4 ; 20,3	0,51	101,6
	PAREJA	36,0%	12,9	15,8 ; 62,9	1,11	35,9
	AMIGOS	3,6%	3,6	0,5 ; 22,6	0,58	101,1
	LABORALES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	ESTUDIOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	ECONÓMICOS	4,5%	4,5	0,6 ; 27,0	0,72	100,2
	SALUD FÍSICA	17,1%	14,8	2,6 ; 61,5	2,36	86,5
	SALUD FAMILIAR	7,0%	6,9	1,0 ; 37,2	1,10	97,6
	SEPARACIÓN DE UN FAMILIAR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	MUERTE DE PAREJA	21,0%	11,9	6,1 ; 52,1	1,30	56,9
	SEPARACIÓN DE PAREJA O CÓNUGE	12,3%	9,1	2,6 ; 42,6	1,18	74,5
	MUERTE DE ALGUNOS DE LOS PADRES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	EXPERIENCIA TRAUMÁTICA	4,2%	4,3	0,6 ; 25,7	0,68	100,5
	OTROS	2,3%	2,4	0,3 ; 15,5	0,38	102,4
TENDENCIA HACIA LA VIOLENCIA						
PREVALENCIA DE TENDENCIAS VIOLENTAS (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	22,9%	0,8	21,4 ; 24,6	1,65	3,5
	LIMA CENTRO	18,8%	1,7	15,8 ; 22,3	1,40	8,9
	LIMA NORTE	21,5%	1,8	18,2 ; 25,2	2,20	8,2
	LIMA ESTE	23,7%	1,5	20,8 ; 26,8	1,37	6,4
	LIMA SUR	24,3%	1,6	21,3 ; 27,7	1,32	6,7
	CALLAO	28,6%	2,8	23,4 ; 34,5	1,86	9,8
LE HA PEGADO A UN NIÑO MENOR Y LE HA DEJADO MORETONES (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	5,9%	0,4	5,1 ; 6,8	1,49	7,3
	LIMA CENTRO	3,9%	0,8	2,5 ; 5,8	1,39	21,2
	LIMA NORTE	6,8%	1,0	5,1 ; 9,1	1,94	14,9
	LIMA ESTE	5,8%	0,7	4,6 ; 7,2	0,86	11,3
	LIMA SUR	6,7%	0,9	5,1 ; 8,7	1,26	13,9
	CALLAO	5,6%	1,5	3,2 ; 9,5	2,18	27,8
HA PARTICIPADO EN MÁS DE UNA PELEA QUE HAYA ACABADO A GOLPES (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	19,2%	0,8	17,8 ; 20,8	1,62	3,9
	LIMA CENTRO	16,8%	1,6	13,9 ; 20,2	1,38	9,4
	LIMA NORTE	17,6%	1,7	14,5 ; 21,1	2,26	9,5
	LIMA ESTE	19,4%	1,5	16,7 ; 22,4	1,48	7,5
	LIMA SUR	20,4%	1,5	17,6 ; 23,5	1,27	7,3
	CALLAO	24,8%	2,4	20,5 ; 29,7	1,43	9,5
EN UNA PELEA HA USADO PIEDRAS, PALOS, CUCHILLOS (NAVAJAS), ETC. (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	3,7%	0,4	3,0 ; 4,4	1,55	9,6
	LIMA CENTRO	1,7%	0,5	0,9 ; 3,1	1,32	32,0
	LIMA NORTE	3,5%	0,8	2,2 ; 5,4	2,22	22,7
	LIMA ESTE	4,4%	0,7	3,2 ; 6,1	1,29	15,9
	LIMA SUR	4,0%	0,7	2,8 ; 5,8	1,32	18,4
	CALLAO	4,8%	1,1	3,0 ; 7,6	1,36	23,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EN UNA PELEA HA USADO ARMAS DE FUEGO COMO PISTOLAS (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	0,9%	0,2	0,6 ; 1,4	1,83	21,0
	LIMA CENTRO	0,8%	0,4	0,3 ; 1,9	1,23	44,6
	LIMA NORTE	1,3%	0,5	0,5 ; 2,8	2,63	41,8
	LIMA ESTE	0,7%	0,3	0,3 ; 1,4	1,02	36,8
	LIMA SUR	0,5%	0,3	0,2 ; 1,5	1,46	56,3
CONSIDERACIONES O PENSAMIENTOS DE ÍNDOLE HOMICIDA (TOTAL)	CALLAO	1,7%	0,8	0,7 ; 4,2	1,75	45,8
	PREVALENCIA DE VIDA	3,0%	0,3	2,5 ; 3,7	1,48	10,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,2	0,6 ; 1,3	1,60	20,3
	PREVALENCIA MENSUAL	0,3%	0,1	0,2 ; 0,7	1,89	36,4
CONSIDERACIONES O PENSAMIENTOS DE ÍNDOLE HOMICIDA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	2,2%	0,6	1,2 ; 3,7	1,36	28,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,5%	0,3	0,2 ; 1,4	1,02	49,8
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,6	0,50	58,1
CONSIDERACIONES O PENSAMIENTOS DE ÍNDOLE HOMICIDA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	4,3%	0,8	2,9 ; 6,3	2,07	19,8
	PREVALENCIA ANUAL	1,4%	0,5	0,7 ; 3,0	2,57	39,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,7%	0,4	0,2 ; 2,1	2,82	59,4
CONSIDERACIONES O PENSAMIENTOS DE ÍNDOLE HOMICIDA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	3,1%	0,5	2,2 ; 4,3	0,95	16,6
	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,3	0,6 ; 1,8	0,85	27,5
	PREVALENCIA MENSUAL	0,3%	0,1	0,1 ; 0,8	0,85	55,2
CONSIDERACIONES O PENSAMIENTOS DE ÍNDOLE HOMICIDA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	2,5%	0,5	1,6 ; 3,8	1,11	21,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,2	0,3 ; 1,3	0,87	38,6
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,1	0,0 ; 0,7	0,77	71,8
CONSIDERACIONES O PENSAMIENTOS DE ÍNDOLE HOMICIDA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	2,3%	0,8	1,2 ; 4,4	1,31	34,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	0,56	70,3
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,54	100,2
FACTORES PROTECTORES						
GRADO DE COHESIÓN FAMILIAR (MEDIA)	TOTAL	18,91	0,0	18,8 ; 19,0	1,62	0,2
	LIMA CENTRO	19,07	0,1	18,9 ; 19,3	1,80	0,5
	LIMA NORTE	18,87	0,1	18,7 ; 19,0	2,12	0,4
	LIMA ESTE	18,64	0,1	18,5 ; 18,8	1,10	0,4
	LIMA SUR	18,92	0,1	18,7 ; 19,1	1,62	0,4
	CALLAO	19,33	0,1	19,2 ; 19,5	1,14	0,3
¿CUÁNTO LE IMPORTARÍA HACER PASAR VERGÜENZA A SU FAMILIA? (TOTAL)	NADA O POCO	4,2%	0,4	3,4 ; 5,0	1,89	10,0
	REGULAR	5,6%	0,4	4,8 ; 6,5	1,55	7,7
	BASTANTE O MUCHO	90,2%	0,6	89,0 ; 91,3	1,71	0,6
¿CUÁNTO LE IMPORTARÍA HACER PASAR VERGÜENZA A SU FAMILIA? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	2,9%	0,7	1,7 ; 4,8	1,52	26,1
	REGULAR	7,7%	1,4	5,4 ; 10,9	3,04	18,0
	BASTANTE O MUCHO	89,4%	1,6	85,9 ; 92,1	1,98	1,8
¿CUÁNTO LE IMPORTARÍA HACER PASAR VERGÜENZA A SU FAMILIA? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	2,9%	0,7	1,8 ; 4,6	1,99	23,9
	REGULAR	6,2%	1,0	4,5 ; 8,4	1,99	16,1
	BASTANTE O MUCHO	91,0%	1,2	88,4 ; 93,0	1,96	1,3
¿CUÁNTO LE IMPORTARÍA HACER PASAR VERGÜENZA A SU FAMILIA? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	6,0%	1,0	4,3 ; 8,4	2,07	17,3
	REGULAR	6,4%	0,7	5,0 ; 8,0	1,01	11,8
	BASTANTE O MUCHO	87,6%	1,2	85,0 ; 89,8	1,46	1,4
¿CUÁNTO LE IMPORTARÍA HACER PASAR VERGÜENZA A SU FAMILIA? (LIMA SUR)	NADA O POCO	5,6%	1,0	3,9 ; 7,9	1,72	17,8
	REGULAR	3,7%	0,7	2,6 ; 5,3	1,13	17,9
	BASTANTE O MUCHO	90,6%	1,2	88,0 ; 92,7	1,52	1,3
¿CUÁNTO LE IMPORTARÍA HACER PASAR VERGÜENZA A SU FAMILIA? (CALLAO)	NADA O POCO	2,3%	0,8	1,2 ; 4,3	1,21	33,1
	REGULAR	2,7%	0,8	1,5 ; 4,8	1,11	28,9
	BASTANTE O MUCHO	95,0%	1,0	92,5 ; 96,7	1,07	1,1
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE LO(A) RESPETAN? (TOTAL)	NADA O POCO	3,2%	0,3	2,7 ; 3,9	1,30	9,4
	REGULAR	12,1%	0,6	10,9 ; 13,3	1,57	5,1
	BASTANTE O MUCHO	84,7%	0,7	83,3 ; 86,0	1,60	0,8
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE LO(A) RESPETAN? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	3,0%	0,7	1,9 ; 4,8	1,32	23,6
	REGULAR	10,2%	1,6	7,5 ; 13,8	2,11	15,6
	BASTANTE O MUCHO	86,8%	1,8	82,8 ; 89,9	2,14	2,1
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE LO(A) RESPETAN? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	2,7%	0,7	1,7 ; 4,3	1,91	24,0
	REGULAR	11,6%	1,4	9,2 ; 14,6	2,15	11,8
	BASTANTE O MUCHO	85,7%	1,5	82,5 ; 88,4	2,14	1,7
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE LO(A) RESPETAN? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	4,6%	0,6	3,5 ; 6,1	1,02	14,0
	REGULAR	15,8%	1,2	13,6 ; 18,2	1,10	7,4
	BASTANTE O MUCHO	79,6%	1,3	77,0 ; 82,0	1,09	1,6
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE LO(A) RESPETAN? (LIMA SUR)	NADA O POCO	3,3%	0,6	2,3 ; 4,7	1,05	18,3
	REGULAR	11,1%	1,1	9,1 ; 13,4	1,09	9,8
	BASTANTE O MUCHO	85,6%	1,3	83,0 ; 87,9	1,17	1,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE LO(A) RESPETAN? (CALLAO)	NADA O POCO	1,7%	0,7	0,8 ; 3,7	1,34	40,4
	REGULAR	9,6%	1,6	6,9 ; 13,2	1,40	16,6
	BASTANTE O MUCHO	88,7%	1,7	84,8 ; 91,7	1,45	2,0
¿CUÁNTO SIENTE QUE SE APOYAN UNOS A OTROS? (TOTAL)	NADA O POCO	5,2%	0,4	4,5 ; 6,1	1,36	7,5
	REGULAR	14,2%	0,6	13,0 ; 15,4	1,45	4,5
	BASTANTE O MUCHO	80,6%	0,8	79,0 ; 82,1	1,66	1,0
¿CUÁNTO SIENTE QUE SE APOYAN UNOS A OTROS? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	4,6%	1,0	3,0 ; 6,9	1,67	21,3
	REGULAR	10,0%	1,5	7,4 ; 13,5	1,97	15,2
	BASTANTE O MUCHO	85,4%	1,9	81,2 ; 88,8	2,29	2,3
¿CUÁNTO SIENTE QUE SE APOYAN UNOS A OTROS? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	4,2%	0,8	3,0 ; 6,0	1,69	18,0
	REGULAR	18,0%	1,6	15,1 ; 21,2	1,95	8,7
	BASTANTE O MUCHO	77,8%	1,8	74,1 ; 81,1	2,18	2,3
¿CUÁNTO SIENTE QUE SE APOYAN UNOS A OTROS? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	7,4%	0,8	5,9 ; 9,2	1,12	11,4
	REGULAR	16,8%	1,1	14,7 ; 19,0	0,92	6,5
	BASTANTE O MUCHO	75,8%	1,3	73,2 ; 78,2	0,95	1,7
¿CUÁNTO SIENTE QUE SE APOYAN UNOS A OTROS? (LIMA SUR)	NADA O POCO	6,4%	0,9	4,9 ; 8,4	1,24	14,0
	REGULAR	11,5%	1,1	9,5 ; 13,9	1,15	9,8
	BASTANTE O MUCHO	82,1%	1,5	78,9 ; 84,9	1,46	1,9
¿CUÁNTO SIENTE QUE SE APOYAN UNOS A OTROS? (CALLAO)	NADA O POCO	1,7%	0,6	0,9 ; 3,5	1,10	36,1
	REGULAR	10,6%	1,5	8,0 ; 13,8	1,06	13,7
	BASTANTE O MUCHO	87,7%	1,7	83,9 ; 90,7	1,30	2,0
¿CUÁN ORGULLOSO SE SIENTE DE SU FAMILIA? (TOTAL)	NADA O POCO	2,2%	0,2	1,7 ; 2,7	1,20	11,1
	REGULAR	9,6%	0,5	8,6 ; 10,8	1,52	5,7
	BASTANTE O MUCHO	88,2%	0,6	87,0 ; 89,3	1,52	0,7
¿CUÁN ORGULLOSO SE SIENTE DE SU FAMILIA? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	1,9%	0,6	1,0 ; 3,5	1,54	32,6
	REGULAR	8,2%	1,4	6,0 ; 11,3	1,85	16,4
	BASTANTE O MUCHO	89,9%	1,5	86,6 ; 92,4	1,82	1,6
¿CUÁN ORGULLOSO SE SIENTE DE SU FAMILIA? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	1,3%	0,4	0,7 ; 2,4	1,54	31,5
	REGULAR	11,1%	1,4	8,7 ; 14,1	2,24	12,3
	BASTANTE O MUCHO	87,6%	1,4	84,6 ; 90,1	2,12	1,6
¿CUÁN ORGULLOSO SE SIENTE DE SU FAMILIA? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	3,1%	0,5	2,4 ; 4,1	0,73	14,4
	REGULAR	10,9%	1,0	9,2 ; 13,0	1,02	8,8
	BASTANTE O MUCHO	85,9%	1,0	83,8 ; 87,9	0,96	1,2
¿CUÁN ORGULLOSO SE SIENTE DE SU FAMILIA? (LIMA SUR)	NADA O POCO	3,2%	0,7	2,1 ; 4,8	1,37	21,4
	REGULAR	9,2%	1,0	7,4 ; 11,3	1,08	10,8
	BASTANTE O MUCHO	87,7%	1,3	84,9 ; 90,0	1,40	1,5
¿CUÁN ORGULLOSO SE SIENTE DE SU FAMILIA? (CALLAO)	NADA O POCO	0,6%	0,4	0,1 ; 2,2	1,33	70,8
	REGULAR	6,0%	1,0	4,3 ; 8,4	0,90	17,1
	BASTANTE O MUCHO	93,4%	1,1	90,9 ; 95,3	0,94	1,2
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE SUS VALORES MORALES SE PARECEN A LOS DE SU FAMILIA? (TOTAL)	NADA O POCO	4,9%	0,4	4,2 ; 5,7	1,37	7,8
	REGULAR	17,4%	0,7	16,1 ; 18,8	1,39	3,9
	BASTANTE O MUCHO	77,7%	0,8	76,1 ; 79,1	1,49	1,0
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE SUS VALORES MORALES SE PARECEN A LOS DE SU FAMILIA? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	4,0%	0,9	2,6 ; 6,2	1,60	22,5
	REGULAR	14,1%	1,6	11,2 ; 17,5	1,59	11,3
	BASTANTE O MUCHO	81,9%	1,8	78,1 ; 85,2	1,71	2,2
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE SUS VALORES MORALES SE PARECEN A LOS DE SU FAMILIA? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	5,5%	0,9	4,0 ; 7,6	1,80	16,1
	REGULAR	23,3%	1,6	20,3 ; 26,6	1,68	6,9
	BASTANTE O MUCHO	71,1%	1,8	67,4 ; 74,5	1,88	2,5
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE SUS VALORES MORALES SE PARECEN A LOS DE SU FAMILIA? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	6,0%	0,8	4,7 ; 7,7	1,09	12,6
	REGULAR	18,6%	1,2	16,4 ; 21,1	1,01	6,4
	BASTANTE O MUCHO	75,4%	1,4	72,6 ; 77,9	1,06	1,8
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE SUS VALORES MORALES SE PARECEN A LOS DE SU FAMILIA? (LIMA SUR)	NADA O POCO	5,1%	0,8	3,8 ; 6,8	1,06	14,8
	REGULAR	13,1%	1,2	10,9 ; 15,7	1,20	9,4
	BASTANTE O MUCHO	81,8%	1,4	78,8 ; 84,5	1,26	1,8
¿QUÉ TANTO SIENTE QUE SUS VALORES MORALES SE PARECEN A LOS DE SU FAMILIA? (CALLAO)	NADA O POCO	1,9%	0,6	1,0 ; 3,6	0,99	32,8
	REGULAR	13,6%	1,9	10,3 ; 17,8	1,48	14,0
	BASTANTE O MUCHO	84,5%	2,0	80,1 ; 88,0	1,49	2,4
¿QUÉ TANTO SE SIENTE PARTE DEL PROGRESO DE SU FAMILIA? (TOTAL)	NADA O POCO	5,0%	0,4	4,3 ; 5,8	1,31	7,5
	REGULAR	16,1%	0,7	14,8 ; 17,5	1,59	4,3
	BASTANTE O MUCHO	78,9%	0,8	77,3 ; 80,4	1,67	1,0
¿QUÉ TANTO SE SIENTE PARTE DEL PROGRESO DE SU FAMILIA? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	3,4%	0,8	2,2 ; 5,5	1,53	23,7
	REGULAR	13,7%	1,6	10,8 ; 17,2	1,67	11,8
	BASTANTE O MUCHO	82,9%	1,9	78,8 ; 86,3	1,94	2,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
¿QUÉ TANTO SE SIENTE PARTE DEL PROGRESO DE SU FAMILIA? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	4,7%	0,8	3,4 ; 6,5	1,53	16,2
	REGULAR	18,6%	1,7	15,4 ; 22,2	2,33	9,3
	BASTANTE O MUCHO	76,7%	1,9	72,8 ; 80,2	2,39	2,5
¿QUÉ TANTO SE SIENTE PARTE DEL PROGRESO DE SU FAMILIA? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	7,0%	0,8	5,6 ; 8,7	1,01	11,2
	REGULAR	18,1%	1,2	15,8 ; 20,6	1,07	6,7
	BASTANTE O MUCHO	74,9%	1,4	72,1 ; 77,5	1,11	1,9
¿QUÉ TANTO SE SIENTE PARTE DEL PROGRESO DE SU FAMILIA? (LIMA SUR)	NADA O POCO	5,2%	0,8	3,8 ; 7,1	1,28	16,0
	REGULAR	15,1%	1,3	12,7 ; 18,0	1,27	8,9
	BASTANTE O MUCHO	79,7%	1,6	76,4 ; 82,6	1,40	2,0
¿QUÉ TANTO SE SIENTE PARTE DEL PROGRESO DE SU FAMILIA? (CALLAO)	NADA O POCO	3,6%	0,9	2,1 ; 5,9	1,22	26,3
	REGULAR	11,1%	1,5	8,5 ; 14,5	1,11	13,6
	BASTANTE O MUCHO	85,3%	1,7	81,7 ; 88,4	1,10	2,0
¿SIENTE UD. QUE PUEDE CONTAR CON SU FAMILIA CUANDO TIENE PROBLEMAS? (TOTAL)	NADA O POCO	5,7%	0,4	4,9 ; 6,6	1,46	7,4
	REGULAR	12,1%	0,6	11,0 ; 13,3	1,44	4,9
	BASTANTE O MUCHO	82,2%	0,7	80,8 ; 83,5	1,38	0,8
¿SIENTE UD. QUE PUEDE CONTAR CON SU FAMILIA CUANDO TIENE PROBLEMAS? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	4,6%	0,9	3,1 ; 6,9	1,54	20,4
	REGULAR	14,5%	1,6	11,6 ; 18,0	1,59	11,1
	BASTANTE O MUCHO	80,9%	1,9	76,9 ; 84,2	1,70	2,3
¿SIENTE UD. QUE PUEDE CONTAR CON SU FAMILIA CUANDO TIENE PROBLEMAS? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	5,8%	1,0	4,1 ; 8,1	2,21	17,5
	REGULAR	12,6%	1,3	10,3 ; 15,4	1,79	10,3
	BASTANTE O MUCHO	81,6%	1,5	78,4 ; 84,4	1,86	1,9
¿SIENTE UD. QUE PUEDE CONTAR CON SU FAMILIA CUANDO TIENE PROBLEMAS? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	7,6%	0,8	6,2 ; 9,3	0,95	10,3
	REGULAR	12,0%	1,1	10,1 ; 14,2	1,14	8,8
	BASTANTE O MUCHO	80,4%	1,2	78,0 ; 82,6	0,94	1,5
¿SIENTE UD. QUE PUEDE CONTAR CON SU FAMILIA CUANDO TIENE PROBLEMAS? (LIMA SUR)	NADA O POCO	5,7%	0,9	4,2 ; 7,7	1,26	15,1
	REGULAR	11,0%	1,2	9,0 ; 13,5	1,25	10,5
	BASTANTE O MUCHO	83,2%	1,3	80,5 ; 85,7	1,14	1,6
¿SIENTE UD. QUE PUEDE CONTAR CON SU FAMILIA CUANDO TIENE PROBLEMAS? (CALLAO)	NADA O POCO	2,8%	0,7	1,7 ; 4,5	0,84	24,7
	REGULAR	9,1%	1,4	6,7 ; 12,3	1,14	15,4
	BASTANTE O MUCHO	88,1%	1,5	84,8 ; 90,7	0,99	1,7
¿CONVERSA CON SU FAMILIA SOBRE SUS ASPECTOS PERSONALES? (TOTAL)	NADA O POCO	14,1%	0,7	12,8 ; 15,4	1,56	4,6
	REGULAR	18,2%	0,7	16,8 ; 19,7	1,55	4,0
	BASTANTE O MUCHO	67,7%	0,9	65,9 ; 69,5	1,70	1,4
¿CONVERSA CON SU FAMILIA SOBRE SUS ASPECTOS PERSONALES? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	10,0%	1,3	7,7 ; 12,8	1,40	12,8
	REGULAR	18,8%	1,9	15,5 ; 22,8	1,72	9,8
	BASTANTE O MUCHO	71,1%	2,2	66,6 ; 75,3	1,82	3,1
¿CONVERSA CON SU FAMILIA SOBRE SUS ASPECTOS PERSONALES? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	14,3%	1,5	11,6 ; 17,5	2,19	10,5
	REGULAR	20,5%	1,7	17,3 ; 24,1	2,19	8,5
	BASTANTE O MUCHO	65,2%	2,1	60,9 ; 69,3	2,36	3,3
¿CONVERSA CON SU FAMILIA SOBRE SUS ASPECTOS PERSONALES? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	17,9%	1,3	15,5 ; 20,6	1,24	7,2
	REGULAR	18,3%	1,2	16,1 ; 20,6	0,98	6,4
	BASTANTE O MUCHO	63,8%	1,6	60,6 ; 66,9	1,24	2,5
¿CONVERSA CON SU FAMILIA SOBRE SUS ASPECTOS PERSONALES? (LIMA SUR)	NADA O POCO	16,7%	1,4	14,1 ; 19,8	1,37	8,6
	REGULAR	16,5%	1,4	13,9 ; 19,3	1,24	8,3
	BASTANTE O MUCHO	66,8%	1,8	63,1 ; 70,3	1,39	2,8
¿CONVERSA CON SU FAMILIA SOBRE SUS ASPECTOS PERSONALES? (CALLAO)	NADA O POCO	6,2%	1,1	4,3 ; 8,7	0,98	17,6
	REGULAR	14,7%	2,0	11,3 ; 19,0	1,48	13,4
	BASTANTE O MUCHO	79,1%	2,2	74,5 ; 83,0	1,35	2,7
¿TOMAN EN CUENTA SU OPINIÓN EN LAS DECISIONES IMPORTANTES? (TOTAL)	NADA O POCO	6,3%	0,4	5,5 ; 7,2	1,38	6,8
	REGULAR	13,5%	0,7	12,3 ; 14,9	1,64	4,9
	BASTANTE O MUCHO	80,2%	0,8	78,7 ; 81,6	1,57	0,9
¿TOMAN EN CUENTA SU OPINIÓN EN LAS DECISIONES IMPORTANTES? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	5,9%	1,0	4,2 ; 8,3	1,49	17,6
	REGULAR	12,2%	1,6	9,4 ; 15,7	1,80	13,0
	BASTANTE O MUCHO	81,9%	1,9	77,8 ; 85,4	1,92	2,4
¿TOMAN EN CUENTA SU OPINIÓN EN LAS DECISIONES IMPORTANTES? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	5,6%	0,9	4,1 ; 7,6	1,71	15,7
	REGULAR	15,5%	1,6	12,6 ; 19,1	2,44	10,6
	BASTANTE O MUCHO	78,9%	1,7	75,3 ; 82,1	2,09	2,2
¿TOMAN EN CUENTA SU OPINIÓN EN LAS DECISIONES IMPORTANTES? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	9,0%	0,9	7,3 ; 10,9	1,12	10,2
	REGULAR	13,7%	1,0	11,8 ; 15,9	0,99	7,6
	BASTANTE O MUCHO	77,3%	1,3	74,6 ; 79,8	1,11	1,7
¿TOMAN EN CUENTA SU OPINIÓN EN LAS DECISIONES IMPORTANTES? (LIMA SUR)	NADA O POCO	6,4%	0,9	4,8 ; 8,5	1,33	14,6
	REGULAR	14,3%	1,3	11,9 ; 17,0	1,22	9,0
	BASTANTE O MUCHO	79,3%	1,5	76,3 ; 82,1	1,24	1,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
¿TOMAN EN CUENTA SU OPINIÓN EN LAS DECISIONES IMPORTANTES? (CALLAO)	NADA O POCO	2,3%	0,7	1,3 ; 4,0	0,92	28,6
	REGULAR	8,7%	1,5	6,2 ; 12,2	1,33	17,1
	BASTANTE O MUCHO	89,0%	1,6	85,4 ; 91,7	1,25	1,8
¿SU FAMILIA MUESTRA INTERÉS POR SUS SENTIMIENTOS Y AFECTOS? (TOTAL)	NADA O POCO	6,7%	0,5	5,9 ; 7,7	1,48	6,8
	REGULAR	14,2%	0,7	12,9 ; 15,6	1,61	4,7
	BASTANTE O MUCHO	79,1%	0,8	77,5 ; 80,6	1,66	1,0
¿SU FAMILIA MUESTRA INTERÉS POR SUS SENTIMIENTOS Y AFECTOS? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	4,5%	0,9	3,0 ; 6,5	1,31	19,2
	REGULAR	14,7%	1,7	11,6 ; 18,4	1,84	11,9
	BASTANTE O MUCHO	80,9%	1,9	76,9 ; 84,4	1,79	2,4
¿SU FAMILIA MUESTRA INTERÉS POR SUS SENTIMIENTOS Y AFECTOS? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	8,4%	1,2	6,4 ; 10,9	2,06	13,8
	REGULAR	14,5%	1,5	11,8 ; 17,6	2,09	10,2
	BASTANTE O MUCHO	77,2%	1,8	73,4 ; 80,6	2,23	2,4
¿SU FAMILIA MUESTRA INTERÉS POR SUS SENTIMIENTOS Y AFECTOS? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	7,8%	0,8	6,3 ; 9,5	0,98	10,4
	REGULAR	16,3%	1,3	14,0 ; 19,0	1,28	7,8
	BASTANTE O MUCHO	75,9%	1,4	73,0 ; 78,6	1,19	1,9
¿SU FAMILIA MUESTRA INTERÉS POR SUS SENTIMIENTOS Y AFECTOS? (LIMA SUR)	NADA O POCO	7,2%	1,0	5,5 ; 9,4	1,35	13,8
	REGULAR	12,7%	1,2	10,4 ; 15,3	1,25	9,7
	BASTANTE O MUCHO	80,1%	1,6	76,7 ; 83,1	1,52	2,0
¿SU FAMILIA MUESTRA INTERÉS POR SUS SENTIMIENTOS Y AFECTOS? (CALLAO)	NADA O POCO	2,8%	0,8	1,6 ; 4,8	1,09	28,2
	REGULAR	11,0%	1,7	8,1 ; 14,7	1,35	15,1
	BASTANTE O MUCHO	86,2%	1,7	82,4 ; 89,3	1,23	2,0
¿SIENTE QUE SU FAMILIA LO(A) TOMA EN CUENTA? (TOTAL)	NADA O POCO	4,6%	0,4	3,9 ; 5,4	1,37	8,0
	REGULAR	11,5%	0,6	10,3 ; 12,7	1,62	5,3
	BASTANTE O MUCHO	83,9%	0,7	82,5 ; 85,2	1,57	0,8
¿SIENTE QUE SU FAMILIA LO(A) TOMA EN CUENTA? (LIMA CENTRO)	NADA O POCO	3,8%	0,8	2,5 ; 5,8	1,44	21,8
	REGULAR	12,3%	1,9	9,0 ; 16,4	2,47	15,2
	BASTANTE O MUCHO	83,9%	2,0	79,6 ; 87,5	2,27	2,4
¿SIENTE QUE SU FAMILIA LO(A) TOMA EN CUENTA? (LIMA NORTE)	NADA O POCO	5,1%	0,8	3,7 ; 7,0	1,73	16,5
	REGULAR	12,1%	1,3	9,7 ; 15,0	2,02	11,1
	BASTANTE O MUCHO	82,8%	1,5	79,6 ; 85,6	1,94	1,8
¿SIENTE QUE SU FAMILIA LO(A) TOMA EN CUENTA? (LIMA ESTE)	NADA O POCO	5,4%	0,7	4,2 ; 6,9	0,96	12,4
	REGULAR	12,0%	1,0	10,2 ; 14,0	0,98	8,2
	BASTANTE O MUCHO	82,6%	1,1	80,3 ; 84,7	0,92	1,3
¿SIENTE QUE SU FAMILIA LO(A) TOMA EN CUENTA? (LIMA SUR)	NADA O POCO	5,1%	0,8	3,8 ; 7,0	1,22	15,7
	REGULAR	11,1%	1,1	9,0 ; 13,5	1,21	10,3
	BASTANTE O MUCHO	83,8%	1,4	80,8 ; 86,4	1,36	1,7
¿SIENTE QUE SU FAMILIA LO(A) TOMA EN CUENTA? (CALLAO)	NADA O POCO	1,8%	0,9	0,7 ; 4,8	2,24	50,7
	REGULAR	8,3%	1,4	5,8 ; 11,6	1,32	17,5
	BASTANTE O MUCHO	89,9%	1,7	86,1 ; 92,8	1,49	1,9
TENDENCIAS RELIGIOSAS (TOTAL)	SIENTE BASTANTE O MUCHA PROTECCIÓN DE DIOS	92,2%	0,5	91,1 ; 93,1	1,67	0,6
	DIOS BASTANTE O MUY IMPORTANTE	91,3%	0,6	90,1 ; 92,4	1,96	0,6
	ASISTE A IGLESIA O TEMPLO	58,9%	1,0	57,0 ; 60,7	1,71	1,6
	PARTICIPA ACTIVAMENTE	15,0%	0,7	13,7 ; 16,3	1,57	4,5
	LEE ESCRITURAS RELIGIOSAS	47,7%	1,0	45,6 ; 49,7	1,89	2,2
	TRANSMITE RELIGIÓN A HIJOS O NIETOS	32,8%	1,0	30,9 ; 34,7	1,84	2,9
	TRANSMITE RELIGIÓN A OTRAS PERSONAS	19,3%	0,8	17,8 ; 21,0	1,90	4,2
TENDENCIAS RELIGIOSAS (LIMA CENTRO)	RELIGIÓN AYUDA A SOLUCIONAR PROBLEMAS	62,9%	0,9	61,0 ; 64,7	1,66	1,5
	SIENTE BASTANTE O MUCHA PROTECCIÓN DE DIOS	89,4%	1,8	85,4 ; 92,4	2,49	2,0
	DIOS BASTANTE O MUY IMPORTANTE	89,1%	1,6	85,5 ; 91,8	2,00	1,8
	ASISTE A IGLESIA O TEMPLO	57,8%	2,3	53,1 ; 62,3	1,71	4,0
	PARTICIPA ACTIVAMENTE	14,8%	1,9	11,5 ; 18,8	2,13	12,7
	LEE ESCRITURAS RELIGIOSAS	41,7%	2,6	36,6 ; 47,0	2,20	6,3
	TRANSMITE RELIGIÓN A HIJOS O NIETOS	35,3%	2,7	30,2 ; 40,7	2,39	7,6
	TRANSMITE RELIGIÓN A OTRAS PERSONAS	15,5%	1,9	12,0 ; 19,7	2,21	12,6
	RELIGIÓN AYUDA A SOLUCIONAR PROBLEMAS	65,2%	2,5	60,2 ; 69,9	2,09	3,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
TENDENCIAS RELIGIOSAS (LIMA NORTE)	SIENTE BASTANTE O MUCHA PROTECCIÓN DE DIOS	93,1%	1,1	90,6 ; 94,9	2,10	1,2
	DIOS BASTANTE O MUY IMPORTANTE	91,5%	1,3	88,7 ; 93,7	2,45	1,4
	ASISTE A IGLESIA O TEMPLO	54,7%	2,3	50,2 ; 59,1	2,49	4,2
	PARTICIPA ACTIVAMENTE	15,2%	1,5	12,6 ; 18,3	1,96	9,6
	LEE ESCRITURAS RELIGIOSAS	50,5%	2,3	46,0 ; 55,1	2,57	4,6
	TRANSMITE RELIGIÓN A HIJOS O NIETOS	30,9%	2,1	27,0 ; 35,1	2,40	6,7
	TRANSMITE RELIGIÓN A OTRAS PERSONAS	20,0%	1,9	16,5 ; 24,1	2,79	9,7
RELIGIÓN AYUDA A SOLUCIONAR PROBLEMAS	67,8%	2,0	63,7 ; 71,7	2,23	3,0	
TENDENCIAS RELIGIOSAS (LIMA ESTE)	SIENTE BASTANTE O MUCHA PROTECCIÓN DE DIOS	92,2%	0,9	90,3 ; 93,7	1,13	0,9
	DIOS BASTANTE O MUY IMPORTANTE	92,1%	0,8	90,3 ; 93,6	1,07	0,9
	ASISTE A IGLESIA O TEMPLO	60,2%	1,7	56,8 ; 63,5	1,29	2,8
	PARTICIPA ACTIVAMENTE	14,6%	1,2	12,4 ; 17,2	1,27	8,3
	LEE ESCRITURAS RELIGIOSAS	45,3%	1,8	41,7 ; 48,9	1,45	4,0
	TRANSMITE RELIGIÓN A HIJOS O NIETOS	27,9%	1,5	25,0 ; 30,9	1,26	5,5
	TRANSMITE RELIGIÓN A OTRAS PERSONAS	17,1%	1,3	14,7 ; 19,8	1,29	7,6
RELIGIÓN AYUDA A SOLUCIONAR PROBLEMAS	61,6%	1,5	58,7 ; 64,5	0,99	2,4	
TENDENCIAS RELIGIOSAS (LIMA SUR)	SIENTE BASTANTE O MUCHA PROTECCIÓN DE DIOS	92,7%	1,0	90,5 ; 94,4	1,26	1,0
	DIOS BASTANTE O MUY IMPORTANTE	89,8%	1,6	86,3 ; 92,5	2,44	1,7
	ASISTE A IGLESIA O TEMPLO	64,9%	1,7	61,5 ; 68,1	1,13	2,6
	PARTICIPA ACTIVAMENTE	15,2%	1,3	12,8 ; 17,9	1,21	8,6
	LEE ESCRITURAS RELIGIOSAS	52,0%	1,9	48,3 ; 55,6	1,28	3,6
	TRANSMITE RELIGIÓN A HIJOS O NIETOS	39,9%	1,9	36,3 ; 43,8	1,40	4,8
	TRANSMITE RELIGIÓN A OTRAS PERSONAS	22,7%	1,7	19,5 ; 26,3	1,57	7,6
RELIGIÓN AYUDA A SOLUCIONAR PROBLEMAS	57,7%	2,1	53,5 ; 61,8	1,72	3,7	
TENDENCIAS RELIGIOSAS (CALLAO)	SIENTE BASTANTE O MUCHA PROTECCIÓN DE DIOS	93,3%	1,1	90,6 ; 95,2	1,01	1,2
	DIOS BASTANTE O MUY IMPORTANTE	95,2%	1,0	92,9 ; 96,9	1,42	1,0
	ASISTE A IGLESIA O TEMPLO	56,5%	2,6	51,2 ; 61,6	1,36	4,7
	PARTICIPA ACTIVAMENTE	15,1%	1,7	12,0 ; 18,7	1,08	11,3
	LEE ESCRITURAS RELIGIOSAS	47,3%	3,2	41,0 ; 53,6	1,99	6,8
	TRANSMITE RELIGIÓN A HIJOS O NIETOS	30,8%	2,7	25,8 ; 36,2	1,60	8,7
	TRANSMITE RELIGIÓN A OTRAS PERSONAS	22,4%	2,2	18,4 ; 27,0	1,33	9,8
RELIGIÓN AYUDA A SOLUCIONAR PROBLEMAS	59,7%	2,4	54,9 ; 64,2	1,13	4,0	
TRASTORNOS CLINICOS						
CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	26,1%	0,9	24,3 ; 27,8	1,82	3,4
	PREVALENCIA ANUAL	11,8%	0,6	10,7 ; 13,0	1,47	5,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	10,1%	0,6	9,0 ; 11,2	1,52	5,5
	PREVALENCIA ACTUAL	7,9%	0,5	6,9 ; 8,9	1,57	6,4
CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	27,6%	2,7	22,7 ; 33,1	2,71	9,6
	PREVALENCIA ANUAL	10,8%	1,5	8,2 ; 14,0	1,70	13,6
	PREVALENCIA DE 6 MESES	9,8%	1,5	7,3 ; 13,1	1,84	14,9
	PREVALENCIA ACTUAL	8,6%	1,4	6,3 ; 11,7	1,81	15,8
CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	23,8%	1,8	20,4 ; 27,5	2,09	7,5
	PREVALENCIA ANUAL	11,4%	1,3	9,1 ; 14,2	1,94	11,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	9,5%	1,2	7,4 ; 12,2	2,01	12,7
	PREVALENCIA ACTUAL	7,6%	1,1	5,8 ; 10,0	1,87	13,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	27,5%	1,5	24,7 ; 30,5	1,19	5,4
	PREVALENCIA ANUAL	14,4%	1,2	12,3 ; 16,9	1,21	8,1
	PREVALENCIA DE 6 MESES	12,2%	1,1	10,1 ; 14,6	1,30	9,3
	PREVALENCIA ACTUAL	10,0%	1,1	8,0 ; 12,4	1,48	11,1
CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	28,3%	1,9	24,7 ; 32,2	1,65	6,8
	PREVALENCIA ANUAL	11,7%	1,2	9,6 ; 14,2	1,21	10,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	10,1%	1,0	8,3 ; 12,3	1,07	10,2
	PREVALENCIA ACTUAL	7,0%	0,9	5,5 ; 9,0	1,11	12,7
CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	21,8%	2,3	17,6 ; 26,6	1,47	10,5
	PREVALENCIA ANUAL	8,6%	1,2	6,5 ; 11,3	0,90	14,1
	PREVALENCIA DE 6 MESES	6,9%	1,2	5,0 ; 9,6	1,00	16,8
	PREVALENCIA ACTUAL	4,1%	0,9	2,7 ; 6,3	1,01	22,1
TRASTORNOS DE ANSIEDAD (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	10,5%	0,6	9,4 ; 11,6	1,55	5,5
	PREVALENCIA ANUAL	2,9%	0,3	2,4 ; 3,5	1,28	9,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	2,4%	0,3	2,0 ; 3,0	1,26	10,7
	PREVALENCIA ACTUAL	1,9%	0,2	1,5 ; 2,4	1,27	12,3
TRASTORNOS DE ANSIEDAD (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	11,2%	1,6	8,4 ; 14,7	1,98	14,4
	PREVALENCIA ANUAL	2,1%	0,5	1,3 ; 3,5	1,08	25,5
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,9%	0,5	1,1 ; 3,2	1,06	26,7
	PREVALENCIA ACTUAL	1,7%	0,5	1,0 ; 3,0	1,10	28,8
TRASTORNOS DE ANSIEDAD (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	10,1%	1,2	7,9 ; 12,9	2,03	12,3
	PREVALENCIA ANUAL	3,0%	0,7	2,0 ; 4,7	1,87	22,4
	PREVALENCIA DE 6 MESES	2,3%	0,6	1,3 ; 3,8	1,99	27,0
	PREVALENCIA ACTUAL	1,7%	0,5	0,9 ; 3,1	1,87	30,2
TRASTORNOS DE ANSIEDAD (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	11,5%	1,0	9,8 ; 13,6	1,00	8,4
	PREVALENCIA ANUAL	4,2%	0,6	3,2 ; 5,6	0,99	14,4
	PREVALENCIA DE 6 MESES	3,9%	0,6	2,9 ; 5,1	0,90	14,3
	PREVALENCIA ACTUAL	3,1%	0,5	2,2 ; 4,3	0,99	16,8
TRASTORNOS DE ANSIEDAD (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	10,2%	1,1	8,2 ; 12,7	1,28	11,1
	PREVALENCIA ANUAL	2,5%	0,5	1,7 ; 3,7	1,02	20,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	2,0%	0,5	1,3 ; 3,2	1,05	23,6
	PREVALENCIA ACTUAL	1,3%	0,4	0,7 ; 2,4	1,11	30,1
TRASTORNOS DE ANSIEDAD (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	8,2%	1,5	5,7 ; 11,7	1,46	18,5
	PREVALENCIA ANUAL	1,4%	0,6	0,7 ; 3,1	1,06	38,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,2%	0,5	0,5 ; 2,7	1,05	42,7
	PREVALENCIA ACTUAL	0,7%	0,4	0,2 ; 2,0	0,99	55,5
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	3,0%	0,3	2,4 ; 3,6	1,49	10,5
	PREVALENCIA ANUAL	0,7%	0,1	0,5 ; 1,0	1,07	18,5
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,7%	0,1	0,5 ; 1,0	1,13	19,0
	PREVALENCIA ACTUAL	0,6%	0,1	0,4 ; 0,8	1,12	21,3
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	4,2%	1,0	2,6 ; 6,7	1,93	23,9
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,4	0,5 ; 1,9	1,00	37,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,9%	0,3	0,4 ; 1,9	1,00	37,5
	PREVALENCIA ACTUAL	0,7%	0,3	0,3 ; 1,7	1,07	43,8
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	2,2%	0,6	1,4 ; 3,7	1,74	25,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,43	41,8
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,43	41,8
	PREVALENCIA ACTUAL	0,5%	0,2	0,2 ; 1,3	1,31	45,5
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	3,2%	0,5	2,3 ; 4,4	1,05	17,2
	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,3	0,5 ; 1,7	0,99	30,8
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,9%	0,3	0,5 ; 1,7	0,99	31,2
	PREVALENCIA ACTUAL	0,7%	0,3	0,3 ; 1,4	1,08	38,4
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	3,4%	0,7	2,3 ; 5,0	1,24	19,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,2	0,3 ; 1,3	0,79	37,8
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,7%	0,3	0,3 ; 1,5	1,12	43,3
	PREVALENCIA ACTUAL	0,5%	0,3	0,2 ; 1,3	1,06	46,1
TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	1,4%	0,7	0,5 ; 3,8	1,74	50,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	0,59	99,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,5%	0,1	0,3 ; 0,8	1,28	24,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,0	0,1 ; 0,3	0,81	36,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,1%	0,0	0,0; 0,2	0,73	39,1
	PREVALENCIA ACTUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,55	99,9
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,5%	0,3	0,2 ; 1,5	1,27	58,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA ACTUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	1,44	100,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA ACTUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,5%	0,3	0,2 ; 1,4	1,41	49,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,69	71,4
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,1%	0,1	0,0; 0,5	0,69	71,4
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,55	99,8
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,6%	0,3	0,3 ; 1,4	1,02	43,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,6	0,57	59,2
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,2%	0,1	0,1; 0,6	0,57	59,2
	PREVALENCIA ACTUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TRASTORNO DE PÁNICO SIN AGORAFOBIA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	1,0%	0,5	0,4 ; 2,8	1,36	52,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,4	0,2 ; 1,9	1,00	58,1
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,4%	0,3	0,1; 1,5	0,91	71,2
	PREVALENCIA ACTUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
AGORAFOBIA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	1,2%	0,2	0,9 ; 1,6	1,29	15,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,5%	0,1	0,3 ; 0,8	1,37	24,4
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,3%	0,1	0,2 ; 0,5	1,04	27,2
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,1	0,2 ; 0,5	1,11	29,5
AGORAFOBIA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,7%	0,4	0,2 ; 1,9	1,50	54,0
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	0,71	100,1
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	0,71	100,1
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	0,71	100,1
AGORAFOBIA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,3%	0,4	0,7 ; 2,4	1,63	32,6
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,3	0,2 ; 1,7	2,04	52,6
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,59	99,6
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,59	99,6
AGORAFOBIA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,2%	0,4	0,7 ; 2,2	1,19	30,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,3	0,4 ; 1,7	1,06	33,7
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,8%	0,3	0,4 ; 1,6	1,07	34,4
	PREVALENCIA ACTUAL	0,7%	0,3	0,4 ; 1,6	1,15	37,5
AGORAFOBIA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	1,8%	0,5	1,1 ; 3,0	1,09	25,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,5%	0,3	0,2 ; 1,4	1,13	47,7
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,2%	0,1	0,1 ; 0,6	0,54	50,4
	PREVALENCIA ACTUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	0,54	58,5
AGORAFOBIA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,8%	0,4	0,3 ; 2,2	1,00	49,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,1	0,71	100,6
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,1%	0,1	0,0 ; 1,1	0,71	100,6
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,1	0,71	100,6
FOBIA SOCIAL (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	2,2%	0,3	1,8 ; 2,8	1,45	12,0
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,2	0,7 ; 1,4	1,48	18,7
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,9%	0,2	0,6 ; 1,3	1,49	19,2
	PREVALENCIA ACTUAL	0,8%	0,2	0,5 ; 1,2	1,42	19,9
FOBIA SOCIAL (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	1,5%	0,5	0,8 ; 2,8	1,22	32,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,3	0,2 ; 1,6	1,18	50,7
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,4%	0,2	0,1 ; 1,2	1,04	58,3
	PREVALENCIA ACTUAL	0,4%	0,2	0,1 ; 1,2	1,04	58,3
FOBIA SOCIAL (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	3,0%	0,7	1,9 ; 4,8	2,12	23,9
	PREVALENCIA ANUAL	1,2%	0,4	0,5 ; 2,4	2,05	38,5
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,2%	0,4	0,5 ; 2,4	2,05	38,5
	PREVALENCIA ACTUAL	0,8%	0,4	0,3 ; 1,9	1,96	45,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
FOBIA SOCIAL (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	3,4%	0,5	2,5 ; 4,5	0,87	15,1
	PREVALENCIA ANUAL	1,7%	0,4	1,0 ; 2,7	1,04	23,8
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,7%	0,4	1,0 ; 2,7	1,04	23,8
	PREVALENCIA ACTUAL	1,6%	0,4	1,0 ; 2,6	1,06	24,1
FOBIA SOCIAL (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	1,1%	0,4	0,5 ; 2,3	1,46	38,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,5%	0,3	0,1 ; 1,6	1,67	63,2
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,4%	0,3	0,1 ; 1,6	1,84	70,9
	PREVALENCIA ACTUAL	0,4%	0,3	0,1 ; 1,6	1,84	70,9
FOBIA SOCIAL (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,9%	0,5	0,3 ; 2,5	1,16	51,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,48	100,4
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,48	100,4
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,48	100,4
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	0,97	30,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,3	1,02	49,2
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,1%	0,0	0,0 ; 0,3	1,02	49,2
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,05	56,4
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	0,85	62,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,35	100,6
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	34,8	100,6
	PREVALENCIA ACTUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,35	100,6
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,4%	0,2	0,1 ; 0,9	1,05	49,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,94	99,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,94	99,9
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,94	99,9
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,51	71,9
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA ACTUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,7	0,73	65,5
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,1	0,0 ; 0,7	0,80	73,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,2%	0,1	0,0 ; 0,7	0,80	73,3
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,55	100,3
TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,48	100,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,48	100,4
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,48	100,4
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,48	100,4
TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	5,1%	0,4	4,4 ; 5,9	1,44	7,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,7%	0,1	0,5 ; 1,0	1,06	18,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,5%	0,1	0,3 ; 0,7	1,00	21,5
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,1	0,2 ; 0,5	1,07	29,5
TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	5,8%	1,2	3,9 ; 8,6	1,92	20,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,4%	0,3	0,1 ; 1,6	1,43	64,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,4%	0,3	0,1 ; 1,6	1,43	64,9
	PREVALENCIA ACTUAL	0,4%	0,3	0,1 ; 1,6	1,43	64,9
TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	5,2%	0,9	3,7 ; 7,3	1,95	17,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,2	0,3 ; 1,3	0,96	35,5
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,98	49,9
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	1,05	54,4
TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	5,0%	0,6	3,9 ; 6,4	0,86	12,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,3	0,5 ; 1,8	1,06	32,1
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,7%	0,2	0,3 ; 1,3	0,92	49,9
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,99	52,6
TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	4,5%	0,7	3,4 ; 6,1	1,00	15,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,3	0,3 ; 1,4	0,94	40,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,4%	0,2	0,2 ; 1,0	0,76	43,0
	PREVALENCIA ACTUAL	0,2%	0,1	0,0 ; 0,6	0,69	70,7
TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	4,8%	1,1	3,1 ; 7,5	1,26	22,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,4	0,2 ; 1,9	1,05	61,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,6%	0,4	0,2 ; 1,9	1,05	61,3
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,44	100,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	17,3%	0,7	15,9 ; 18,7	1,63	4,2
	PREVALENCIA ANUAL	6,2%	0,4	5,4 ; 7,1	1,40	6,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	4,6%	0,4	3,9 ; 5,5	1,52	8,4
	PREVALENCIA ACTUAL	2,8%	0,3	2,3 ; 3,5	1,68	11,4
TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	20,5%	2,1	16,7 ; 25,0	2,11	10,3
	PREVALENCIA ANUAL	6,1%	1,2	4,1 ; 8,8	1,86	19,4
	PREVALENCIA DE 6 MESES	5,1%	1,1	3,3 ; 7,9	2,05	22,3
	PREVALENCIA ACTUAL	4,3%	1,0	2,6 ; 6,8	2,02	24,3
TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	14,0%	1,3	11,6 ; 16,8	1,72	9,5
	PREVALENCIA ANUAL	5,2%	0,8	3,8 ; 7,1	1,70	16,2
	PREVALENCIA DE 6 MESES	3,7%	0,8	2,5 ; 5,5	1,91	20,5
	PREVALENCIA ACTUAL	2,6%	0,6	1,6 ; 4,2	1,98	25,2
TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	17,1%	1,3	14,8 ; 19,8	1,26	7,5
	PREVALENCIA ANUAL	7,3%	0,8	5,9 ; 9,1	1,10	11,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	5,1%	0,7	3,9 ; 6,8	1,22	14,4
	PREVALENCIA ACTUAL	2,9%	0,6	2,0 ; 4,3	1,33	20,2
TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	19,9%	1,7	16,7 ; 23,5	1,68	8,6
	PREVALENCIA ANUAL	6,7%	1,0	5,0 ; 8,9	1,38	14,5
	PREVALENCIA DE 6 MESES	5,3%	0,8	3,9 ; 7,2	1,27	15,7
	PREVALENCIA ACTUAL	2,7%	0,6	1,7 ; 4,2	1,40	23,6
TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	15,6%	1,8	12,4 ; 19,5	1,18	11,6
	PREVALENCIA ANUAL	5,7%	1,0	4,1 ; 7,9	0,82	16,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	3,7%	0,9	2,3 ; 5,8	0,98	23,2
	PREVALENCIA ACTUAL	1,2%	0,5	0,6 ; 2,7	0,94	39,5
EPISODIO DEPRESIVO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	17,2%	0,7	15,9 ; 18,7	1,63	4,2
	PREVALENCIA ANUAL	6,2%	0,4	5,4 ; 7,1	1,40	7,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	4,6%	0,4	3,9 ; 5,4	1,52	8,5
	PREVALENCIA ACTUAL	2,8%	0,3	2,2 ; 3,5	1,68	11,6
EPISODIO DEPRESIVO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	20,5%	2,1	16,7 ; 25,0	2,11	10,3
	PREVALENCIA ANUAL	5,9%	1,2	4,0 ; 8,6	1,86	19,7
	PREVALENCIA DE 6 MESES	4,9%	1,1	3,1 ; 7,7	2,06	22,8
	PREVALENCIA ACTUAL	4,1%	1,0	2,5 ; 6,6	2,02	24,9
EPISODIO DEPRESIVO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	14,0%	1,3	11,6 ; 16,8	1,72	9,5
	PREVALENCIA ANUAL	5,2%	0,8	3,8 ; 7,1	1,70	16,2
	PREVALENCIA DE 6 MESES	3,7%	0,8	2,5 ; 5,5	1,91	20,5
	PREVALENCIA ACTUAL	2,6%	0,6	1,6 ; 4,2	1,98	25,2
EPISODIO DEPRESIVO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	17,1%	1,3	14,7 ; 19,8	1,27	7,5
	PREVALENCIA ANUAL	7,3%	0,8	5,9 ; 9,1	1,10	11,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	5,1%	0,7	3,9 ; 6,8	1,22	14,4
	PREVALENCIA ACTUAL	2,9%	0,6	2,0 ; 4,3	1,33	20,2
EPISODIO DEPRESIVO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	19,8%	1,7	16,6 ; 23,3	1,68	8,6
	PREVALENCIA ANUAL	6,5%	1,0	4,9 ; 8,7	1,39	14,8
	PREVALENCIA DE 6 MESES	5,2%	0,8	3,8 ; 7,0	1,27	16,0
	PREVALENCIA ACTUAL	2,5%	0,6	1,6 ; 4,1	1,44	24,7
EPISODIO DEPRESIVO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	15,5%	1,8	12,3 ; 19,4	1,18	11,6
	PREVALENCIA ANUAL	5,6%	0,9	4,0 ; 7,8	0,80	16,8
	PREVALENCIA DE 6 MESES	3,6%	0,8	2,3 ; 5,6	0,96	23,1
	PREVALENCIA ACTUAL	1,2%	0,5	0,5 ; 2,5	0,86	39,0
EPISODIO DEPRESIVO LEVE (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	2,8%	0,3	2,3 ; 3,5	1,31	10,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,2	0,6 ; 1,3	1,28	17,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,6%	0,1	0,4 ; 1,0	1,38	22,3
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,1	0,2 ; 0,6	1,28	31,1
EPISODIO DEPRESIVO LEVE (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	3,6%	0,8	2,4 ; 5,6	1,41	22,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	1,09	56,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,2%	0,1	0,0 ; 0,8	0,80	77,7
	PREVALENCIA ACTUAL	0,2%	0,1	0,0 ; 0,8	0,80	77,7
EPISODIO DEPRESIVO LEVE (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,4%	0,4	0,8 ; 2,6	1,47	29,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 1,2	1,78	74,7
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,3%	0,2	0,1 ; 1,2	1,78	74,7
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 1,2	1,78	74,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EPISODIO DEPRESIVO LEVE (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	4,2%	0,7	3,1 ; 5,9	1,32	16,6
	PREVALENCIA ANUAL	2,2%	0,5	1,4 ; 3,4	1,26	22,6
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,7%	0,5	1,0 ; 2,9	1,39	26,8
	PREVALENCIA ACTUAL	0,6%	0,3	0,3 ; 1,4	1,12	40,9
EPISODIO DEPRESIVO LEVE (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	3,0%	0,6	2,0 ; 4,5	1,14	20,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,16	43,2
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,4%	0,2	0,1 ; 1,1	1,04	53,7
	PREVALENCIA ACTUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,1	1,32	80,3
EPISODIO DEPRESIVO LEVE (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	1,5%	0,5	0,8 ; 2,8	0,75	32,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,3	0,2 ; 1,7	0,89	57,7
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	0,65	100,0
	PREVALENCIA ACTUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	5,5%	0,4	4,7 ; 6,4	1,49	7,6
	PREVALENCIA ANUAL	1,9%	0,2	1,4 ; 2,4	1,45	13,2
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,4%	0,2	1,0 ; 1,9	1,59	15,8
	PREVALENCIA ACTUAL	0,8%	0,2	0,5 ; 1,2	1,77	22,6
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	7,7%	1,2	5,7 ; 10,3	1,49	15,3
	PREVALENCIA ANUAL	1,7%	0,5	1,0 ; 3,2	1,26	30,4
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,2%	0,4	0,6 ; 2,5	1,30	37,5
	PREVALENCIA ACTUAL	1,0%	0,4	0,4 ; 2,1	1,18	40,0
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	5,2%	0,9	3,8 ; 7,2	1,79	16,5
	PREVALENCIA ANUAL	2,2%	0,6	1,3 ; 3,7	1,87	26,7
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,6%	0,5	0,9 ; 3,1	2,09	32,5
	PREVALENCIA ACTUAL	1,0%	0,4	0,4 ; 2,3	2,29	44,0
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	4,7%	0,7	3,5 ; 6,2	1,14	14,6
	PREVALENCIA ANUAL	1,6%	0,5	1,2 ; 3,3	1,29	26,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,1%	0,4	0,5 ; 2,2	1,55	36,1
	PREVALENCIA ACTUAL	0,8%	0,4	0,3 ; 1,9	1,79	46,0
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	5,0%	0,9	3,5 ; 7,1	1,57	18,0
	PREVALENCIA ANUAL	2,0%	0,5	1,2 ; 3,3	1,29	26,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,9%	0,5	1,1 ; 3,2	1,35	27,8
	PREVALENCIA ACTUAL	0,6%	0,3	0,2 ; 1,7	1,53	50,9
EPISODIO DEPRESIVO MODERADO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	5,2%	1,2	3,3 ; 8,2	1,46	23,6
	PREVALENCIA ANUAL	1,6%	0,6	0,8 ; 3,3	1,04	36,1
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,1%	0,5	0,4 ; 2,8	1,19	46,8
	PREVALENCIA ACTUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	0,93	100,6
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	9,0%	0,5	8,0 ; 10,1	1,58	6,0
	PREVALENCIA ANUAL	3,4%	0,3	2,8 ; 4,1	1,47	9,7
	PREVALENCIA DE 6 MESES	2,5%	0,3	2,0 ; 3,1	1,50	11,5
	PREVALENCIA ACTUAL	1,7%	0,3	1,3 ; 2,3	1,71	15,0
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	9,2%	1,7	6,3 ; 13,2	2,71	18,7
	PREVALENCIA ANUAL	3,7%	1,0	2,2 ; 6,2	2,12	26,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	3,6%	1,0	2,1 ; 6,1	2,19	27,8
	PREVALENCIA ACTUAL	3,0%	0,9	1,6 ; 5,5	2,40	32,1
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	7,6%	1,0	5,9 ; 9,9	1,71	13,2
	PREVALENCIA ANUAL	2,8%	0,6	1,7 ; 4,4	1,85	23,4
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,8%	0,5	1,0 ; 3,3	2,03	30,7
	PREVALENCIA ACTUAL	1,3%	0,5	0,6 ; 2,6	2,01	35,9
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	8,2%	0,9	6,6 ; 10,1	1,14	10,8
	PREVALENCIA ANUAL	3,6%	0,6	2,6 ; 4,9	1,03	16,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	2,3%	0,4	1,6 ; 3,3	0,92	19,0
	PREVALENCIA ACTUAL	1,5%	0,4	0,9 ; 2,5	0,99	24,3
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	11,7%	1,2	9,5 ; 14,4	1,36	10,6
	PREVALENCIA ANUAL	3,9%	0,7	2,6 ; 5,6	1,36	19,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	2,9%	0,6	1,9 ; 4,3	1,13	20,5
	PREVALENCIA ACTUAL	1,7%	0,5	0,9 ; 2,9	1,33	29,4
EPISODIO DEPRESIVO SEVERO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	8,8%	1,3	6,6 ; 11,6	0,94	14,3
	PREVALENCIA ANUAL	3,4%	0,8	2,2 ; 5,3	0,89	23,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	2,3%	0,6	1,4 ; 4,0	0,86	27,3
	PREVALENCIA ACTUAL	1,0%	0,4	0,4 ; 2,2	0,85	42,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
DISTIMIA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,6%	0,1	0,4 ; 0,9	1,12	20,6
	PREVALENCIA ACTUAL	0,2%	0,1	0,1; 0,4	1,27	37,9
DISTIMIA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	0,93	40,1
	PREVALENCIA ACTUAL	0,4%	0,2	0,1; 1,3	1,12	63,2
DISTIMIA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	2,20	99,6
	PREVALENCIA ACTUAL	0,2%	0,2	0,0; 1,3	2,20	99,6
DISTIMIA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,0%	0,3	0,6 ; 1,9	1,09	31,2
	PREVALENCIA ACTUAL	0,2%	0,1	0,0; 0,7	1,00	70,5
DISTIMIA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,2	1,12	54,2
	PREVALENCIA ACTUAL	0,2%	0,1	0,0; 0,6	0,73	71,8
DISTIMIA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,7	0,73	47,0
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0; 0,6	0,38	100,6
ANOREXIA (PREVALENCIA ACTUAL)	TOTAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,31	100,1
	LIMA CENTRO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA ESTE	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	0,31	100,0
	LIMA SUR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CALLAO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
BULIMIA NERVOSA (PREVALENCIA ACTUAL)	TOTAL	0,1%	0,1	0,1 ; 0,3	1,30	47,6
	LIMA CENTRO	0,3%	0,3	0,1 ; 1,9	2,03	87,6
	LIMA NORTE	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA ESTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,53	73,8
	LIMA SUR	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,63	71,2
	CALLAO	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	0,85	100,2
EPISODIO MANIACO (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,34	77,3
	LIMA CENTRO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,62	100,0
	LIMA ESTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,62	99,8
	LIMA SUR	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CALLAO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
HIPOMANÍA (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	1,84	60,5
	LIMA CENTRO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	2,32	100,2
	LIMA ESTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	1,04	100,2
	LIMA SUR	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	1,68	99,7
	CALLAO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TRASTORNO BIPOLAR (MANÍA E HIPOMANÍA) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	1,68	48,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	2,32	100,1
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	2,32	100,1
TRASTORNO BIPOLAR (MANÍA E HIPOMANÍA) (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,4	2,03	71,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	2,32	100,2
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	2,32	100,2
TRASTORNO BIPOLAR (MANÍA E HIPOMANÍA) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,1	0,0 ; 0,6	0,88	73,0
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TRASTORNO BIPOLAR (MANÍA E HIPOMANÍA) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,1	0,0 ; 1,3	1,68	99,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TENDENCIA A PROBLEMAS ALIMENTARIOS (PREVALENCIA ACTUAL)	TOTAL	3,7%	0,3	3,1 ; 4,5	1,40	9,0
	LIMA CENTRO	3,4%	0,8	2,1 ; 5,4	1,55	24,0
	LIMA NORTE	4,8%	0,9	3,4 ; 6,9	2,02	18,3
	LIMA ESTE	3,1%	0,5	2,3 ; 4,3	0,94	16,3
	LIMA SUR	3,9%	0,6	2,8 ; 5,3	0,97	16,3
	CALLAO	2,6%	0,7	1,6 ; 4,3	0,83	25,4
TRASTORNOS PSICÓTICOS EN GENERAL (CON AL MENOS 1 CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	1,5%	0,2	1,1 ; 2,0	1,57	15,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,6%	0,1	0,4 ; 1,0	1,60	24,2
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,5%	0,1	0,3 ; 0,8	1,65	27,6
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,1	0,1 ; 0,6	1,86	37,9
TRASTORNOS PSICÓTICOS EN GENERAL (CON AL MENOS 1 CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO) (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	2,5%	0,8	1,3 ; 4,7	2,03	32,2
	PREVALENCIA ANUAL	1,3%	0,6	0,5 ; 3,2	2,14	46,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	1,1%	0,6	0,4 ; 3,0	2,30	52,0
	PREVALENCIA ACTUAL	1,0%	0,6	0,3 ; 3,0	2,48	57,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
TRASTORNOS PSICÓTICOS EN GENERAL (CON AL MENOS 1 CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO) (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,1%	0,4	0,5 ; 2,2	1,80	37,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	1,36	58,9
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	1,36	58,9
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,72	99,9
TRASTORNOS PSICÓTICOS EN GENERAL (CON AL MENOS 1 CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,1%	0,3	0,6 ; 1,9	1,07	30,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,5%	0,3	0,2 ; 1,3	1,27	46,5
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,4%	0,2	0,1 ; 1,2	1,28	53,1
	PREVALENCIA ACTUAL	0,3%	0,1	0,1 ; 0,8	0,82	52,9
TRASTORNOS PSICÓTICOS EN GENERAL (CON AL MENOS 1 CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	2,0%	0,5	1,2 ; 3,2	1,21	25,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,7%	0,3	0,3 ; 1,8	1,37	45,3
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	1,26	57,2
	PREVALENCIA ACTUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,52	75,8
TRASTORNOS PSICÓTICOS EN GENERAL (CON AL MENOS 1 CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO) (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	1,0%	0,6	0,3 ; 2,9	1,51	56,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,0	0,64	81,0
	PREVALENCIA DE 6 MESES	0,2%	0,2	0,0 ; 1,0	0,64	81,0
	PREVALENCIA ACTUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
ABUSO O DEPENDENCIA DE CUALQUIER SUSTANCIA (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	3,2%	0,3	2,6 ; 3,9	1,50	10,1
	LIMA CENTRO	2,6%	0,7	1,6 ; 4,3	1,34	25,7
	LIMA NORTE	3,3%	0,8	2,0 ; 5,2	2,25	23,7
	LIMA ESTE	4,3%	0,7	3,1 ; 5,9	1,31	16,5
	LIMA SUR	2,5%	0,5	1,7 ; 3,8	0,98	20,3
	CALLAO	2,7%	0,8	1,5 ; 4,6	1,04	28,1
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	7,5%	0,5	6,5 ; 8,5	1,61	6,7
	PREVALENCIA ANUAL	2,5%	0,3	2,0 ; 3,2	1,56	11,7
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	6,0%	1,2	4,1 ; 8,8	1,82	19,3
	PREVALENCIA ANUAL	1,6%	0,5	0,8 ; 3,1	1,40	33,8
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	6,2%	1,0	4,5 ; 8,5	2,14	16,6
	PREVALENCIA ANUAL	2,4%	0,7	1,4 ; 4,2	2,37	28,6
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	10,0%	1,1	9,1 ; 12,4	1,44	10,9
	PREVALENCIA ANUAL	4,0%	0,7	2,8 ; 5,6	1,37	17,5
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	7,5%	1,0	5,8 ; 9,8	1,36	13,5
	PREVALENCIA ANUAL	2,1%	0,5	1,3 ; 3,4	1,09	23,5
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	6,8%	1,1	4,9 ; 9,3	0,92	16,3
	PREVALENCIA ANUAL	1,8%	0,6	1,0 ; 3,4	0,91	31,8
EXPERIENCIAS POCO USUALES O EXTRAÑAS QUE PUEDEN OCURRIRLE A ALGUNAS PERSONAS, EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA... (TOTAL)	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN LO(A) ESPIABA O CONSPIRABA O TRAMABA ALGO CONTRA UD?	2,4%	0,3	1,8 ; 3,1	2,03	13,8
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN INTENTABA HACERLE DAÑO?	2,0%	0,3	1,5 ; 2,7	1,85	14,3
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE LE PODÍAN LEER SUS PENSAMIENTOS O QUE PODÍA LEER LOS PENSAMIENTOS DE OTROS?	0,4%	0,1	0,2 ; 0,6	1,07	25,5
	¿HA CREÍDO QUE ALGUIEN O ALGUNA COSA DEL EXTERIOR LE METÍA EN LA CABEZA PENSAMIENTOS EXTRAÑOS QUE NO ERAN LOS SUYOS O LE HACÍA ACTUAR DE UNA MANERA INHABITUAL PARA USTED?	0,3%	0,1	0,1 ; 0,5	1,39	33,2
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN SE DIRIGÍA DIRECTAMENTE A USTED A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN, LA RADIO O LOS PERIÓDICOS O QUE CIERTAS PERSONAS QUE NO CONOCÍA PERSONALMENTE SE INTERESABAN PARTICULARMENTE POR USTED?	0,3%	0,1	0,1 ; 0,5	1,71	39,3
	¿HA TENIDO IDEAS QUE LAS PERSONAS CERCANAS A USTED CONSIDERABAN COMO EXTRAÑAS O FUERA DE LA REALIDAD?	0,2%	0,1	0,1 ; 0,3	1,05	39,2
	¿HA ESCUCHADO COSAS QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN OÍR, COMO VOCES?	2,1%	0,3	1,6 ; 2,7	1,58	12,9
	¿HA VISTO COSAS O HA TENIDO VISIONES QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN VER?	2,2%	0,3	1,6 ; 2,9	2,15	14,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EXPERIENCIAS POCO USUALES O EXTRAÑAS QUE PUEDEN OCURRIRLE A ALGUNAS PERSONAS, EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA... (LIMA CENTRO)	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN LO(A) ESPIABA O CONSPIRABA O TRAMABA ALGO CONTRA UD?	4,2%	1,3	2,3 ; 7,6	3,11	30,3
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN INTENTABA HACERLE DAÑO?	4,2%	1,1	2,6 ; 6,9	2,18	25,4
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE LE PODÍAN LEER SUS PENSAMIENTOS O QUE PODÍA LEER LOS PENSAMIENTOS DE OTROS?	0,8%	0,4	0,4 ; 2,0	1,27	44,0
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN SE DIRIGÍA DIRECTAMENTE A USTED A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN, LA RADIO O LOS PERIÓDICOS O QUE CIERTAS PERSONAS QUE NO CONOCÍA PERSONALMENTE SE INTERESABAN PARTICULARMENTE POR USTED?	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,43	100,5
	¿HA TENIDO IDEAS QUE LAS PERSONAS CERCANAS A USTED CONSIDERABAN COMO EXTRAÑAS O FUERA DE LA REALIDAD?	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	0,80	100,0
	¿HA ESCUCHADO COSAS QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN OÍR, COMO VOCES?	2,2%	0,7	1,2 ; 4,1	1,69	31,1
	¿HA VISTO COSAS O HA TENIDO VISIONES QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN VER?	3,8%	1,4	1,9 ; 7,5	3,87	35,9
EXPERIENCIAS POCO USUALES O EXTRAÑAS QUE PUEDEN OCURRIRLE A ALGUNAS PERSONAS, EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA... (LIMA NORTE)	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN LO(A) ESPIABA O CONSPIRABA O TRAMABA ALGO CONTRA UD?	2,7%	0,6	1,7 ; 4,3	1,86	23,9
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN INTENTABA HACERLE DAÑO?	2,3%	0,7	1,3 ; 4,0	2,26	28,4
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE LE PODÍAN LEER SUS PENSAMIENTOS O QUE PODÍA LEER LOS PENSAMIENTOS DE OTROS?	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	0,53	50,2
	¿HA CREÍDO QUE ALGUIEN O ALGUNA COSA DEL EXTERIOR LE METÍA EN LA CABEZA PENSAMIENTOS EXTRAÑOS QUE NO ERAN LOS SUYOS O LE HACÍA ACTUAR DE UNA MANERA INHABITUAL PARA USTED?	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	1,73	59,0
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN SE DIRIGÍA DIRECTAMENTE A USTED A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN, LA RADIO O LOS PERIÓDICOS O QUE CIERTAS PERSONAS QUE NO CONOCÍA PERSONALMENTE SE INTERESABAN PARTICULARMENTE POR USTED?	0,5%	0,3	0,1 ; 1,7	2,41	65,8
	¿HA TENIDO IDEAS QUE LAS PERSONAS CERCANAS A USTED CONSIDERABAN COMO EXTRAÑAS O FUERA DE LA REALIDAD?	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	1,47	72,1
	¿HA ESCUCHADO COSAS QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN OÍR, COMO VOCES?	2,8%	0,7	1,7 ; 4,6	2,22	25,6
	¿HA VISTO COSAS O HA TENIDO VISIONES QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN VER?	2,0%	0,5	1,2 ; 3,3	1,56	25,5
EXPERIENCIAS POCO USUALES O EXTRAÑAS QUE PUEDEN OCURRIRLE A ALGUNAS PERSONAS, EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA... (LIMA ESTE)	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN LO(A) ESPIABA O CONSPIRABA O TRAMABA ALGO CONTRA UD?	1,2%	0,3	0,7 ; 2,0	1,08	29,1
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN INTENTABA HACERLE DAÑO?	0,6%	0,3	0,2 ; 1,4	1,29	45,0
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE LE PODÍAN LEER SUS PENSAMIENTOS O QUE PODÍA LEER LOS PENSAMIENTOS DE OTROS?	0,4%	0,2	0,1 ; 1,1	1,34	58,3
	¿HA CREÍDO QUE ALGUIEN O ALGUNA COSA DEL EXTERIOR LE METÍA EN LA CABEZA PENSAMIENTOS EXTRAÑOS QUE NO ERAN LOS SUYOS O LE HACÍA ACTUAR DE UNA MANERA INHABITUAL PARA USTED?	0,2%	0,1	0,1 ; 0,6	0,76	58,6
	¿HA TENIDO IDEAS QUE LAS PERSONAS CERCANAS A USTED CONSIDERABAN COMO EXTRAÑAS O FUERA DE LA REALIDAD?	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,57	67,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EXPERIENCIAS POCO USUALES O EXTRAÑAS QUE PUEDEN OCURRIRLE A ALGUNAS PERSONAS, EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA... (LIMA ESTE)	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN SE DIRIGÍA DIRECTAMENTE A USTED A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN, LA RADIO O LOS PERIÓDICOS O QUE CIERTAS PERSONAS QUE NO CONOCÍA PERSONALMENTE SE INTERESABAN PARTICULARMENTE POR USTED?	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,78	100,1
	¿HA ESCUCHADO COSAS QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN OÍR, COMO VOCES?	1,0%	0,3	0,5 ; 1,8	1,10	32,3
	¿HA VISTO COSAS O HA TENIDO VISIONES QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN VER?	0,7%	0,3	0,3 ; 1,5	1,13	38,1
EXPERIENCIAS POCO USUALES O EXTRAÑAS QUE PUEDEN OCURRIRLE A ALGUNAS PERSONAS, EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA... (LIMA SUR)	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN LO(A) ESPIABA O CONSPIRABA O TRAMABA ALGO CONTRA UD?	2,3%	0,5	1,4 ; 3,6	1,20	23,8
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN INTENTABA HACERLE DAÑO?	2,2%	0,5	1,5 ; 3,4	0,93	21,2
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE LE PODÍAN LEER SUS PENSAMIENTOS O QUE PODÍA LEER LOS PENSAMIENTOS DE OTROS?	0,4%	0,2	0,2 ; 1,0	0,71	43,6
	¿HA CREÍDO QUE ALGUIEN O ALGUNA COSA DEL EXTERIOR LE METÍA EN LA CABEZA PENSAMIENTOS EXTRAÑOS QUE NO ERAN LOS SUYOS O LE HACÍA ACTUAR DE UNA MANERA INHABITUAL PARA USTED?	0,5%	0,3	0,2 ; 1,5	1,43	55,7
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN SE DIRIGÍA DIRECTAMENTE A USTED A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN, LA RADIO O LOS PERIÓDICOS O QUE CIERTAS PERSONAS QUE NO CONOCÍA PERSONALMENTE SE INTERESABAN PARTICULARMENTE POR USTED?	0,5%	0,2	0,2 ; 1,3	1,12	50,6
	¿HA TENIDO IDEAS QUE LAS PERSONAS CERCANAS A USTED CONSIDERABAN COMO EXTRAÑAS O FUERA DE LA REALIDAD?	0,2%	0,1	0,1 ; 0,8	0,87	65,9
	¿HA ESCUCHADO COSAS QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN OÍR, COMO VOCES?	2,8%	0,6	1,9 ; 4,2	1,01	19,4
	¿HA VISTO COSAS O HA TENIDO VISIONES QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN VER?	3,4%	0,7	2,3 ; 5,1	1,37	20,5
EXPERIENCIAS POCO USUALES O EXTRAÑAS QUE PUEDEN OCURRIRLE A ALGUNAS PERSONAS, EN ALGÚN MOMENTO DE SU VIDA... (CALLAO)	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN LO(A) ESPIABA O CONSPIRABA O TRAMABA ALGO CONTRA UD?	1,5%	0,6	0,6 ; 3,4	1,32	43,1
	¿HA TENIDO LA IMPRESIÓN DE QUE ALGUIEN INTENTABA HACERLE DAÑO?	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	0,67	46,1
	¿HA CREÍDO QUE ALGUIEN O ALGUNA COSA DEL EXTERIOR LE METÍA EN LA CABEZA PENSAMIENTOS EXTRAÑOS QUE NO ERAN LOS SUYOS O LE HACÍA ACTUAR DE UNA MANERA INHABITUAL PARA USTED?	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	0,86	100,2
	¿HA ESCUCHADO COSAS QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN OÍR, COMO VOCES?	1,3%	0,5	0,6 ; 2,7	0,89	38,0
	¿HA VISTO COSAS O HA TENIDO VISIONES QUE OTRAS PERSONAS NO PODÍAN VER?	0,9%	0,4	0,4 ; 1,9	0,71	41,4
EDAD DE INICIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (TOTAL)	AGORAFOBIA	82,53	35,8	10,5 ; 154,6	1,31	43,4
	FOBIA SOCIAL	16,42	1,4	13,6 ; 19,3	1,55	8,8
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	31,89	1,4	29,1 ; 34,6	1,25	4,3
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	24,29	1,0	22,3 ; 26,2	1,20	4,1
	EPISODIO DEPRESIVO	30,53	0,6	29,3 ; 31,8	1,30	2,0
	DISTIMIA	33,82	4,1	25,3 ; 42,4	1,47	12,3
	PSICOSIS CON CONVENCIMIENTO Y AL MENOS UN MES	31,14	2,1	26,9 ; 35,3	1,41	6,7
EDAD DE INICIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (LIMA CENTRO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	36,97	2,8	31,5 ; 42,4	1,3	7,4
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	24,88	1,9	21,1 ; 28,7	0,98	7,8
	EPISODIO DEPRESIVO	32,13	1,6	29,0 ; 35,3	1,7	5,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EDAD DE INICIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (LIMA NORTE)	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	23,84	2,2	19,5 ; 28,2	1,9	9,3
	EPISODIO DEPRESIVO	29,52	1,4	26,8 ; 32,2	1,5	4,6
EDAD DE INICIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (LIMA ESTE)	FOBIA SOCIAL	14,96	1,1	12,7 ; 17,1	0,78	7,0
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	30,70	2,6	25,5 ; 35,9	1,09	8,5
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	26,61	2,1	22,5 ; 30,7	1,04	7,8
	EPISODIO DEPRESIVO	28,88	1,0	27,0 ; 30,8	1,01	3,4
EDAD DE INICIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (LIMA SUR)	AGORAFOBIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	31,87	2,0	27,9 ; 35,9	0,82	6,3
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	20,90	2,0	17,0 ; 24,8	1,05	9,5
	EPISODIO DEPRESIVO	30,11	1,3	27,6 ; 32,6	1,12	4,2
EDAD DE INICIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (CALLAO)	EPISODIO DEPRESIVO	34,58	2,1	30,4 ; 38,8	1,19	6,2
DURACIÓN EN MESES DEL ÚLTIMO EPISODIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (TOTAL)	AGORAFOBIA	53,16	16,6	19,6 ; 86,6	1,74	31,3
	TRASTORNO DE PÁNICO	3,35	1,3	0,57 ; 6,1	1,30	38,9
	FOBIA SOCIAL	71,90	12,8	46,4 ; 97,4	1,13	17,8
	TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO	9,54	2,36	4,1 ; 15,0	0,65	24,7
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	24,80	4,5	15,8 ; 33,7	1,13	18,1
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	26,94	6,9	13,4 ; 40,5	1,62	25,5
	EPISODIO DEPRESIVO	19,02	2,5	14,1 ; 24,0	1,55	13,3
	DISTIMIA	76,24	20,1	34,8 ; 117,7	1,61	26,3
	TRASTORNO BIPOLAR	14,39	9,2	-25,2 ; 54,0	1,41	63,9
	PSICOSIS CON CONVENCIMIENTO Y AL MENOS UN MES	24,48	11,2	1,9 ; 46,9	1,43	45,8
DURACIÓN EN MESES DEL ÚLTIMO EPISODIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (LIMA CENTRO)	AGORAFOBIA	4,10	2,4	-0,6 ; 8,8	1,58	57,5
	TRASTORNO DE PÁNICO	2,43	1,6	-0,9 ; 5,7	1,92	64,8
	FOBIA SOCIAL	93,75	49,7	-5,3 ; 192,8	0,94	53,1
	TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO	18,66	10,8	-6,2 ; 43,5	1,03	57,7
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	33,82	11,1	11,8 ; 55,9	1,00	32,9
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	33,96	23,5	-13,4 ; 79,3	1,92	71,3
	EPISODIO DEPRESIVO	22,30	6,8	8,9 ; 35,7	1,88	30,6
	DISTIMIA	66,11	15,8	33,6 ; 98,7	1,41	23,9
	TRASTORNO BIPOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	PSICOSIS CON CONVENCIMIENTO Y AL MENOS UN MES	52,09	35,6	-19,3 ; 123,4	2,09	68,3
DURACIÓN EN MESES DEL ÚLTIMO EPISODIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (LIMA NORTE)	AGORAFOBIA	34,26	24,3	-14,6 ; 83,2	1,92	70,8
	TRASTORNO DE PÁNICO	14,00	0,0	14,0 ; 14,0	0,0	0,0
	FOBIA SOCIAL	81,46	27,1	27,6 ; 135,3	1,30	33,2
	TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO	5,84	2,3	0,6 ; 11,1	1,63	39,1
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	27,29	13,8	-0,1 ; 54,7	1,26	50,7
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	26,31	7,9	11,3 ; 41,3	1,32	28,9
	EPISODIO DEPRESIVO	33,40	8,3	17,2 ; 49,6	1,56	24,8
	DISTIMIA	228,00	0,0	228,0 ; 228,0	0,0	0,0
	TRASTORNO BIPOLAR	17,84	19,8	-67,6 ; 103,2	2,09	111,2
	PSICOSIS CON CONVENCIMIENTO Y AL MENOS UN MES	7,19	3,7	-0,2 ; 14,6	1,34	51,3
DURACIÓN EN MESES DEL ÚLTIMO EPISODIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (LIMA ESTE)	AGORAFOBIA	80,94	24,1	32,3 ; 129,5	0,86	29,8
	TRASTORNO DE PÁNICO	0,82	0,1	0,6 ; 1,1	1,14	14,0
	FOBIA SOCIAL	67,98	15,3	37,6 ; 98,4	1,19	22,5
	TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO	1,00	0,0	1,0 ; 1,0	0,0	0,0
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	20,58	6,7	7,3 ; 33,9	1,26	32,7
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	27,31	15,2	-2,8 ; 57,4	1,58	55,8
	EPISODIO DEPRESIVO	12,60	2,0	8,7 ; 16,5	0,83	15,6
	DISTIMIA	77,04	29,8	15,6 ; 138,5	1,13	38,7
	TRASTORNO BIPOLAR	8,63	4,2	-9,5 ; 26,8	0,86	48,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
DURACIÓN EN MESES DEL ÚLTIMO EPISODIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (LIMA SUR)	PSICOSIS CON CONVENCIMIENTO Y AL MENOS UN MES	35,54	25,5	-15,6 ; 86,7	0,59	71,8
	AGORAFOBIA	61,32	41,1	-21,4 ; 144,1	2,10	67,0
	TRASTORNO DE PÁNICO	6,24	2,7	0,4 ; 12,1	0,82	43,8
	FOBIA SOCIAL	53,54	27,0	-0,1 ; 107,2	1,43	50,3
	TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO	9,86	4,3	0,0 ; 19,8	0,68	43,6
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	19,27	4,1	11,1 ; 27,4	1,05	21,4
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	18,56	7,4	4,0 ; 33,1	0,76	39,7
	EPISODIO DEPRESIVO	12,79	3,3	6,4 ; 19,2	1,04	25,5
	DISTIMIA	33,73	17,8	-3,8 ; 70,6	0,95	52,9
	TRASTORNO BIPOLAR	12,00	0,0	12,0 ; 12,0	0,0	0,0
DURACIÓN EN MESES DEL ÚLTIMO EPISODIO DE LOS PRINCIPALES TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS (MEDIA) (CALLAO)	PSICOSIS CON CONVENCIMIENTO Y AL MENOS UN MES	6,35	2,5	1,3 ; 11,5	0,39	40,0
	AGORAFOBIA	42,90	14,5	13,8 ; 72,0	1,62	33,7
	TRASTORNO DE PÁNICO	0,32	0,2	-0,1 ; 0,7	1,47	55,3
	FOBIA SOCIAL	12,39	5,4	1,6 ; 23,2	1,49	43,8
	TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO	12,00	0,0	12,0 ; 12,0	0,0	0,0
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	17,59	4,1	9,5 ; 25,7	0,24	23,1
	TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO	29,68	18,3	-6,4 ; 65,7	1,49	61,6
	EPISODIO DEPRESIVO	11,15	2,6	6,0 ; 16,3	1,03	23,6
	DISTIMIA	35,81	5,8	23,8 ; 47,8	0,63	16,3
	TRASTORNO BIPOLAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NÚMERO DE EPISODIOS DE AGORAFOBIA (MEDIA)	PSICOSIS CON CONVENCIMIENTO Y AL MENOS UN MES	7,67	7,2	-6,7 ; 22,0	1,32	93,5
	TOTAL	2,01	0,2	1,7 ; 2,3	1,16	8,3
	LIMA CENTRO	2,11	0,6	1,0 ; 3,2	1,30	26,7
	LIMA NORTE	2,15	0,2	1,7 ; 2,6	2,09	11,4
	LIMA ESTE	1,65	0,3	1,1 ; 2,2	0,79	16,1
	LIMA SUR	1,85	0,2	1,4 ; 2,2	0,84	10,8
NÚMERO DE EPISODIOS DE TRASTORNO DE PÁNICO (MEDIA)	CALLAO	3,35	1,2	1,0 ; 5,7	1,59	35,3
	TOTAL	1,77	0,2	1,3 ; 2,3	1,08	13,3
	LIMA CENTRO	2,22	0,8	0,5 ; 3,9	1,80	35,3
	LIMA NORTE	1,67	0,0	1,7 ; 1,7	0,0	0,0
	LIMA ESTE	1,62	0,5	0,6 ; 2,6	1,03	29,4
	LIMA SUR	1,59	0,4	0,8 ; 2,4	0,62	24,3
NÚMERO DE EPISODIOS DE FOBIA SOCIAL (MEDIA)	CALLAO	1,82	0,2	1,4 ; 2,2	1,05	10,9
	TOTAL	1,85	0,2	1,5 ; 2,2	1,18	9,6
	LIMA CENTRO	1,67	0,4	0,9 ; 2,4	1,50	23,1
	LIMA NORTE	1,77	0,3	1,2 ; 2,3	1,97	15,4
	LIMA ESTE	2,03	0,3	1,4 ; 2,7	1,08	16,1
	LIMA SUR	1,14	0,1	1,0 ; 1,3	0,47	6,8
NÚMERO DE EPISODIOS DE TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (MEDIA)	CALLAO	3,02	1,6	-0,2 ; 6,3	1,09	53,8
	TOTAL	1,76	0,3	1,0 ; 2,5	1,00	19,0
	LIMA CENTRO	1,38	0,4	0,5 ; 2,2	1,45	26,6
	LIMA NORTE	1,93	0,6	0,6 ; 3,3	1,82	29,4
	LIMA ESTE	3,35	1,9	-1,2 ; 7,9	1,11	57,8
	LIMA SUR	1,64	0,7	0,0 ; 3,3	1,08	42,4
NÚMERO DE EPISODIOS DE TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA (MEDIA)	CALLAO	1,00	0,0	1,0 ; 1,0	0,0	0,0
	TOTAL	1,41	0,1	1,2 ; 1,6	1,63	7,1
	LIMA CENTRO	1,38	0,1	1,2 ; 1,6	1,31	8,4
	LIMA NORTE	1,62	0,5	0,7 ; 2,6	1,80	29,1
	LIMA ESTE	1,46	0,1	1,2 ; 1,7	1,16	7,6
	LIMA SUR	1,20	0,1	1,0 ; 1,4	1,32	8,2
NÚMERO DE EPISODIOS DE TRASTORNO DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO (MEDIA)	CALLAO	1,51	0,2	1,1 ; 1,9	1,06	12,4
	TOTAL	1,31	0,1	1,2 ; 1,4	1,18	4,0
	LIMA CENTRO	1,14	0,1	1,0 ; 1,3	1,98	6,3
	LIMA NORTE	1,49	0,2	1,2 ; 1,8	1,46	10,6
	LIMA ESTE	1,26	0,1	1,1 ; 1,4	0,85	6,2
	LIMA SUR	1,34	0,1	1,1 ; 1,5	0,99	7,9
	CALLAO	1,32	0,1	1,1 ; 1,6	0,79	10,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
NÚMERO DE EPISODIOS DEL EPISODIO DEPRESIVO (MEDIA)	TOTAL	1,52	0,0	1,5 ; 1,6	1,30	2,4
	LIMA CENTRO	1,54	0,8	1,4 ; 1,7	1,51	5,3
	LIMA NORTE	1,42	0,1	1,3 ; 1,6	1,56	4,9
	LIMA ESTE	1,62	0,1	1,5 ; 1,8	1,14	5,4
	LIMA SUR	1,53	0,1	1,4 ; 1,6	1,19	4,2
	CALLAO	1,50	0,1	1,3 ; 1,7	1,13	6,1
NÚMERO DE EPISODIOS DE DISTIMIA (MEDIA)	TOTAL	1,17	0,1	1,0 ; 1,3	1,04	6,1
	LIMA CENTRO	1,00	0,0	1,0 ; 1,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	1,00	0,0	1,0 ; 1,0	0,0	0,0
	LIMA ESTE	1,26	0,1	1,0 ; 1,5	1,24	10,9
	LIMA SUR	1,37	0,3	0,8 ; 1,9	1,39	19,9
	CALLAO	1,00	0,0	1,0 ; 1,0	0,0	0,0
NÚMERO DE EPISODIOS DE TRASTORNO BIPOLAR (MEDIA)	TOTAL	4,25	3,4	-10,5 ; 19,0	1,42	80,5
	LIMA CENTRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	6,75	6,8	-22,4 ; 35,9	2,09	100,4
	LIMA ESTE	1,63	0,5	-0,4 ; 3,6	0,86	28,8
	LIMA SUR	1,00	0,0	1,0 ; 1,0	-	0,0
	CALLAO	1,00	0,0	1,0 ; 1,0	-	0,0
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN LA ÚLTIMA VEZ QUE RECIBIÓ ALGUNA ATENCIÓN MÉDICA O PSICOLÓGICA (TOTAL)	AGORAFOBIA	6,7%	4,0	2,0 ; 20,2	0,57	59,9
	TRASTORNO DE PÁNICO	26,5%	14,4	7,8 ; 60,5	0,85	54,1
	FOBIA SOCIAL	0,9%	0,9	0,1 ; 6,5	0,36	101,1
	TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO	16,9%	12,5	3,4 ; 53,7	0,55	73,8
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	19,9%	6,8	9,6 ; 36,5	1,11	34,4
	TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO	6,9%	4,2	2,0 ; 21,0	1,04	61,1
	EPISODIO DEPRESIVO MOD. A SEVERO	23,1%	3,2	17,5 ; 29,9	1,66	13,7
	DISTIMIA	22,7%	14,1	5,7 ; 58,7	1,25	62,0
	EPISODIO PSICÓTICO	12,7%	6,7	4,3 ; 32,3	1,13	52,6
	USO PERJUDICIAL Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL	3,1%	1,6	1,1 ; 8,4	1,17	52,1
	TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO	25,2%	25,8	2,0 ; 84,6	0,49	106,1
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN LA ÚLTIMA VEZ QUE RECIBIÓ ALGUNA ATENCIÓN MÉDICA O PSICOLÓGICA (LIMA CENTRO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	49,2%	19,0	17,9 ; 81,1	1,21	38,6
	EPISODIO DEPRESIVO MOD. A SEVERO	43,9%	9,8	26,5 ; 63,0	1,90	22,2
	DISTIMIA	69,1%	27,5	15,2 ; 96,5	1,07	39,8
	EPISODIO PSICÓTICO	17,7%	13,9	3,2 ; 58,3	1,45	78,5
	USO PERJUDICIAL Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL	18,6%	10,8	5,3 ; 48,0	1,17	57,9
	TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO	25,2%	25,8	2,0 ; 84,6	0,49	106,1
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN LA ÚLTIMA VEZ QUE RECIBIÓ ALGUNA ATENCIÓN MÉDICA O PSICOLÓGICA (LIMA NORTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	21,9%	12,4	6,4 ; 53,7	0,85	56,4
	EPISODIO DEPRESIVO MOD. A SEVERO	22,7%	6,9	12,0 ; 38,8	1,80	30,3
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN LA ÚLTIMA VEZ QUE RECIBIÓ ALGUNA ATENCIÓN MÉDICA O PSICOLÓGICA (LIMA ESTE)	AGORAFOBIA	4,2%	4,3	0,5 ; 26,3	0,41	102,2
	TRASTORNO DE PÁNICO	58,8%	34,4	8,1 ; 95,9	0,82	58,6
	FOBIA SOCIAL	2,2%	2,2	0,3 ; 14,6	0,36	101,4
	TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA	10,5%	7,3	2,5 ; 35,1	0,74	69,8
	TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO	15,3%	10,8	3,4 ; 48,1	1,18	70,6
	EPISODIO DEPRESIVO MOD. A SEVERO	14,1%	4,0	7,9 ; 23,7	1,10	28,1
	EPISODIO PSICÓTICO	18,2%	12,8	4,0 ; 54,5	0,71	70,2
	USO PERJUDICIAL Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL	3,1%	1,6	1,1 ; 8,4	1,17	52,1
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN LA ÚLTIMA VEZ QUE RECIBIÓ ALGUNA ATENCIÓN MÉDICA O PSICOLÓGICA (LIMA SUR)	AGORAFOBIA	23,3%	16,5	4,7 ; 64,9	0,72	70,6
	TRASTORNO DE PÁNICO	43,0%	24,9	9,3 ; 84,7	0,67	57,9
	TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO	36,6%	32,9	3,4 ; 90,3	0,66	90,0
	TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO	8,1%	8,3	1,0 ; 43,9	0,68	102,0
	EPISODIO DEPRESIVO MOD. A SEVERO	13,9%	4,7	7,0 ; 25,7	1,16	33,6
	EPISODIO PSICÓTICO	4,1%	4,3	0,5 ; 27,3	0,29	106,6
	USO PERJUDICIAL Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL	5,3%	5,2	0,7 ; 29,7	1,32	97,1
	TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO	16,9%	12,5	3,4 ; 53,7	0,55	73,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN CON TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS EN LA ÚLTIMA VEZ QUE RECIBIÓ ALGUNA ATENCIÓN MÉDICA O PSICOLÓGICA (CALLAO)	AGORAFOBIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EPISODIO DEPRESIVO MOD. A SEVERO	36,2%	9,9	19,6 ; 56,8	1,20	27,3
	DISTIMIA	100,0%	0,0	100,0 ; 100,0	0,0	0,0
	EPISODIO PSICÓTICO	22,4%	24,7	1,7 ; 82,5	0,31	110,5
USO DE SUSTANCIAS NOCIVAS						
CONSUMO DE CUALQUIER SUSTANCIA NO ALCOHÓLICA EN GENERAL (LEGAL E ILEGAL) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	64,7%	1,0	62,6 ; 66,7	2,07	1,6
	PREVALENCIA ANUAL	21,2%	0,8	19,6 ; 22,9	1,86	4,0
	PREVALENCIA MENSUAL	13,8%	0,7	12,5 ; 15,2	1,79	5,0
CONSUMO DE CUALQUIER SUSTANCIA NO ALCOHÓLICA EN GENERAL (LEGAL E ILEGAL) (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	62,8%	3,1	56,5 ; 68,6	3,09	4,9
	PREVALENCIA ANUAL	19,9%	2,3	15,7 ; 24,8	2,59	11,7
	PREVALENCIA MENSUAL	15,8%	2,2	11,9 ; 20,7	2,86	14,1
CONSUMO DE CUALQUIER SUSTANCIA NO ALCOHÓLICA EN GENERAL (LEGAL E ILEGAL) (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	61,0%	2,1	56,8 ; 65,0	2,15	3,4
	PREVALENCIA ANUAL	22,4%	1,8	19,0 ; 26,1	2,23	8,1
	PREVALENCIA MENSUAL	13,9%	1,5	11,3 ; 17,1	2,16	10,6
CONSUMO DE CUALQUIER SUSTANCIA NO ALCOHÓLICA EN GENERAL (LEGAL E ILEGAL) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	64,9%	1,8	61,2 ; 68,4	1,59	2,8
	PREVALENCIA ANUAL	20,9%	1,6	18,1 ; 24,0	1,57	7,2
	PREVALENCIA MENSUAL	12,3%	1,1	10,3 ; 14,7	1,23	9,0
CONSUMO DE CUALQUIER SUSTANCIA NO ALCOHÓLICA EN GENERAL (LEGAL E ILEGAL) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	69,1%	1,8	65,4 ; 72,6	1,45	2,7
	PREVALENCIA ANUAL	22,6%	1,7	19,5 ; 26,0	1,46	7,4
	PREVALENCIA MENSUAL	14,6%	1,2	12,3 ; 17,2	1,14	8,6
CONSUMO DE CUALQUIER SUSTANCIA NO ALCOHÓLICA EN GENERAL (LEGAL E ILEGAL) (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	67,9%	3,1	61,5 ; 73,7	2,12	4,6
	PREVALENCIA ANUAL	18,5%	2,2	14,6 ; 23,1	1,48	11,7
	PREVALENCIA MENSUAL	12,1%	1,7	9,0 ; 15,9	1,37	14,5
CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES NO ALCOHÓLICAS (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	64,4%	1,0	62,3 ; 66,4	2,07	1,6
	PREVALENCIA ANUAL	20,9%	0,8	19,3 ; 22,6	1,87	4,0
	PREVALENCIA MENSUAL	13,7%	0,7	12,4 ; 15,2	1,81	5,1
CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES NO ALCOHÓLICAS (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	62,4%	3,1	56,3 ; 68,2	3,03	4,9
	PREVALENCIA ANUAL	19,8%	2,3	15,6 ; 24,7	2,59	11,7
	PREVALENCIA MENSUAL	15,8%	2,2	11,9 ; 20,7	2,86	14,1
CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES NO ALCOHÓLICAS (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	60,4%	2,1	56,3 ; 64,5	2,15	3,5
	PREVALENCIA ANUAL	22,3%	1,8	18,9 ; 26,0	2,23	8,1
	PREVALENCIA MENSUAL	13,9%	1,5	11,3 ; 17,1	2,16	10,6
CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES NO ALCOHÓLICAS (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	64,9%	1,8	61,2 ; 68,4	1,59	2,8
	PREVALENCIA ANUAL	20,4%	1,5	17,7 ; 23,4	1,41	7,1
	PREVALENCIA MENSUAL	12,3%	1,1	10,3 ; 14,7	1,23	9,0
CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES NO ALCOHÓLICAS (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	68,8%	1,9	65,0 ; 72,4	1,48	2,7
	PREVALENCIA ANUAL	22,0%	1,7	18,9 ; 25,5	1,48	7,6
	PREVALENCIA MENSUAL	14,6%	1,2	12,3 ; 17,2	1,14	8,6
CONSUMO DE SUSTANCIAS LEGALES NO ALCOHÓLICAS (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	67,8%	3,1	61,4 ; 73,6	2,12	4,6
	PREVALENCIA ANUAL	17,9%	2,2	13,9 ; 22,6	1,60	12,4
	PREVALENCIA MENSUAL	11,4%	1,8	8,4 ; 15,4	1,48	15,5
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES NO ALCOHÓLICAS (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	7,1%	0,5	6,2 ; 8,1	1,65	7,0
	PREVALENCIA ANUAL	1,2%	0,2	0,8 ; 1,7	1,68	17,9
	PREVALENCIA MENSUAL	0,4%	0,1	0,2 ; 0,7	1,79	33,1
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES NO ALCOHÓLICAS (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	7,4%	1,5	5,0 ; 10,8	2,41	19,9
	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,4	0,5 ; 2,1	1,11	38,5
	PREVALENCIA MENSUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 1,3	1,34	80,1
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES NO ALCOHÓLICAS (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	5,7%	0,9	4,1 ; 7,9	1,96	16,5
	PREVALENCIA ANUAL	1,3%	0,5	0,6 ; 2,8	2,25	37,7
	PREVALENCIA MENSUAL	0,5%	0,3	0,1 ; 1,7	2,55	69,0
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES NO ALCOHÓLICAS (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	6,2%	0,8	4,8 ; 8,0	1,16	12,7
	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,4	0,4 ; 2,2	1,79	40,5
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	1,10	64,4
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES NO ALCOHÓLICAS (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	9,2%	1,2	7,1 ; 11,7	1,47	12,7
	PREVALENCIA ANUAL	1,2%	0,4	0,7 ; 2,3	1,14	31,8
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,1	0,0 ; 0,8	0,91	71,2
CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES NO ALCOHÓLICAS (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	8,1%	1,4	5,8 ; 11,2	1,19	16,8
	PREVALENCIA ANUAL	1,4%	0,7	0,5 ; 3,7	1,69	50,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,9%	0,6	0,3 ; 3,2	1,81	63,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONSUMO DE ALCOHOL (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	95,3%	0,5	94,4 ; 96,2	2,05	0,5
	PREVALENCIA ANUAL	71,9%	0,9	70,2 ; 73,7	1,72	1,2
	PREVALENCIA MENSUAL	38,7%	1,0	36,8 ; 40,7	1,87	2,6
CONSUMO DE ALCOHOL (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	95,9%	1,1	93,0 ; 97,6	2,47	1,2
	PREVALENCIA ANUAL	67,0%	2,7	61,5 ; 72,0	2,44	4,0
	PREVALENCIA MENSUAL	42,6%	3,1	36,8 ; 48,7	2,92	7,2
CONSUMO DE ALCOHOL (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	93,0%	1,2	90,2 ; 95,0	2,69	1,3
	PREVALENCIA ANUAL	70,6%	1,8	66,9 ; 74,0	1,89	2,6
	PREVALENCIA MENSUAL	33,5%	2,0	29,7 ; 37,4	2,03	5,8
CONSUMO DE ALCOHOL (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	95,6%	0,6	94,2 ; 96,7	1,01	0,7
	PREVALENCIA ANUAL	74,9%	1,4	72,0 ; 77,6	1,16	1,9
	PREVALENCIA MENSUAL	39,5%	1,7	36,3 ; 42,8	1,24	4,2
CONSUMO DE ALCOHOL (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	97,4%	0,6	95,9 ; 98,3	1,30	0,6
	PREVALENCIA ANUAL	76,5%	1,7	72,9 ; 79,7	1,50	2,2
	PREVALENCIA MENSUAL	42,8%	1,9	39,1 ; 46,6	1,37	4,5
CONSUMO DE ALCOHOL (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	95,8%	1,2	92,6 ; 97,7	1,82	1,3
	PREVALENCIA ANUAL	67,9%	2,6	62,5 ; 72,8	1,51	3,9
	PREVALENCIA MENSUAL	36,1%	3,1	30,2 ; 42,4	2,02	8,7
CONSUMO DE TABACO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	62,6%	1,0	60,6 ; 64,6	2,03	1,7
	PREVALENCIA ANUAL	19,9%	0,8	18,4 ; 21,6	1,86	4,1
	PREVALENCIA MENSUAL	13,3%	0,7	12,0 ; 14,7	1,83	5,2
CONSUMO DE TABACO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	61,7%	3,1	55,4 ; 67,6	3,12	5,0
	PREVALENCIA ANUAL	19,4%	2,3	15,2 ; 24,3	2,61	11,9
	PREVALENCIA MENSUAL	15,6%	2,2	11,7 ; 20,5	2,89	14,3
CONSUMO DE TABACO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	58,0%	2,1	53,8 ; 62,0	2,10	2,9
	PREVALENCIA ANUAL	21,5%	1,8	18,2 ; 25,2	2,24	8,3
	PREVALENCIA MENSUAL	13,4%	1,5	10,8 ; 16,6	2,22	11,0
CONSUMO DE TABACO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	62,4%	1,8	58,8 ; 65,8	1,48	2,9
	PREVALENCIA ANUAL	19,0%	1,4	16,4 ; 21,8	1,30	7,1
	PREVALENCIA MENSUAL	11,7%	1,1	9,8 ; 13,9	1,17	9,0
CONSUMO DE TABACO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	67,6%	1,9	63,9 ; 71,2	1,45	2,8
	PREVALENCIA ANUAL	21,2%	1,7	18,1 ; 24,6	1,53	7,9
	PREVALENCIA MENSUAL	14,3%	1,3	12,0 ; 16,9	1,16	8,8
CONSUMO DE TABACO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	66,6%	3,1	60,2 ; 72,4	2,10	4,7
	PREVALENCIA ANUAL	16,8%	2,1	13,0 ; 21,4	1,56	12,7
	PREVALENCIA MENSUAL	11,4%	1,8	8,3 ; 15,3	1,49	15,6
CONSUMO DE TRANQUILIZANTES (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	1,24	37,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	0,87	55,8
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	1,26	100,0
CONSUMO DE TRANQUILIZANTES (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,5%	0,3	0,1 ; 1,8	1,61	64,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,2	1,26	100,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,2	1,26	100,1
CONSUMO DE TRANQUILIZANTES (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,62	100,0
CONSUMO DE TRANQUILIZANTES (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,55	59,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,3	0,42	70,5
CONSUMO DE TRANQUILIZANTES (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,56	73,5
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,67	100,3
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSUMO DE TRANQUILIZANTES (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	0,85	100,2
CONSUMO DE PASTILLAS PARA DORMIR (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,4%	0,1	0,3 ; 0,7	1,15	24,0
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	1,07	32,9
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,1 ; 0,3	0,94	41,5
CONSUMO DE PASTILLAS PARA DORMIR (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,7	1,37	55,5
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,06	100,6
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,06	100,6
CONSUMO DE PASTILLAS PARA DORMIR (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,1	1,31	51,9
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,64	100,2
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,64	100,2
CONSUMO DE PASTILLAS PARA DORMIR (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,1	1,18	52,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,28	60,2
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	1,38	99,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONSUMO DE PASTILLAS PARA DORMIR (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,7%	0,2	0,3 ; 1,4	0,84	36,6
	PREVALENCIA ANUAL	0,5%	0,2	0,2 ; 1,2	0,95	45,2
	PREVALENCIA MENSUAL	0,3%	0,1	0,1 ; 0,8	0,72	54,6
CONSUMO DE PASTILLAS PARA EL DOLOR DE CABEZA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,8%	0,2	0,5 ; 1,3	2,19	24,6
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	1,43	38,3
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,00	57,2
CONSUMO DE PASTILLAS PARA EL DOLOR DE CABEZA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,3	0,0 ; 1,8	2,00	99,6
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,3	0,0 ; 1,8	2,00	99,6
CONSUMO DE PASTILLAS PARA EL DOLOR DE CABEZA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,1%	0,4	0,56 ; 2,3	1,81	36,5
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	1,19	58,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	1,39	99,8
CONSUMO DE PASTILLAS PARA EL DOLOR DE CABEZA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,2	1,49	63,5
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,52	100,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,52	100,1
CONSUMO DE PASTILLAS PARA EL DOLOR DE CABEZA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	1,8%	0,7	0,8 ; 4,0	2,66	39,6
	PREVALENCIA ANUAL	0,4%	0,3	0,1 ; 1,4	1,48	63,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,76	80,9
CONSUMO DE JARABE PARA LA TOS (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,3	1,06	38,6
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,89	100,1
CONSUMO DE JARABE PARA LA TOS (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,0	1,16	50,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSUMO DE JARABE PARA LA TOS (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,85	72,6
CONSUMO DE JARABE PARA LA TOS (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	0,90	100,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	0,90	100,3
CONSUMO DE ESTIMULANTES (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,1	0,2 ; 0,6	1,25	29,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	0,75	41,9
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	0,81	50,8
CONSUMO DE ESTIMULANTES (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	1,1%	0,5	0,4 ; 2,6	1,66	45,0
CONSUMO DE ESTIMULANTES (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,78	71,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,78	71,7
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,78	71,7
CONSUMO DE ESTIMULANTES (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,1	0,1 ; 0,7	0,63	44,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,84	72,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,84	72,1
CONSUMO DE ESTIMULANTES (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,55	70,6
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,55	70,6
CONSUMO DE ÉXTASIS (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	1,21	38,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,49	100,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,49	100,0
CONSUMO DE ÉXTASIS (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	0,94	63,5
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,49	100,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,49	100,1
CONSUMO DE ÉXTASIS (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,89	100,3
CONSUMO DE ÉXTASIS (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,5	1,36	51,9
CONSUMO DE MARIHUANA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	5,7%	0,5	4,9 ; 6,7	1,74	8,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,2	0,6 ; 1,4	1,69	20,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,3%	0,1	0,1 ; 0,6	1,81	38,8
CONSUMO DE MARIHUANA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	6,5%	1,4	4,2 ; 9,7	2,35	21,1
	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,4	0,5 ; 2,1	1,11	38,5
	PREVALENCIA MENSUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 1,3	1,34	80,1
CONSUMO DE MARIHUANA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	4,7%	0,9	3,2 ; 6,8	2,15	19,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,4	0,3 ; 2,3	2,71	51,7
	PREVALENCIA MENSUAL	0,3%	0,3	0,0 ; 2,0	3,45	99,4
CONSUMO DE MARIHUANA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	5,4%	0,8	4,0 ; 7,1	1,27	14,4
	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,4	0,4 ; 2,2	1,78	40,8
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	1,10	64,4
CONSUMO DE MARIHUANA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	6,9%	1,1	5,1 ; 9,3	1,56	15,2
	PREVALENCIA ANUAL	1,1%	0,4	0,5 ; 2,0	1,10	33,6
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,1	0,0 ; 0,8	0,91	71,2
CONSUMO DE MARIHUANA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	5,6%	1,1	3,8 ; 8,3	1,17	20,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,5	0,3 ; 2,7	1,43	57,9
	PREVALENCIA MENSUAL	0,4%	0,3	0,1 ; 1,9	1,22	78,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONSUMO DE COCAÍNA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	2,2%	0,3	1,7 ; 2,8	1,71	13,1
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,1	0,2 ; 0,7	1,93	37,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	2,58	66,9
CONSUMO DE COCAÍNA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	2,7%	0,9	1,4 ; 5,2	2,43	33,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,45	100,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,45	100,1
CONSUMO DE COCAÍNA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,7%	0,5	0,9 ; 3,1	1,92	30,9
	PREVALENCIA ANUAL	0,7%	0,4	0,2 ; 2,0	2,40	54,7
	PREVALENCIA MENSUAL	0,4%	0,3	0,1 ; 1,8	2,94	82,7
CONSUMO DE COCAÍNA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,6%	0,4	1,0 ; 2,8	1,36	27,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	1,16	66,8
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,48	99,8
CONSUMO DE COCAÍNA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	2,8%	0,7	1,7 ; 4,5	1,60	24,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,2	1,52	100,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,2	1,52	100,0
CONSUMO DE COCAÍNA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	2,8%	0,7	1,7 ; 4,6	0,92	25,9
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,48	100,4
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,0	1,48	100,4
CONSUMO DE PBC (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	1,8%	0,2	1,3 ; 2,3	1,49	13,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	1,66	45,4
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	1,76	49,7
CONSUMO DE PBC (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,8%	0,4	0,3 ; 2,0	1,32	46,0
CONSUMO DE PBC (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,3%	0,4	0,7 ; 2,5	1,83	34,5
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,71	73,8
	PREVALENCIA MENSUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,71	73,8
CONSUMO DE PBC (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	1,6%	0,4	1,0 ; 2,7	1,19	26,0
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,1	0,0 ; 0,6	0,84	70,4
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,78	100,1
CONSUMO DE PBC (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	2,6%	0,6	1,6 ; 4,1	1,34	23,6
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,75	99,5
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,75	99,5
CONSUMO DE PBC (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	3,3%	1,1	1,8 ; 6,2	1,66	31,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,5%	0,5	0,1 ; 3,5	2,38	98,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,5%	0,5	0,1 ; 3,5	2,38	98,1
CONSUMO DE COCAÍNA EN GENERAL (PBC o CLORHIDRATO) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	3,2%	0,3	2,6 ; 3,9	1,52	10,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,4%	0,1	0,2 ; 0,8	1,83	30,9
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,6	2,13	44,3
CONSUMO DE COCAÍNA EN GENERAL (PBC o CLORHIDRATO) (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	3,1%	0,9	1,7 ; 5,6	2,23	30,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,45	100,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,45	100,1
CONSUMO DE COCAÍNA EN GENERAL (PBC o CLORHIDRATO) (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	2,2%	0,6	1,4 ; 3,6	1,73	25,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,8%	0,4	0,3 ; 2,0	2,23	49,5
	PREVALENCIA MENSUAL	0,5%	0,3	0,1 ; 1,7	2,55	69,0
CONSUMO DE COCAÍNA EN GENERAL (PBC o CLORHIDRATO) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	2,7%	0,5	1,8 ; 4,0	1,14	19,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	1,06	56,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 0,9	1,23	73,6
CONSUMO DE COCAÍNA EN GENERAL (PBC o CLORHIDRATO) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	4,0%	0,8	2,8 ; 5,8	1,36	18,9
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,1 ; 1,1	1,25	74,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,75	99,5
CONSUMO DE COCAÍNA EN GENERAL (PBC o CLORHIDRATO) (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	5,1%	1,1	3,3 ; 7,8	1,26	22,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,8%	0,6	0,2 ; 3,3	1,99	71,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,5%	0,5	0,1 ; 3,5	2,38	98,1
CONSUMO DE ALUCINÓGENOS(LSD) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,1 ; 0,3	1,21	43,8
	PREVALENCIA ANUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,49	100,0
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,49	100,0
CONSUMO DE ALUCINÓGENOS(LSD) (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,5%	0,3	0,2 ; 1,7	1,42	59,2
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,49	100,1
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,49	100,1
CONSUMO DE ALUCINÓGENOS(LSD) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,52	99,6
CONSUMO DE ALUCINÓGENOS(LSD) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,1	0,0 ; 0,8	0,92	72,8
CONSUMO DE HOJA DE COCA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	5,5%	0,5	4,7 ; 6,5	1,78	8,3
	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,2	0,7 ; 1,4	1,13	15,7
	PREVALENCIA MENSUAL	0,4%	0,1	0,2 ; 0,6	1,08	25,1
CONSUMO DE HOJA DE COCA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	3,7%	0,9	2,3 ; 5,8	1,63	23,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,10	71,7
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,87	100,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONSUMO DE HOJA DE COCA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	6,0%	1,1	4,2; 8,7	2,67	18,8
	PREVALENCIA ANUAL	1,1%	0,3	0,6 ; 1,9	1,20	30,7
	PREVALENCIA MENSUAL	0,4%	0,2	0,2 ; 1,1	1,07	45,7
CONSUMO DE HOJA DE COCA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	8,1%	0,9	6,4; 10,1	1,25	11,5
	PREVALENCIA ANUAL	1,9%	0,4	1,2 ; 2,9	0,99	21,8
	PREVALENCIA MENSUAL	0,8%	0,3	0,4 ; 1,6	1,07	34,8
CONSUMO DE HOJA DE COCA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	3,8%	0,7	2,6; 5,4	1,26	18,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,4%	0,2	0,17 ; 1,1	1,06	55,6
	PREVALENCIA MENSUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,1	1,32	82,7
CONSUMO DE HOJA DE COCA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	4,5%	1,2	2,7; 7,5	1,57	26,3
	PREVALENCIA ANUAL	1,3%	0,6	0,5 ; 3,2	1,32	45,3
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,37	100,5
CONSUMO DE INHALANTES (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,1	0,1 ; 0,6	2,11	40,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	2,71	100,0
CONSUMO DE INHALANTES (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,3%	0,3	0,0 ; 1,9	2,11	99,5
CONSUMO DE INHALANTES (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,6%	0,4	0,2 ; 2,0	2,69	62,3
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,6	2,71	99,9
CONSUMO DE INHALANTES (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,91	99,7
CONSUMO DE INHALANTES (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	1,20	99,8
CONSUMO DE INHALANTES (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,4%	0,3	0,1 ; 1,8	1,15	79,6
CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,1 ; 0,3	1,09	41,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,3	1,58	73,5
	PREVALENCIA MENSUAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	1,05	100,1
CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,2	0,0 ; 0,9	0,89	74,4
	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,06	100,6
	PREVALENCIA MENSUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,06	100,6
CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,2%	0,2	0,0 ; 1,0	1,60	82,7
	PREVALENCIA ANUAL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,1	1,88	100,0
CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,82	77,5
CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,56	76,8
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE TABACO (MEDIA)	TOTAL	18,53	0,1	18,3 ; 18,8	1,38	0,6
	LIMA CENTRO	17,97	0,3	17,5 ; 18,5	1,27	1,4
	LIMA NORTE	18,56	0,3	18,0 ; 19,1	1,96	1,5
	LIMA ESTE	18,92	0,2	18,6 ; 19,3	1,11	1,0
	LIMA SUR	18,46	0,2	18,0 ; 18,9	1,04	1,2
	CALLAO	18,63	0,4	17,9 ; 19,3	1,30	1,9
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE TRANQUILIZANTES (MEDIA)	TOTAL	26,23	5,9	9,8 ; 42,7	1,55	22,5
	LIMA CENTRO	29,73	13,3	-7,2 ; 66,6	2,09	44,7
	LIMA NORTE	15,00	0,0	15,0 ; 15,0	0,0	0,0
	LIMA ESTE	33,03	3,7	22,7 ; 43,4	0,99	11,3
	LIMA SUR	24,21	4,1	12,7 ; 35,7	0,90	17,1
	CALLAO	25,00	0,0	25,0 ; 25,0	0,0	0,0
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE ESTIMULANTES (MEDIA)	TOTAL	22,04	1,6	18,4 ; 25,6	0,82	7,6
	LIMA CENTRO	20,08	1,8	16,1 ; 24,1	1,32	9,1
	LIMA NORTE	36,51	2,9	30,2 ; 42,9	1,59	8,0
	LIMA ESTE	21,66	2,4	16,5 ; 26,8	0,44	11,0
	LIMA SUR	17,50	0,5	16,4 ; 18,6	1,18	2,9
	CALLAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE ÉXTASIS (MEDIA)	TOTAL	19,59	1,1	17,0 ; 22,2	1,29	5,7
	LIMA CENTRO	21,59	3,2	14,1 ; 29,1	1,29	14,7
	LIMA NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA ESTE	20,00	0,0	20,0 ; 20,0	0,0	0,0
	LIMA SUR	18,60	0,4	17,6 ; 19,6	0,50	2,3
	CALLAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE PBC (MEDIA)	TOTAL	19,27	0,6	18,1 ; 20,4	0,82	3,0
	LIMA CENTRO	22,53	3,5	15,5 ; 29,6	1,29	15,6
	LIMA NORTE	19,52	1,3	16,9 ; 22,1	1,23	6,7
	LIMA ESTE	18,58	0,9	16,8 ; 20,3	1,12	4,7
	LIMA SUR	18,69	0,8	17,0 ; 20,4	1,41	4,5
	CALLAO	19,37	1,7	16,1 ; 22,7	0,58	8,6

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA (MEDIA)	TOTAL	20,20	0,5	19,2 ; 21,2	1,25	2,5
	LIMA CENTRO	20,52	0,8	18,9 ; 22,2	1,08	4,0
	LIMA NORTE	19,91	1,0	17,9 ; 21,9	1,64	5,1
	LIMA ESTE	19,42	0,8	17,9 ; 20,9	0,80	3,9
	LIMA SUR	20,42	1,2	18,0 ; 22,8	1,96	5,9
	CALLAO	20,75	1,7	17,4 ; 24,1	0,84	8,2
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE HOJA DE COCA (MEDIA)	TOTAL	21,84	0,9	20,1 ; 23,6	1,30	4,1
	LIMA CENTRO	18,81	1,6	15,6 ; 22,0	1,06	8,6
	LIMA NORTE	22,80	2,2	18,4 ; 27,2	1,54	9,8
	LIMA ESTE	22,67	1,2	20,2 ; 25,1	1,12	5,5
	LIMA SUR	19,11	2,1	15,0 ; 23,2	1,38	10,9
	CALLAO	23,43	2,2	19,0 ; 27,9	0,87	9,6
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE MARIHUANA (MEDIA)	TOTAL	18,42	0,4	17,7 ; 19,1	1,42	1,9
	LIMA CENTRO	20,35	1,1	18,1 ; 22,6	1,67	5,6
	LIMA NORTE	17,94	0,5	16,9 ; 19,0	1,73	3,1
	LIMA ESTE	18,42	0,7	17,0 ; 19,9	1,61	3,9
	LIMA SUR	18,00	0,5	17,1 ; 18,9	0,91	2,6
	CALLAO	16,91	0,7	15,5 ; 18,3	0,51	4,2
EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE INHALANTES (MEDIA)	TOTAL	17,15	1,1	13,7 ; 20,7	1,24	6,4
	LIMA CENTRO	17,00	0,0	17,0 ; 17,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	17,03	2,1	10,4 ; 23,6	2,00	12,2
	LIMA ESTE	22,00	0,0	22,0 ; 22,0	0,0	0,0
	LIMA SUR	18,00	0,0	18,0 ; 18,0	0,0	0,0
	CALLAO	14,76	0,4	13,6 ; 15,9	0,71	2,5
BEBEDOR RIESGOSO DE ALCOHOL (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	8,8%	0,5	7,8 ; 9,9	1,59	6,1
	LIMA CENTRO	5,8%	1,1	4,0 ; 8,4	1,68	18,8
	LIMA NORTE	6,3%	1,0	4,6 ; 8,5	1,93	9,2
	LIMA ESTE	13,7%	1,3	11,4 ; 16,4	1,47	9,2
	LIMA SUR	8,5%	1,1	6,7 ; 10,8	1,28	12,3
	CALLAO	8,6%	1,6	6,0 ; 12,3	1,51	18,3
CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL (TOTAL)	PREVALENCIA ANUAL	1,6%	0,2	1,2 ; 2,2	1,69	15,2
	PREVALENCIA DE VIDA	4,8%	0,4	4,0 ; 5,6	1,56	8,4
CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,4	0,4 ; 2,2	1,41	44,6
	PREVALENCIA DE VIDA	3,7%	0,8	2,3 ; 5,8	1,55	23,0
CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL (LIMA NORTE)	PREVALENCIA ANUAL	2,3%	0,7	1,3 ; 4,1	2,43	29,6
	PREVALENCIA DE VIDA	5,1%	0,9	3,6 ; 7,3	2,16	18,4
CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL (LIMA ESTE)	PREVALENCIA ANUAL	2,1%	0,5	1,4 ; 3,4	1,29	23,3
	PREVALENCIA DE VIDA	6,7%	0,9	5,2 ; 8,6	1,29	12,8
CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL (LIMA SUR)	PREVALENCIA ANUAL	1,1%	0,4	0,6 ; 2,1	1,02	31,5
	PREVALENCIA DE VIDA	3,9%	0,7	2,7 ; 5,6	1,25	18,4
CONSUMO PERJUDICIAL DE ALCOHOL (CALLAO)	PREVALENCIA ANUAL	0,8%	0,4	0,3 ; 2,4	1,15	53,3
	PREVALENCIA DE VIDA	2,7%	0,7	1,6 ; 4,6	0,95	26,6
DEPENDENCIA DE ALCOHOL (TOTAL)	PREVALENCIA ANUAL	0,9%	0,2	0,6 ; 1,3	1,42	18,8
	PREVALENCIA DE VIDA	2,7%	0,3	2,2 ; 3,3	1,35	10,5
DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA ANUAL	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,08	46,3
	PREVALENCIA DE VIDA	2,3%	0,6	1,4 ; 4,0	1,39	27,6
DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA NORTE)	PREVALENCIA ANUAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	1,11	100,0
	PREVALENCIA DE VIDA	1,1%	0,4	0,5 ; 2,2	1,86	38,2
DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA ESTE)	PREVALENCIA ANUAL	1,8%	0,5	1,0 ; 3,2	1,75	29,5
	PREVALENCIA DE VIDA	3,3%	0,6	2,3 ; 4,8	1,34	19,0
DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA SUR)	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,4	0,5 ; 2,0	1,18	35,5
	PREVALENCIA DE VIDA	3,6%	0,7	2,5 ; 5,3	1,30	19,4
DEPENDENCIA DE ALCOHOL (CALLAO)	PREVALENCIA ANUAL	1,0%	0,4	0,5 ; 2,2	0,78	40,2
	PREVALENCIA DE VIDA	4,1%	0,9	2,6 ; 6,2	0,98	22,1
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (TOTAL)	PREVALENCIA ANUAL	2,5%	0,3	2,0 ; 3,2	1,56	11,7
	PREVALENCIA DE VIDA	7,5%	0,5	6,5 ; 8,5	1,61	6,7
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA ANUAL	1,6%	0,5	0,8 ; 3,1	1,40	33,8
	PREVALENCIA DE VIDA	6,0%	1,2	4,1 ; 8,8	1,82	19,3
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA NORTE)	PREVALENCIA ANUAL	2,4%	0,7	1,4 ; 4,2	2,37	28,6
	PREVALENCIA DE VIDA	6,2%	1,0	4,5 ; 8,5	2,14	16,6
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA ESTE)	PREVALENCIA ANUAL	4,0%	0,7	2,8 ; 5,6	1,37	17,5
	PREVALENCIA DE VIDA	10,0%	1,1	8,1 ; 12,4	1,44	10,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA SUR)	PREVALENCIA ANUAL	2,1%	0,5	1,3 ; 3,4	1,09	23,5
	PREVALENCIA DE VIDA	7,5%	1,0	5,8 ; 9,8	1,36	13,5
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (CALLAO)	PREVALENCIA ANUAL	1,8%	0,6	1,0 ; 3,4	0,91	31,8
	PREVALENCIA DE VIDA	6,8%	1,1	4,9 ; 9,3	0,92	16,3
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE TABACO (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	0,7%	0,2	0,5 ; 1,1	1,38	20,6
	LIMA CENTRO	1,1%	0,4	0,5 ; 2,3	1,17	36,8
	LIMA NORTE	0,7%	0,3	0,3 ; 1,7	1,87	48,0
	LIMA ESTE	0,4%	0,2	0,1 ; 0,9	0,94	48,6
	LIMA SUR	0,6%	0,3	0,2 ; 1,5	1,22	48,2
	CALLAO	1,4%	0,6	0,5 ; 3,4	1,45	46,9
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ESTIMULANTES (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,55	100,0
	LIMA CENTRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA ESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA SUR	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,55	100,0
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ÉXTASIS (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,1	0,49	100,0
	LIMA CENTRO	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,49	100,1
	LIMA NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA ESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE MARIHUANA (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	2,08	47,2
	LIMA CENTRO	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	1,36	99,9
	LIMA NORTE	0,3%	0,3	0,0 ; 2,0	3,45	99,4
	LIMA ESTE	0,2%	0,2	0,0 ; 0,9	1,22	73,7
	LIMA SUR	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,75	99,5
	CALLAO	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,48	100,4
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,24	73,7
	LIMA CENTRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,79	99,6
	LIMA ESTE	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,48	99,8
	LIMA SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	CALLAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE PBC (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,3	1,73	77,9
	LIMA CENTRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	0,2%	0,2	0,0 ; 1,2	2,07	99,4
	LIMA ESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA SUR	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,75	99,5
	CALLAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE COCAÍNA (PBC O CLORHIDRATO) (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,3	1,50	54,1
	LIMA CENTRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA NORTE	0,2%	0,2	0,1 ; 1,1	1,70	76,7
	LIMA ESTE	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,48	99,8
	LIMA SUR	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,75	99,5
	CALLAO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE OTRAS SUSTANCIAS (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	1,05	100,1
	LIMA CENTRO	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,06	100,6
	LIMA NORTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA ESTE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LIMA SUR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE CUALQUIER SUSTANCIA (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	3,2%	0,3	2,6 ; 3,9	1,50	10,1
	LIMA CENTRO	2,6%	0,7	1,6 ; 4,3	1,34	25,7
	LIMA NORTE	3,3%	0,8	2,0 ; 5,2	2,25	23,7
	LIMA ESTE	4,3%	0,7	3,1 ; 5,9	1,31	16,5
	LIMA SUR	2,5%	0,5	1,7 ; 3,8	0,98	20,3
	CALLAO	2,7%	0,8	1,5 ; 4,6	1,04	28,1
DEPENDENCIA DE CUALQUIER SUSTANCIA (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	1,4%	0,2	1,1 ; 1,9	1,38	14,7
	LIMA CENTRO	1,6%	0,5	0,9 ; 3,1	1,38	33,0
	LIMA NORTE	0,6%	0,3	0,2 ; 1,6	1,80	49,0
	LIMA ESTE	2,3%	0,6	1,4 ; 3,6	1,53	24,7
	LIMA SUR	1,2%	0,4	0,7 ; 2,2	1,11	31,5
	CALLAO	1,6%	0,5	0,8 ; 3,0	0,80	32,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
TRASTORNOS CLÍNICOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS						
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	19,9%	1,8	16,6 ; 23,6	1,58	8,9
	25 A 44 AÑOS	27,7%	1,3	25,2 ; 30,2	1,44	4,6
	45 A 64 AÑOS	26,5%	1,5	23,6 ; 29,6	1,44	5,7
	>65 AÑOS	28,7%	2,2	24,7 ; 33,1	1,39	7,5
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	23,4%	6,8	12,7 ; 39,1	2,61	29,0
	25 A 44 AÑOS	31,8%	3,9	24,7 ; 39,9	1,75	12,3
	45 A 64 AÑOS	24,4%	3,7	17,8 ; 32,4	1,83	15,3
	>65 AÑOS	28,4%	4,5	20,5 ; 37,9	1,65	15,7
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	12,9%	2,9	8,1 ; 19,8	1,76	22,6
	25 A 44 AÑOS	27,6%	2,6	22,8 ; 33,1	1,79	9,5
	45 A 64 AÑOS	22,6%	3,3	16,8 ; 29,8	1,82	14,7
	>65 AÑOS	29,7%	5,1	20,8 ; 40,6	1,79	17,1
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	23,4%	3,2	17,7 ; 30,2	1,25	13,6
	25 A 44 AÑOS	28,5%	2,1	24,5 ; 32,8	1,08	7,5
	45 A 64 AÑOS	30,2%	2,6	25,3 ; 35,6	0,91	8,7
	>65 AÑOS	24,4%	3,9	17,5 ; 32,9	0,85	16,1
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	22,1%	3,5	16,0 ; 29,7	1,29	15,9
	25 A 44 AÑOS	28,5%	2,6	23,7 ; 33,9	1,21	9,2
	45 A 64 AÑOS	30,1%	3,5	23,7 ; 37,3	1,48	11,6
	>65 AÑOS	32,9%	4,7	24,4 ; 42,8	1,18	14,4
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	21,1%	4,8	13,3 ; 31,9	0,99	22,5
	25 A 44 AÑOS	18,2%	3,3	12,6 ; 25,6	1,33	18,1
	45 A 64 AÑOS	24,0%	3,8	17,4 ; 32,1	1,12	15,7
	>65 AÑOS	26,8%	4,8	18,4 ; 37,3	0,94	18,1
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	11,1%	1,4	8,6 ; 14,1	1,60	12,6
	25 A 44 AÑOS	13,2%	0,9	11,5 ; 15,1	1,35	7,0
	45 A 64 AÑOS	11,0%	1,1	9,1 ; 13,3	1,37	9,6
	>65 AÑOS	10,0%	1,5	7,5 ; 13,3	1,45	14,6
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	14,2%	5,9	6,1 ; 29,9	2,87	41,3
	25 A 44 AÑOS	12,2%	2,4	8,2 ; 17,7	1,32	19,5
	45 A 64 AÑOS	7,7%	2,0	4,6 ; 12,6	1,36	25,9
	>65 AÑOS	11,1%	3,0	6,4 ; 18,4	1,53	26,9
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	7,4%	2,4	3,9 ; 13,6	1,87	31,7
	25 A 44 AÑOS	12,5%	2,0	9,2 ; 16,9	1,80	15,6
	45 A 64 AÑOS	12,0%	2,6	7,7 ; 18,1	1,37	21,9
	>65 AÑOS	12,5%	3,7	6,8 ; 21,8	1,84	29,9
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	14,0%	2,5	9,7 ; 19,7	1,18	18,1
	25 A 44 AÑOS	15,7%	1,8	12,4 ; 19,6	1,23	11,7
	45 A 64 AÑOS	14,8%	2,3	10,8 ; 20,0	1,19	15,7
	>65 AÑOS	8,2%	2,5	4,4 ; 14,8	0,86	30,8
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	10,1%	2,4	6,3 ; 15,8	1,11	23,4
	25 A 44 AÑOS	13,8%	1,8	10,6 ; 17,7	1,00	13,2
	45 A 64 AÑOS	11,9%	2,2	8,2 ; 16,8	1,15	18,2
	>65 AÑOS	7,3%	3,0	3,2 ; 15,7	1,52	40,6
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	12,1%	4,3	5,9 ; 23,3	1,26	35,3
	25 A 44 AÑOS	8,9%	2,1	5,6 ; 14,0	0,99	23,6
	45 A 64 AÑOS	6,0%	1,7	3,4 ; 10,4	0,77	28,9
	>65 AÑOS	9,4%	3,4	4,6 ; 18,4	1,04	35,9
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	9,7%	1,4	7,3 ; 12,7	1,70	14,0
	25 A 44 AÑOS	11,1%	0,9	9,5 ; 13,0	1,40	7,9
	45 A 64 AÑOS	9,6%	1,0	7,8 ; 11,8	1,40	10,4
	>65 AÑOS	8,2%	1,4	5,9 ; 11,3	1,48	16,4
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	14,2%	5,9	6,1 ; 29,9	2,87	41,3
	25 A 44 AÑOS	10,5%	2,3	6,8 ; 15,9	1,40	21,8
	45 A 64 AÑOS	7,4%	2,0	4,4 ; 12,4	1,38	26,6
	>65 AÑOS	9,5%	2,9	5,2 ; 16,9	1,63	30,2
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	6,5%	2,3	3,2 ; 12,8	2,02	35,3
	25 A 44 AÑOS	10,4%	1,9	7,2 ; 14,8	2,01	18,2
	45 A 64 AÑOS	10,7%	2,5	6,7 ; 16,7	1,88	23,3
	>65 AÑOS	8,6%	3,1	4,1 ; 16,9	1,75	36,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	12,3%	2,5	8,2 ; 18,0	1,26	20,2
	25 A 44 AÑOS	12,7%	1,7	9,6 ; 16,5	1,33	13,8
	45 A 64 AÑOS	13,0%	2,2	9,2 ; 18,0	1,24	17,3
	>65 AÑOS	7,5%	2,5	3,8 ; 14,1	0,92	33,6
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	8,2%	2,2	4,8 ; 13,6	1,15	26,7
	25 A 44 AÑOS	12,3%	1,6	9,6 ; 15,7	0,82	12,7
	45 A 64 AÑOS	10,1%	2,0	6,8 ; 14,7	1,09	19,5
	>65 AÑOS	6,4%	2,9	2,5 ; 15,1	1,67	45,8
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	9,3%	3,9	4,0 ; 20,3	1,32	41,9
	25 A 44 AÑOS	7,7%	2,0	4,7 ; 12,6	0,99	25,4
	45 A 64 AÑOS	3,9%	1,5	1,8 ; 8,1	0,86	38,4
	>65 AÑOS	8,5%	3,3	3,9 ; 17,6	1,09	38,8
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	7,0%	1,2	5,0 ; 9,8	1,82	17,3
	25 A 44 AÑOS	8,6%	0,8	7,1 ; 10,3	1,48	9,4
	45 A 64 AÑOS	8,2%	1,0	6,5 ; 10,2	1,47	11,7
	>65 AÑOS	6,4%	1,2	4,4 ; 9,3	1,50	18,9
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	12,0%	5,5	4,6 ; 27,6	2,95	46,3
	25 A 44 AÑOS	8,6%	2,2	5,2 ; 13,8	1,48	25,2
	45 A 64 AÑOS	7,4%	2,0	4,4 ; 12,4	1,38	26,6
	>65 AÑOS	8,4%	2,8	4,3 ; 15,7	1,70	33,1
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	4,4%	2,1	1,7 ; 10,8	2,37	46,9
	25 A 44 AÑOS	8,6%	1,8	5,7 ; 12,8	2,06	20,6
	45 A 64 AÑOS	9,7%	2,4	5,9 ; 15,6	1,89	24,7
	>65 AÑOS	5,2%	2,4	2,0 ; 12,5	1,70	46,4
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	10,6%	2,3	6,8 ; 16,0	1,25	21,9
	25 A 44 AÑOS	10,0%	1,6	7,3 ; 13,6	1,36	15,9
	45 A 64 AÑOS	11,3%	2,2	7,7 ; 16,4	1,34	19,4
	>65 AÑOS	5,2%	2,1	2,3 ; 11,2	0,90	40,4
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	4,7%	1,7	2,3 ; 9,5	1,19	36,5
	25 A 44 AÑOS	9,5%	1,4	7,0 ; 12,7	0,88	15,3
	45 A 64 AÑOS	6,0%	1,6	3,6 ; 10,0	1,14	26,4
	>65 AÑOS	5,4%	2,9	1,9 ; 14,8	1,90	53,3
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	3,3%	2,2	0,9 ; 11,9	1,14	67,6
	25 A 44 AÑOS	3,2%	1,5	1,3 ; 7,7	1,28	46,3
	45 A 64 AÑOS	3,9%	1,5	1,8 ; 8,1	0,86	38,4
	>65 AÑOS	7,6%	2,8	3,6 ; 15,4	0,90	37,3
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	8,7%	1,1	6,7 ; 11,2	1,31	13,0
	25 A 44 AÑOS	10,8%	0,9	9,1 ; 12,6	1,50	8,3
	45 A 64 AÑOS	11,4%	1,1	9,4 ; 13,9	1,54	9,9
	>65 AÑOS	10,0%	1,4	7,5 ; 13,1	1,37	14,2
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	9,0%	3,7	4,0 ; 19,3	1,66	40,7
	25 A 44 AÑOS	12,3%	2,9	7,6 ; 19,2	1,95	23,6
	45 A 64 AÑOS	10,1%	2,8	5,7 ; 17,1	2,14	28,0
	>65 AÑOS	12,4%	3,1	7,4 ; 20,0	1,54	25,3
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	6,7%	1,9	3,8 ; 11,7	1,41	29,0
	25 A 44 AÑOS	12,0%	2,0	8,5 ; 16,5	2,00	16,9
	45 A 64 AÑOS	10,6%	2,8	6,2 ; 17,5	2,42	26,7
	>65 AÑOS	8,1%	3,1	3,8 ; 16,7	1,86	38,1
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	8,5%	2,0	5,4 ; 13,3	1,10	23,1
	25 A 44 AÑOS	11,3%	1,4	8,9 ; 14,3	0,90	12,1
	45 A 64 AÑOS	15,2%	2,0	11,6 ; 19,5	0,87	13,2
	>65 AÑOS	9,2%	2,8	5,0 ; 16,5	0,96	30,6
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	10,6%	2,7	6,4 ; 17,1	1,34	25,0
	25 A 44 AÑOS	10,0%	1,8	7,0 ; 14,1	1,29	18,0
	45 A 64 AÑOS	10,5%	2,0	7,1 ; 15,3	1,13	19,4
	>65 AÑOS	9,7%	3,0	5,2 ; 17,5	1,22	31,2
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	10,5%	3,5	5,3 ; 19,6	0,96	33,5
	25 A 44 AÑOS	5,3%	1,6	2,9 ; 9,6	0,95	30,4
	45 A 64 AÑOS	9,9%	2,7	5,7 ; 16,7	1,20	27,3
	>65 AÑOS	9,6%	3,0	5,0 ; 17,4	0,84	31,9
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	2,5%	0,6	1,5 ; 4,0	1,20	24,2
	25 A 44 AÑOS	3,0%	0,4	2,2 ; 3,9	1,21	14,9
	45 A 64 AÑOS	3,4%	0,6	2,4 ; 4,9	1,38	17,8
	>65 AÑOS	2,1%	0,7	1,0 ; 4,2	1,66	35,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	1,6%	1,3	0,3 ; 7,3	1,03	79,6
	25 A 44 AÑOS	2,4%	1,0	1,1 ; 5,3	1,04	41,2
	45 A 64 AÑOS	1,3%	0,8	0,4 ; 4,1	1,12	59,3
	>65 AÑOS	3,3%	1,5	1,3 ; 8,0	1,25	46,6
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	2,8%	1,3	1,1 ; 6,8	1,41	45,7
	25 A 44 AÑOS	2,9%	1,0	1,5 ; 5,7	1,89	34,9
	45 A 64 AÑOS	3,7%	1,6	1,6 ; 8,4	2,02	42,8
	>65 AÑOS	2,6%	2,0	0,6 ; 11,1	2,26	76,4
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	2,8%	1,1	1,3 ; 6,0	0,99	39,4
	25 A 44 AÑOS	4,4%	0,9	2,9 ; 6,6	0,97	20,8
	45 A 64 AÑOS	6,0%	1,5	3,6 ; 9,8	1,16	25,5
	>65 AÑOS	1,3%	1,3	0,2 ; 8,8	1,33	99,6
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	1,6%	1,0	0,5 ; 5,4	1,16	62,8
	25 A 44 AÑOS	2,0%	0,6	1,1 ; 3,6	0,66	29,9
	45 A 64 AÑOS	4,1%	1,3	2,2 ; 7,6	1,12	32,0
	>65 AÑOS	1,8%	1,8	0,3 ; 11,3	2,02	96,6
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	3,8%	2,6	1,0 ; 13,5	1,31	67,5
	25 A 44 AÑOS	1,9%	1,0	0,7 ; 5,2	0,96	52,8
	45 A 64 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,5	0,72	101,0
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	2,4%	0,6	1,4 ; 4,0	1,31	25,7
	25 A 44 AÑOS	2,5%	0,4	1,8 ; 3,5	1,25	16,4
	45 A 64 AÑOS	2,8%	0,5	1,9 ; 4,0	1,29	19,3
	>65 AÑOS	1,6%	0,6	0,7 ; 3,3	1,44	38,6
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	1,6%	1,3	0,3 ; 7,3	1,03	79,6
	25 A 44 AÑOS	1,9%	0,8	0,9 ; 4,4	0,86	41,7
	45 A 64 AÑOS	1,3%	0,8	0,4 ; 4,1	1,12	59,3
	>65 AÑOS	2,9%	1,5	1,1 ; 7,7	1,31	50,7
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	2,4%	1,2	0,9 ; 6,5	1,51	50,9
	25 A 44 AÑOS	2,2%	1,0	0,9 ; 5,1	2,20	43,4
	45 A 64 AÑOS	2,9%	1,4	1,1 ; 7,4	2,00	47,8
	>65 AÑOS	0,7%	0,7	0,1 ; 5,2	1,09	100,4
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	2,5%	1,1	1,1 ; 5,7	1,04	42,7
	25 A 44 AÑOS	4,2%	0,9	2,8 ; 6,4	0,98	21,4
	45 A 64 AÑOS	5,3%	1,4	3,2 ; 8,7	1,07	26,1
	>65 AÑOS	1,3%	1,3	0,2 ; 8,8	1,33	99,6
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	2,1%	1,3	0,6 ; 7,0	1,53	63,1
	25 A 44 AÑOS	1,7%	0,6	0,9 ; 3,2	0,68	33,3
	45 A 64 AÑOS	2,6%	0,9	1,3 ; 5,1	0,84	35,5
	>65 AÑOS	1,8%	1,8	0,3 ; 11,3	2,02	96,6
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	3,8%	2,6	1,0 ; 13,5	1,31	67,5
	25 A 44 AÑOS	1,2%	0,7	0,4 ; 4,0	0,84	61,1
	45 A 64 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,5	0,72	101,0
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	1,5%	0,5	0,8 ; 2,7	1,22	31,7
	25 A 44 AÑOS	1,9%	0,4	1,3 ; 2,8	1,37	20,0
	45 A 64 AÑOS	2,3%	0,5	1,5 ; 3,4	1,26	21,2
	>65 AÑOS	1,6%	0,6	0,7 ; 3,3	1,44	38,6
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	1,6%	1,3	0,3 ; 7,3	1,03	79,6
	25 A 44 AÑOS	1,3%	0,7	0,5 ; 3,6	0,90	51,7
	45 A 64 AÑOS	1,3%	0,8	0,4 ; 4,1	1,12	59,3
	>65 AÑOS	2,9%	1,5	1,1 ; 7,7	1,31	50,7
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	1,0%	0,7	0,2 ; 4,1	1,25	71,9
	25 A 44 AÑOS	2,1%	1,0	0,9 ; 5,1	2,27	44,9
	45 A 64 AÑOS	2,0%	1,1	0,7 ; 5,6	1,71	54,2
	>65 AÑOS	0,7%	0,7	0,1 ; 5,2	1,09	100,4
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	2,3%	1,0	0,9 ; 5,5	1,09	46,1
	25 A 44 AÑOS	3,3%	0,8	2,0 ; 5,3	1,00	24,8
	45 A 64 AÑOS	4,2%	1,3	2,3 ; 7,7	1,17	30,8
	>65 AÑOS	1,3%	1,3	0,2 ; 8,8	1,33	99,6
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	0,8%	0,8	0,1 ; 5,8	1,53	99,5
	25 A 44 AÑOS	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	0,51	46,5
	45 A 64 AÑOS	2,4%	1,0	1,1 ; 5,3	1,05	40,9
	>65 AÑOS	1,8%	1,8	0,3 ; 11,3	2,0	96,6

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	2,0%	2,0	0,3 ; 12,7	1,43	97,8
	25 A 44 AÑOS	0,6%	0,4	0,1 ; 2,3	0,52	71,2
	45 A 64 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,5	0,72	101,0
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	10,8%	1,4	8,4 ; 13,8	1,57	12,7
	25 A 44 AÑOS	17,9%	1,1	15,9 ; 20,0	1,38	5,9
	45 A 64 AÑOS	17,8%	1,3	15,4 ; 20,6	1,41	7,3
	>65 AÑOS	23,0%	2,0	19,3 ; 27,1	1,36	8,6
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	13,7%	5,7	5,8 ; 29,2	2,82	41,8
	25 A 44 AÑOS	23,1%	3,3	17,2 ; 30,2	1,54	14,3
	45 A 64 AÑOS	18,6%	3,0	13,3 ; 25,2	1,48	16,3
	>65 AÑOS	23,6%	4,0	16,6 ; 32,4	1,54	17,1
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	5,0%	1,7	2,5 ; 9,7	1,47	34,7
	25 A 44 AÑOS	16,4%	2,1	12,6 ; 21,0	1,72	13,0
	45 A 64 AÑOS	12,0%	2,6	7,8 ; 18,1	1,80	21,4
	>65 AÑOS	23,6%	4,4	16,0 ; 33,3	1,58	18,8
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	13,3%	2,7	8,9 ; 19,5	1,35	19,9
	25 A 44 AÑOS	17,7%	1,8	14,4 ; 21,5	1,09	10,3
	45 A 64 AÑOS	18,4%	2,3	14,2 ; 23,5	1,03	12,8
	>65 AÑOS	19,3%	3,7	13,1 ; 27,7	0,89	19,2
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	12,2%	2,7	7,9 ; 18,5	1,20	21,8
	25 A 44 AÑOS	18,8%	2,3	14,7 ; 23,7	1,27	12,3
	45 A 64 AÑOS	24,2%	3,3	18,2 ; 31,4	1,56	13,8
	>65 AÑOS	25,7%	4,7	17,6 ; 35,8	1,34	18,2
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	13,9%	4,3	7,4 ; 24,8	1,14	31,1
	25 A 44 AÑOS	13,5%	2,7	9,0 ; 19,7	1,13	20,0
	45 A 64 AÑOS	15,9%	3,4	10,3 ; 23,8	1,25	21,3
	>65 AÑOS	21,5%	4,7	13,7 ; 32,0	1,01	21,7
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	5,8%	1,1	4,0 ; 8,3	1,67	18,3
	25 A 44 AÑOS	6,9%	0,7	5,6 ; 8,4	1,46	10,5
	45 A 64 AÑOS	5,2%	0,7	3,9 ; 6,8	1,24	13,7
	>65 AÑOS	7,0%	1,3	4,9 ; 10,0	1,54	18,3
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	11,0%	5,7	3,8 ; 27,8	3,32	51,6
	25 A 44 AÑOS	5,2%	1,6	2,9 ; 9,3	1,24	30,0
	45 A 64 AÑOS	4,4%	1,4	2,3 ; 8,0	1,09	31,4
	>65 AÑOS	6,8%	2,5	3,2 ; 13,9	1,73	37,3
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	1,0%	0,6	0,3 ; 3,4	0,93	62,5
	25 A 44 AÑOS	6,4%	1,5	4,0 ; 10,1	1,99	23,7
	45 A 64 AÑOS	4,0%	1,5	1,9 ; 8,2	1,66	37,0
	>65 AÑOS	9,9%	3,3	5,1 ; 18,5	1,76	33,3
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	6,5%	1,7	3,8 ; 10,8	1,08	26,6
	25 A 44 AÑOS	9,1%	1,5	6,5 ; 12,4	1,29	16,3
	45 A 64 AÑOS	5,7%	1,6	3,2 ; 9,9	1,38	28,6
	>65 AÑOS	5,4%	2,0	2,7 ; 10,8	0,75	35,9
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	6,3%	1,9	3,5 ; 11,3	1,12	30,2
	25 A 44 AÑOS	6,8%	1,5	4,4 ; 10,5	1,32	22,4
	45 A 64 AÑOS	6,8%	1,7	4,2 ; 10,9	1,11	24,4
	>65 AÑOS	6,5%	2,9	2,7 ; 15,1	1,62	44,5
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	10,3%	4,1	4,5 ; 21,5	1,32	39,5
	25 A 44 AÑOS	4,8%	1,4	2,7 ; 8,5	0,78	29,1
	45 A 64 AÑOS	4,8%	1,6	2,5 ; 9,0	0,76	32,2
	>65 AÑOS	4,9%	2,7	1,6 ; 13,8	1,23	55,4
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	4,3%	1,0	2,7 ; 6,6	1,87	22,8
	25 A 44 AÑOS	4,7%	0,6	3,7 ; 6,1	1,51	13,0
	45 A 64 AÑOS	4,1%	0,6	3,0 ; 5,6	1,24	15,4
	>65 AÑOS	5,8%	1,2	3,8 ; 8,7	1,66	21,0
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	11,0%	5,7	3,8 ; 27,8	3,32	51,6
	25 A 44 AÑOS	3,4%	1,3	1,6 ; 7,1	1,29	38,5
	45 A 64 AÑOS	4,1%	1,3	2,2 ; 7,8	1,12	32,7
	>65 AÑOS	5,7%	2,4	2,4 ; 12,8	1,87	42,9
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	0,5%	0,4	0,1 ; 2,0	0,59	72,4
	25 A 44 AÑOS	4,5%	1,4	2,4 ; 8,2	2,39	31,3
	45 A 64 AÑOS	2,8%	1,2	1,2 ; 6,4	1,54	43,2
	>65 AÑOS	7,9%	3,0	3,6 ; 16,3	1,84	38,6

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	4,8%	1,6	2,5 ; 9,0	1,20	32,8
	25 A 44 AÑOS	5,4%	1,2	3,5 ; 8,2	1,29	21,5
	45 A 64 AÑOS	5,0%	1,6	2,7 ; 9,2	1,45	31,3
	>65 AÑOS	4,6%	1,9	2,0 ; 10,2	0,83	41,0
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	3,9%	1,4	1,9 ; 7,9	0,96	36,2
	25 A 44 AÑOS	5,5%	1,3	3,5 ; 8,6	1,11	23,0
	45 A 64 AÑOS	5,9%	1,5	3,5 ; 9,6	1,04	25,6
	>65 AÑOS	5,6%	2,8	2,0 ; 14,6	1,80	51,1
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	6,2%	3,6	2,0 ; 18,2	1,61	57,4
	25 A 44 AÑOS	3,9%	1,3	2,0 ; 7,3	0,78	32,5
	45 A 64 AÑOS	2,0%	1,1	0,7 ; 5,6	0,84	53,4
	>65 AÑOS	4,0%	2,6	1,1 ; 13,4	1,35	64,7
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	2,2%	0,8	1,1 ; 4,4	2,30	35,4
	25 A 44 AÑOS	2,8%	0,5	2,0 ; 4,0	1,67	18,0
	45 A 64 AÑOS	2,8%	0,5	1,9 ; 4,1	1,33	19,5
	>65 AÑOS	3,8%	1,0	2,2 ; 6,4	1,73	26,8
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	8,7%	5,3	2,5 ; 26,1	3,57	60,7
	25 A 44 AÑOS	2,0%	1,0	0,8 ; 5,2	1,23	48,6
	45 A 64 AÑOS	4,1%	1,3	2,2 ; 7,8	1,12	32,7
	>65 AÑOS	5,1%	2,4	2,0 ; 12,3	1,97	46,4
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	0,3%	0,3	0,0 ; 2,0	0,66	100,9
	25 A 44 AÑOS	2,9%	1,2	1,3 ; 6,5	2,69	41,4
	45 A 64 AÑOS	2,8%	1,2	1,2 ; 6,4	1,54	43,2
	>65 AÑOS	4,5%	2,3	1,6 ; 12,0	1,83	52,0
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	2,4%	1,1	1,0 ; 5,9	1,14	45,5
	25 A 44 AÑOS	3,2%	0,9	1,8 ; 5,4	1,19	27,4
	45 A 64 AÑOS	3,1%	1,4	1,3 ; 7,2	1,73	44,2
	>65 AÑOS	2,4%	1,2	0,8 ; 6,5	0,68	52,5
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	1,7%	1,0	0,5 ; 5,2	1,04	57,8
	25 A 44 AÑOS	3,8%	1,1	2,1 ; 6,8	1,26	29,8
	45 A 64 AÑOS	1,7%	0,8	0,7 ; 4,3	0,97	46,3
	>65 AÑOS	2,8%	2,3	0,5 ; 13,3	2,31	82,8
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,4%	0,4	0,1 ; 2,8	0,72	100,8
	45 A 64 AÑOS	2,0%	1,1	0,7 ; 5,6	0,84	53,4
	>65 AÑOS	3,1%	1,9	0,9 ; 9,8	0,91	60,8
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	3,4%	0,9	2,1 ; 5,6	1,80	25,2
	25 A 44 AÑOS	2,9%	0,5	2,1 ; 3,9	1,37	16,1
	45 A 64 AÑOS	2,4%	0,6	1,5 ; 3,8	1,61	23,1
	>65 AÑOS	0,5%	0,3	0,2 ; 1,5	0,87	51,4
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	1,7%	1,7	0,2 ; 11,2	1,73	100,4
	25 A 44 AÑOS	3,0%	1,3	1,3 ; 6,9	1,40	42,4
	45 A 64 AÑOS	1,1%	0,8	0,3 ; 4,4	1,36	69,6
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	3,2%	2,0	0,9 ; 10,3	2,88	61,9
	25 A 44 AÑOS	1,9%	0,8	0,8 ; 4,5	1,96	44,4
	45 A 64 AÑOS	3,6%	1,6	1,4 ; 8,5	2,21	45,5
	>65 AÑOS	0,7%	0,7	0,1 ; 4,8	1,00	98,9
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	6,3%	1,9	3,4 ; 11,2	1,36	30,4
	25 A 44 AÑOS	3,6%	1,0	2,1 ; 6,2	1,35	27,2
	45 A 64 AÑOS	4,1%	1,3	2,2 ; 7,6	1,18	31,3
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	1,2%	1,0	0,3 ; 5,8	1,47	80,7
	25 A 44 AÑOS	3,7%	1,0	2,2 ; 6,4	1,06	27,7
	45 A 64 AÑOS	1,5%	0,9	0,4 ; 5,0	1,50	62,5
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	3,3%	2,2	0,9 ; 11,9	1,14	67,6
	25 A 44 AÑOS	1,6%	0,8	0,6 ; 4,3	0,76	50,3
	45 A 64 AÑOS	0,8%	0,8	0,1 ; 5,7	1,22	100,6
	>65 AÑOS	2,9%	1,7	0,9 ; 8,9	0,81	59,4
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	7,6%	1,2	5,5 ; 10,5	1,75	16,2
	25 A 44 AÑOS	8,4%	0,8	7,0 ; 10,1	1,45	9,4
	45 A 64 AÑOS	7,4%	0,9	5,8 ; 9,4	1,48	12,4
	>65 AÑOS	4,4%	0,9	2,9 ; 6,6	1,22	20,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	4,5%	2,9	1,3 ; 14,8	1,91	63,2
	25 A 44 AÑOS	9,0%	2,4	5,3 ; 15,0	1,73	26,5
	45 A 64 AÑOS	5,2%	1,9	2,5 ; 10,3	1,73	36,2
	>65 AÑOS	3,8%	1,6	1,6 ; 8,3	1,15	41,6
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	6,8%	2,5	3,2 ; 13,8	2,35	37,2
	25 A 44 AÑOS	6,5%	1,6	4,0 ; 10,4	2,14	24,4
	45 A 64 AÑOS	6,7%	2,1	3,5 ; 12,2	2,07	31,7
	>65 AÑOS	3,2%	1,9	1,0 ; 10,1	1,75	60,4
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	9,1%	2,5	5,3 ; 15,3	1,64	27,2
	25 A 44 AÑOS	11,5%	1,6	8,8 ; 14,9	1,15	13,6
	45 A 64 AÑOS	10,7%	2,1	7,3 ; 15,5	1,24	19,2
	>65 AÑOS	3,3%	1,7	1,2 ; 8,7	0,87	50,0
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	10,0%	2,6	5,9 ; 16,4	1,39	26,3
	25 A 44 AÑOS	8,0%	1,6	5,4 ; 11,7	1,20	19,6
	45 A 64 AÑOS	7,0%	1,7	4,3 ; 11,1	1,09	23,9
	>65 AÑOS	3,5%	2,1	1,1 ; 10,7	1,45	58,4
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE ABUSO Y DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN GRUPOS ETARIOS (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	4,5%	2,5	1,5 ; 12,8	1,05	55,3
	25 A 44 AÑOS	5,9%	1,5	3,5 ; 9,6	0,75	25,7
	45 A 64 AÑOS	6,9%	2,5	3,4 ; 13,7	1,38	35,8
	>65 AÑOS	10,9%	3,5	5,7 ; 20,0	1,00	32,3
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	0,5%	0,3	0,2 ; 1,4	1,08	51,0
	25 A 44 AÑOS	1,6%	0,4	1,0 ; 2,5	1,68	24,3
	45 A 64 AÑOS	2,4%	0,5	1,5 ; 3,7	1,58	23,2
	>65 AÑOS	0,8%	0,4	0,4 ; 2,0	1,03	44,6
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	2,4%	1,7	0,6 ; 9,1	3,00	69,5
	45 A 64 AÑOS	4,5%	1,9	2,0 ; 10,0	1,97	41,3
	>65 AÑOS	1,2%	0,8	0,3 ; 4,6	1,00	71,1
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,2	1,08	98,8
	25 A 44 AÑOS	1,3%	0,7	0,4 ; 3,6	1,94	53,5
	45 A 64 AÑOS	1,4%	0,8	0,5 ; 4,0	1,22	55,3
	>65 AÑOS	0,7%	0,7	0,1 ; 4,8	1,01	98,9
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	1,6%	0,6	0,7 ; 3,4	1,18	39,0
	45 A 64 AÑOS	1,1%	0,7	0,4 ; 3,5	1,07	57,3
	>65 AÑOS	0,8%	0,6	0,2 ; 3,3	0,44	75,6
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	1,7%	1,0	0,5 ; 5,3	1,09	59,6
	25 A 44 AÑOS	1,7%	0,7	0,8 ; 3,6	0,92	38,5
	45 A 64 AÑOS	2,9%	1,1	1,3 ; 6,2	1,18	39,5
	>65 AÑOS	1,2%	1,2	0,2 ; 8,2	1,43	100,1
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,9%	0,6	0,2 ; 3,5	0,81	70,6
	45 A 64 AÑOS	2,1%	1,7	0,4 ; 10,0	2,09	82,2
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,09	99,6
	25 A 44 AÑOS	0,6%	0,3	0,3 ; 1,4	1,96	42,5
	45 A 64 AÑOS	1,1%	0,4	0,5 ; 2,1	1,55	34,4
	>65 AÑOS	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	0,89	59,9
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	1,4%	1,4	0,2 ; 9,0	3,39	98,9
	45 A 64 AÑOS	1,8%	1,2	0,5 ; 6,2	1,80	62,8
	>65 AÑOS	1,2%	0,8	0,3 ; 4,6	1,00	71,1
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,2	1,08	98,8
	25 A 44 AÑOS	0,2%	0,2	0,0 ; 1,5	1,08	99,9
	45 A 64 AÑOS	0,6%	0,6	0,1 ; 4,2	1,74	100,3
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,6%	0,4	0,1 ; 2,4	1,48	72,0
	45 A 64 AÑOS	0,9%	0,6	0,2 ; 3,5	1,26	70,7
	>65 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,6	0,52	100,6
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,7%	0,5	0,2 ; 2,9	1,30	69,7
	45 A 64 AÑOS	1,6%	0,9	0,5 ; 5,0	1,45	59,7
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,4%	0,4	0,1 ; 2,9	0,75	100,0
	45 A 64 AÑOS	0,1%	0,1	0,0 ; 1,1	0,22	100,5
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,09	99,6
	25 A 44 AÑOS	0,6%	0,3	0,3 ; 1,4	1,96	42,5
	45 A 64 AÑOS	0,6%	0,3	0,2 ; 1,5	1,60	46,7
	>65 AÑOS	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	0,89	59,9
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	1,4%	1,4	0,2 ; 9,0	3,39	98,9
	45 A 64 AÑOS	1,3%	1,0	0,3 ; 5,8	1,96	79,8
	>65 AÑOS	1,2%	0,8	0,3 ; 4,6	1,00	71,1
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,2	1,08	98,8
	25 A 44 AÑOS	0,2%	0,2	0,0 ; 1,5	1,08	99,9
	45 A 64 AÑOS	0,6%	0,6	0,1 ; 4,2	1,74	100,3
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,6%	0,4	0,1 ; 2,4	1,48	72,0
	45 A 64 AÑOS	0,4%	0,4	0,1 ; 2,9	1,17	100,2
	>65 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,6	0,52	100,6
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,7%	0,5	0,2 ; 2,9	1,30	69,7
	45 A 64 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,2	1,17	99,6
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (CALLAO)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,4%	0,4	0,1 ; 2,9	0,75	100,0
	45 A 64 AÑOS	0,1%	0,1	0,0 ; 1,1	0,22	100,5
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0 ; 0,0	0,00	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	2,32	64,3
	45 A 64 AÑOS	0,5%	0,3	0,2 ; 1,4	1,74	54,0
	>65 AÑOS	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	0,76	73,3
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	1,4%	1,4	0,2 ; 9,0	3,39	98,9
	45 A 64 AÑOS	1,3%	1,0	0,3 ; 5,8	1,96	79,8
	>65 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,7	0,90	99,7
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	45 A 64 AÑOS	0,6%	0,6	0,1 ; 4,2	1,74	100,3
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	0,67	72,3
	45 A 64 AÑOS	0,4%	0,4	0,1 ; 2,9	1,17	100,2
	>65 AÑOS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,6	0,52	100,6
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	18 A 24 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	25 A 44 AÑOS	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	0,51	75,4
	45 A 64 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	>65 AÑOS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
POBREZA Y SALUD MENTAL						
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	30,5%	5,6	20,8 ; 42,3	1,43	18,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	29,0%	1,6	26,0 ; 32,2	1,35	5,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	26,2%	1,2	23,9 ; 28,6	1,76	4,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	21,2%	1,8	17,8 ; 25,0	1,73	8,7
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	22,2%	4,2	15,0 ; 31,4	1,51	18,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	31,2%	3,6	24,5 ; 38,7	2,28	11,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	26,5%	4,3	18,9 ; 35,8	2,30	16,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	21,7%	8,9	9,0 ; 43,7	1,79	41,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	30,1%	3,7	23,4 ; 37,7	1,83	12,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	22,2%	2,3	18,0 ; 27,1	2,02	10,4
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	19,5%	3,8	13,1 ; 28,0	1,81	19,4
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	44,5%	8,5	29,0 ; 61,2	0,68	19,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	30,7%	2,6	25,8 ; 36,1	1,07	8,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	28,0%	2,1	24,1 ; 32,2	1,15	7,4
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	18,0%	2,9	13,0 ; 24,4	1,04	16,1
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	43,6%	12,9	21,7 ; 68,4	1,46	29,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	29,6%	3,3	23,7 ; 36,4	1,20	11,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	29,1%	2,6	24,4 ; 34,4	1,60	8,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	21,2%	4,7	13,5 ; 31,7	1,95	22,0
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	30,8%	17,7	8,0 ; 69,5	0,91	57,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	29,3%	3,8	22,4 ; 37,4	0,76	13,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	20,3%	3,3	14,6 ; 27,5	1,89	16,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	16,3%	3,8	10,2 ; 25,1	0,83	23,2
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	18,8%	4,5	11,4 ; 29,2	1,31	24,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	15,0%	1,3	12,7 ; 17,7	1,38	8,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	11,4%	0,8	9,9 ; 13,0	1,38	6,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	8,0%	1,2	5,9 ; 10,8	1,71	15,2
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	12,1%	3,6	6,6 ; 21,2	1,83	29,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	10,6%	1,9	7,4 ; 14,8	1,35	17,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	10,7%	3,0	6,1 ; 18,1	2,22	27,8
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	18,7%	9,0	6,7 ; 42,3	2,02	48,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	14,9%	2,9	10,1 ; 21,5	1,88	19,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	10,2%	1,6	7,5 ; 13,9	1,87	15,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	9,0%	2,7	5,0 ; 15,8	1,73	29,7
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	26,8%	7,6	14,6 ; 43,9	0,69	28,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	15,4%	2,0	11,8 ; 19,8	1,05	13,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	15,1%	1,7	12,1 ; 18,7	1,21	11,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	9,0%	2,4	5,3 ; 15,0	1,31	26,9
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	18,7%	8,1	7,5 ; 39,7	0,94	43,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	17,2%	2,6	12,7 ; 22,9	1,11	15,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	11,4%	1,4	8,9 ; 14,6	1,04	12,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	3,1%	1,4	1,2 ; 7,6	1,05	47,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	16,9%	15,2	2,4 ; 62,9	1,01	89,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	13,4%	3,4	8,0 ; 21,7	1,09	25,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	7,7%	1,7	5,0 ; 11,8	1,15	21,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	4,5%	2,0	1,9 ; 10,3	0,71	43,5
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	17,4%	4,5	10,3 ; 27,9	1,36	25,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	12,5%	1,2	10,4 ; 15,0	1,42	9,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	9,6%	0,7	8,3 ; 11,2	1,42	7,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	7,2%	1,2	5,2 ; 10,0	1,80	16,4
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	11,0%	3,6	5,7 ; 20,1	1,91	32,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	9,1%	1,8	6,2 ; 13,3	1,41	19,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	10,5%	3,0	5,9 ; 17,9	2,28	28,4
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	18,7%	9,0	6,7 ; 42,3	2,02	48,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	12,3%	2,6	8,0 ; 18,5	1,86	21,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	8,5%	1,5	6,0 ; 12,0	1,96	18,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	7,3%	2,5	3,6 ; 14,1	1,89	34,9
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	23,0%	7,3	11,7 ; 40,2	0,71	31,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	12,3%	1,9	9,0 ; 16,6	1,15	15,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	12,7%	1,6	9,9 ; 16,3	1,29	12,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	8,8%	2,4	5,1 ; 14,9	1,34	27,4
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	16,6%	8,2	5,8 ; 38,8	1,05	49,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	14,1%	2,4	10,0 ; 19,5	1,12	17,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	10,3%	1,3	8,0 ; 13,2	0,96	12,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,6%	1,4	0,9 ; 7,1	1,09	52,1
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	16,9%	15,2	2,4 ; 62,9	1,01	89,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	12,4%	3,3	7,2 ; 20,5	1,08	26,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	5,9%	1,5	3,5 ; 9,7	1,18	25,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,4%	1,4	0,8 ; 7,1	0,61	55,6
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	15,2%	4,2	8,7 ; 25,4	1,34	27,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	9,9%	1,1	7,9 ; 12,3	1,50	11,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	7,4%	0,7	6,2 ; 8,8	1,49	8,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	5,8%	1,1	3,9 ; 8,4	1,92	19,2
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	10,0%	3,5	4,9 ; 19,1	1,98	34,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	8,1%	1,7	5,4 ; 12,0	1,37	20,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	8,9%	2,8	4,7 ; 16,2	2,33	31,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	18,7%	9,0	6,7 ; 42,3	2,02	48,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	10,7%	2,5	6,7 ; 16,8	1,92	23,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	6,5%	1,3	4,3 ; 9,7	1,95	20,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	5,0%	2,3	2,0 ; 11,9	2,17	45,8
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	23,0%	7,3	11,7 ; 40,2	0,71	31,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	9,6%	1,8	6,6 ; 13,9	1,31	19,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	10,7%	1,6	8,0 ; 14,2	1,43	14,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	6,9%	2,3	3,6 ; 13,0	1,49	33,1
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	11,5%	6,0	4,0 ; 29,1	0,76	51,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	9,5%	2,0	6,2 ; 14,3	1,11	21,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	7,0%	1,2	5,0 ; 9,8	1,10	17,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,6%	1,4	0,9 ; 7,1	1,09	52,1
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	9,1%	2,8	4,8 ; 16,3	1,03	31,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	3,1%	1,2	1,4 ; 6,4	1,30	38,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,6%	1,2	0,4 ; 6,6	0,69	72,7
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	11,7%	3,4	6,4 ; 20,3	1,13	29,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	13,4%	1,2	11,3 ; 16,0	1,36	8,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	9,9%	0,8	8,5 ; 11,5	1,53	7,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	8,1%	1,0	6,3 ; 10,3	1,14	12,4
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	12,2%	3,1	7,3 ; 19,7	1,32	25,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	13,0%	2,3	9,1 ; 18,3	1,76	17,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	8,1%	1,9	5,0 ; 12,8	1,20	23,8
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	5,8%	4,0	1,4 ; 20,9	1,14	69,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	13,8%	2,9	9,0 ; 20,5	2,03	21,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	9,2%	1,6	6,5 ; 12,9	2,04	17,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	9,2%	2,4	5,4 ; 15,2	1,42	26,7
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	16,0%	7,1	6,3 ; 35,1	0,88	44,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	14,7%	2,0	11,1 ; 19,1	1,12	14,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	10,2%	1,3	7,9 ; 13,0	1,01	12,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	9,3%	2,0	6,0 ; 14,2	0,90	21,9
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	17,0%	9,2	5,4 ; 42,4	1,29	53,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	13,6%	2,3	9,7 ; 18,7	1,03	16,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	9,5%	1,4	7,1 ; 12,7	1,18	14,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	6,4%	2,0	3,4 ; 11,7	1,02	31,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	30,8%	17,7	8,0 ; 69,5	0,91	57,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	10,1%	2,8	5,7 ; 17,2	0,96	28,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	7,7%	2,1	4,5 ; 13,0	1,74	27,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	5,5%	2,3	2,3 ; 12,4	0,84	42,7
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	1,7%	1,2	0,4 ; 6,7	0,87	71,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,6%	0,7	3,4 ; 6,1	1,18	14,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,5%	0,4	1,9 ; 3,3	1,25	14,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,0%	0,5	1,2 ; 3,2	1,14	25,9
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	5,0%	2,0	2,2 ; 10,9	1,31	41,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,3%	0,6	0,5 ; 3,3	1,10	47,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,7%	0,8	0,7 ; 4,4	1,00	48,5
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	3,9%	1,4	1,9 ; 7,8	1,49	35,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,9%	0,9	1,6 ; 5,2	1,76	30,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,8%	1,4	1,0 ; 7,6	1,51	51,1
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	2,7%	2,4	0,4 ; 14,5	0,52	89,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	5,7%	1,3	3,6 ; 8,9	1,07	23,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	3,7%	0,8	2,5 ; 5,6	0,95	21,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	3,1%	1,3	1,4 ; 6,9	0,99	41,1
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	5,3%	1,5	3,0 ; 9,0	1,00	27,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,9%	0,6	1,0 ; 3,5	0,98	31,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,4	0,74	101,0
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	16,9%	15,2	2,4 ; 62,9	1,01	89,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,7%	0,7	0,1 ; 4,7	0,73	101,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,6%	0,8	0,6 ; 4,4	1,22	50,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,5%	0,6	0,1 ; 4,0	0,45	102,1
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	1,7%	1,2	0,4 ; 6,7	0,87	71,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	3,8%	0,6	2,8 ; 5,2	1,15	16,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,1%	0,3	1,5 ; 2,8	1,24	15,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,8%	0,5	1,1 ; 3,0	1,12	26,8
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,8%	2,0	2,1 ; 10,8	1,33	42,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,9%	0,5	0,3 ; 2,5	0,94	53,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,7%	0,8	0,7 ; 4,4	1,00	48,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	3,2%	1,2	1,5 ; 6,7	1,37	37,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,0%	0,7	1,0 ; 4,1	1,81	36,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,2%	1,3	0,7 ; 6,8	1,55	59,1
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	2,7%	2,4	0,4 ; 14,5	0,52	89,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,5%	1,2	2,7 ; 7,5	1,08	26,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	3,7%	0,8	2,4 ; 5,6	0,95	21,4
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	3,4%	1,3	1,6 ; 7,2	0,95	38,2
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,2%	1,3	2,3 ; 7,6	0,97	30,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,7%	0,6	0,9 ; 3,3	1,04	34,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	16,9%	15,2	2,4 ; 62,9	1,01	89,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,7%	0,7	0,1 ; 4,7	0,73	101,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,2%	0,7	0,4 ; 3,9	1,26	59,4
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,5%	0,6	0,1 ; 4,0	0,45	102,1
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,6%	0,6	0,1 ; 4,3	0,61	98,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,9%	0,5	2,0 ; 4,2	1,21	19,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,7%	0,3	1,2 ; 2,4	1,19	17,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,2%	0,4	0,7 ; 2,2	1,03	31,4
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,4%	2,0	1,8 ; 10,4	1,37	44,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,6%	0,4	0,2 ; 2,2	0,96	64,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,7%	0,8	0,7 ; 4,4	1,00	48,5
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	3,2%	1,2	1,5 ; 6,7	1,37	37,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,5%	0,6	0,7 ; 3,3	1,57	39,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,8	1,08	100,6
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	2,7%	2,4	0,4 ; 14,5	0,52	89,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	3,3%	1,1	1,7 ; 6,2	1,21	32,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	3,2%	0,7	2,1 ; 5,0	0,93	22,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,5%	1,2	1,0 ; 6,4	1,11	48,2
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	1,8%	0,8	0,8 ; 4,2	0,81	43,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,6%	0,6	0,7 ; 3,4	1,25	39,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,7%	0,7	0,1 ; 4,7	0,72	101,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,7%	0,6	0,2 ; 3,2	1,23	77,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,5%	0,6	0,1 ; 4,0	0,45	102,1
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	16,5%	4,4	9,6 ; 26,9	1,36	26,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	19,4%	1,4	16,9 ; 22,2	1,30	7,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	17,7%	1,0	15,8 ; 19,8	1,65	5,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	13,6%	1,5	10,9 ; 16,9	1,73	11,4
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	15,9%	3,7	9,9 ; 24,7	1,55	23,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	22,7%	3,0	17,3 ; 29,2	1,93	13,4
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	20,9%	3,8	14,3 ; 29,4	2,14	18,4
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	8,0%	4,8	2,4 ; 23,7	1,18	59,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	16,8%	2,7	12,1 ; 22,9	1,55	16,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	15,0%	2,0	11,5 ; 19,2	1,95	13,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	8,1%	2,2	4,8 ; 13,5	1,24	26,6
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	25,5%	7,8	13,3 ; 43,4	0,74	30,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	21,3%	2,4	16,9 ; 26,5	1,19	11,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	16,9%	1,7	13,7 ; 20,5	1,15	10,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	9,4%	2,4	5,6 ; 15,2	1,21	25,3
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	29,3%	13,0	10,8 ; 58,7	1,77	44,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	19,4%	2,9	14,3 ; 25,8	1,28	15,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	21,0%	2,3	16,8 ; 26,0	1,63	11,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	15,6%	4,4	8,8 ; 26,2	2,16	27,8
PREVALENCIA GENERAL DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	13,8%	12,9	1,9 ; 57,3	0,86	93,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	25,2%	3,6	18,7 ; 33,0	0,75	14,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	13,2%	2,6	8,9 ; 19,1	1,63	19,4
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	11,3%	3,4	6,2 ; 20,0	0,92	30,1
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	10,1%	3,2	5,3 ; 18,2	1,10	31,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	8,2%	0,9	6,5 ; 10,3	1,32	11,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	5,9%	0,6	4,9 ; 7,2	1,47	9,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	4,1%	0,9	2,6 ; 6,4	1,91	23,0
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	5,7%	2,8	2,2 ; 14,3	2,12	48,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	5,8%	1,5	3,5 ; 9,5	1,48	25,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	6,9%	2,6	3,3 ; 14,1	2,51	37,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	6,8%	4,6	1,7 ; 23,3	1,28	68,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	6,3%	1,8	3,5 ; 10,8	1,58	28,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	5,4%	1,3	3,4 ; 8,5	2,05	23,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,9%	1,2	1,2 ; 6,6	1,05	42,5
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	14,0%	7,0	5,0 ; 33,7	0,94	49,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	8,3%	1,6	5,7 ; 12,1	1,13	19,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	7,4%	1,3	5,3 ; 10,3	1,25	16,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	4,4%	2,0	1,8 ; 10,5	1,75	45,5
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	18,7%	8,1	7,5 ; 39,7	0,94	43,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	10,7%	2,1	7,2 ; 15,6	1,11	19,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	5,9%	1,2	4,0 ; 8,8	1,29	20,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,2%	1,1	0,2 ; 6,4	1,39	86,3
PREVALENCIA GENERAL ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	11,1%	3,1	6,3 ; 18,8	1,06	28,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	4,5%	1,2	2,7 ; 7,6	0,98	26,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,9%	1,7	0,9 ; 9,0	0,84	59,8
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	8,7%	3,1	4,3 ; 16,9	1,17	35,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	5,8%	0,8	4,4 ; 7,7	1,39	14,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	4,5%	0,5	3,6 ; 5,7	1,55	11,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,9%	0,8	1,7 ; 5,0	1,97	27,8
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,7%	2,7	1,5 ; 13,9	2,41	57,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	4,4%	1,3	2,4 ; 7,8	1,52	30,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	6,7%	2,6	3,1 ; 14,0	2,59	38,7
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	6,8%	4,6	1,7 ; 23,3	1,28	68,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	3,7%	1,4	1,7 ; 7,7	1,62	38,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	4,4%	1,2	2,5 ; 7,4	2,25	27,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,1%	0,7	0,4 ; 3,7	0,82	60,0
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	10,2%	6,2	2,9 ; 30,1	0,98	60,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	6,0%	1,5	3,7 ; 9,6	1,25	24,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	5,4%	1,1	3,6 ; 8,0	1,31	20,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,1%	0,9	0,9 ; 4,9	0,77	44,2
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	16,6%	8,2	5,8 ; 38,8	1,05	49,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	7,7%	1,8	4,8 ; 12,1	1,10	23,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	4,9%	1,1	3,2 ; 7,5	1,19	21,3
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,2%	1,1	0,2 ; 6,4	1,39	86,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA GENERAL DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	8,2%	2,8	4,1 ; 15,8	1,15	34,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,8%	1,0	1,4 ; 5,7	1,07	35,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,8%	0,8	0,1 ; 5,2	0,60	95,9
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	7,0%	2,7	3,3 ; 14,4	1,08	38,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	3,7%	0,7	2,6 ; 5,4	1,54	18,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,5%	0,4	1,8 ; 3,5	1,70	16,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,1%	0,7	1,0 ; 4,1	2,28	35,6
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,1%	2,6	1,1 ; 13,8	2,62	64,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	3,6%	1,2	1,8 ; 6,9	1,56	33,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	5,6%	2,4	2,3 ; 12,7	2,69	43,5
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	6,8%	4,6	1,7 ; 23,3	1,28	68,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,8%	1,2	1,2 ; 6,6	1,62	43,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,9%	1,0	1,4 ; 5,7	2,43	35,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,5%	0,5	0,1 ; 3,6	1,02	100,6
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	7,9%	5,8	1,7 ; 29,4	1,10	74,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	3,4%	1,1	1,8 ; 6,4	1,25	32,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	3,1%	0,9	1,8 ; 5,4	1,38	28,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,8%	0,6	0,2 ; 3,2	0,77	72,5
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	11,5%	6,0	4,0 ; 29,1	0,76	51,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,5%	1,6	2,2 ; 9,0	1,43	35,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,9%	0,6	1,0 ; 3,6	1,09	33,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,2%	1,1	0,2 ; 6,4	1,39	86,3
PREVALENCIA GENERAL ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GRUPOS DE POBREZA SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	4,9%	2,1	2,1 ; 11,0	1,00	42,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,2%	0,2	0,0 ; 1,8	0,71	100,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA DE VIDA DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	17,4%	5,2	9,4 ; 29,9	1,82	29,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	7,7%	0,9	6,1 ; 9,8	1,39	12,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	7,4%	0,7	6,2 ; 8,9	1,56	9,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	5,7%	1,0	4,0 ; 8,1	1,67	18,0
PREVALENCIA DE VIDA DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	5,2%	2,1	2,3 ; 11,4	1,38	41,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	7,0%	1,8	4,2 ; 11,5	1,85	25,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	5,3%	1,9	2,6 ; 10,6	1,76	36,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE VIDA DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	24,4%	10,9	9,2 ; 50,9	2,48	44,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	6,7%	1,9	3,9 ; 11,5	1,60	27,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	4,3%	1,1	2,5 ; 7,2	2,10	26,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	6,9%	2,7	3,2 ; 14,4	2,22	38,9
PREVALENCIA DE VIDA DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	16,9%	6,0	8,0 ; 31,9	0,60	35,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	8,7%	1,8	5,7 ; 13,0	1,38	20,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	11,7%	1,7	8,9 ; 15,4	1,44	14,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	6,7%	2,2	3,5 ; 12,4	1,39	32,6
PREVALENCIA DE VIDA DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	14,0%	9,9	3,1 ; 44,8	1,75	70,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	8,8%	2,1	5,5 ; 14,0	1,33	24,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	7,5%	1,3	5,4 ; 10,4	1,18	17,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	4,7%	1,9	2,0 ; 10,3	1,26	41,4
PREVALENCIA DE VIDA DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	13,8%	12,9	1,9 ; 57,3	0,93	57,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	8,5%	2,8	4,5 ; 15,7	1,04	32,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	6,8%	1,6	4,2 ; 10,6	1,13	23,4
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	4,0%	1,7	1,7 ; 9,2	0,63	43,4
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	7,7%	3,7	3,0 ; 18,7	1,82	47,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,6%	0,6	1,7 ; 4,1	1,46	22,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,6%	0,4	1,9 ; 3,4	1,40	15,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,7%	0,7	0,8 ; 3,6	2,19	38,3
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,9%	0,9	0,1 ; 6,5	1,42	100,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,5%	1,0	1,2 ; 5,5	1,52	39,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,6%	0,4	0,1 ; 2,4	0,74	73,7
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	11,9%	8,3	2,8 ; 39,1	2,52	70,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	3,8%	1,6	1,6 ; 8,6	2,03	42,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,4%	0,6	0,6 ; 3,2	1,71	43,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,0%	1,9	0,3 ; 12,5	3,80	97,5
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	12,4%	6,0	4,6 ; 29,6	0,77	48,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,8%	1,0	1,4 ; 5,5	1,15	34,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	4,4%	1,0	2,8 ; 6,9	1,35	23,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	3,5%	2,0	1,2 ; 10,3	2,09	55,7
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,3%	1,0	1,0 ; 5,2	0,98	41,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,4%	0,8	1,2 ; 4,5	1,30	32,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,4%	0,8	0,4 ; 4,5	0,77	60,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA ANUAL DE ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL SEGÚN COBERTURA DE INGRESOS PARA NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,0%	1,4	0,5 ; 7,5	1,05	69,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,0%	0,8	0,9 ; 4,4	0,93	39,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,1%	1,0	0,2 ; 7,0	0,82	97,5
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0 ; 0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,0%	0,5	1,2 ; 3,1	1,27	23,8
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,3%	0,3	0,8 ; 1,9	1,33	21,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,3%	0,4	0,7 ; 2,5	1,26	33,2
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,8%	1,9	0,7 ; 10,0	1,91	67,6
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,5%	1,0	1,1 ; 5,5	1,57	40,7
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,4%	1,2	0,9 ; 6,5	1,59	51,8
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,0%	0,8	0,9 ; 4,5	1,03	42,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	0,85	71,1
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,1%	0,9	0,2 ; 5,2	1,41	78,7
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,0%	0,8	0,9 ; 4,3	1,04	39,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,8%	0,3	0,3 ; 1,8	0,85	45,3
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,5%	0,3	0,1 ; 1,9	0,45	72,8
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	2,3%	1,1	0,9 ; 5,8	1,31	49,1
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	2,3%	0,7	1,2 ; 4,3	1,23	32,5
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,8%	0,5	0,2 ; 2,7	0,47	63,6
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	0,21	97,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,1%	0,9	0,2 ; 5,0	1,92	76,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,5%	1,1	0,3 ; 6,4	0,68	74,5
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0 ; 0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,8%	0,3	0,4 ; 1,6	1,26	38,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,5%	0,2	0,3 ; 0,9	1,26	32,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,8%	0,4	0,3 ; 2,1	1,64	48,5
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	1,0%	1,0	0,1 ; 6,5	1,42	99,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,0%	0,7	0,3 ; 3,5	1,55	64,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,0%	1,2	0,6 ; 6,3	1,76	60,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,8%	0,5	0,2 ; 3,0	1,12	71,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,9%	0,9	0,1 ; 5,8	1,69	98,6
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,8%	0,5	0,2 ; 2,7	1,05	61,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,5%	0,3	0,1 ; 1,6	1,02	62,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,3%	0,3	0,0 ; 2,0	0,52	100,6
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,9%	0,8	0,2 ; 5,0	1,69	88,5
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,9%	0,5	0,3 ; 2,5	1,24	52,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	0,21	97,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,3%	0,3	0,0 ; 1,9	0,76	100,4
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0 ; 0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,5%	0,2	0,2 ; 1,1	1,00	42,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,4%	0,1	0,2 ; 0,8	1,28	37,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,8%	0,4	0,3 ; 2,1	1,64	48,5
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,0%	0,7	0,3 ; 3,5	1,55	64,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	2,0%	1,2	0,6 ; 6,3	1,76	60,7
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,8%	0,5	0,2 ; 3,0	1,12	71,3
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,9%	0,9	0,1 ; 5,8	1,69	98,6
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,8%	0,5	0,2 ; 2,7	1,05	61,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	0,67	72,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,3%	0,3	0,0 ; 2,0	0,52	100,6
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,27	99,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,7%	0,4	0,2 ; 2,3	1,33	60,8
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (CALLAO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	0,21	97,7
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,3%	0,3	0,0 ; 1,9	0,76	100,4
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0 ; 0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	1,00	83,4
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,2%	0,1	0,1 ; 0,6	1,24	46,9
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,7%	0,4	0,2 ; 2,0	1,75	54,4
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	1,0%	0,7	0,3 ; 3,5	1,55	64,2
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	1,5%	1,1	0,4 ; 6,2	1,96	72,8
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,9%	0,9	0,1 ; 5,8	1,69	98,6
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,3%	0,3	0,0 ; 2,4	1,17	100,2
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	0,67	72,6
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,3%	0,3	0,0 ; 2,0	0,52	100,6
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	NO CUBREN NI LAS NECESIDADES BÁSICAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,27	99,9
	CUBREN SÓLO LAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN, VESTIDO	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	0,62	99,3
	CUBREN LAS NECESIDADES BÁSICAS Y OTRAS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	15,3%	1,3	13,0 ; 18,0	1,20	8,3
	NO POBRE (0 NBI)	10,8%	0,7	9,6 ; 12,2	1,55	6,1
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	9,2%	3,1	4,7 ; 17,2	0,79	33,1
	NO POBRE (0 NBI)	10,9%	1,6	8,2 ; 14,5	1,82	14,6
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	13,4%	2,6	9,0 ; 19,5	1,70	19,7
	NO POBRE (0 NBI)	10,7%	1,5	8,2 ; 14,0	2,04	13,7
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	18,9%	2,4	14,5 ; 24,1	1,11	13,0
	NO POBRE (0 NBI)	12,8%	1,3	10,5 ; 15,6	1,21	10,2
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	17,2%	2,6	12,6 ; 22,9	0,94	15,3
	NO POBRE (0 NBI)	10,2%	1,3	7,9 ; 13,1	1,32	12,7
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	12,4%	2,8	7,8 ; 18,9	0,91	22,6
	NO POBRE (0 NBI)	7,3%	1,3	5,1 ; 10,2	0,85	17,6
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	13,3%	1,2	11,1 ; 15,8	1,22	9,1
	NO POBRE (0 NBI)	9,2%	0,6	8,0 ; 10,5	1,59	6,8
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	8,4%	3,1	4,1 ; 16,7	0,85	36,2
	NO POBRE (0 NBI)	9,9%	1,6	7,2 ; 13,5	1,97	16,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	12,0%	2,6	7,8 ; 18,1	1,78	21,4
	NO POBRE (0 NBI)	8,7%	1,4	6,4 ; 11,8	2,13	15,8
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	15,2%	2,3	11,2 ; 20,2	1,16	15,1
	NO POBRE (0 NBI)	11,1%	1,2	8,9 ; 13,8	1,25	11,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	15,0%	2,4	10,9 ; 20,3	0,87	15,9
	NO POBRE (0 NBI)	8,8%	1,1	6,8 ; 11,3	1,18	13,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	11,8%	2,8	7,4 ; 18,4	0,93	23,4
	NO POBRE (0 NBI)	5,2%	1,1	3,3 ; 7,9	0,94	22,2
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	9,8%	1,0	7,9 ; 12,1	1,19	10,7
	NO POBRE (0 NBI)	7,3%	0,6	6,3 ; 8,6	1,67	7,8
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	7,8%	3,0	3,6 ; 16,3	0,91	39,0
	NO POBRE (0 NBI)	8,7%	1,5	6,2 ; 12,1	1,95	17,2
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	8,8%	2,1	5,5 ; 13,9	1,56	23,8
	NO POBRE (0 NBI)	7,3%	1,2	5,2 ; 10,1	2,07	17,1
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	12,6%	2,2	8,9 ; 17,5	1,22	17,3
	NO POBRE (0 NBI)	9,1%	1,2	7,0 ; 11,7	1,40	13,2
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	9,7%	1,9	6,6 ; 14,0	0,76	19,1
	NO POBRE (0 NBI)	6,3%	1,1	4,5 ; 8,7	1,34	16,6
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	7,1%	2,3	3,7 ; 13,2	1,04	32,8
	NO POBRE (0 NBI)	3,1%	0,8	1,8 ; 5,2	0,80	26,8
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	4,6%	0,7	3,3 ; 6,2	1,18	16,0
	NO POBRE (0 NBI)	2,4%	0,3	1,9 ; 3,1	1,34	12,5
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	3,1%	2,1	0,8 ; 11,2	1,03	67,7
	NO POBRE (0 NBI)	2,0%	0,6	1,2 ; 3,5	1,10	27,7
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	3,2%	1,3	1,5 ; 6,8	1,44	39,0
	NO POBRE (0 NBI)	3,0%	0,8	1,7 ; 5,1	2,06	27,2
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	6,6%	1,5	4,1 ; 10,3	1,12	23,6
	NO POBRE (0 NBI)	3,4%	0,6	2,3 ; 4,8	0,95	18,5
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	5,2%	1,7	2,8 ; 9,6	1,07	31,5
	NO POBRE (0 NBI)	1,7%	0,5	1,0 ; 3,0	1,02	28,3
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,9%	1,5	1,0 ; 7,7	0,99	51,5
	NO POBRE (0 NBI)	0,9%	0,5	0,3 ; 2,8	1,09	57,9
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	4,0%	0,7	2,9 ; 5,6	1,14	16,7
	NO POBRE (0 NBI)	2,0%	0,3	1,5 ; 2,6	1,36	13,9
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	3,1%	2,1	0,8 ; 11,2	1,03	67,7
	NO POBRE (0 NBI)	1,8%	0,5	1,0 ; 3,1	1,07	29,1
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,1%	1,0	0,9 ; 5,3	1,36	46,8
	NO POBRE (0 NBI)	2,3%	0,7	1,2 ; 4,3	2,20	32,3
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	5,8%	1,4	3,6 ; 9,2	1,03	24,3
	NO POBRE (0 NBI)	3,2%	0,6	2,2 ; 4,7	0,97	19,1
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	5,4%	1,7	2,9 ; 10,0	1,14	32,1
	NO POBRE (0 NBI)	1,1%	0,4	0,6 ; 2,2	0,96	34,7
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,9%	1,5	1,0 ; 7,7	0,99	51,5
	NO POBRE (0 NBI)	0,6%	0,4	0,1 ; 2,4	1,08	72,2
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,6%	0,6	1,7 ; 3,9	1,18	21,6
	NO POBRE (0 NBI)	1,7%	0,3	1,2 ; 2,2	1,35	15,2
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	3,1%	2,1	0,8 ; 11,2	1,03	67,7
	NO POBRE (0 NBI)	1,6%	0,5	0,8 ; 2,9	1,11	31,7
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	1,3%	0,8	0,4 ; 4,2	1,31	58,0
	NO POBRE (0 NBI)	1,8%	0,6	0,9 ; 3,6	2,03	34,9
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	4,1%	1,3	2,2 ; 7,5	1,19	31,4
	NO POBRE (0 NBI)	2,8%	0,6	1,8 ; 4,2	1,05	21,3
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,3%	1,1	0,9 ; 5,8	1,06	48,0
	NO POBRE (0 NBI)	1,1%	0,4	0,5 ; 2,3	1,15	38,7
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN GENERAL (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,1%	1,3	0,6 ; 6,9	1,04	62,7
	NO POBRE (0 NBI)	0,2%	0,2	0,0 ; 1,2	0,59	99,4
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	7,6%	0,9	6,0 ; 9,6	1,15	12,1
	NO POBRE (0 NBI)	5,9%	0,5	5,0 ; 6,9	1,54	8,5
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,0%	1,2	0,6 ; 6,3	0,50	58,8
	NO POBRE (0 NBI)	6,5%	1,3	4,4 ; 9,5	1,86	19,6
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	6,0%	1,9	3,2 ; 11,0	1,84	31,9
	NO POBRE (0 NBI)	4,9%	1,0	3,4 ; 7,2	1,76	19,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	9,0%	1,7	6,2 ; 12,9	0,98	18,6
	NO POBRE (0 NBI)	6,7%	1,0	5,0 ; 9,0	1,25	14,7
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	9,6%	2,1	6,3 ; 14,6	0,97	21,6
	NO POBRE (0 NBI)	5,9%	1,1	4,1 ; 8,5	1,58	18,7
PREVALENCIA ANUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	7,8%	2,1	4,5 ; 13,0	0,78	27,1
	NO POBRE (0 NBI)	4,9%	1,1	3,2 ; 7,5	0,87	21,8
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	5,8%	0,8	4,3 ; 7,6	1,20	14,3
	NO POBRE (0 NBI)	4,3%	0,4	3,5 ; 5,3	1,67	10,3
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	1,2%	0,9	0,3 ; 5,0	0,46	72,5
	NO POBRE (0 NBI)	5,5%	1,2	3,5 ; 8,5	2,05	22,5
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	4,9%	1,8	2,4 ; 9,8	1,94	36,4
	NO POBRE (0 NBI)	3,3%	0,8	2,0 ; 5,5	2,02	25,5
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	6,1%	1,5	3,8 ; 9,8	1,12	24,6
	NO POBRE (0 NBI)	4,8%	0,9	3,3 ; 6,8	1,29	18,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	7,2%	1,7	4,5 ; 11,3	0,83	23,4
	NO POBRE (0 NBI)	4,8%	1,0	3,2 ; 7,1	1,44	20,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	7,3%	2,1	4,1 ; 12,5	0,80	28,5
	NO POBRE (0 NBI)	2,4%	0,9	1,2 ; 4,9	1,15	36,6
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	3,2%	0,6	2,2 ; 4,6	1,12	18,7
	NO POBRE (0 NBI)	2,7%	0,4	2,1 ; 3,6	1,85	13,8
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,6%	0,6	0,1 ; 4,4	0,45	102,1
	NO POBRE (0 NBI)	4,6%	1,1	2,9 ; 7,4	2,01	24,4
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,9%	1,3	1,2 ; 6,9	1,72	45,2
	NO POBRE (0 NBI)	2,5%	0,8	1,3 ; 4,5	2,20	31,1
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	3,7%	1,1	2,1 ; 6,5	0,92	29,2
	NO POBRE (0 NBI)	2,7%	0,7	1,6 ; 4,3	1,40	25,3
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	4,3%	1,4	2,2 ; 8,0	0,94	33,1
	NO POBRE (0 NBI)	2,3%	0,7	1,2 ; 4,2	1,66	31,6
PREVALENCIA ACTUAL DE TRASTORNOS DEPRESIVOS EN GENERAL (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,8%	1,3	1,1 ; 6,7	0,77	46,3
	NO POBRE (0 NBI)	0,7%	0,4	0,2 ; 2,3	0,92	60,8
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,9%	0,6	1,9 ; 4,4	1,32	21,5
	NO POBRE (0 NBI)	2,4%	0,3	1,8 ; 3,2	1,66	13,9
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	4,2%	2,7	1,1 ; 14,2	1,27	64,9
	NO POBRE (0 NBI)	1,3%	0,5	0,6 ; 2,9	1,45	39,6
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,3%	1,3	0,8 ; 6,7	2,04	55,1
	NO POBRE (0 NBI)	2,4%	0,8	1,2 ; 4,7	2,54	33,8
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	4,5%	1,3	2,6 ; 7,9	1,12	28,7
	NO POBRE (0 NBI)	3,8%	0,8	2,4 ; 5,8	1,49	21,9
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	1,3%	0,8	0,4 ; 4,2	0,91	59,5
	NO POBRE (0 NBI)	2,4%	0,6	1,4 ; 3,9	1,15	25,8
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	2,3%	1,4	0,7 ; 7,2	1,07	60,5
	NO POBRE (0 NBI)	1,7%	0,6	0,8 ; 3,5	0,85	37,5
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,7%	0,3	0,3 ; 1,5	1,02	39,0
	NO POBRE (0 NBI)	0,6%	0,2	0,3 ; 1,0	1,70	28,6
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	NO POBRE (0 NBI)	1,4%	0,7	0,6 ; 3,5	2,14	46,3
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	1,0%	0,7	0,2 ; 3,9	1,43	70,7
	NO POBRE (0 NBI)	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	1,09	100,1
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,4%	0,3	0,1 ; 1,9	0,68	73,1
	NO POBRE (0 NBI)	0,6%	0,3	0,2 ; 1,5	1,05	47,8
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,8%	0,6	0,2 ; 3,2	0,78	69,7
	NO POBRE (0 NBI)	0,7%	0,4	0,2 ; 2,1	1,55	55,1
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,8%	0,6	0,2 ; 3,5	0,59	78,0
	NO POBRE (0 NBI)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,6%	0,3	0,3 ; 1,4	1,03	42,5
	No POBRE (0 NBI)	0,5%	0,2	0,2 ; 0,9	1,75	33,1
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	No POBRE (0 NBI)	1,2%	0,6	0,4 ; 3,3	2,31	52,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	1,0%	0,7	0,2 ; 3,9	1,43	70,7
	No POBRE (0 NBI)	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	1,09	100,1
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,4%	0,3	0,1 ; 1,9	0,68	73,1
	No POBRE (0 NBI)	0,4%	0,2	0,1 ; 1,2	0,95	54,1
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	0,59	96,9
	No POBRE (0 NBI)	0,4%	0,3	0,1 ; 1,6	1,38	65,6
PREVALENCIA DE 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (CALLAO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,8%	0,6	0,2 ; 3,5	0,59	78,0
	No POBRE (0 NBI)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (TOTAL)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,4%	0,2	0,1 ; 1,1	1,15	56,2
	No POBRE (0 NBI)	0,3%	0,1	0,1 ; 0,7	2,14	47,9
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA CENTRO)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	No POBRE (0 NBI)	1,1%	0,6	0,3 ; 3,3	2,48	57,8
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA NORTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,6%	0,6	0,1 ; 4,1	1,69	98,7
	No POBRE (0 NBI)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA ESTE)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,4%	0,3	0,1 ; 1,9	0,68	73,1
	No POBRE (0 NBI)	0,2%	0,2	0,0 ; 0,9	0,95	75,5
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES (LIMA SUR)	POBRE (1 O MÁS NBI)	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	0,59	96,9
	No POBRE (0 NBI)	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,27	99,7
EFECTOS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA POR LIMAS						
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: FAMILIAR DIRECTO (PADRES, ESPOSO(A), HIJOS)	LIMA CENTRO	0,9%	0,7	0,2 ; 4,1	4,17	76,3
	LIMA NORTE	1,4%	0,5	0,8 ; 2,7	1,73	31,6
	LIMA ESTE	1,8%	0,4	1,2 ; 2,8	1,00	22,2
	LIMA SUR	2,2%	0,5	1,4 ; 3,4	1,05	22,9
	CALLAO	1,2%	0,6	0,5 ; 3,0	1,28	47,1
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: OTRO FAMILIAR NO DIRECTO	LIMA CENTRO	2,9%	0,9	1,6 ; 5,1	2,07	30,3
	LIMA NORTE	5,4%	1,0	3,8 ; 7,6	2,11	17,7
	LIMA ESTE	6,2%	0,7	4,9 ; 7,7	0,94	11,5
	LIMA SUR	6,5%	0,9	5,0 ; 8,4	1,13	13,3
	CALLAO	4,5%	1,0	3,0 ; 6,8	1,01	21,2
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: FAMILIAR DESAPARECIDO	LIMA CENTRO	1,2%	0,7	0,4 ; 3,5	2,81	54,2
	LIMA NORTE	2,1%	0,5	1,3 ; 3,5	1,68	25,4
	LIMA ESTE	3,0%	0,5	2,2 ; 4,0	0,79	15,4
	LIMA SUR	3,4%	0,7	2,3 ; 4,9	1,20	19,4
	CALLAO	2,2%	0,6	1,2 ; 3,9	0,94	29,5
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: TESTIGO DE MUERTE VIOLENTA DE ALGUNA PERSONA	LIMA CENTRO	0,9%	0,6	0,2 ; 3,3	3,19	69,6
	LIMA NORTE	2,2%	0,6	1,3 ; 3,8	2,09	27,9
	LIMA ESTE	1,7%	0,4	1,1 ; 2,7	0,91	21,7
	LIMA SUR	2,9%	0,6	1,9 ; 4,3	1,21	21,1
	CALLAO	2,1%	0,7	1,1 ; 3,9	1,07	32,5
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: FAMILIAR DETENIDO	LIMA CENTRO	0,5%	0,3	0,2 ; 1,6	1,35	57,1
	LIMA NORTE	1,9%	0,7	0,9 ; 3,8	2,36	35,3
	LIMA ESTE	1,6%	0,4	1,0 ; 2,5	0,94	23,0
	LIMA SUR	2,1%	0,5	1,3 ; 3,2	0,98	22,4
	CALLAO	0,8%	0,4	0,3 ; 1,9	0,75	43,7
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: FAMILIAR EN PRISIÓN	LIMA CENTRO	0,7%	0,4	0,2 ; 2,3	1,98	60,8
	LIMA NORTE	0,6%	0,2	0,3 ; 1,3	1,11	40,0
	LIMA ESTE	1,1%	0,3	0,7 ; 1,8	0,77	25,1
	LIMA SUR	1,7%	0,5	1,0 ; 2,9	1,19	27,6
	CALLAO	0,9%	0,5	0,3 ; 2,9	1,51	57,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: PÉRDIDA DE BIENES	LIMA CENTRO	0,5%	0,3	0,1 ; 1,9	1,84	70,8
	LIMA NORTE	1,3%	0,4	0,7 ; 2,5	1,72	33,0
	LIMA ESTE	2,0%	0,5	1,3 ; 3,2	1,18	23,0
	LIMA SUR	3,2%	0,7	2,1 ; 4,8	1,33	21,0
	CALLAO	1,4%	0,5	0,6 ; 3,0	1,05	39,4
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: CAMBIO DE RESIDENCIA	LIMA CENTRO	1,0%	0,5	0,4 ; 2,5	1,73	46,8
	LIMA NORTE	2,1%	0,5	1,3 ; 3,4	1,61	25,2
	LIMA ESTE	3,1%	0,5	2,2 ; 4,3	1,07	17,7
	LIMA SUR	4,5%	0,9	3,0 ; 6,7	1,81	20,4
	CALLAO	1,4%	0,5	0,7 ; 3,0	1,00	37,9
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: FUE VÍCTIMA DE ALGÚN ATENTADO VINCULADO AL TERRORISMO	LIMA CENTRO	3,1%	0,9	1,8 ; 5,4	1,87	27,4
	LIMA NORTE	0,9%	0,4	0,4 ; 1,9	1,79	42,0
	LIMA ESTE	1,1%	0,3	0,6 ; 1,9	1,00	28,6
	LIMA SUR	1,3%	0,4	0,7 ; 2,4	1,16	30,5
	CALLAO	0,9%	0,4	0,4 ; 2,1	0,78	41,1
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: AL MENOS UNA SITUACIÓN DE PÉRDIDA PERSONAL	LIMA CENTRO	6,0%	1,6	3,6 ; 9,9	3,27	25,8
	LIMA NORTE	9,6%	1,3	7,4 ; 12,5	2,28	13,4
	LIMA ESTE	10,7%	1,0	8,9 ; 12,8	1,11	9,2
	LIMA SUR	13,5%	1,4	11,0 ; 16,4	1,45	10,1
	CALLAO	7,1%	1,4	4,8 ; 10,4	1,40	19,5
FRECUENCIA DE PÉRDIDAS HUMANAS Y MATERIALES RELACIONADOS CON LA VIOLENCIA EN LA ÉPOCA DEL TERRORISMO: ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	LIMA CENTRO	4,2%	1,4	2,1 ; 8,1	3,96	34,5
	LIMA NORTE	6,9%	1,1	5,1 ; 9,4	2,14	15,6
	LIMA ESTE	8,3%	0,8	6,8 ; 10,0	0,94	9,8
	LIMA SUR	9,7%	1,1	7,7 ; 12,1	1,29	11,5
	CALLAO	6,2%	1,1	4,3 ; 8,8	1,03	18,1
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	34,8%	2,9	29,3 ; 40,7	1,22	8,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	25,4%	0,9	23,6 ; 27,2	1,86	3,7
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	32,1%	13,4	12,4 ; 61,2	2,62	41,7
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	27,4%	2,7	22,5 ; 33,0	2,61	9,7
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	32,0%	6,2	21,3 ; 45,1	1,43	19,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	23,2%	1,9	19,6 ; 27,1	2,25	8,2
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	38,7%	4,8	29,7 ; 48,5	0,89	12,5
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	26,5%	1,5	23,6 ; 29,6	1,22	5,8
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	37,2%	4,9	28,1 ; 47,3	0,93	13,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	27,3%	2,0	23,6 ; 31,4	1,61	7,2
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	26,5%	8,2	13,6 ; 45,1	1,02	31,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	21,5%	2,4	17,2 ; 26,6	1,53	11,1
PREVALENCIA DE ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	16,5%	2,3	12,4 ; 21,6	1,28	14,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	11,4%	0,6	10,3 ; 12,7	1,47	5,3
PREVALENCIA DE ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	13,3%	7,1	4,4 ; 33,8	1,39	53,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,7%	1,5	8,1 ; 13,9	1,66	13,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	16,0%	5,6	7,8 ; 30,0	1,88	34,6
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	11,0%	1,3	8,7 ; 13,9	1,95	12,0
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	19,7%	4,2	12,8 ; 29,3	1,00	21,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	13,9%	1,2	11,7 ; 16,4	1,19	8,6
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	17,1%	4,1	10,5 ; 26,7	1,04	23,8
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	11,1%	1,2	8,9 ; 13,7	1,23	10,9
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,2%	5,2	2,8 ; 25,7	0,97	57,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	8,6%	1,3	6,4 ; 11,5	0,94	14,9
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	15,2%	2,3	11,2 ; 20,3	1,35	15,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,7%	0,6	8,6 ; 10,8	1,50	5,8
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	13,3%	7,1	4,4 ; 33,8	1,39	53,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,7%	1,5	7,2 ; 12,9	1,78	15,1
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	14,8%	5,6	6,7 ; 29,5	2,06	38,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,1%	1,2	7,0 ; 11,8	1,99	13,4
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	18,0%	4,2	11,2 ; 27,7	1,07	23,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	11,6%	1,1	9,6 ; 14,1	1,26	9,8
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	16,0%	4,0	9,7 ; 25,4	1,04	24,8
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,5%	1,1	7,6 ; 11,8	1,08	11,2
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,9%	4,8	1,7 ; 24,4	1,07	69,5
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,9%	1,2	4,9 ; 9,8	1,05	17,7
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	13,2%	2,2	9,4 ; 18,2	1,38	16,8
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,5%	0,5	6,5 ; 8,5	1,54	6,8
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,4%	6,1	3,1 ; 29,5	1,27	58,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	8,6%	1,4	6,2 ; 11,7	1,76	16,0
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	12,7%	5,6	5,1 ; 28,0	2,29	43,9
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,3%	1,1	5,4 ; 9,6	1,83	14,6
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	17,0%	4,1	10,4 ; 26,6	1,07	24,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,4%	1,1	7,4 ; 11,8	1,47	11,9
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	13,7%	3,6	8,0 ; 22,3	0,96	26,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,3%	0,9	4,8 ; 8,3	1,05	13,8
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,4%	4,3	0,6 ; 25,8	1,33	98,5
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,1%	1,0	2,6 ; 6,5	1,04	23,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	19,5%	2,4	15,3 ; 24,6	1,14	12,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,8%	0,6	8,7 ; 11,0	1,61	6,0
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	17,7%	9,5	5,7 ; 43,6	1,97	53,6
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,9%	1,6	8,1 ; 14,5	1,97	14,8
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	15,9%	4,4	9,1 ; 26,4	1,16	27,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,7%	1,3	7,4 ; 12,6	2,21	13,7
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	23,4%	4,5	15,8 ; 33,3	1,01	19,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,5%	1,0	8,7 ; 12,5	1,02	9,4
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	20,5%	4,2	13,5 ; 29,9	0,95	20,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,1%	1,1	7,2 ; 11,6	1,23	12,2
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	16,9%	6,8	7,3 ; 34,4	0,97	40,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,6%	1,6	5,1 ; 11,3	1,54	20,4
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,7%	1,2	2,8 ; 7,8	1,08	26,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,7%	0,3	2,2 ; 3,4	1,33	10,7
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,4%	3,5	0,9 ; 18,9	0,91	78,6
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,0%	0,5	1,2 ; 3,4	1,11	27,1
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,6%	1,8	0,6 ; 10,0	1,10	71,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,1%	0,7	1,9 ; 4,9	1,94	23,5
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,9%	2,8	3,9 ; 15,4	0,95	34,9
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,9%	0,6	2,8 ; 5,3	1,08	16,4
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,9%	2,6	1,7 ; 13,3	1,26	52,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2%	0,5	1,4 ; 3,5	1,00	23,1
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,5%	0,6	0,7 ; 3,3	1,05	38,8
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,3%	1,2	2,5 ; 7,4	1,13	27,8
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,3%	0,3	1,8 ; 2,9	1,30	11,6
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,4%	3,5	0,9 ; 18,9	0,91	78,6
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,8%	0,5	1,0 ; 3,1	1,10	28,6
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,6%	1,8	0,6 ; 10,0	1,10	71,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2%	0,6	1,3 ; 3,9	2,09	28,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,3%	2,7	3,4 ; 14,8	1,00	37,6
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,6%	0,6	2,6 ; 4,9	0,95	16,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,4%	2,5	1,4 ; 13,1	1,37	58,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,8%	0,5	1,1 ; 2,9	1,00	26,1
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,3%	0,5	0,5 ; 2,9	1,05	42,6
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,8%	1,2	2,1 ; 6,8	1,19	30,7
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,7%	0,2	1,3 ; 2,2	1,30	13,5
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,6%	1,6	0,2 ; 11,3	0,55	103,9
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,7%	0,5	1,0 ; 3,0	1,12	29,6
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,6%	1,8	0,6 ; 10,0	1,10	71,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,6%	0,5	0,9 ; 3,1	1,98	32,8
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,8%	2,7	3,1 ; 14,4	1,04	39,7
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,8%	0,5	1,9 ; 4,0	1,03	18,9
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,8%	2,5	1,0 ; 13,1	1,51	65,6
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,1%	0,4	0,5 ; 2,0	1,00	33,6
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DE ANSIEDAD, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,7%	0,4	0,2 ; 2,1	0,99	55,6
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	22,0%	2,5	17,5 ; 27,2	1,14	11,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	16,9%	0,7	15,5 ; 18,4	1,59	4,4
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	17,2%	8,6	6,0 ; 40,5	1,65	49,9
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	20,7%	2,1	16,8 ; 25,2	2,00	10,2
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	24,0%	5,5	15,0 ; 36,3	1,33	22,7
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	13,2%	1,3	10,8 ; 16,1	1,72	10,1
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	20,6%	3,9	13,9 ; 29,3	0,85	19,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	16,8%	1,3	14,4 ; 19,6	1,24	7,9
PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	24,7%	4,5	16,9 ; 34,6	0,99	18,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	19,4%	1,7	16,2 ; 23,1	1,60	9,0
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	17,8%	7,3	7,5 ; 36,7	1,09	41,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	15,5%	1,9	12,1 ; 19,6	1,23	12,2
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	8,4%	1,8	5,5 ; 12,7	1,35	21,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,1%	0,4	5,3 ; 7,0	1,39	7,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,6%	5,0	1,4 ; 25,6	1,28	75,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,1%	1,2	4,1 ; 8,9	1,83	19,7
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,9%	4,7	3,8 ; 23,6	2,01	47,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,8%	0,8	3,5 ; 6,7	1,61	16,9
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	8,8%	3,0	4,4 ; 16,7	1,02	34,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,2%	0,9	5,7 ; 9,1	1,13	12,1
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,5%	3,1	4,9 ; 17,7	1,02	33,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,4%	1,0	4,7 ; 8,7	1,40	15,8
PREVALENCIA ANUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2%	2,2	0,3 ; 14,6	0,68	100,7
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	5,9%	1,0	4,2 ; 8,2	0,80	16,9
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,3%	1,8	4,5 ; 11,5	1,47	24,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,4%	0,4	3,7 ; 5,3	1,48	8,8
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,6%	5,0	1,4 ; 25,6	1,28	75,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	5,1%	1,2	3,2 ; 7,9	2,03	22,8
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	8,7%	4,7	2,9 ; 23,3	2,29	54,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,3%	0,7	2,2 ; 5,1	1,75	21,5
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,7%	2,9	3,6 ; 15,8	1,08	37,9
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,9%	0,8	3,6 ; 6,6	1,23	15,5
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	8,1%	3,0	3,9 ; 16,2	1,05	36,6
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	5,0%	0,9	3,6 ; 7,0	1,26	17,0
PREVALENCIA DE 6 MESES DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,9%	0,9	2,5 ; 6,1	0,97	23,0
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	5,5%	1,6	3,2 ; 9,5	1,49	28,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,6%	0,3	2,1 ; 3,3	1,64	12,2
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,6%	5,0	1,4 ; 25,6	1,28	75,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,2%	1,0	2,5 ; 6,8	1,99	24,9
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,9%	4,7	2,4 ; 23,3	2,48	59,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2%	0,6	1,3 ; 3,7	1,81	27,2
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	5,0%	2,1	2,1 ; 11,3	0,87	42,7
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,7%	0,6	1,8 ; 4,2	1,37	22,1
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	5,3%	2,0	2,5 ; 11,1	0,74	38,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,4%	0,6	1,4 ; 4,0	1,42	26,5
PREVALENCIA ACTUAL DE CUALQUIER TRASTORNO DEPRESIVO, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,3%	0,5	0,6 ; 2,9	0,94	39,5

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,8%	2,1	7,3 ; 15,7	1,50	19,6
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,2%	0,5	6,2 ; 8,3	1,64	7,2
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,9%	8,3	2,3 ; 39,5	2,20	75,8
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	5,8%	1,2	3,9 ; 8,6	1,86	20,3
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,0%	4,8	3,0 ; 23,9	2,24	53,7
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,0%	1,1	4,2 ; 8,4	2,18	17,6
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	13,4%	4,0	7,4 ; 23,2	1,21	29,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,7%	1,1	7,8 ; 12,2	1,40	11,4
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	10,7%	3,6	5,5 ; 20,0	1,18	33,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,2%	1,1	5,4 ; 9,6	1,41	14,9
PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	7,9%	4,0	2,8 ; 20,2	0,66	51,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	6,7%	1,2	4,7 ; 9,5	1,00	17,6
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,6%	1,2	1,9 ; 6,9	1,32	33,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,4%	0,3	1,9 ; 3,1	1,56	12,3
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,6%	0,6	0,8 ; 3,2	1,45	34,4
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,6%	0,7	1,5 ; 4,5	2,38	28,6
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	9,1%	3,4	4,2 ; 18,5	1,29	37,8
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,5%	0,7	2,4 ; 5,1	1,32	19,1
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	3,8%	2,3	1,2 ; 12,0	1,24	59,9
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,0%	0,5	1,2 ; 3,2	1,03	25,1
PREVALENCIA ANUAL DE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,0%	0,6	1,1 ; 3,6	0,90	31,7
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,9%	1,0	1,5 ; 5,7	1,13	33,9
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,4%	0,2	1,0 ; 1,9	1,64	16,9
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,5%	0,8	1,3 ; 4,8	2,09	33,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2%	2,3	0,3 ; 15,7	0,80	104,5
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,0%	1,5	0,4 ; 8,4	0,95	75,5
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,0%	0,4	0,4 ; 2,3	1,95	41,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	4,3%	2,3	1,5 ; 12,0	1,18	53,8
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,8%	0,3	0,4 ; 1,5	0,83	32,7
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,8%	2,1	0,7 ; 11,2	1,36	72,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,9%	0,5	1,1 ; 3,2	1,22	27,9
PREVALENCIA DE VIDA DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,5%	2,4	0,4 ; 15,3	0,71	96,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,9%	0,6	0,2 ; 3,1	1,70	65,8
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,7%	0,8	0,7 ; 4,1	1,13	45,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,5%	0,1	0,3 ; 0,9	1,65	27,5
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2%	2,3	0,3 ; 15,7	0,80	104,5
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,2%	0,6	0,5 ; 3,3	2,27	49,5
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,3%	1,3	0,2 ; 9,1	1,12	100,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	1,47	72,4
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,3%	1,0	0,3 ; 5,5	0,67	74,7
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,5%	0,2	0,2 ; 1,2	1,05	47,4
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,0%	2,0	0,3 ; 12,9	1,77	99,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,6%	0,3	0,2 ; 1,6	1,26	50,7
PREVALENCIA ANUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,5%	2,4	0,4 ; 15,3	0,71	96,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,22	100,1
PREVALENCIA A 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,7%	0,8	0,7 ; 4,1	1,13	45,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,4%	0,1	0,2 ; 0,7	1,74	32,7
REVALENCIA A 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2%	2,3	0,3 ; 15,7	0,80	104,5
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,1%	0,6	0,3 ; 3,1	2,46	56,2
PREVALENCIA A 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,3%	1,3	0,2 ; 9,1	1,12	100,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	1,47	72,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA A 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	1,3%	1,0	0,3 ; 5,5	0,67	74,7
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	0,96	53,4
PREVALENCIA A 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,0%	2,0	0,3 ; 12,9	1,77	99,4
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,88	64,9
PREVALENCIA A 6 MESES DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (CALLAO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,5%	2,4	0,4 ; 15,3	0,71	96,1
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,22	100,1
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (TOTAL)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,4%	0,3	1,9 ; 3,1	1,56	12,3
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,4%	0,3	1,9 ; 3,1	1,56	12,3
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	2,2%	2,3	0,3 ; 15,7	0,80	104,5
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,9%	0,6	0,3 ; 3,1	2,69	63,2
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,2%	0,2	0,0 ; 1,1	1,73	100,0
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,9%	0,9	0,1 ; 6,0	0,79	100,2
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,2%	0,1	0,1 ; 0,7	0,85	62,6
PREVALENCIA ACTUAL DE PSICOSIS CON AL MENOS UN CRITERIO CORREGIDO POR CONVENCIMIENTO Y AL MENOS 1 MES, SEGÚN PÉRDIDAS PERSONALES DURANTE LA ÉPOCA DEL TERRORISMO Y LA SALUD MENTAL (LIMA SUR)	PRESENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	AUSENCIA DE ALGÚN FAMILIAR FALLECIDO O DESAPARECIDO	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,52	75,7
ESTILOS DE CRIANZA (TOTAL)	LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECE	20,0%	0,8	18,6 ; 21,6	1,68	3,9
	LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO	12,8%	0,6	11,6 ; 14,0	1,44	4,8
	SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO	79,2%	0,8	77,6 ; 80,7	1,65	1,0
	EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES	88,9%	0,6	87,7 ; 89,9	1,35	0,6
	LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR	33,0%	1,0	31,0 ; 35,1	2,15	3,1
	ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES	45,0%	1,1	42,9 ; 47,1	2,00	2,4
	LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC	49,1%	1,0	47,1 ; 51,1	1,77	2,0
	SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES	63,7%	1,0	61,8 ; 65,6	1,75	1,5
	LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA	22,2%	0,9	20,5 ; 24,1	2,03	4,0
	SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR	23,9%	0,8	22,3 ; 25,6	1,68	3,5
	LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECE	12,6%	0,6	11,4 ; 13,9	1,52	5,0
	LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO	14,8%	0,6	13,6 ; 16,1	1,44	4,3
	SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO	16,1%	0,7	14,7 ; 17,5	1,57	4,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ESTILOS DE CRIANZA (TOTAL)	LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES	74,7%	0,9	72,9 ; 76,3	1,80	1,2
	SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS	25,1%	0,9	23,3 ; 27,0	2,05	3,7
	LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN	88,8%	0,6	87,5 ; 89,9	1,57	0,7
	LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS)	13,9%	0,7	12,7 ; 15,3	1,60	4,8
	LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO	9,9%	0,6	8,8 ; 11,1	1,73	6,0
ESTILOS DE CRIANZA (LIMA CENTRO)	LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MEREÍA	15,0%	2,0	11,5 ; 19,4	2,44	13,4
	LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO	11,4%	1,7	8,5 ; 15,1	2,06	14,6
	SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO	81,9%	2,2	77,2 ; 85,9	2,53	2,7
	EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES	92,2%	1,2	89,3 ; 94,3	1,64	1,3
	LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR	28,9%	2,9	23,6 ; 34,8	3,09	10,0
	ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES	34,8%	2,8	29,5 ; 40,5	2,69	8,1
	LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC	58,8%	2,6	53,7 ; 63,7	2,06	4,3
	SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES	65,6%	2,6	60,4 ; 70,5	2,26	3,9
	LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA	14,4%	1,8	11,2 ; 18,3	2,02	12,6
	SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR	19,9%	2,1	16,1 ; 24,3	2,00	10,4
	SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES	8,6%	1,3	6,4 ; 11,4	1,49	14,7
	LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS	8,5%	1,2	6,4 ; 11,3	1,52	14,6
	LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS)	11,9%	1,6	9,1 ; 15,4	1,79	13,2
	LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES	81,9%	1,9	77,9 ; 85,4	1,85	2,3
	SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS	18,8%	2,2	14,9 ; 23,5	2,37	11,6
	LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN	91,7%	1,4	88,5 ; 94,1	1,99	1,5
	LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS)	10,3%	1,5	7,7 ; 13,6	1,84	14,6
	LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO	8,1%	1,6	5,5 ; 11,8	2,58	19,5
ESTILOS DE CRIANZA (LIMA NORTE)	LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MEREÍA	20,0%	1,6	16,9 ; 23,4	1,99	8,2
	LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO	12,6%	1,4	10,2 ; 15,5	1,90	10,7
	SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO	82,8%	1,5	79,5 ; 85,6	1,98	1,9
	EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES	92,0%	1,0	89,8 ; 93,9	1,71	1,1
	LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR	29,5%	2,0	25,8 ; 33,5	2,20	6,7
	ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES	39,0%	2,3	34,6 ; 43,6	2,61	5,9
	LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC	53,5%	2,0	49,4 ; 57,4	1,97	3,8
	SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES	63,6%	2,1	59,5 ; 67,6	2,15	3,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ESTILOS DE CRIANZA (LIMA NORTE)	SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES	63,6%	2,1	59,5 ; 67,6	2,15	3,2
	LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA	21,7%	1,9	18,3 ; 25,7	2,48	8,7
	SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR	23,6%	1,9	20,1 ; 27,5	2,33	8,0
	SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES	12,0%	1,4	9,6 ; 14,9	2,01	11,3
	LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS	15,4%	1,5	12,6 ; 18,6	2,07	9,8
	LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS)	17,8%	1,6	14,8 ; 21,2	2,06	9,1
	LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES	77,5%	1,8	73,6 ; 80,9	2,29	2,4
	SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS	26,2%	2,0	22,4 ; 30,2	2,39	7,6
	LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN	90,4%	1,1	88,0 ; 92,4	1,70	1,2
	LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS)	14,7%	1,5	12,0 ; 17,9	2,06	10,2
	LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO	8,2%	1,2	6,1 ; 10,9	2,29	14,7
ESTILOS DE CRIANZA (LIMA ESTE)	LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MEREÍA	22,9%	1,3	20,4 ; 25,6	1,08	5,8
	LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO	13,6%	1,1	11,5 ; 15,9	1,14	8,2
	SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO	73,1%	1,4	70,2 ; 75,7	1,08	1,9
	EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES	83,4%	1,1	81,2 ; 85,4	0,90	1,3
	LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR	36,5%	1,7	33,2 ; 40,0	1,38	4,7
	ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES	50,0%	1,6	46,9 ; 53,0	1,07	3,1
	LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC	41,1%	1,7	37,8 ; 44,5	1,30	4,2
	SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES	59,5%	1,7	56,2 ; 62,8	1,24	2,8
	LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA	26,8%	1,6	23,8 ; 30,0	1,37	5,9
	SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR	25,3%	1,5	22,6 ; 28,3	1,23	5,8
	SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES	16,1%	1,2	13,9 ; 18,6	1,12	7,5
	LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS	18,2%	1,1	16,1 ; 20,6	0,93	6,2
	LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS)	17,5%	1,2	15,2 ; 20,1	1,14	7,1
	LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES	70,9%	1,6	67,6 ; 74,1	1,40	2,3
	SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS	27,5%	1,7	24,3 ; 31,0	1,58	6,2
	LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN	83,6%	1,3	80,8 ; 86,0	1,34	1,6
	LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS)	15,9%	1,2	13,6 ; 18,4	1,19	7,7
	LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO	13,8%	1,1	11,8 ; 16,1	1,08	7,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ESTILOS DE CRIANZA (LIMA SUR)	LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECEBA	20,9%	1,6	18,0 ; 24,2	1,35	7,5
	LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO	15,7%	1,2	13,4 ; 18,3	1,01	7,8
	SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO	78,9%	1,3	76,2 ; 81,4	0,98	1,7
	EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES	88,4%	1,1	86,0 ; 90,4	1,13	1,3
	LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR	39,8%	2,5	35,1 ; 44,7	2,31	6,2
	ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES	59,3%	2,0	55,4 ; 63,2	1,49	3,3
	LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC	45,1%	2,0	41,1 ; 49,1	1,55	4,5
	SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES	68,7%	1,8	65,0 ; 72,2	1,40	2,6
	LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA	27,8%	2,4	23,4 ; 32,7	2,55	8,5
	SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR	26,1%	1,6	23,1 ; 29,3	1,17	6,1
	SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES	14,5%	1,4	11,9 ; 17,6	1,47	9,9
	LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS	16,2%	1,4	13,7 ; 19,2	1,30	8,6
	LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS)	17,6%	1,6	14,7 ; 20,8	1,51	8,9
	LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES	71,7%	1,8	68,0 ; 75,2	1,49	2,5
	SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS	28,5%	2,2	24,4 ; 33,0	2,16	7,7
	LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN	91,1%	0,9	89,2 ; 92,8	0,94	1,0
	LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS)	16,4%	1,5	13,7 ; 19,6	1,43	9,0
	LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO	10,5%	1,2	8,3 ; 13,2	1,51	11,9
ESTILOS DE CRIANZA (CALLAO)	LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECEBA	20,1%	2,5	15,6 ; 25,5	1,92	12,7
	LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO	8,0%	1,2	6,0 ; 10,8	0,94	15,0
	SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO	80,1%	2,5	74,7 ; 84,6	1,93	3,2
	EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES	89,0%	1,8	85,1 ; 92,0	1,50	2,0
	LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR	27,2%	2,7	22,3 ; 32,8	1,75	9,9
	ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES	37,6%	3,1	31,7 ; 63,2	1,49	3,3
	LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC	48,7%	2,9	43,1 ; 54,3	1,58	5,9
	SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES	60,9%	2,8	55,3 ; 66,2	1,54	4,5
	LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA	15,1%	1,8	12,0 ; 18,9	1,16	11,7
	SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR	23,8%	2,6	19,1 ; 29,2	1,73	10,8
	SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES	9,4%	1,5	6,8 ; 12,7	1,20	15,7
	LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS	12,5%	1,5	9,9 ; 15,8	0,96	11,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ESTILOS DE CRIANZA (CALLAO)	LE ENGREÑAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS)	12,4%	1,7	9,5 ; 16,1	1,23	13,4
	LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES	69,8%	2,8	64,0 ; 75,1	1,81	4,1
	SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS	20,7%	2,4	16,4 ; 25,7	1,65	11,5
	LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN	87,1%	2,0	82,5 ; 90,6	1,79	2,4
	LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS)	8,6%	1,5	6,1 ; 11,9	1,32	17,3
	LE CONTROLABAN PERO NO LE DABAN AFECTO	6,8%	1,4	4,5 ; 10,2	1,55	21,0
EVENTOS DE VIDA (TOTAL)	CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	29,9%	0,9	28,1 ; 31,8	1,76	3,1
	ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	28,3%	0,9	26,5 ; 30,1	1,78	3,2
	ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	27,1%	0,9	25,3 ; 29,0	1,99	3,5
	ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	20,2%	0,8	18,7 ; 21,8	1,69	3,9
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	3,2%	0,3	2,6 ; 3,9	1,37	9,7
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	0,9%	0,2	0,6 ; 1,3	1,35	18,3
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	4,5%	0,4	3,8 ; 5,3	1,37	8,1
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	3,1%	0,3	2,5 ; 3,7	1,29	9,6
EVENTOS DE VIDA (LIMA CENTRO)	CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	23,9%	2,6	19,2 ; 29,3	2,72	10,7
	ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	19,0%	2,2	15,0 ; 23,7	2,41	11,6
	ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	22,2%	2,8	17,1 ; 28,1	3,46	12,6
	ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	17,2%	2,0	13,7 ; 21,5	2,11	11,6
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	2,0%	0,6	1,2 ; 3,5	1,22	27,9
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	0,6%	0,3	0,2 ; 1,7	1,24	51,1
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	2,1%	0,6	1,2 ; 3,8	1,54	30,4
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	1,7%	0,6	0,9 ; 3,4	1,59	34,6
EVENTOS DE VIDA (LIMA NORTE)	CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	29,0%	1,9	25,4 ; 33,0	2,10	6,7
	ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	25,7%	1,9	22,2 ; 29,5	2,09	7,2
	ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	21,5%	1,7	18,3 ; 25,1	2,05	8,1
	ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	19,1%	1,8	15,9 ; 22,8	2,31	9,2
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	3,6%	0,8	2,4 ; 5,4	1,99	21,4
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	1,5%	0,5	0,8 ; 2,8	1,82	31,9
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	5,0%	0,9	3,5 ; 7,1	2,00	18,1
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	3,4%	0,7	2,3 ; 5,0	1,63	19,9
EVENTOS DE VIDA (LIMA ESTE)	CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	33,9%	1,6	30,8 ; 37,0	1,17	4,6
	ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	37,4%	1,6	34,3 ; 40,6	1,20	4,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EVENTOS DE VIDA (LIMA ESTE)	ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	35,0%	1,7	31,7 ; 38,4	1,36	4,8
	ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	22,6%	1,4	19,9 ; 25,6	1,27	6,4
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	3,7%	0,6	2,7 ; 5,1	1,05	15,9
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	0,8%	0,2	0,4 ; 1,4	0,67	28,1
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	5,2%	0,7	4,0 ; 6,6	0,96	12,8
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	3,9%	0,6	2,9 ; 5,2	0,92	14,4
EVENTOS DE VIDA (LIMA SUR)	CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	33,8%	1,8	30,4 ; 37,4	1,28	5,4
	ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	31,2%	1,9	27,6 ; 35,0	1,46	6,0
	ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	31,8%	1,9	28,2 ; 35,6	1,47	5,9
	ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	23,8%	1,6	20,8 ; 26,9	1,18	6,6
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	3,5%	0,7	2,5 ; 5,1	1,12	18,4
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,75	50,1
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	5,3%	0,8	4,0 ; 7,1	1,10	14,7
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	3,0%	0,6	2,0 ; 4,5	1,24	21,2
EVENTOS DE VIDA (CALLAO)	CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO	25,6%	2,6	20,8 ; 31,1	1,70	10,3
	ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD	23,5%	2,6	18,8 ; 28,9	1,78	11,0
	ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA	22,1%	2,8	17,1 ; 28,0	2,16	12,6
	ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN	15,3%	2,0	11,7 ; 19,7	1,51	13,3
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A)	2,4%	0,7	1,3 ; 4,3	1,12	31,0
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A)	1,3%	0,6	0,5 ; 3,0	1,27	45,7
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA	3,9%	0,9	2,4 ; 6,2	1,11	24,0
	ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A)	2,7%	0,8	1,5 ; 4,9	1,23	30,3
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECÍA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	41,2%	2,0	37,4 ; 45,1	1,42	4,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	19,8%	1,5	17,0 ; 23,0	1,33	7,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	26,7%	1,8	23,3 ; 30,2	1,40	6,6
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECÍA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	41,7%	5,8	30,8 ; 53,3	1,61	14,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	25,5%	4,8	17,2 ; 36,0	1,40	18,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	25,4%	5,7	15,8 ; 38,2	2,00	22,6
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECÍA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	38,9%	4,2	31,0 ; 47,4	1,77	10,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	25,5%	4,8	17,2 ; 36,0	1,40	18,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	25,2%	3,6	18,8 ; 32,8	1,62	14,2
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECÍA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	37,4%	3,2	31,4 ; 43,8	1,07	8,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	18,5%	3,1	13,1 ; 25,4	1,52	16,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	24,2%	2,7	19,3 ; 29,8	0,97	11,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECÍA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	47,4%	4,2	39,2 ; 55,7	1,36	8,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,8%	1,0	7,9 ; 12,0	1,01	10,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	32,3%	4,1	24,9 ; 40,8	1,44	12,6
LE DIERON MÁS CASTIGOS DE LOS QUE MERECÍA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	44,1%	5,9	33,0 ; 55,8	1,37	13,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	17,5%	2,5	13,2 ; 22,9	1,04	14,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	27,0%	4,9	18,4 ; 37,7	1,18	18,3
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	30,3%	2,3	26,0 ; 35,0	1,39	7,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,5%	1,8	11,3 ; 18,3	1,39	12,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	19,3%	2,0	15,7 ; 23,5	1,39	10,3
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	30,1%	6,4	19,2 ; 43,8	1,65	21,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	11,3%	3,8	5,7 ; 21,1	1,23	33,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	24,6%	6,4	14,2 ; 39,1	1,90	26,0
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,0%	4,4	18,3 ; 35,5	1,43	16,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	16,2%	4,0	9,9 ; 25,5	1,65	24,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	14,5%	3,4	9,0 ; 22,5	1,32	23,3
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	31,4%	4,5	23,3 ; 40,8	1,36	14,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	11,1%	2,5	7,0 ; 17,0	0,93	22,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	18,3%	3,7	12,0 ; 26,8	1,36	20,5
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	34,1%	4,5	26,0 ; 43,3	1,23	13,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	17,2%	3,9	10,9 ; 26,1	1,46	22,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	22,4%	3,8	15,8 ; 30,9	1,18	17,1
LE PERMITÍAN HACER COSAS QUE A SUS HERMANOS NO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	29,4%	7,8	16,5 ; 46,6	1,14	26,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	18,2%	7,9	7,3 ; 38,7	1,61	43,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,4%	5,1	9,5 ; 29,6	0,68	29,1
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	23,1%	1,0	21,3 ; 25,0	1,78	4,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,0%	0,6	7,9 ; 10,3	1,63	6,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	15,1%	0,8	13,7 ; 16,7	1,55	5,0
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	23,8%	2,8	18,8 ; 29,6	2,64	11,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,4%	1,8	6,4 ; 13,4	2,25	18,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	18,2%	2,2	14,3 ; 22,9	2,01	12,1
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	20,7%	1,9	17,2 ; 24,8	2,19	9,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,8%	1,3	6,5 ; 11,7	2,10	15,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	11,6%	1,4	9,1 ; 14,6	1,88	12,2
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	25,8%	1,7	22,6 ; 29,3	1,20	6,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,3%	1,2	8,2 ; 12,8	1,15	11,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	15,9%	1,4	13,3 ; 18,8	1,16	8,8
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	24,9%	2,0	21,2 ; 29,0	1,51	8,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,5%	1,2	6,5 ; 11,1	1,21	13,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,6%	1,7	14,4 ; 21,3	1,51	10,0



ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SI LAS COSAS IBAN MAL SUS PADRES TRATABAN DE CONFORTARLO Y ANIMARLO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	19,2%	2,0	15,6 ; 23,4	0,97	10,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	7,4%	1,4	5,0 ; 10,8	1,16	19,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	13,2%	1,6	10,3 ; 16,8	0,91	12,4
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	24,1%	0,9	22,3 ; 25,9	1,80	3,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,4%	0,6	8,3 ; 10,6	1,57	6,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,0%	0,7	14,6 ; 17,5	1,55	4,6
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	25,6%	2,6	20,8 ; 31,1	2,59	10,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,2%	1,6	7,5 ; 13,7	1,91	15,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	19,4%	2,1	15,7 ; 23,8	1,93	10,7
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	21,2%	1,8	17,9 ; 25,0	2,13	8,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,0%	1,3	6,8 ; 11,8	2,13	14,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	12,4%	1,3	10,0 ; 15,2	1,71	10,6
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,4%	1,6	23,3 ; 29,8	1,25	6,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,5%	1,1	8,5 ; 12,7	1,10	10,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,5%	1,3	14,1 ; 19,3	1,17	8,1
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,0%	1,9	22,4 ; 29,9	1,51	7,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,8%	1,1	6,9 ; 11,2	1,21	12,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	18,5%	1,7	15,3 ; 22,1	1,61	9,4
EXISTÍA AMOR Y TERNURA ENTRE USTED Y SUS PADRES (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	20,1%	2,2	16,1 ; 24,9	1,32	11,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	7,7%	1,4	5,3 ; 11,0	1,23	18,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	13,6%	1,7	10,5 ; 17,4	1,09	12,7
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,0%	1,5	23,2 ; 29,0	1,66	5,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	11,2%	0,9	9,5 ; 13,1	1,23	8,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,2%	1,2	13,9 ; 18,8	1,66	7,7
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	24,4%	5,0	16,0 ; 35,5	2,96	20,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	12,5%	2,9	7,9 ; 19,4	1,66	23,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	15,2%	4,1	8,7 ; 25,2	2,90	27,2
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	22,4%	3,1	16,9 ; 29,0	1,91	13,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	6,8%	1,6	4,2 ; 10,8	1,49	24,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	12,5%	2,4	8,5 ; 17,9	1,80	19,0
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	28,5%	2,4	24,0 ; 33,5	1,15	8,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,1%	1,7	11,2 ; 17,7	0,89	11,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,0%	2,0	12,4 ; 20,4	1,20	12,6
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	30,6%	2,9	25,2 ; 36,6	1,45	9,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	12,1%	1,9	8,9 ; 16,4	1,26	15,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	22,3%	2,8	17,3 ; 28,2	1,63	12,5
LE PROHIBÍAN HACER COSAS QUE A OTROS NIÑOS SÍ LES ERAN PERMITIDAS PORQUE TEMÍAN QUE ALGO MALO LE PODÍA OCURRIR (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	17,6%	3,6	11,6 ; 25,7	1,15	20,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,6%	2,4	4,9 ; 14,7	0,97	28,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	12,1%	3,0	7,3 ; 19,4	1,14	25,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,5%	1,2	24,2 ; 29,0	1,54	4,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,5%	0,8	9,1 ; 12,2	1,36	7,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,1%	1,0	15,2 ; 19,3	1,52	6,1
ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	27,7%	4,2	20,3 ; 36,6	2,29	15,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	11,1%	2,4	7,2 ; 16,8	1,56	21,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	22,0%	3,5	15,8 ; 29,7	1,94	16,1
ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	22,3%	2,7	17,4 ; 27,9	1,90	12,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,0%	1,8	6,0 ; 13,2	1,83	20,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	13,3%	2,2	9,6 ; 18,2	1,86	16,3
ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	29,2%	2,1	25,3 ; 33,5	1,15	7,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	12,2%	1,4	9,7 ; 15,2	1,00	11,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,0%	1,7	12,9 ; 19,6	1,16	10,6
ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	27,9%	2,4	23,5 ; 32,8	1,47	8,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,8%	1,5	8,2 ; 14,2	1,27	14,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	19,3%	2,1	15,5 ; 23,8	1,50	10,8
ERAN MUY EXIGENTES RESPECTO A SUS CALIFICACIONES ESCOLARES, DESEMPEÑO DEPORTIVO O ACTIVIDADES SIMILARES (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	23,2%	2,8	18,2 ; 29,1	0,77	11,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	7,7%	2,2	4,3 ; 13,3	1,21	28,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,7%	2,5	12,4 ; 22,1	0,77	14,7
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	21,1%	1,1	19,0 ; 23,4	1,68	5,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,2%	0,7	6,9 ; 9,7	1,47	8,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	13,5%	0,9	11,8 ; 15,5	1,63	6,9
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	20,0%	2,9	14,8 ; 26,4	2,42	14,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	7,6%	1,8	4,8 ; 12,0	2,05	23,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	14,6%	2,6	10,2 ; 20,5	2,46	17,9
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	16,0%	2,1	12,3 ; 20,5	2,03	13,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	7,5%	1,4	5,2 ; 10,7	1,71	18,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	9,4%	1,7	6,6 ; 13,2	2,01	17,6
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	27,4%	2,2	23,3 ; 32,0	1,10	8,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,6%	1,5	7,0 ; 13,0	1,17	15,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,4%	1,7	13,3 ; 19,9	0,91	10,2
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	24,4%	2,3	20,1 ; 29,2	1,19	9,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,7%	1,4	6,3 ; 12,0	1,07	16,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	15,7%	1,9	12,4 ; 19,8	1,10	12,0
LE PERMITÍAN TOMAR SUS PROPIAS DECISIONES COMO POR EJEMPLO ELEGIR SU ROPA, ESCOGER A SUS AMISTADES, LOS ESTUDIOS, DISTRACCIONES, ETC (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	19,4%	3,2	13,9 ; 26,4	1,49	16,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	7,2%	1,8	4,4 ; 11,6	1,13	25,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	13,5%	2,9	8,8 ; 20,2	1,64	21,2
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	20,7%	1,0	18,8 ; 22,7	1,67	4,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,1%	0,6	6,9 ; 9,4	1,45	7,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	14,1%	0,8	12,5 ; 15,9	1,66	6,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	22,6%	3,0	17,3 ; 28,9	2,53	13,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,0%	1,6	5,3 ; 11,8	1,78	20,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,9%	2,7	13,3 ; 23,7	2,39	14,8
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	15,9%	1,9	12,6 ; 19,9	1,93	11,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	6,9%	1,2	4,9 ; 9,8	1,78	17,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	9,4%	1,5	6,8 ; 12,9	2,08	16,4
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	24,1%	1,8	20,7 ; 27,9	1,19	7,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,5%	1,4	7,2 ; 12,5	1,37	14,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	14,7%	1,4	12,1 ; 17,7	1,01	9,5
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	23,1%	2,0	19,4 ; 27,3	1,41	8,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,7%	1,2	6,6 ; 11,3	1,09	13,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,6%	1,9	13,2 ; 20,6	1,57	11,3
SUS PADRES SE INTERESABAN POR CONOCER SUS OPINIONES (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	17,0%	2,1	13,2 ; 21,6	0,94	12,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	6,6%	1,4	4,2 ; 10,1	0,99	22,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	13,2%	1,9	10,0 ; 17,3	0,89	14,2
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	30,7%	1,8	27,3 ; 34,3	1,49	5,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,4%	1,3	12,0 ; 17,2	1,40	9,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	18,1%	1,5	15,4 ; 21,2	1,43	8,2
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	37,5%	6,8	25,3 ; 51,4	2,14	18,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	21,5%	5,4	12,7 ; 34,0	1,92	25,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	25,8%	5,8	16,1 ; 38,5	1,89	22,3
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	27,7%	4,1	20,5 ; 36,3	2,08	14,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	12,9%	3,0	8,0 ; 19,9	2,01	23,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,7%	3,2	11,3 ; 24,0	1,89	19,3
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	32,4%	2,7	27,4 ; 37,8	0,94	8,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,5%	2,0	12,0 ; 19,9	0,88	12,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,0%	2,2	12,2 ; 20,8	1,02	13,6
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	31,6%	3,5	25,2 ; 38,8	1,42	11,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,1%	2,3	9,2 ; 18,3	1,17	17,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	19,8%	2,9	14,8 ; 26,2	1,33	14,6
LA ANSIEDAD DE SUS PADRES DE QUE ALGO MALO PODÍA SUCEDERLE ERA EXAGERADA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	21,0%	4,8	13,1 ; 32,0	1,01	23,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,2%	3,3	4,5 ; 18,1	0,94	35,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	13,5%	3,8	7,7 ; 22,7	0,88	27,9
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	32,5%	1,8	29,2 ; 36,1	1,48	5,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,8%	1,2	11,6 ; 16,4	1,28	8,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	21,8%	1,5	19,0 ; 25,0	1,42	7,0
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	37,2%	5,2	27,7 ; 47,7	1,68	13,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,1%	3,4	8,7 ; 22,1	1,37	23,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	29,3%	5,0	20,4 ; 40,0	1,80	17,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	28,7%	3,5	22,3 ; 36,1	1,69	12,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,0%	2,6	9,6 ; 20,0	1,57	18,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,2%	2,7	12,6 ; 23,1	1,37	15,5
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	35,1%	3,3	29,0 ; 41,8	1,28	9,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,5%	2,0	11,0 ; 18,9	0,89	13,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	21,5%	2,9	16,3 ; 27,8	1,38	13,6
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	34,1%	3,8	27,0 ; 41,8	1,49	11,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,3%	2,6	9,0 ; 19,3	1,38	19,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	25,0%	3,3	19,1 ; 31,9	1,32	13,1
SUS PADRES PENSABAN QUE LOS HIJOS HOMBRES NO DEBERÍAN LLORAR (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,5%	4,3	19,0 ; 35,7	1,05	16,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	12,2%	3,4	7,0 ; 20,6	1,20	27,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,9%	3,7	11,7 ; 26,4	1,06	20,9
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	36,9%	2,5	32,2 ; 41,8	1,39	6,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	19,6%	2,0	16,1 ; 23,8	1,31	10,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	22,9%	2,1	19,0 ; 27,3	1,36	9,2
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	44,8%	8,4	29,4 ; 61,3	1,79	18,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	24,7%	6,5	14,1 ; 39,5	1,43	26,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	33,1%	8,1	19,5 ; 50,3	1,84	24,4
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	34,6%	5,3	25,1 ; 45,5	1,67	15,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	19,4%	4,3	12,3 ; 29,3	1,64	22,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,0%	3,8	10,8 ; 25,9	1,43	22,5
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	33,8%	3,9	26,7 ; 41,8	1,10	11,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	17,7%	3,0	12,6 ; 24,5	1,03	17,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	20,0%	3,4	14,1 ; 27,5	1,20	17,1
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	41,6%	5,1	32,0 ; 52,0	1,39	12,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	20,0%	4,0	13,3 ; 29,0	1,28	20,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	29,2%	4,5	21,1 ; 38,8	1,27	15,5
SUS PADRES PREFERÍAN A LOS HIJOS VARONES EN DESVENTAJA DE LAS HIJAS MUJERES (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	30,1%	6,2	19,4 ; 43,5	0,82	20,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	19,3%	6,5	9,6 ; 35,1	1,18	33,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	19,0%	4,7	11,4 ; 29,8	0,62	24,5
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	43,4%	2,2	39,1 ; 47,8	1,30	5,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	22,5%	1,7	19,3 ; 26,1	1,11	7,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	28,9%	2,0	25,1 ; 33,0	1,30	7,0
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	51,5%	6,9	38,2 ; 64,6	1,24	13,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	33,1%	6,5	21,8 ; 46,7	1,23	19,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	29,9%	6,5	18,8 ; 43,9	1,31	21,7
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	41,6%	4,7	32,8 ; 51,0	1,64	11,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	19,2%	3,5	13,2 ; 27,0	1,45	18,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	28,4%	4,3	20,8 ; 37,6	1,66	15,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	37,2%	3,4	30,8 ; 44,2	0,99	9,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	20,1%	2,5	15,7 ; 25,5	0,77	12,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	24,0%	3,0	18,5 ; 30,3	0,98	12,6
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	51,9%	4,7	42,7 ; 61,0	1,31	9,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	23,8%	3,6	17,4 ; 31,6	1,08	15,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	36,8%	4,4	28,7 ; 45,8	1,24	12,0
LE CASTIGABAN SEVERAMENTE POR COSAS PEQUEÑAS (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	39,4%	7,4	26,1 ; 54,5	1,39	18,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	26,0%	6,2	15,8 ; 39,7	1,19	23,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	25,6%	6,4	15,1 ; 40,1	1,31	25,1
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	27,2%	2,0	23,5 ; 31,3	1,39	7,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	11,7%	1,4	9,2 ; 14,7	1,33	12,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,1%	1,6	14,1 ; 20,5	1,28	9,4
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS) (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	31,3%	6,2	20,6 ; 44,5	1,60	19,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,8%	4,5	7,2 ; 25,1	1,50	32,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	23,5%	5,4	14,5 ; 35,7	1,48	23,2
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS) (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	20,6%	3,5	14,5 ; 28,4	1,55	17,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,5%	2,8	6,2 ; 17,4	1,66	26,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	12,3%	2,9	7,6 ; 19,2	1,59	23,7
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	29,4%	3,3	23,3 ; 36,3	0,99	11,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,0%	2,0	5,8 ; 13,6	0,87	21,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	15,5%	2,5	11,1 ; 21,1	0,91	16,4
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	33,5%	4,6	25,1 ; 43,1	1,51	13,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,7%	3,3	10,3 ; 23,2	1,28	20,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	22,8%	3,7	16,3 ; 31,0	1,25	16,4
LE ENGREÍAN MÁS A USTED EN COMPARACIÓN CON SUS HERMANOS(AS) (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	19,9%	5,7	11,0 ; 33,4	1,21	28,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,2%	3,9	4,7 ; 20,8	1,00	38,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	13,5%	4,3	7,1 ; 24,2	0,93	31,6
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	24,6%	1,0	22,7 ; 26,6	1,78	4,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,0%	0,6	8,8 ; 11,3	1,48	6,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,0%	0,8	14,5 ; 17,7	1,57	5,0
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,9%	2,9	21,6 ; 32,9	2,64	10,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,8%	1,7	7,9 ; 14,6	1,84	15,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	20,6%	2,3	16,4 ; 25,5	2,07	11,3
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	21,3%	1,9	17,8 ; 25,4	2,03	9,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,7%	1,3	7,4 ; 12,6	1,78	13,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	11,3%	1,4	8,9 ; 14,3	1,70	12,2
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	27,2%	1,8	23,9 ; 30,8	1,20	6,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,7%	1,2	8,7 ; 13,3	1,08	10,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,7%	1,5	13,9 ; 19,9	1,27	9,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,2%	2,1	22,3 ; 30,5	1,46	8,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,4%	1,3	7,1 ; 12,4	1,34	14,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	18,6%	1,8	15,3 ; 22,5	1,42	9,8
LE DEMOSTRABAN QUE ESTABAN INTERESADOS EN QUE USTED TUVIERA BUENAS CALIFICACIONES (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	20,1%	2,5	15,7 ; 25,4	1,26	12,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,5%	1,7	5,7 ; 12,3	1,17	19,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	14,0%	1,9	10,6 ; 18,3	1,05	13,9
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	28,8%	1,9	25,3 ; 32,7	1,93	6,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,2%	1,2	11,0 ; 15,8	1,43	9,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,3%	1,5	14,6 ; 20,4	1,70	8,6
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	36,4%	7,7	22,9 ; 52,4	3,66	21,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,8%	4,2	9,2 ; 26,0	1,91	26,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	25,6%	6,0	15,7 ; 38,9	2,66	23,3
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	21,5%	3,6	15,3 ; 29,3	2,29	16,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,4%	2,2	5,8 ; 14,7	1,74	23,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	10,9%	2,4	7,0 ; 16,7	1,82	22,0
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	31,7%	2,8	26,5 ; 37,3	1,05	8,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,9%	2,3	11,9 ; 21,0	1,19	14,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,6%	2,2	13,7 ; 22,3	0,98	12,4
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	30,2%	3,7	23,5 ; 38,0	1,68	12,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	12,3%	2,3	8,5 ; 17,4	1,23	18,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	20,2%	3,3	14,5 ; 27,3	1,71	16,2
SUS PADRES LO(A) CUIDABAN EXCESIVAMENTE PARA EVITAR QUE TUVIERA PROBLEMAS (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	28,5%	4,6	20,4 ; 38,4	1,03	16,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,9%	3,6	10,0 ; 24,3	0,96	22,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,4%	3,6	10,5 ; 24,8	0,95	22,1
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	24,5%	0,9	22,7 ; 26,3	1,81	3,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	9,6%	0,6	8,5 ; 10,8	1,54	6,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,2%	0,7	14,8 ; 17,7	1,56	4,5
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,0%	2,8	20,8 ; 31,9	2,93	10,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,3%	1,6	7,6 ; 13,9	1,89	15,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	19,5%	2,2	15,5 ; 24,2	2,18	11,3
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	21,5%	1,8	18,1 ; 25,3	2,09	8,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,8%	1,2	6,7 ; 11,6	2,02	14,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	12,6%	1,3	10,2 ; 15,4	1,68	10,5
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	27,2%	1,6	24,2 ; 30,3	1,10	5,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	11,2%	1,1	9,2 ; 13,6	1,13	9,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,9%	1,3	14,5 ; 19,5	1,07	7,6
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	26,1%	1,8	22,7 ; 29,9	1,47	7,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,9%	1,1	6,9 ; 11,2	1,22	12,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	18,3%	1,6	15,4 ; 21,8	1,48	8,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
LE DEMOSTRABAN QUE LO(A) QUERÍAN (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	20,6%	2,3	16,3 ; 25,5	1,40	11,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,1%	1,5	5,6 ; 11,5	1,22	18,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	14,2%	1,9	10,8 ; 18,4	1,28	13,6
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	29,7%	2,1	25,7 ; 34,0	1,30	7,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,0%	1,5	10,3 ; 16,2	1,20	11,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	19,1%	1,8	15,8 ; 22,9	1,24	9,3
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS) (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	31,7%	6,7	20,2 ; 45,9	1,58	21,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,4%	5,3	6,8 ; 27,9	1,73	36,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	22,9%	5,8	13,5 ; 36,2	1,47	25,3
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS) (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	23,8%	4,1	16,7 ; 32,7	1,52	17,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	8,9%	2,5	5,0 ; 15,2	1,31	28,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	18,0%	3,7	11,8 ; 26,5	1,56	20,7
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	30,4%	3,3	24,3 ; 37,3	0,88	10,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,3%	2,4	9,2 ; 18,7	0,85	18,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	13,9%	2,4	9,8 ; 19,2	0,80	17,2
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	34,9%	4,6	26,4 ; 44,5	1,39	13,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	16,5%	3,4	10,8 ; 24,3	1,25	20,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	24,6%	3,9	17,7 ; 33,1	1,23	16,0
LE FAVORECÍAN CON RELACIÓN A SUS HERMANOS(AS) (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	27,9%	6,6	16,8 ; 42,5	0,88	23,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,2%	4,7	6,4 ; 25,3	0,77	35,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	18,3%	5,2	10,2 ; 30,6	0,72	28,2
LE CONTROLABAN, PERO NO LE DABAN AFECTO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	45,8%	3,0	39,9 ; 51,8	1,63	6,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	22,1%	2,1	18,3 ; 26,5	1,13	9,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	31,4%	3,0	25,9 ; 37,5	1,80	9,5
LE CONTROLABAN, PERO NO LE DABAN AFECTO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	65,4%	8,7	47,2 ; 80,0	2,07	13,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	31,6%	5,2	22,4 ; 42,5	0,78	16,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	50,0%	10,3	30,9 ; 69,2	2,64	20,6
LE CONTROLABAN, PERO NO LE DABAN AFECTO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	44,3%	7,2	31,0 ; 58,4	2,02	16,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	17,1%	4,9	9,5 ; 28,9	1,64	28,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	27,4%	6,4	16,6 ; 41,6	2,02	23,5
LE CONTROLABAN, PERO NO LE DABAN AFECTO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	36,9%	4,6	28,5 ; 46,2	1,34	12,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	19,7%	3,0	14,4 ; 26,3	0,86	15,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	24,5%	4,1	17,4 ; 33,4	1,34	16,6
LE CONTROLABAN, PERO NO LE DABAN AFECTO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	49,8%	5,6	39,0 ; 60,6	1,20	11,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	27,1%	4,9	18,6 ; 37,8	1,17	18,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	33,4%	5,4	23,7 ; 44,7	1,27	16,3
LE CONTROLABAN, PERO NO LE DABAN AFECTO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	41,5%	8,5	26,4 ; 58,5	0,96	20,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,3%	7,3	5,6 ; 35,4	1,35	47,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	33,7%	7,8	20,4 ; 50,3	0,89	23,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	37,1%	1,7	33,9 ; 40,4	1,54	4,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	16,0%	1,2	13,8 ; 18,5	1,35	7,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	24,2%	1,5	21,4 ; 27,2	1,53	6,1
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	45,4%	4,3	37,1 ; 53,8	1,34	9,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	18,2%	3,2	12,7 ; 25,4	1,27	17,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	36,4%	4,4	28,2 ; 45,5	1,53	12,2
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	29,8%	3,5	23,4 ; 37,1	1,92	11,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,3%	2,6	11,0 ; 21,0	1,65	16,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	15,9%	2,8	11,0 ; 22,3	2,00	17,9
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	38,1%	3,2	32,1 ; 44,6	1,56	8,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	16,7%	2,1	12,9 ; 21,3	1,19	12,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	23,2%	2,6	18,5 ; 28,7	1,37	11,3
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	39,2%	3,2	33,1 ; 45,6	1,26	8,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	16,2%	2,4	12,0 ; 21,4	1,23	14,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	26,4%	3,0	20,8 ; 32,7	1,39	11,5
CUANDO ERA MENOR DE 11 AÑOS SUS PADRES DISCUTÍAN MUCHO (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	36,5%	5,2	27,0 ; 47,1	1,40	14,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	12,2%	3,6	6,7 ; 21,3	1,48	29,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	26,2%	4,7	18,1 ; 36,4	1,38	17,9
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	33,3%	1,6	30,3 ; 36,6	1,42	4,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,4%	1,1	12,4 ; 16,7	1,20	7,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	22,4%	1,4	19,7 ; 25,3	1,48	6,5
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	40,8%	5,3	30,9 ; 51,5	1,68	13,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,3%	3,4	9,8 ; 23,1	1,26	22,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	31,3%	5,4	21,9 ; 42,7	1,93	17,1
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	27,6%	3,4	21,5 ; 34,7	1,66	12,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	16,7%	2,8	11,9 ; 22,8	1,62	16,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	14,8%	2,6	10,4 ; 20,7	1,58	17,5
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	33,4%	2,6	28,6 ; 38,6	1,19	7,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	12,6%	1,6	9,8 ; 16,0	0,92	12,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	22,3%	2,3	18,0 ; 27,2	1,28	10,5
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	34,7%	3,4	28,4 ; 41,6	1,40	9,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,5%	2,2	11,6 ; 20,4	1,04	14,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	23,8%	3,1	18,3 ; 30,3	1,43	12,9
ALGUNO DE SUS PADRES LLEGABA EBRIO O BORRACHO A CASA CON REGULARIDAD (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	35,4%	4,9	26,5 ; 45,5	1,16	13,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	11,7%	3,3	6,7 ; 19,9	1,17	28,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	27,5%	4,5	19,6 ; 37,2	1,15	16,4
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	35,8%	1,7	32,6 ; 39,1	1,42	4,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,7%	1,2	12,6 ; 17,1	1,26	7,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	23,6%	1,5	20,8 ; 26,7	1,45	6,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	38,5%	5,0	29,3 ; 48,6	1,74	12,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,8%	3,3	8,6 ; 21,6	1,50	23,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	29,5%	5,2	20,4 ; 40,6	2,14	17,6
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	32,9%	3,9	25,6 ; 41,0	1,75	12,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,9%	2,8	9,2 ; 20,4	1,65	20,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	18,5%	3,0	13,3 ; 25,1	1,49	16,2
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	35,8%	2,7	30,7 ; 41,3	1,21	7,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,6%	1,9	12,3 ; 19,8	1,04	12,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	23,2%	2,4	18,8 ; 28,3	1,24	10,4
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	39,0%	3,3	32,8 ; 45,5	1,27	8,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	16,3%	2,2	12,4 ; 21,2	1,04	13,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	26,4%	2,9	21,1 ; 32,5	1,24	11,0
ALGUNO DE SUS PADRES ESTABA MUCHO TIEMPO AUSENTE DE CASA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	29,7%	4,7	21,4 ; 39,6	1,10	15,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	10,7%	3,5	5,4 ; 19,9	1,39	33,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	20,5%	4,0	13,7 ; 29,5	1,05	19,7
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	36,1%	1,9	32,5 ; 40,0	1,40	5,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	16,0%	1,4	13,5 ; 18,9	1,22	8,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	23,6%	1,8	20,3 ; 27,2	1,48	7,4
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	43,9%	5,6	33,4 ; 55,0	1,64	12,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	19,4%	3,7	13,1 ; 27,7	1,15	19,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	37,3%	5,8	26,7 ; 49,2	1,87	15,6
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	34,7%	4,3	26,8 ; 43,5	1,78	12,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	18,7%	3,5	12,8 ; 26,6	1,77	18,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	17,1%	3,1	11,8 ; 24,2	1,53	18,4
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	34,7%	3,5	28,3 ; 41,8	1,28	10,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	14,3%	2,3	10,4 ; 19,3	1,00	15,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	22,6%	3,4	16,6 ; 30,0	1,63	15,2
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	35,8%	3,7	28,8 ; 43,4	1,28	10,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	13,6%	2,3	9,7 ; 18,7	0,91	16,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	23,2%	3,3	17,3 ; 30,3	1,31	14,4
ALGUNO DE SUS PADRES FUE INFIEL EN LA RELACIÓN (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	32,5%	4,7	24,0 ; 42,3	0,73	14,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	15,0%	4,1	8,6 ; 25,1	0,97	27,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	23,5%	4,3	16,2 ; 32,9	0,73	18,1
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	57,8%	4,3	49,2 ; 66,0	1,08	7,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	35,0%	4,3	27,1 ; 43,9	1,15	12,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	33,5%	4,6	25,2 ; 43,0	1,32	13,6
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A) (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	76,4%	12,3	45,9 ; 92,6	1,29	16,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	47,5%	14,5	22,5 ; 73,9	0,31	73,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	41,3%	13,9	18,6 ; 68,4	1,22	33,6

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A) (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	62,1%	8,0	45,8 ; 76,1	1,12	12,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	35,7%	8,4	21,3 ; 53,2	1,28	23,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	31,9%	9,2	16,9 ; 51,7	1,62	28,8
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	39,7%	7,1	26,9 ; 54,1	0,84	17,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	28,0%	7,0	16,5 ; 43,4	0,96	24,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	21,3%	5,5	12,4 ; 34,1	0,73	25,9
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	63,3%	9,0	44,7 ; 78,6	1,11	14,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	38,8%	9,0	23,1 ; 57,1	1,09	23,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	41,8%	10,3	23,9 ; 62,2	1,39	24,6
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON NO QUERERLO(A) (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	65,8%	12,0	40,2 ; 84,6	0,73	18,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	29,7%	14,1	10,1 ; 61,4	1,08	47,5
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	49,2%	15,0	23,1 ; 75,8	1,01	30,4
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	60,3%	9,0	42,0 ; 76,0	1,35	15,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	29,0%	7,5	16,7 ; 45,4	1,08	25,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	37,9%	9,2	22,1 ; 56,7	1,42	24,2
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A) (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	82,7%	16,6	32,7 ; 97,9	0,92	20,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	49,0%	25,8	11,2 ; 87,9	1,26	52,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	55,3%	25,4	14,1 ; 90,3	1,24	46,0
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A) (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	63,5%	16,1	30,9 ; 87,2	1,96	25,3
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	18,4%	10,5	5,5 ; 47,0	1,28	56,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	37,3%	15,3	14,1 ; 68,4	1,77	41,1
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	39,5%	13,4	17,8 ; 66,3	0,64	34,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	34,2%	12,0	15,4 ; 59,6	0,54	35,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	16,5%	8,0	6,0 ; 38,1	0,39	48,3
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	88,5%	11,7	44,7 ; 98,7	0,40	13,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	88,5%	11,7	44,7 ; 98,7	0,40	13,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	52,8%	24,9	13,6 ; 88,8	0,74	47,1
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON MATARLO(A) (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	48,3%	24,6	11,9 ; 86,6	1,46	51,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	7,2%	7,6	0,8 ; 41,8	0,52	104,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	48,3%	24,6	11,9 ; 86,6	1,46	51,0
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	50,0%	3,9	42,5 ; 57,6	1,17	7,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	28,6%	3,5	22,2 ; 35,9	1,18	12,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	30,6%	3,6	24,0 ; 38,1	1,21	11,8
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	51,0%	13,7	26,3 ; 75,3	1,21	26,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	39,8%	13,6	17,8 ; 66,8	1,25	34,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	30,1%	12,5	11,9 ; 58,0	1,20	41,4
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACÍA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	47,1%	8,5	31,2 ; 63,5	1,69	18,1
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	20,5%	6,7	10,3 ; 36,8	1,62	32,8
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	28,1%	7,8	15,5 ; 45,4	1,74	27,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACIA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	42,8%	6,5	30,8 ; 55,8	0,97	15,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	27,6%	5,8	17,7 ; 40,2	0,94	21,0
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	24,7%	5,8	15,0 ; 37,7	1,02	23,6
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACIA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	67,0%	6,1	54,1 ; 77,8	0,83	9,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	39,5%	6,9	27,0 ; 53,4	0,95	17,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	42,4%	7,0	29,5 ; 56,4	0,97	16,5
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) HACIA SENTIR CULPABLE POR DESACUERDOS O DISCUSIONES DE LA FAMILIA (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	36,1%	10,4	18,9 ; 57,8	0,87	28,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	18,8%	8,6	7,1 ; 41,2	0,90	45,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	25,9%	9,2	12,0 ; 47,4	0,83	35,6
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A) (TOTAL)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	49,4%	4,8	40,2 ; 58,6	1,22	9,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	26,4%	4,2	19,1 ; 35,3	1,20	15,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	27,9%	4,4	20,2 ; 37,3	1,29	15,7
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A) (LIMA CENTRO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	44,8%	17,3	17,0 ; 76,2	1,58	38,7
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	30,5%	16,3	8,9 ; 66,5	1,63	53,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	6,8%	5,1	1,5 ; 26,1	0,53	74,9
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A) (LIMA NORTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	51,9%	9,5	33,9 ; 69,4	1,43	18,2
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	25,2%	7,52	13,4 ; 42,3	1,18	29,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	28,7%	8,4	15,3 ; 47,4	1,37	29,2
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A) (LIMA ESTE)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	33,4%	6,1	22,5 ; 46,3	0,72	18,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	21,2%	5,9	11,9 ; 34,9	0,87	27,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	20,2%	5,2	11,9 ; 32,3	0,71	25,7
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A) (LIMA SUR)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	61,7%	10,3	40,7 ; 79,0	1,20	16,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	29,1%	9,9	13,8 ; 51,2	1,26	33,9
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	41,8%	11,7	21,8 ; 64,9	1,52	28,0
ALGUNO DE SUS PADRES LO(A) AMENAZABA CON ABANDONARLO(A) (CALLAO)	PREVALENCIA DE VIDA DE CUALQUIER TRASTORNO	73,1%	11,2	46,9 ; 89,3	0,83	15,4
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DE ANSIEDAD	37,5%	16,0	13,6 ; 69,6	1,42	42,6
	PREVALENCIA DE VIDA DE TRASTORNOS DEPRESIVOS	43,2%	15,6	17,9 ; 72,6	1,29	36,2
EXPERIENCIA EN LA NIÑEZ ANTES DE LOS 18 AÑOS (TOTAL)	SUS PADRES SE SEPARARON O DIVORCIARON	20,8%	0,8	19,4 ; 22,4	1,58	3,7
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO FÍSICO	11,8%	0,6	10,6 ; 13,0	1,59	5,2
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO SEXUAL	4,9%	0,4	4,2 ; 5,6	1,28	7,5
	SU FAMILIA VIVIÓ EN PERMANENTE RIESGO O AMENAZA DE INTEGRIDAD FÍSICA DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS	2,3%	0,3	1,8 ; 2,8	1,36	11,5
	SUFRIÓ DE INSULTOS, AGRESIONES VERBALES U OFENSAS	13,1%	0,6	11,9 ; 14,4	1,63	4,9
	SUFRIÓ DE CHANTAJES, MANIPULACIONES O HUMILLACIONES	5,9%	0,4	5,2 ; 6,8	1,46	7,2
	SUFRIÓ DE SITUACIONES DE ABANDONO	9,2%	0,5	8,2 ; 10,4	1,60	6,0
EXPERIENCIA EN LA NIÑEZ ANTES DE LOS 18 AÑOS (LIMA CENTRO)	SUS PADRES SE SEPARARON O DIVORCIARON	18,9%	2,0	15,4 ; 23,1	1,88	10,4
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO FÍSICO	10,0%	1,6	7,3 ; 13,6	2,17	15,9
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO SEXUAL	3,0%	0,7	1,9 ; 4,7	1,26	23,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
EXPERIENCIA EN LA NIÑEZ ANTES DE LOS 18 AÑOS (LIMA CENTRO)	SU FAMILIA VIVIÓ EN PERMANENTE RIESGO O AMENAZA DE INTEGRIDAD FÍSICA DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS	1,5%	0,6	0,7 ; 3,1	1,67	38,2
	SUFRIÓ DE INSULTOS, AGRESIONES VERBALES U OFENSAS	11,2%	1,5	8,5 ; 14,6	1,80	13,6
	SUFRIÓ DE CHANTAJES, MANIPULACIONES O HUMILLACIONES	5,4%	1,0	3,7 ; 7,8	1,55	18,8
	SUFRIÓ DE SITUACIONES DE ABANDONO	7,4%	1,3	5,2 ; 10,3	1,86	17,5
EXPERIENCIA EN LA NIÑEZ ANTES DE LOS 18 AÑOS (LIMA NORTE)	SUS PADRES SE SEPARARON O DIVORCIARON	21,6%	1,8	18,2 ; 25,4	2,31	8,5
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO FÍSICO	13,1%	1,4	10,6 ; 16,1	2,06	10,7
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO SEXUAL	5,2%	0,9	3,8 ; 7,3	1,86	16,9
	SU FAMILIA VIVIÓ EN PERMANENTE RIESGO O AMENAZA DE INTEGRIDAD FÍSICA DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS	3,1%	0,7	2,0 ; 4,7	1,74	21,4
	SUFRIÓ DE INSULTOS, AGRESIONES VERBALES U OFENSAS	14,4%	1,6	11,6 ; 17,8	2,40	10,9
	SUFRIÓ DE CHANTAJES, MANIPULACIONES O HUMILLACIONES	6,8%	1,0	5,0 ; 9,1	2,01	15,3
	SUFRIÓ DE SITUACIONES DE ABANDONO	11,6%	1,3	9,3 ; 14,3	1,82	10,8
EXPERIENCIA EN LA NIÑEZ ANTES DE LOS 18 AÑOS (LIMA ESTE)	SUS PADRES SE SEPARARON O DIVORCIARON	21,4%	1,3	19,0 ; 24,0	1,01	5,9
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO FÍSICO	13,6%	1,1	11,6 ; 16,0	1,15	8,2
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO SEXUAL	5,4%	0,6	4,3 ; 6,8	0,82	11,5
	SU FAMILIA VIVIÓ EN PERMANENTE RIESGO O AMENAZA DE INTEGRIDAD FÍSICA DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS	2,2%	0,4	1,5 ; 3,2	0,93	19,4
	SUFRIÓ DE INSULTOS, AGRESIONES VERBALES U OFENSAS	15,3%	1,2	13,1 ; 17,8	1,19	7,8
	SUFRIÓ DE CHANTAJES, MANIPULACIONES O HUMILLACIONES	5,9%	0,7	4,7 ; 7,5	0,98	12,0
	SUFRIÓ DE SITUACIONES DE ABANDONO	9,5%	1,0	7,7 ; 11,8	1,38	11,0
EXPERIENCIA EN LA NIÑEZ ANTES DE LOS 18 AÑOS (LIMA SUR)	SUS PADRES SE SEPARARON O DIVORCIARON	21,7%	1,4	19,0 ; 24,7	1,10	6,6
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO FÍSICO	9,9%	1,1	7,9 ; 12,2	1,22	11,0
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO SEXUAL	6,0%	0,8	4,6 ; 7,9	1,16	14,0
	SU FAMILIA VIVIÓ EN PERMANENTE RIESGO O AMENAZA DE INTEGRIDAD FÍSICA DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS	2,3%	0,5	1,5 ; 3,6	1,18	23,3
	SUFRIÓ DE INSULTOS, AGRESIONES VERBALES U OFENSAS	10,5%	1,1	8,5 ; 12,8	1,15	10,3
	SUFRIÓ DE CHANTAJES, MANIPULACIONES O HUMILLACIONES	4,9%	0,8	3,5 ; 6,7	1,28	16,5
	SUFRIÓ DE SITUACIONES DE ABANDONO	7,8%	1,1	5,9 ; 10,3	1,55	14,1
EXPERIENCIA EN LA NIÑEZ ANTES DE LOS 18 AÑOS (CALLAO)	SUS PADRES SE SEPARARON O DIVORCIARON	19,2%	2,2	15,2 ; 23,9	1,50	11,5
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO FÍSICO	10,8%	1,5	8,1 ; 14,2	1,19	14,4
	SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE ABUSO SEXUAL	3,4%	0,9	2,1 ; 5,6	1,08	25,2
	SU FAMILIA VIVIÓ EN PERMANENTE RIESGO O AMENAZA DE INTEGRIDAD FÍSICA DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS	1,4%	0,5	0,7 ; 3,0	0,99	37,9
	SUFRIÓ DE INSULTOS, AGRESIONES VERBALES U OFENSAS	12,7%	1,7	9,7 ; 16,4	1,27	13,5
	SUFRIÓ DE CHANTAJES, MANIPULACIONES O HUMILLACIONES	6,9%	1,3	4,8 ; 9,8	1,20	18,4
	SUFRIÓ DE SITUACIONES DE ABANDONO	8,2%	1,4	5,9 ; 11,4	1,22	16,8

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ACCESO A SERVICIOS						
MORBILIDAD SENTIDA DE VIDA EN SALUD MENTAL (COMO PROBLEMAS EMOCIONALES O DE LOS NERVIOS) (PREVALENCIA DE VIDA)	TOTAL	28,8%	0,9	27,1 ; 30,6	1,75	3,1
	LIMA CENTRO	32,2%	2,6	27,3 ; 37,5	2,38	8,1
	LIMA NORTE	28,8%	2,0	25,1 ; 32,8	2,23	6,8
	LIMA ESTE	32,1%	1,6	29,0 ; 35,2	1,25	4,9
	LIMA SUR	22,5%	1,6	19,6 ; 25,7	1,29	6,9
	CALLAO	27,9%	2,5	23,3 ; 33,0	1,48	8,9
MORBILIDAD SENTIDA DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL (CON PROBL. DE S.M.) (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	11,7%	0,6	10,6 ; 13,0	1,65	5,3
	LIMA CENTRO	10,2%	1,6	7,5 ; 13,7	2,05	15,4
	LIMA NORTE	10,5%	1,4	8,1 ; 13,6	2,43	13,2
	LIMA ESTE	13,5%	1,1	11,5 ; 15,8	1,14	8,2
	LIMA SUR	12,7%	1,3	10,4 ; 15,5	1,37	10,1
	CALLAO	11,4%	1,5	8,7 ; 14,8	1,13	13,5
MORBILIDAD SENTIDA EXPRESADA ATENDIDA EN SERVICIOS DE SALUD (% DE LA DEMANDA SENTIDA) (PREVALENCIA ANUAL)	TOTAL	31,0%	2,5	26,3 ; 36,1	1,63	8,1
	LIMA CENTRO	51,8%	8,4	35,6 ; 67,6	2,34	16,3
	LIMA NORTE	29,6%	5,6	19,9 ; 41,6	1,97	18,8
	LIMA ESTE	23,5%	3,5	17,4 ; 31,0	1,05	14,8
	LIMA SUR	23,9%	4,2	16,6 ; 33,1	1,22	17,7
	CALLAO	39,7%	7,7	26,0 ; 55,4	1,43	19,4
PROPORCIÓN DE LA MORBILIDAD SENTIDA ATENDIDA EN (TOTAL)	PUESTOS O CENTROS DE SALUD	3,9%	1,0	2,4 ; 6,5	1,53	26,0
	HOSPITAL GENERAL DE MINSA	5,7%	1,1	3,8 ; 8,3	1,29	19,7
	POSTA O POLICLÍNICO	3,7%	0,8	2,4 ; 5,7	1,05	22,1
	HOSPITAL GENERAL DE ESSALUD	2,3%	0,7	1,2 ; 4,1	1,23	31,0
	CONSULTORIO PAAD-ESSALUD	0,2%	0,2	0,0 ; 1,7	1,33	99,8
	INSTITUTO U HOSPITAL ESPECIALIZADO	0,9%	0,4	0,3 ; 2,2	1,11	48,3
	CENTRO DE SALUD MENTAL DE ESSALUD	0,8%	0,4	0,3 ; 2,2	1,20	52,6
	CONSULTORIO MÉDICO PARTICULAR	3,5%	1,1	1,8 ; 6,6	2,16	33,0
	HOSPITAL DE LAS FFAA Y POLICIA NACIONAL	0,3%	0,3	0,0 ; 2,2	1,75	100,0
	CLÍNICA PARTICULAR	5,0%	1,4	2,9 ; 8,5	2,16	27,3
	CONSULTORIO DEL INSTITUCIÓN ACADÉMICA	0,5%	0,3	0,2 ; 1,7	1,02	58,2
	CONSULTORIO DE CENTRO PARROQUIAL	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,48	50,9
	HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD	1,7%	0,6	0,9 ; 3,5	1,26	35,9
	INSTITUTO NACIONAL MINSA	0,6%	0,6	0,1 ; 3,9	3,14	99,7
	OTRO	1,5%	1,1	0,4 ; 6,0	4,27	70,5
PROPORCIÓN DE LA MORBILIDAD SENTIDA ATENDIDA EN (LIMA CENTRO)	PUESTOS O CENTROS DE SALUD	1,1%	1,1	0,2 ; 7,2	0,87	97,2
	HOSPITAL GENERAL DE MINSA	3,8%	2,3	1,1 ; 12,1	1,21	60,7
	POSTA O POLICLÍNICO	2,5%	1,9	0,5 ; 11,0	1,30	79,3
	HOSPITAL GENERAL DE ESSALUD	2,2%	1,6	0,5 ; 8,9	0,98	71,9
	INSTITUTO U HOSPITAL ESPECIALIZADO	1,9%	2,0	0,3 ; 12,9	1,64	100,1
	CONSULTORIO MÉDICO PARTICULAR	1,3%	1,4	0,2 ; 9,2	1,14	100,7
	CLÍNICA PARTICULAR	22,7%	7,7	11,0 ; 41,0	2,78	33,9
	HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD	5,4%	3,1	1,7 ; 15,9	1,56	57,4
	INSTITUTO NACIONAL MINSA	3,8%	3,7	0,5 ; 22,7	3,15	98,2
	OTRO	6,9%	6,5	1,0 ; 35,4	5,49	95,0
PROPORCIÓN DE LA MORBILIDAD SENTIDA ATENDIDA EN (LIMA NORTE)	PUESTOS O CENTROS DE SALUD	4,9%	2,9	1,5 ; 14,7	2,33	58,4
	HOSPITAL GENERAL DE MINSA	7,0%	2,8	3,1 ; 15,0	1,63	40,5
	POSTA O POLICLÍNICO	3,7%	2,0	1,2 ; 10,4	1,51	54,8
	CONSULTORIO PAAD-ESSALUD	1,0%	1,0	0,1 ; 6,8	1,33	99,3
	CONSULTORIO MÉDICO PARTICULAR	7,4%	4,0	2,5 ; 20,3	3,14	54,3
	CLÍNICA PARTICULAR	1,9%	1,3	0,5 ; 7,4	1,28	70,6
	HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD	1,8%	1,3	0,4 ; 7,1	1,25	71,9
	INSTITUTO NACIONAL MINSA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	OTRO	2,0%	1,6	0,4 ; 8,9	1,67	79,6

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN	
PROPORCIÓN DE LA MORBILIDAD SENTIDA ATENDIDA EN (LIMA ESTE)	PUESTOS O CENTROS DE SALUD	3,2%	1,8	1,0 ; 9,4	1,65	56,8	
	HOSPITAL GENERAL DE MINSA	4,9%	1,8	2,3 ; 10,0	1,11	37,3	
	POSTA O POLICLÍNICO	4,8%	1,7	2,4 ; 9,4	0,96	35,0	
	HOSPITAL GENERAL DE ESSALUD	1,7%	0,9	0,6 ; 4,6	0,70	50,5	
	INSTITUTO U HOSPITAL ESPECIALIZADO	2,0%	1,0	0,7 ; 5,5	0,86	51,9	
	CENTRO DE SALUD MENTAL DE ESSALUD	1,4%	1,1	0,3 ; 6,3	1,35	77,4	
	CONSULTORIO MÉDICO PARTICULAR	1,9%	1,0	0,7 ; 5,1	0,81	52,2	
	CLÍNICA PARTICULAR	1,3%	1,0	0,3 ; 5,5	1,16	75,8	
	CONSULTORIO DE INSTITUCIÓN ACADÉMICA	0,5%	0,5	0,1 ; 3,7	0,84	100,2	
	CONSULTORIO DE CENTRO PARROQUIAL	1,0%	0,6	0,3 ; 3,0	0,52	57,6	
	HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD	0,7%	0,6	0,2 ; 3,2	0,68	76,9	
	OTRO	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	0,21	99,6	
PROPORCIÓN DE LA MORBILIDAD SENTIDA ATENDIDA EN (LIMA SUR)	PUESTOS O CENTROS DE SALUD	3,4%	1,7	1,3 ; 8,9	1,08	49,4	
	HOSPITAL GENERAL DE MINSA	6,2%	2,3	3,0 ; 12,6	1,12	36,9	
	POSTA O POLICLÍNICO	2,4%	1,1	0,9 ; 5,9	0,67	47,3	
	HOSPITAL GENERAL DE ESSALUD	2,4%	1,7	0,6 ; 9,4	1,57	71,6	
	CONSULTORIO MÉDICO PARTICULAR	4,3%	1,9	1,8 ; 9,9	1,07	43,8	
	HOSPITAL DE LAS FFAA Y POLICIA NACIONAL	1,4%	1,4	0,2 ; 9,4	1,77	99,8	
	CLÍNICA PARTICULAR	2,9%	1,7	0,9 ; 8,7	1,22	57,0	
	CONSULTORIO DE CENTRO PARROQUIAL	0,3%	0,3	0,0 ; 1,8	0,32	100,0	
	HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD	0,6%	0,6	0,1 ; 4,0	0,71	100,0	
	PUESTOS O CENTROS DE SALUD	8,9%	3,7	3,9 ; 19,2	0,96	41,2	
	HOSPITAL GENERAL DE MINSA	6,3%	3,5	2,0 ; 17,8	1,21	55,8	
	POSTA O POLICLÍNICO	5,6%	2,5	2,3 ; 13,2	0,70	45,0	
PROPORCIÓN DE LA MORBILIDAD SENTIDA ATENDIDA EN (CALLAO)	HOSPITAL GENERAL DE ESSALUD	8,7%	4,4	3,1 ; 22,1	1,42	50,9	
	CENTRO DE SALUD MENTAL DE ESSALUD	3,6%	2,5	0,9 ; 13,2	1,02	68,8	
	CLÍNICA PARTICULAR	1,3%	1,3	0,2 ; 8,4	0,72	97,8	
	CONSULTORIO DE INSTITUCIÓN ACADÉMICA	3,7%	2,6	0,9 ; 14,1	1,12	70,8	
	HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD	1,6%	1,6	0,2 ; 11,0	0,97	100,8	
	TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD SENTIDA Y EXPRESADA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN (TOTAL)	MEDICINAS	58,0%	5,0	48,0 ; 67,4	1,62	8,6
	PSICOTERAPIA	31,6%	4,4	23,6 ; 40,9	1,42	14,1	
	CONSEJERÍA	73,2%	4,1	64,4 ; 80,5	1,35	5,6	
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD SENTIDA Y EXPRESADA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN (LIMA CENTRO)	HOSPITALIZACIÓN	5,9%	1,8	3,1 ; 10,7	0,95	31,4	
	OTROS	1,9%	1,3	0,5 ; 6,9	1,35	66,6	
	MEDICINAS	59,5%	12,1	35,4 ; 79,8	2,40	20,4	
	PSICOTERAPIA	18,1%	7,3	7,8 ; 36,7	1,40	40,1	
	CONSEJERÍA	75,9%	9,0	54,5 ; 89,3	1,69	11,9	
	HOSPITALIZACIÓN	7,2%	4,5	2,1 ; 22,3	1,16	61,7	
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD SENTIDA Y EXPRESADA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN (LIMA NORTE)	OTROS	1,2%	1,2	0,2 ; 8,4	0,50	102,3	
	MEDICINAS	51,7%	12,4	28,7 ; 73,9	2,21	24,0	
	PSICOTERAPIA	39,3%	11,7	19,9 ; 62,9	2,05	29,7	
	CONSEJERÍA	74,7%	9,7	51,8 ; 89,0	1,79	13,0	
	HOSPITALIZACIÓN	3,4%	3,3	0,5 ; 20,0	1,17	96,4	
	OTROS	5,1%	5,0	0,7 ; 28,9	1,84	98,2	
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD SENTIDA Y EXPRESADA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN (LIMA ESTE)	MEDICINAS	55,8%	7,9	40,3 ; 70,3	0,84	14,1	
	PSICOTERAPIA	29,9%	7,2	17,9 ; 45,6	0,83	24,0	
	CONSEJERÍA	72,3%	7,4	55,9 ; 84,3	0,91	10,2	
	HOSPITALIZACIÓN	10,2%	4,8	3,9 ; 24,0	0,83	46,9	
	OTROS	2,1%	2,1	0,3 ; 13,9	0,73	100,0	
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD SENTIDA Y EXPRESADA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN (LIMA SUR)	MEDICINAS	67,9%	8,7	49,2 ; 82,2	0,94	12,8	
	PSICOTERAPIA	32,9%	9,4	17,6 ; 53,1	1,03	28,5	
	CONSEJERÍA	70,1%	8,9	50,4 ; 84,3	1,01	12,7	
	HOSPITALIZACIÓN	3,0%	2,2	0,7 ; 12,3	0,46	75,5	
	OTROS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD SENTIDA Y EXPRESADA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN (CALLAO)	MEDICINAS	56,7%	11,3	34,5 ; 76,4	1,10	20,0
	PSICOTERAPIA	44,9%	9,9	27,1 ; 64,1	0,83	22,0
	CONSEJERÍA	71,4%	10,4	48,0 ; 87,1	1,10	14,5
	HOSPITALIZACIÓN	4,4%	4,3	0,6 ; 25,9	0,91	99,4
	OTROS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD ATENDIDA (TOTAL)	PSIQUIATRA	25,2%	4,4	17,6 ; 34,8	1,62	17,5
	PSICÓLOGO	41,8%	5,0	32,4 ; 51,7	1,60	11,9
	MÉDICO GENERAL	25,9%	3,9	19,0 ; 34,3	1,26	15,1
	NEURÓLOGO	5,6%	2,4	2,3 ; 12,8	1,79	43,9
	OTROS	1,5%	1,2	0,3 ; 7,0	1,53	79,6
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD ATENDIDA (LIMA CENTRO)	PSIQUIATRA	35,3%	12,1	16,2 ; 60,6	2,51	34,2
	PSICÓLOGO	28,6%	12,0	11,2 ; 55,9	2,79	42,1
	MÉDICO GENERAL	28,9%	9,6	13,9 ; 50,5	1,79	33,4
	NEURÓLOGO	7,3%	7,0	1,0 ; 37,5	2,86	96,1
	OTROS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD ATENDIDA (LIMA NORTE)	PSIQUIATRA	8,9%	6,0	2,2 ; 29,3	1,58	67,2
	PSICÓLOGO	52,3%	11,6	30,6 ; 73,1	1,92	22,1
	MÉDICO GENERAL	25,3%	8,5	12,3 ; 45,0	1,37	33,5
	NEURÓLOGO	8,3%	6,3	1,8 ; 31,3	1,85	75,4
	OTROS	5,2%	5,1	0,7 ; 29,5	1,89	98,0
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD ATENDIDA (LIMA ESTE)	PSIQUIATRA	27,2%	7,7	14,8 ; 44,6	1,02	28,5
	PSICÓLOGO	51,4%	8,7	34,8 ; 67,7	1,02	16,9
	MÉDICO GENERAL	18,5%	6,7	8,6 ; 35,4	1,01	36,4
	NEURÓLOGO	2,3%	1,6	0,5 ; 9,1	0,42	73,3
	OTROS	0,6%	0,6	0,1 ; 4,1	0,20	99,9
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD ATENDIDA (LIMA SUR)	PSIQUIATRA	34,3%	9,8	18,2 ; 55,0	1,15	28,5
	PSICÓLOGO	32,3%	8,6	18,1 ; 50,7	0,91	26,6
	MÉDICO GENERAL	26,9%	8,4	13,8 ; 45,9	0,97	31,1
	NEURÓLOGO	5,4%	4,1	1,2 ; 21,5	0,88	75,2
	OTROS	1,2%	1,2	0,2 ; 8,0	1,01	32,4
TIPO DE AYUDA RECIBIDA POR LA MORBILIDAD ATENDIDA (CALLAO)	PSIQUIATRA	19,5%	7,7	8,5 ; 38,7	0,78	39,2
	PSICÓLOGO	45,3%	10,3	26,9 ; 65,2	0,90	22,7
	MÉDICO GENERAL	31,9%	10,0	16,0 ; 53,5	0,96	31,2
	NEURÓLOGO	3,2%	3,1	0,5 ; 19,4	0,66	97,0
	OTROS	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
MOTIVOS PRINCIPALES DE NO BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS PERSONAS QUE PERCIBIERON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL (TOTAL)	NO SABÍA A DÓNDE IR	26,5%	2,7	21,5 ; 32,2	1,52	10,3
	NO TENÍA DINERO	30,2%	2,7	25,2 ; 35,7	1,37	9,0
	TENÍA DINERO, PERO PREFERÍA GASTARLO EN OTRA COSA	9,3%	1,8	6,3 ; 13,6	1,56	19,6
	NO CUBRÍA SEGURO MÉDICO	6,5%	1,3	4,4 ; 9,6	1,09	19,8
	LARGAS LISTAS DE ESPERA	10,3%	2,0	7,0 ; 14,9	1,65	19,1
	NO EXISTÍA SERVICIO DE SALUD MENTAL CERCANO	7,6%	1,6	5,0 ; 11,5	1,49	21,3
	FALTA DE CONFIANZA	30,3%	2,6	25,4 ; 35,7	1,27	8,6
	DUDA DE MANEJO POR MÉDICOS	15,6%	2,2	11,8 ; 20,4	1,45	14,1
	PENSABA QUE NO LE AYUDARÍA	16,7%	2,1	13,1 ; 21,2	1,22	12,4
	LO DEBÍA SUPERAR SOLO	50,4%	3,1	44,3 ; 56,5	1,54	6,2
	PREFERENCIA REMEDIOS CASEROS	8,3%	1,7	5,6 ; 12,2	1,42	20,0
	POR VERGÜENZA	14,2%	2,1	10,6 ; 18,7	1,38	14,5
	SU ESPOSO(A) O PAREJA LA(O) CRITICARÍA O NO LE GUSTARÍA	4,0%	1,1	2,4 ; 6,7	1,17	26,6
	SU ESPOSO(A) O PAREJA SE BURLARÍA DE USTED	1,9%	0,7	1,0 ; 3,7	0,89	33,9
	SU ESPOSO(A) O PAREJA NO LE AYUDARÍA ECONÓMICAMENTE PARA LA CONSULTA	2,4%	0,9	1,1 ; 4,9	1,33	37,2
	SU ESPOSO(A) O PAREJA LO PROHIBIRÍA	1,1%	0,5	0,4 ; 2,7	0,94	46,4
	SUS VECINOS HABLARÍAN MAL DE UD. SI SE ENTERARAN	7,6%	1,4	5,2 ; 10,8	1,12	18,6
	POR TEMOR A QUE LO(A) VIERAN COMO ENFERMO(A) MENTAL	8,1%	1,5	5,6 ; 11,4	1,14	18,1
	EXPERIENCIA DE MALA ATENCIÓN ANTERIOR	6,6%	1,4	4,3 ; 10,1	1,33	21,8
	POR FALTA DE TIEMPO	33,1%	2,8	27,9 ; 38,8	1,37	8,4
	NO HAY CENTRO DE SALUD CERCANO	4,4%	1,1	2,7 ; 7,2	1,13	24,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
	PREFERÍA TRATAMIENTO CON NATURISTA O YERBERO	5,2%	1,3	3,1 ; 8,5	1,45	26,0
	PREFERÍA TRATAMIENTO CON CURANDERO O BRUJO	1,4%	0,7	0,5 ; 3,5	1,26	47,8
	NO ERA SERIO, GRAVE O MUY IMPORTANTE	31,1%	3,0	25,7 ; 37,2	1,61	9,5
	OTRO	11,9%	2,1	8,3 ; 16,7	1,68	17,8
MOTIVOS PRINCIPALES DE NO BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS PERSONAS QUE PERCIBIERON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL (LIMA CENTRO)	NO SABÍA A DÓNDE IR	17,8%	8,4	6,6 ; 40,1	1,98	47,2
	NO TENÍA DINERO	17,7%	8,4	6,4 ; 40,2	2,02	47,8
	TENÍA DINERO, PERO PREFERÍA GASTARLO EN OTRA COSA	5,6%	5,5	0,8 ; 31,2	2,33	97,8
	NO CUBRÍA SEGURO MÉDICO	1,4%	1,4	0,2 ; 9,9	0,62	102,0
	LARGAS LISTAS DE ESPERA	4,7%	3,7	1,0 ; 19,9	1,25	78,6
	FALTA DE CONFIANZA	18,2%	5,8	9,4 ; 32,3	0,93	31,8
	DUDA DE MANEJO POR MÉDICOS	10,2%	5,9	3,1 ; 28,8	1,58	57,9
	PENSABA QUE NO LE AYUDARÍA	9,8%	5,0	3,4 ; 24,8	1,16	51,1
	LO DEBÍA SUPERAR SOLO	34,8%	9,3	19,2 ; 54,5	1,58	26,8
	POR VERGÜENZA	6,6%	4,9	1,5 ; 25,1	1,59	74,1
	SUS VECINOS HABLARÍAN MAL DE UD. SI SE ENTERARAN	2,2%	2,2	0,3 ; 14,5	0,94	101,2
	POR FALTA DE TIEMPO	23,8%	8,3	11,2 ; 43,5	1,58	35,1
	NO ERA SERIO, GRAVE O MUY IMPORTANTE	25,7%	10,9	10,1 ; 51,5	2,56	42,4
	OTRO	24,7%	8,5	11,7 ; 44,7	1,61	34,6
MOTIVOS PRINCIPALES DE NO BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS PERSONAS QUE PERCIBIERON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL (LIMA NORTE)	NO SABÍA A DÓNDE IR	32,4%	5,7	22,3 ; 44,6	1,46	17,7
	NO TENÍA DINERO	35,6%	6,3	24,4 ; 48,7	1,68	17,7
	TENÍA DINERO, PERO PREFERÍA GASTARLO EN OTRA COSA	10,6%	3,3	5,7 ; 18,9	1,08	30,8
	NO CUBRÍA SEGURO MÉDICO	7,7%	3,0	3,5 ; 16,1	1,23	38,9
	LARGAS LISTAS DE ESPERA	21,1%	6,3	11,2 ; 36,0	2,31	30,0
	NO EXISTÍA SERVICIO DE SALUD MENTAL CERCANO	16,5%	5,0	8,8 ; 28,9	1,79	30,6
	FALTA DE CONFIANZA	34,1%	5,7	23,9 ; 46,0	1,41	16,8
	DUDA DE MANEJO POR MÉDICOS	23,1%	5,1	14,7 ; 34,4	1,39	21,9
	PENSABA QUE NO LE AYUDARÍA	21,8%	4,9	13,6 ; 33,0	1,39	22,7
	LO DEBÍA SUPERAR SOLO	58,2%	6,1	46,0 ; 69,5	1,47	10,5
	PREFERENCIA REMEDIOS CASEROS	19,2%	5,3	10,8 ; 31,7	1,76	27,7
	POR VERGÜENZA	17,1%	4,5	10,0 ; 27,7	1,36	26,1
	SU ESPOSO(A) O PAREJA LA(O) CRITICARÍA O NO LE GUSTARÍA	7,0%	2,6	3,4 ; 14,1	0,98	36,7
	SU ESPOSO(A) O PAREJA SE BURLARÍA DE USTED	2,2%	1,5	0,6 ; 8,1	1,01	68,8
	SU ESPOSO(A) O PAREJA LO PROHIBIRÍA	1,0%	0,9	0,1 ; 6,3	0,90	97,6
	SUS VECINOS HABLARÍAN MAL DE UD. SI SE ENTERARAN	8,6%	3,0	4,2 ; 16,6	1,12	35,1
	POR TEMOR A QUE LO(A) VIERAN COMO ENFERMO(A) MENTAL	14,2%	4,3	7,6 ; 24,9	1,48	30,5
	EXPERIENCIA DE MALA ATENCIÓN ANTERIOR	11,3%	4,3	5,2 ; 22,7	1,76	37,7
	POR FALTA DE TIEMPO	35,6%	6,5	24,1 ; 49,1	1,74	18,2
	NO HAY CENTRO DE SALUD CERCANO	6,6%	2,9	2,7 ; 15,1	1,30	44,0
	PREFERÍA TRATAMIENTO CON NATURISTA O YERBERO	5,1%	2,5	1,9 ; 13,1	1,26	49,5
	PREFERÍA TRATAMIENTO CON CURANDERO O BRUJO	3,7%	2,1	1,2 ; 10,7	1,15	55,5
	NO ERA SERIO, GRAVE O MUY IMPORTANTE	34,3%	6,7	22,5 ; 48,3	1,92	19,5
	OTRO	3,2%	2,0	0,9 ; 10,5	1,23	61,9
MOTIVOS PRINCIPALES DE NO BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS PERSONAS QUE PERCIBIERON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	NO SABÍA A DÓNDE IR	28,1%	4,6	20,0 ; 38,1	1,31	16,5
	NO TENÍA DINERO	36,0%	4,8	27,1 ; 45,9	1,25	13,4
	TENÍA DINERO, PERO PREFERÍA GASTARLO EN OTRA COSA	6,2%	2,6	2,7 ; 14,0	1,48	42,5
	NO CUBRÍA SEGURO MÉDICO	6,2%	1,9	3,4 ; 11,1	0,76	30,5
	LARGAS LISTAS DE ESPERA	7,6%	2,2	4,3 ; 13,1	0,82	28,4
	NO EXISTÍA SERVICIO DE SALUD MENTAL CERCANO	5,0%	1,9	2,3 ; 10,5	0,99	39,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MOTIVOS PRINCIPALES DE NO BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS PERSONAS QUE PERCIBIERON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL (LIMA ESTE)	FALTA DE CONFIANZA	34,6%	4,9	25,6 ; 44,8	1,33	14,3
	DUDA DE MANEJO POR MÉDICOS	11,7%	4,0	5,8 ; 22,2	1,96	34,7
	PENSABA QUE NO LE AYUDARÍA	14,9%	3,7	9,0 ; 23,6	1,32	24,6
	LO DEBÍA SUPERAR SOLO	48,8%	5,4	38,5 ; 59,3	1,44	11,0
	PREFERENCIA REMEDIOS CASEROS	5,9%	2,1	2,9 ; 11,5	0,95	34,9
	POR VERGÜENZA	12,4%	3,3	7,2 ; 20,5	1,24	26,7
	SU ESPOSO(A) O PAREJA LA(O) CRITICARÍA O NO LE GUSTARÍA	2,5%	1,6	0,7 ; 8,5	1,29	63,8
	SU ESPOSO(A) O PAREJA SE BURLARÍA DE USTED	1,2%	0,9	0,3 ; 4,8	0,75	68,8
	SU ESPOSO(A) O PAREJA NO LE AYUDARÍA ECONÓMICAMENTE PARA LA CONSULTA	2,4%	1,5	0,7 ; 8,0	1,21	63,3
	SU ESPOSO(A) O PAREJA LO PROHIBIRÍA	1,3%	1,0	0,3 ; 5,6	0,94	77,5
	SUS VECINOS HABLARÍAN MAL DE UD. SI SE ENTERARAN	5,7%	2,1	2,8 ; 11,5	1,01	36,6
	POR TEMOR A QUE LO(A) VIERAN COMO ENFERMO(A) MENTAL	8,5%	2,4	4,8 ; 14,6	0,93	28,5
	EXPERIENCIA DE MALA ATENCIÓN ANTERIOR	3,7%	1,4	1,8 ; 7,7	0,66	37,7
	POR FALTA DE TIEMPO	36,0%	5,0	26,9 ; 46,3	1,33	13,8
	NO HAY CENTRO SE SALUD CERCANO	3,8%	1,5	1,7 ; 8,3	0,81	40,6
	PREFERÍA TRATAMIENTO CON NATURISTA O YERBERO	7,0%	3,2	2,7 ; 16,6	2,00	46,3
	PREFERÍA TRATAMIENTO CON CURANDERO O BRUJO	0,2%	0,2	0,0 ; 1,5	0,26	100,1
	NO ERA SERIO, GRAVE O MUY IMPORTANTE	26,8%	4,7	18,6 ; 36,9	1,39	17,5
	OTRO	10,2%	2,9	5,7 ; 17,6	1,17	28,9
MOTIVOS PRINCIPALES DE NO BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS PERSONAS QUE PERCIBIERON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL (LIMA SUR)	NO SABÍA A DÓNDE IR	19,9%	4,6	12,4 ; 30,4	1,28	22,9
	NO TENÍA DINERO	24,3%	4,3	16,8 ; 33,8	1,00	17,8
	TENÍA DINERO, PERO PREFERÍA GASTARLO EN OTRA COSA	16,0%	4,8	8,6 ; 27,7	1,67	29,9
	NO CUBRÍA SEGURO MÉDICO	8,9%	3,2	4,3 ; 17,5	1,26	36,3
	LARGAS LISTAS DE ESPERA	6,1%	2,5	2,7 ; 13,2	1,04	40,5
	NO EXISTÍA SERVICIO DE SALUD MENTAL CERCANO	5,6%	2,6	2,2 ; 13,4	1,21	45,9
	FALTA DE CONFIANZA	31,8%	4,9	23,0 ; 42,0	1,07	15,4
	DUDA DE MANEJO POR MÉDICOS	17,6%	4,1	11,0 ; 27,1	1,12	23,1
	PENSABA QUE NO LE AYUDARÍA	18,4%	3,9	11,9 ; 27,4	1,01	21,4
	LO DEBÍA SUPERAR SOLO	57,3%	5,7	46,0 ; 67,9	1,29	9,9
	PREFERENCIA REMEDIOS CASEROS	3,6%	1,8	1,3 ; 9,4	0,92	49,8
	POR VERGÜENZA	20,2%	5,1	11,9 ; 32,0	1,58	25,3
	SU ESPOSO(A) O PAREJA LA(O) CRITICARÍA O NO LE GUSTARÍA	5,3%	2,6	2,0 ; 13,4	1,32	48,8
	SU ESPOSO(A) O PAREJA SE BURLARÍA DE USTED	3,4%	1,8	1,2 ; 9,3	0,95	52,7
	SU ESPOSO(A) O PAREJA NO LE AYUDARÍA ECONÓMICAMENTE PARA LA CONSULTA	4,2%	2,6	1,2 ; 13,3	1,61	61,3
	SU ESPOSO(A) O PAREJA LO PROHIBIRÍA	1,9%	1,4	0,4 ; 7,5	0,97	72,3
	SUS VECINOS HABLARÍAN MAL DE UD. SI SE ENTERARAN	9,8%	3,5	4,8 ; 19,1	1,32	35,4
	POR TEMOR A QUE LO(A) VIERAN COMO ENFERMO(A) MENTAL	4,4%	1,8	1,9 ; 9,7	0,79	42,0
	EXPERIENCIA DE MALA ATENCIÓN ANTERIOR	9,6%	3,3	4,7 ; 18,3	1,24	34,6
	POR FALTA DE TIEMPO	33,3%	4,7	24,8 ; 43,2	0,99	14,2
	NO HAY CENTRO SE SALUD CERCANO	3,6%	2,4	1,0 ; 12,4	1,55	64,5
	PREFERÍA TRATAMIENTO CON NATURISTA O YERBERO	5,2%	2,1	2,3 ; 11,1	0,85	39,8
	PREFERÍA TRATAMIENTO CON CURANDERO O BRUJO	1,6%	1,6	0,2 ; 10,7	1,58	99,2
	NO ERA SERIO, GRAVE O MUY IMPORTANTE	38,3%	5,9	27,5 ; 50,3	1,42	15,4
	OTRO	13,6%	3,8	7,6 ; 22,9	1,21	28,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
MOTIVOS PRINCIPALES DE NO BÚSQUEDA DE ATENCIÓN MÉDICA DE LAS PERSONAS QUE PERCIBIERON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL (CALLAO)	NO SABÍA A DÓNDE IR	33,1%	11,8	14,9 ; 58,4	2,25	35,5
	NO TENÍA DINERO	26,1%	7,2	14,5 ; 42,4	0,97	27,5
	TENÍA DINERO, PERO PREFERÍA GASTARLO EN OTRA COSA	2,9%	2,2	0,7 ; 11,9	0,56	74,2
	NO CUBRÍA SEGURO MÉDICO	3,8%	2,7	0,9 ; 14,5	0,72	70,6
	LARGAS LISTAS DE ESPERA	8,4%	3,8	3,4 ; 19,6	0,67	45,2
	NO EXISTÍA SERVICIO DE SALUD MENTAL CERCANO	7,2%	3,7	2,5 ; 18,9	0,76	52,3
	FALTA DE CONFIANZA	15,9%	5,3	7,9 ; 29,3	0,77	33,7
	DUDA DE MANEJO POR MÉDICOS	9,9%	4,4	4,0 ; 22,6	0,80	44,7
	PENSABA QUE NO LE AYUDARÍA	13,0%	5,0	5,9 ; 26,2	0,80	38,5
	LO DEBÍA SUPERAR SOLO	33,6%	9,6	17,9 ; 54,0	1,48	28,4
	PREFERENCIA REMEDIOS CASEROS	9,3%	4,1	3,8 ; 21,2	0,73	44,5
	POR VERGÜENZA	4,5%	2,8	1,3 ; 14,5	0,66	61,9
	SU ESPOSO(A) O PAREJA LA(O) CRITICARÍA O NO LE GUSTARÍA	1,9%	1,9	0,3 ; 12,5	0,70	98,8
	SU ESPOSO(A) O PAREJA SE BURLARÍA DE USTED	1,9%	1,9	0,3 ; 12,5	0,70	98,8
	SU ESPOSO(A) O PAREJA NO LE AYUDARÍA ECONÓMICAMENTE PARA LA CONSULTA	6,5%	3,6	2,1 ; 18,0	0,75	54,9
	SUS VECINOS HABLARÍAN MAL DE UD. SI SE ENTERARAN	11,3%	4,4	5,1 ; 23,2	0,70	39,1
	POR TEMOR A QUE LO(A) VIERAN COMO ENFERMO(A) MENTAL	9,3%	4,1	3,8 ; 21,2	0,73	44,5
	EXPERIENCIA DE MALA ATENCIÓN ANTERIOR	3,4%	2,5	0,8 ; 13,7	0,70	73,9
	POR FALTA DE TIEMPO	26,6%	7,7	14,4 ; 43,9	1,09	28,8
	NO HAY CENTRO DE SALUD CERCANO	8,2%	3,9	3,2 ; 19,7	0,72	47,0
	PREFERÍA TRATAMIENTO CON NATURISTA O YERBERO	4,8%	3,3	1,2 ; 17,4	0,88	69,5
	NO ERA SERIO, GRAVE O MUY IMPORTANTE	24,8%	8,8	11,6 ; 45,4	1,49	35,4
	OTRO	21,8%	12,2	6,4 ; 53,2	3,16	56,1
SÍNDROMES SOCIOCULTURALES Y SALUD MENTAL						
PREVALENCIA DE VIDA DE SÍNDROMES FOLCLÓRICOS (TOTAL)	DAÑO	6,2%	0,4	5,4 ; 7,1	1,46	7,1
	SUSTO	8,9%	0,5	8,0 ; 10,0	1,51	5,9
	MAL DE OJO	5,0%	0,4	4,3 ; 5,9	1,56	8,2
	AIRE	5,0%	0,4	4,2 ; 5,8	1,55	8,2
	CHUCAQUE	8,4%	0,6	7,4 ; 9,6	1,80	6,7
	ATAQUE DE NERVIOS	2,2%	0,3	1,7 ; 2,8	1,63	12,9
	EPILEPSIA	0,9%	0,2	0,6 ; 1,3	1,39	18,7
	PROBLEMAS DE ALCOHOL	1,7%	0,3	1,3 ; 2,3	1,77	15,2
	ESTRÉS	11,2%	0,7	9,9 ; 12,6	2,17	6,2
	TRAUMA	1,0%	0,2	0,7 ; 1,4	1,56	18,9
PREVALENCIA DE VIDA DE SÍNDROMES FOLCLÓRICOS (LIMA CENTRO)	DAÑO	4,3%	1,0	2,7 ; 6,8	1,87	23,4
	SUSTO	4,1%	0,9	2,7 ; 6,2	1,48	21,2
	MAL DE OJO	4,3%	1,0	2,7 ; 6,7	1,81	23,0
	AIRE	1,9%	0,6	1,0 ; 3,7	1,71	33,9
	CHUCAQUE	3,2%	0,8	2,0 ; 5,1	1,41	23,5
	ATAQUE DE NERVIOS	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,78	59,4
	EPILEPSIA	0,2%	0,1	0,0 ; 0,7	0,74	75,4
	PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,6%	0,4	0,2 ; 2,0	1,63	57,1
	ESTRÉS	6,6%	1,4	4,3 ; 9,9	2,39	21,1
	TRAUMA	0,8%	0,5	0,2 ; 2,6	2,33	62,1
PREVALENCIA DE VIDA DE SÍNDROMES FOLCLÓRICOS (LIMA NORTE)	DAÑO	6,5%	1,0	4,8 ; 8,8	1,98	15,5
	SUSTO	12,5%	1,4	10,0 ; 15,5	2,10	11,2
	MAL DE OJO	6,0%	0,9	4,4 ; 8,0	1,68	15,0
	AIRE	5,4%	0,9	3,8 ; 7,5	2,00	17,2
	CHUCAQUE	17,2%	1,6	14,3 ; 20,5	2,05	9,1
	ATAQUE DE NERVIOS	4,1%	0,9	2,7 ; 6,1	2,26	21,3
	EPILEPSIA	1,2%	0,4	0,7 ; 2,3	1,55	32,3
	PROBLEMAS DE ALCOHOL	2,0%	0,6	1,1 ; 3,6	2,12	29,5
	ESTRÉS	13,7%	1,7	10,7 ; 17,3	2,73	12,1
	TRAUMA	1,4%	0,4	0,7 ; 2,6	1,75	32,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
PREVALENCIA DE VIDA DE SÍNDROMES FOLCLÓRICOS (LIMA ESTE)	DAÑO	6,4%	0,8	5,1 ; 8,1	1,06	11,9
	SUSTO	10,9%	0,9	9,2 ; 12,9	0,98	8,6
	MAL DE OJO	5,1%	0,8	3,7 ; 7,0	1,48	15,9
	AIRE	6,1%	0,8	4,7 ; 7,8	1,16	12,8
	CHUCAQUE	4,8%	0,8	3,5 ; 6,5	1,35	15,7
	ATAQUE DE NERVIOS	2,6%	0,5	1,8 ; 3,8	1,05	19,0
	EPILEPSIA	0,9%	0,3	0,5 ; 1,8	1,14	33,2
	PROBLEMAS DE ALCOHOL	1,8%	0,6	1,0 ; 3,4	1,98	31,3
	ESTRÉS	15,6%	1,4	13,1 ; 18,5	1,52	8,7
PREVALENCIA DE VIDA DE SÍNDROMES FOLCLÓRICOS (LIMA SUR)	TRAUMA	1,3%	0,4	0,8 ; 2,3	1,20	28,6
	DAÑO	7,5%	0,9	5,8 ; 9,6	1,16	12,6
	SUSTO	8,3%	1,0	6,5 ; 10,5	1,24	12,3
	MAL DE OJO	5,1%	0,8	3,6 ; 7,0	1,36	16,7
	AIRE	6,9%	1,0	5,1 ; 9,2	1,53	15,1
	CHUCAQUE	5,8%	1,0	4,2 ; 8,1	1,61	16,9
	ATAQUE DE NERVIOS	1,5%	0,4	0,9 ; 2,6	1,14	28,5
	EPILEPSIA	1,0%	0,4	0,4 ; 2,3	1,76	44,2
	PROBLEMAS DE ALCOHOL	2,2%	0,5	1,4 ; 3,6	1,27	24,8
PREVALENCIA DE VIDA DE SÍNDROMES FOLCLÓRICOS (CALLAO)	ESTRÉS	8,2%	1,2	6,1 ; 11,0	1,86	15,1
	TRAUMA	0,6%	0,3	0,3 ; 1,5	1,18	44,6
	DAÑO	5,5%	1,2	3,6 ; 8,4	1,31	21,7
	SUSTO	4,8%	1,2	3,0 ; 7,7	1,42	24,3
	MAL DE OJO	3,4%	1,0	1,9 ; 5,9	1,36	28,5
	AIRE	2,4%	0,7	1,3 ; 4,4	1,11	30,5
	CHUCAQUE	8,0%	1,5	5,6 ; 11,4	1,38	18,2
	ATAQUE DE NERVIOS	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	0,64	44,9
	EPILEPSIA	0,9%	0,4	0,4 ; 2,1	0,82	43,7
DAÑO (TOTAL)	PROBLEMAS DE ALCOHOL	1,3%	0,6	0,5 ; 3,2	1,38	47,4
	ESTRÉS	7,6%	1,8	4,7 ; 12,1	2,25	23,9
	TRAUMA	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,23	100,5
	TRASTORNO DE ANSIEDAD	20,6%	2,7	15,8 ; 26,4	1,23	13,2
	EPISODIO DEPRESIVO	34,4%	3,5	27,9 ; 41,5	1,48	10,1
	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	9,8%	2,5	5,8 ; 15,9	1,96	25,8
	TRASTORNO DE ANSIEDAD	35,8%	11,6	17,2 ; 60,1	1,92	32,4
	EPISODIO DEPRESIVO	63,5%	11,2	40,2 ; 81,8	1,79	17,7
	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	27,2%	13,8	8,7 ; 59,4	3,14	50,6
DAÑO (LIMA CENTRO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	14,7%	4,4	7,9 ; 25,7	1,21	30,2
	EPISODIO DEPRESIVO	26,6%	6,5	15,9 ; 41,0	1,65	24,3
	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	7,3%	3,4	2,9 ; 17,3	1,29	46,3
DAÑO (LIMA NORTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	19,5%	4,7	11,8 ; 30,5	0,99	24,2
	EPISODIO DEPRESIVO	30,3%	6,1	19,8 ; 43,3	1,21	20,0
	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	1,7%	1,7	0,2 ; 11,3	1,20	99,6
DAÑO (LIMA ESTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	25,6%	5,5	16,3 ; 37,7	1,08	21,4
	EPISODIO DEPRESIVO	34,7%	5,9	24,2 ; 46,9	1,04	16,9
	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	14,3%	4,6	7,4 ; 25,9	1,18	32,1
DAÑO (LIMA SUR)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	8,9%	6,1	2,2 ; 29,8	1,20	68,5
	EPISODIO DEPRESIVO	31,0%	10,1	15,1 ; 53,2	1,26	32,6
	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	4,6%	3,4	1,1 ; 17,7	0,67	72,6
DAÑO (CALLAO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	17,2%	2,0	13,6 ; 21,5	1,14	11,8
	EPISODIO DEPRESIVO	24,3%	2,5	19,7 ; 29,5	1,35	10,3
	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	3,1%	0,9	1,7 ; 5,6	1,18	30,8
SUSTO (TOTAL)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	15,7%	8,5	5,0 ; 39,6	1,72	54,1
	EPISODIO DEPRESIVO	41,9%	10,5	23,6 ; 62,7	1,43	25,1
	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
SUSTO (LIMA CENTRO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	12,5%	3,2	7,4 ; 20,4	1,41	25,9
	EPISODIO DEPRESIVO	15,7%	3,9	9,4 ; 24,9	1,71	25,0
	EPISODIO PSICÓTICO (AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	1,9%	1,5	0,4 ; 8,1	1,63	74,7

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SUSTO (LIMA ESTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	20,0%	3,4	14,1 ; 27,6	0,86	17,1
	EPISODIO DEPRESIVO	28,1%	4,4	20,3 ; 37,5	1,14	15,7
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	1,4%	1,1	0,3 ; 6,2	1,00	77,0
SUSTO (LIMA SUR)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	24,8%	5,0	16,4 ; 35,8	1,00	20,0
	EPISODIO DEPRESIVO	29,5%	5,6	19,8 ; 41,6	1,14	19,0
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	8,9%	3,5	4,0 ; 18,6	1,15	39,5
SUSTO (CALLAO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	9,6%	5,1	3,2 ; 25,3	0,70	53,4
	EPISODIO DEPRESIVO	18,5%	7,8	7,6 ; 38,5	0,92	42,1
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	3,8%	2,8	0,9 ; 14,8	0,48	73,0
MAL DE OJO (TOTAL)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	19,4%	3,1	14,1 ; 26,2	1,33	15,8
	EPISODIO DEPRESIVO	25,2%	3,3	19,3 ; 32,1	1,25	12,9
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	4,6%	1,8	2,1 ; 9,8	1,64	39,1
MAL DE OJO (LIMA CENTRO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	26,8%	10,4	11,5 ; 50,9	1,81	38,8
	EPISODIO DEPRESIVO	29,0%	9,6	14,1 ; 50,4	1,45	32,9
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	13,9	9,4	3,3 ; 42,9	2,41	67,5
MAL DE OJO (LIMA NORTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	9,9%	4,1	4,3 ; 21,3	1,31	41,0
	EPISODIO DEPRESIVO	20,8%	5,8	11,6 ; 34,4	1,44	27,9
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	2,7%	2,0	0,7 ; 10,6	1,01	71,7
MAL DE OJO (LIMA ESTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	19,2%	5,9	10,1 ; 33,4	1,25	30,8
	EPISODIO DEPRESIVO	33,5%	6,9	21,5 ; 48,1	1,19	20,6
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	2,2%	2,1	0,3 ; 13,6	1,18	98,2
MAL DE OJO (LIMA SUR)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	20,8%	5,4	12,2 ; 33,2	0,81	25,8
	EPISODIO DEPRESIVO	25,9%	6,2	15,7 ; 39,7	0,92	23,8
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	5,6%	3,2	1,8 ; 16,4	0,91	57,4
MAL DE OJO (CALLAO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	42,8%	13,5	20,3 ; 68,8	1,20	31,5
	EPISODIO DEPRESIVO	5,7%	3,9	1,5 ; 19,9	0,45	67,6
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
AIRE (TOTAL)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	21,7%	3,2	16,1 ; 28,6	1,32	14,7
	EPISODIO DEPRESIVO	26,7%	3,4	20,6 ; 33,9	1,28	12,7
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	5,4%	1,8	2,8 ; 10,3	1,42	33,7
AIRE (LIMA CENTRO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	19,2%	13,7	4,1 ; 57,4	1,76	71,2
	EPISODIO DEPRESIVO	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	14,5%	13,3	2,0 ; 58,	2,07	91,4
AIRE (LIMA NORTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	15,7%	6,8	6,4 ; 33,7	2,20	43,0
	EPISODIO DEPRESIVO	15,9%	4,9	8,4 ; 27,9	1,14	30,7
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	6,8%	3,7	2,2 ; 18,7	1,39	54,7
AIRE (LIMA ESTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	22,6%	5,3	13,9 ; 34,5	1,05	23,3
	EPISODIO DEPRESIVO	34,4%	7,6	21,4 ; 50,1	1,65	21,8
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
AIRE (LIMA SUR)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	28,6%	5,6	19,0 ; 40,7	0,96	19,4
	EPISODIO DEPRESIVO	39,5%	5,4	29,6 ; 50,4	0,76	13,6
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	7,4%	3,6	2,7 ; 18,4	1,22	49,3
AIRE (CALLAO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	15,3%	9,9	3,9 ; 44,6	0,88	64,4
	EPISODIO DEPRESIVO	13,6%	7,4	4,4 ; 35,3	0,55	54,7
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	6,4%	6,0	1,0 ; 32,9	0,70	93,6
CHUCAQUE (TOTAL)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	16,1%	2,4	12,0 ; 21,2	1,52	14,6
	EPISODIO DEPRESIVO	26,1%	2,7	21,1 ; 31,8	1,45	10,5
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	5,5%	1,4	3,3 ; 8,9	1,35	25,0
CHUCAQUE (LIMA CENTRO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	21,0%	8,3	9,0 ; 41,5	1,03	39,6
	EPISODIO DEPRESIVO	37,4%	11,4	18,7 ; 61,0	1,38	30,6
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	10,3%	5,9	3,2 ; 28,6	0,93	57,2

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
CHUCAQUE (LIMA NORTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	14,1%	3,6	8,5 ; 22,6	2,12	25,2
	EPISODIO DEPRESIVO	22,7%	3,8	16,1 ; 31,1	1,67	16,7
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	5,1%	2,0	2,4 ; 10,7	1,63	38,5
CHUCAQUE (LIMA ESTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	19,8%	5,0	11,7 ; 31,4	0,81	25,2
	EPISODIO DEPRESIVO	21,4%	6,0	11,9 ; 35,4	1,11	28,0
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	1,5%	1,5	0,2 ; 10,2	0,80	100,5
CHUCAQUE (LIMA SUR)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	23,5%	6,1	13,6 ; 37,4	1,10	26,0
	EPISODIO DEPRESIVO	48,2%	7,1	34,8 ; 62,0	1,08	14,7
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	11,5%	4,8	4,9 ; 24,6	1,18	41,4
CHUCAQUE (CALLAO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	7,8%	3,5	3,2 ; 18,1	0,65	44,7
	EPISODIO DEPRESIVO	13,3%	5,7	5,5 ; 28,7	1,07	42,6
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	1,3%	1,3	0,2 ; 9,2	0,53	101,6
ATAQUE DE NERVIOS (TOTAL)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	36,2%	5,8	25,7 ; 48,2	1,41	16,1
	EPISODIO DEPRESIVO	44,3%	5,9	33,1 ; 56,1	1,37	13,4
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	12,5%	4,2	6,3 ; 23,3	1,56	33,8
ATAQUE DE NERVIOS (LIMA CENTRO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	22,6%	21,5	2,6 ; 76,6	0,59	95,1
	EPISODIO DEPRESIVO	100,0%	0,0	100,0 ; 100,0	-	0,0
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	38,5%	29,4	5,2 ; 87,8	0,81	76,5
ATAQUE DE NERVIOS (LIMA NORTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	35,5%	9,3	19,9 ; 54,9	1,81	26,2
	EPISODIO DEPRESIVO	43,2%	9,4	26,4 ; 61,7	1,72	21,7
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	14,8%	7,2	5,3 ; 34,9	2,00	49,0
ATAQUE DE NERVIOS (LIMA ESTE)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	32,1%	9,1	17,3 ; 51,7	1,08	28,3
	EPISODIO DEPRESIVO	32,6%	9,3	17,4 ; 52,6	1,12	28,5
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	4,2%	4,1	0,6 ; 24,7	1,20	98,2
ATAQUE DE NERVIOS (LIMA SUR)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	55,2%	13,4	29,9 ; 78,1	1,00	24,3
	EPISODIO DEPRESIVO	60,5%	13,0	34,5 ; 81,7	0,98	21,5
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	20,2%	10,1	6,9 ; 46,3	0,87	49,8
ATAQUE DE NERVIOS (CALLAO)	TRASTORNO DE ANSIEDAD	11,6%	11,5	1,4 ; 54,4	0,41	99,4
	EPISODIO DEPRESIVO	55,9%	22,1	17,8 ; 88,0	0,63	39,6
	EPISODIO PSICÓTICO(AL MENOS 2 SÍNTOMAS)	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS PSICOLÓGICOS Y SUS MODELOS DE ATENCIÓN (TOTAL)	MÉDICO -ANGUSTIA	32,1%	1,0	30,1 ; 34,1	1,11	3,2
	MÉDICO-TRISTEZA O DEPRESIÓN	27,6%	0,9	25,8 ; 29,5	1,89	3,4
	MÉDICO-LOCURA	47,0%	1,1	44,9 ; 49,1	2,00	2,3
	MÉDICO-PROBLEMAS DE ALCOHOL	43,9%	1,0	41,8 ; 45,9	1,92	2,4
	MÉDICO-VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,3%	0,3	1,8 ; 2,9	1,59	12,4
	PSICÓLOGO -ANGUSTIA	51,5%	1,0	49,4 ; 53,5	1,92	2,0
	PSICÓLOGO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	57,8%	1,0	55,8 ; 59,7	1,76	1,7
	PSICÓLOGO -LOCURA	40,1%	1,0	38,1 ; 42,2	2,03	2,6
	PSICÓLOGO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	34,0%	1,0	32,1 ; 36,0	1,97	2,9
	PSICÓLOGO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	22,2%	0,9	20,6 ; 24,0	1,91	3,9
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -ANGUSTIA	0,5%	0,1	0,3 ; 0,8	1,39	26,3
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	1,59	41,2
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -LOCURA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	1,65	49,7
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,02	51,2
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,1%	0,1	0,1 ; 0,4	1,44	48,2
	CURANDERO -ANGUSTIA	0,4%	0,1	0,3 ; 0,7	1,22	25,4
	CURANDERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	1,13	34,4
	CURANDERO -LOCURA	0,4%	0,1	0,3 ; 0,7	1,12	24,6
	CURANDERO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,4%	0,1	0,2 ; 0,7	1,64	30,2
	CURANDERO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	1,9%	0,2	1,5 ; 2,5	1,46	13,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS PSICOLÓGICOS Y SUS MODELOS DE ATENCIÓN (TOTAL)	BRUJO -ANGUSTIA	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,03	50,0
	BRUJO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	1,97	71,8
	BRUJO -LOCURA	0,3%	0,1	0,1 ; 0,5	1,12	30,5
	BRUJO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,13	59,1
	BRUJO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,4%	0,3	1,9 ; 3,0	1,59	12,2
	SANTIGUADOR O REZADOR -ANGUSTIA	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	0,83	56,9
	SANTIGUADOR O REZADOR -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	2,42	57,8
	SANTIGUADOR O REZADOR -LOCURA	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	1,06	100,0
	SANTIGUADOR O REZADOR -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	2,98	69,1
	SANTIGUADOR O REZADOR -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,4%	0,1	0,2 ; 0,8	2,29	37,3
	YERBERO -ANGUSTIA	0,6%	0,1	0,3 ; 0,9	1,36	23,6
	YERBERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,4%	0,1	0,2 ; 0,7	1,34	26,8
	YERBERO -LOCURA	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,20	59,1
	YERBERO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1%	0,0	0,0 ; 0,2	1,24	66,2
	YERBERO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,1%	0,0	0,0 ; 0,3	1,46	69,8
	NINGUNA -ANGUSTIA	10,7%	0,7	9,4 ; 12,2	2,28	6,6
	NINGUNA -TRISTEZA O DEPRESIÓN	9,0%	0,7	7,7 ; 10,4	2,59	7,7
	NINGUNA -LOCURA	7,5%	0,6	6,4 ; 8,8	2,54	8,4
	NINGUNA -PROBLEMAS DE ALCOHOL	10,2%	0,7	8,9 ; 11,6	2,43	7,0
	NINGUNA -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	63,5%	1,0	61,4 ; 65,5	2,04	1,6
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS PSICOLÓGICOS Y SUS MODELOS DE ATENCIÓN (LIMA CENTRO)	MÉDICO -ANGUSTIA	32,6%	2,9	27,2 ; 38,6	2,98	9,0
	MÉDICO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	27,2%	2,4	22,8 ; 32,2	2,20	8,8
	MÉDICO -LOCURA	51,8%	2,9	46,1 ; 57,4	2,54	5,6
	MÉDICO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	49,8%	3,1	43,8 ; 55,8	2,86	6,2
	MÉDICO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,6%	0,8	1,4 ; 4,6	1,78	29,7
	PSICÓLOGO -ANGUSTIA	57,6%	2,7	52,2 ; 62,9	2,35	4,8
	PSICÓLOGO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	65,1%	2,2	60,7 ; 69,4	1,66	3,4
	PSICÓLOGO -LOCURA	40,9%	2,8	35,6 ; 46,5	2,45	6,8
	PSICÓLOGO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	41,3%	3,0	35,6 ; 47,2	2,78	7,2
	PSICÓLOGO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	26,3%	2,4	21,9 ; 31,1	2,18	9,0
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -ANGUSTIA	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	1,50	100,3
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,13	99,7
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CURANDERO -ANGUSTIA	0,1%	0,1	0,0 ; 1,0	1,04	100,2
	CURANDERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	CURANDERO -LOCURA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	0,95	100,2
	CURANDERO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,90	100,1
	CURANDERO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,8%	0,9	1,5 ; 5,2	2,12	30,9
	BRUJO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,9%	0,3	0,5 ; 1,7	0,76	32,9
	SANTIGUADOR O REZADOR -ANGUSTIA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,50	99,9
	SANTIGUADOR O REZADOR -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,54	100,5
	NINGUNA -ANGUSTIA	7,0%	1,1	5,0 ; 9,6	1,54	16,4
	NINGUNA -TRISTEZA O DEPRESIÓN	5,0%	1,0	3,4 ; 7,4	1,57	19,7
	NINGUNA -LOCURA	4,7%	1,0	3,1 ; 7,1	1,64	20,8
	NINGUNA -PROBLEMAS DE ALCOHOL	3,8%	0,8	2,4 ; 5,8	1,44	21,9
	NINGUNA -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	61,9%	2,5	56,8 ; 66,7	2,06	4,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS PSICOLÓGICOS Y SUS MODELOS DE ATENCIÓN (LIMA NORTE)	MÉDICO -ANGUSTIA	28,2%	2,2	24,1 ; 32,6	2,71	7,6
	MÉDICO-TRISTEZA O DEPRESIÓN	26,5%	2,0	22,8 ; 30,6	2,38	7,5
	MÉDICO-LOCURA	50,6%	2,3	46,1 ; 55,1	2,49	4,5
	MÉDICO-PROBLEMAS DE ALCOHOL	45,5%	2,0	41,7 ; 49,4	1,86	4,3
	MÉDICO-VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,2%	0,6	1,2 ; 3,9	2,30	29,5
	PSICÓLOGO -ANGUSTIA	56,2%	2,3	51,7 ; 60,7	2,53	4,1
	PSICÓLOGO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	58,9%	2,1	54,7 ; 62,9	2,15	3,6
	PSICÓLOGO -LOCURA	37,7%	2,3	33,3 ; 42,3	2,65	6,1
	PSICÓLOGO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	37,1%	2,0	33,3 ; 41,2	2,03	5,4
	PSICÓLOGO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	23,0%	1,8	19,7 ; 26,7	2,10	7,7
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -ANGUSTIA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,40	58,2
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,2%	0,2	0,1 ; 1,0	1,46	71,6
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -LOCURA	0,2%	0,1	0,0 ; 0,7	1,04	71,0
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,67	70,3
	CURANDERO -ANGUSTIA	0,8%	0,3	0,4 ; 1,8	1,49	38,5
	CURANDERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,4%	0,2	0,2 ; 1,2	1,32	50,7
	CURANDERO -LOCURA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,45	41,3
	CURANDERO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,4%	0,2	0,2 ; 1,1	1,32	51,6
	CURANDERO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,0%	0,5	1,2 ; 3,2	1,45	24,4
	BRUJO -ANGUSTIA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	1,18	99,9
	BRUJO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	1,05	99,9
	BRUJO -LOCURA	0,4%	0,2	0,2 ; 1,1	1,16	49,3
	BRUJO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,89	100,2
	BRUJO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	4,4%	0,8	3,0 ; 6,3	1,91	18,8
	SANTIGUADOR O REZADOR -ANGUSTIA	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	0,40	100,1
	SANTIGUADOR O REZADOR -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,4%	0,3	0,1 ; 2,0	3,09	78,3
	SANTIGUADOR O REZADOR -LOCURA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	1,06	99,8
	SANTIGUADOR O REZADOR -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,3%	0,3	0,0 ; 2,3	3,85	99,9
	SANTIGUADOR O REZADOR -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,8%	0,4	0,3 ; 2,3	2,88	55,9
	YERBERO -ANGUSTIA	1,1%	0,4	0,5 ; 2,2	1,68	36,0
	YERBERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,8%	0,3	0,3 ; 1,9	1,89	45,8
	YERBERO -LOCURA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	1,51	99,8
	YERBERO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,63	99,9
	YERBERO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,2%	0,2	0,0 ; 1,0	1,63	79,4
	NINGUNA -ANGUSTIA	6,8%	1,0	5,1 ; 9,1	1,85	14,6
	NINGUNA -TRISTEZA O DEPRESIÓN	6,2%	1,1	4,4 ; 8,7	2,38	17,4
	NINGUNA -LOCURA	3,9%	0,8	2,7 ; 5,7	1,84	19,5
	NINGUNA -PROBLEMAS DE ALCOHOL	9,2%	1,2	7,1 ; 11,8	2,03	13,0
	NINGUNA -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	60,4%	2,2	56,0 ; 64,7	2,40	3,6
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS PSICOLÓGICOS Y SUS MODELOS DE ATENCIÓN (LIMA ESTE)	MÉDICO -ANGUSTIA	30,5%	1,6	27,5 ; 33,8	1,30	5,2
	MÉDICO-TRISTEZA O DEPRESIÓN	22,7%	1,4	20,1 ; 25,7	1,26	6,3
	MÉDICO-LOCURA	41,5%	1,7	38,3 ; 44,8	1,25	4,0
	MÉDICO-PROBLEMAS DE ALCOHOL	42,1%	1,7	38,8 ; 45,4	1,28	4,0
	MÉDICO-VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,5%	0,5	1,6 ; 3,7	1,25	21,4
	PSICÓLOGO -ANGUSTIA	51,4%	1,7	48,0 ; 54,7	1,25	3,3
	PSICÓLOGO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	60,2%	1,8	56,6 ; 63,7	1,50	3,0
	PSICÓLOGO -LOCURA	45,7%	1,8	42,1 ; 49,3	1,47	4,0
	PSICÓLOGO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	32,9%	1,8	29,5 ; 36,6	1,61	5,5
	PSICÓLOGO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	25,0%	1,8	21,6 ; 28,7	1,92	7,3

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS PSICOLÓGICOS Y SUS MODELOS DE ATENCIÓN (LIMA ESTE)	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -ANGUSTIA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,7	1,66	46,7
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,4%	0,3	0,1 ; 1,5	1,98	67,7
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -LOCURA	0,4%	0,3	0,1 ; 1,5	1,92	64,4
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,2%	0,1	0,0 ; 0,7	1,01	73,8
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,2%	0,2	0,1 ; 0,9	1,27	71,8
	CURANDERO -ANGUSTIA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,8	0,95	63,3
	CURANDERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,2%	0,1	0,1 ; 0,5	0,43	43,3
	CURANDERO -LOCURA	0,4%	0,1	0,2 ; 0,8	0,57	36,4
	CURANDERO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,3%	0,2	0,0 ; 1,3	1,94	84,2
	CURANDERO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	1,2%	0,4	0,7 ; 2,2	1,16	29,1
	BRUJO -ANGUSTIA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,61	99,5
	BRUJO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,2%	0,2	0,0 ; 1,6	2,52	99,8
	BRUJO -LOCURA	0,3%	0,1	0,1 ; 0,6	0,54	42,2
	BRUJO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	BRUJO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	1,9%	0,4	1,2 ; 3,0	1,07	22,6
	SANTIGUADOR O REZADOR -ANGUSTIA	0,2%	0,1	0,0 ; 0,7	1,02	78,5
	SANTIGUADOR O REZADOR -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,2%	0,1	0,1 ; 0,7	0,91	63,8
	SANTIGUADOR O REZADOR -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,50	99,6
	SANTIGUADOR O REZADOR -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,1%	0,1	0,0 ; 0,4	0,59	70,0
	YERBERO -ANGUSTIA	0,8%	0,3	0,4 ; 1,5	0,92	32,1
	YERBERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,6%	0,2	0,3 ; 1,1	0,78	35,8
	YERBERO -LOCURA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	0,94	99,3
	YERBERO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,0	1,42	80,1
	YERBERO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,42	100,1
	NINGUNA -ANGUSTIA	12,5%	1,1	10,4 ; 14,9	1,28	9,1
	NINGUNA -TRISTEZA O DEPRESIÓN	11,3%	1,1	9,3 ; 13,8	1,42	10,1
	NINGUNA -LOCURA	6,9%	0,7	5,6 ; 8,5	0,89	10,5
	NINGUNA -PROBLEMAS DE ALCOHOL	12,0%	1,2	9,9 ; 14,5	1,42	9,8
	NINGUNA -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	62,9%	2,0	59,0 ; 66,8	1,84	3,2
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS PSICOLÓGICOS Y SUS MODELOS DE ATENCIÓN (LIMA SUR)	MÉDICO -ANGUSTIA	38,6%	2,1	34,6 ; 42,8	1,69	5,4
	MÉDICO-TRISTEZA O DEPRESIÓN	34,9%	2,1	30,8 ; 39,2	1,83	6,1
	MÉDICO-LOCURA	44,7%	2,1	40,5 ; 48,9	1,70	4,8
	MÉDICO-PROBLEMAS DE ALCOHOL	41,5%	2,2	37,2 ; 45,9	1,86	5,4
	MÉDICO-VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,1%	0,5	1,2 ; 3,4	1,25	25,6
	PSICÓLOGO -ANGUSTIA	39,4%	2,0	35,5 ; 43,4	1,55	5,1
	PSICÓLOGO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	47,2%	2,2	42,9 ; 51,5	1,75	4,6
	PSICÓLOGO -LOCURA	37,1%	2,0	33,2 ; 41,1	1,55	5,4
	PSICÓLOGO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	23,3%	1,6	20,3 ; 26,6	1,31	6,9
	PSICÓLOGO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	16,4%	1,5	13,7 ; 19,6	1,47	9,1
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -ANGUSTIA	0,5%	0,2	0,2 ; 1,3	1,07	48,4
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,43	100,3
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,0%	0,0	0,0 ; 0,3	0,35	100,4
	CURANDERO -ANGUSTIA	0,5%	0,2	0,2 ; 1,2	1,06	50,4
	CURANDERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	1,68	99,9
	CURANDERO -LOCURA	0,4%	0,2	0,1 ; 1,3	1,23	57,1
	CURANDERO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,4%	0,3	0,1 ; 2,1	2,61	82,9
	CURANDERO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	1,7%	0,4	1,1 ; 2,8	1,01	24,9

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS PSICOLÓGICOS Y SUS MODELOS DE ATENCIÓN (LIMA SUR)	BRUJO -ANGUSTIA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	1,07	68,0
	BRUJO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	0,25	99,9
	BRUJO -LOCURA	0,5%	0,3	0,1 ; 1,5	1,48	59,1
	BRUJO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,1	1,41	100,0
	BRUJO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,3%	0,6	1,3 ; 3,9	1,62	27,8
	SANTIGUADOR O REZADOR -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	1,54	99,6
	YERBERO -ANGUSTIA	0,2%	0,2	0,0 ; 1,1	1,48	99,8
	YERBERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,3%	0,2	0,1 ; 0,8	0,82	58,0
	YERBERO -LOCURA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,8	0,97	100,1
	NINGUNA -ANGUSTIA	17,6%	2,4	13,3 ; 22,9	3,73	13,8
	NINGUNA -TRISTEZA O DEPRESIÓN	13,4%	2,3	9,4 ; 18,7	4,31	17,5
	NINGUNA -LOCURA	13,1%	2,4	9,1 ; 18,5	4,53	18,1
	NINGUNA -PROBLEMAS DE ALCOHOL	14,8%	2,4	10,7 ; 20,1	4,16	16,2
	NINGUNA -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	67,1%	2,2	62,6 ; 71,2	2,02	3,3
SÍNTOMAS PSICOLÓGICOS, FOLKLÓRICOS PSICOLÓGICOS Y SUS MODELOS DE ATENCIÓN (CALLAO)	MÉDICO -ANGUSTIA	32,0%	3,0	26,3 ; 38,2	2,03	9,5
	MÉDICO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	28,0%	2,7	23,0 ; 33,6	1,74	9,7
	MÉDICO -LOCURA	47,6%	3,1	41,5 ; 53,8	1,90	6,6
	MÉDICO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	38,9%	3,0	33,2 ; 44,9	1,80	7,7
	MÉDICO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,0%	0,6	1,1 ; 3,7	0,96	31,0
	PSICÓLOGO -ANGUSTIA	53,4%	3,1	47,2 ; 59,4	1,89	5,9
	PSICÓLOGO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	57,8%	2,9	52,1 ; 63,3	1,61	5,0
	PSICÓLOGO -LOCURA	38,3%	2,9	32,8 ; 44,1	1,69	7,5
	PSICÓLOGO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	37,9%	3,3	31,6 ; 44,6	2,24	8,8
	PSICÓLOGO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	18,8%	2,5	14,4 ; 24,1	1,92	13,2
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -ANGUSTIA	0,5%	0,3	0,1 ; 1,8	1,04	66,4
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,4%	0,3	0,1 ; 1,8	1,17	79,9
	BOTICARIO O FARMACÉUTICO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,3	0,90	99,4
	CURANDERO -ANGUSTIA	0,3%	0,2	0,1 ; 0,8	0,38	51,1
	CURANDERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,1%	0,1	0,0 ; 0,7	0,46	100,7
	CURANDERO -LOCURA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,8	0,46	69,3
	CURANDERO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	1,2%	0,6	0,5 ; 2,9	1,27	47,5
	CURANDERO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	2,1%	0,7	1,1 ; 4,0	1,15	33,5
	BRUJO -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	0,97	100,4
	BRUJO -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	1,1%	0,5	0,5 ; 2,8	1,20	46,6
	SANTIGUADOR O REZADOR -PROBLEMAS DE ALCOHOL	0,4%	0,4	0,1 ; 2,8	1,90	99,9
	SANTIGUADOR O REZADOR -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	0,8%	0,6	0,2 ; 3,2	1,92	70,0
	YERBERO -ANGUSTIA	0,3%	0,3	0,0 ; 1,8	1,23	99,9
	YERBERO -TRISTEZA O DEPRESIÓN	0,3%	0,3	0,0 ; 1,8	1,23	99,9
	NINGUNA -ANGUSTIA	9,0%	1,6	6,3 ; 12,7	1,52	17,9
	NINGUNA -TRISTEZA O DEPRESIÓN	8,2%	1,7	5,7 ; 12,2	1,87	21,0
	NINGUNA -LOCURA	11,4%	1,8	8,3 ; 15,4	1,53	15,8
	NINGUNA -PROBLEMAS DE ALCOHOL	9,9%	1,6	7,2 ; 13,6	1,41	16,4
	NINGUNA -VÍCTIMA DE INFIDELIDAD	68,1%	2,6	62,8 ; 73,0	1,48	3,8
ESTIGMA CONTRA LOS TRASTORNOS MENTALES						
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS COMO TRASTORNOS MENTALES (TOTAL)	NERVIOS EXCESIVOS O FOBIAS	69,2%	0,9	67,4 ; 71,0	1,84	1,4
	TRISTEZA EXCESIVA O DEPRESIÓN	68,8%	0,9	66,9 ; 70,6	1,78	1,3
	PSICOSIS O LOCURA	88,9%	0,6	87,7 ; 90,1	1,58	0,7
	CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Y DROGAS	67,8%	0,9	66,0 ; 69,5	1,66	1,3
	PROBLEMAS DEL CARÁCTER O DE LA PERSONALIDAD	48,6%	1,0	46,7 ; 50,5	1,64	2,0

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS COMO TRASTORNOS MENTALES (LIMA CENTRO)	NERVIOS EXCESIVOS O FOBIAS	76,4%	2,5	71,3 ; 81,0	2,61	3,2
	TRISTEZA EXCESIVA O DEPRESIÓN	79,0%	2,3	74,1 ; 83,1	2,46	2,9
	PSICOSIS O LOCURA	97,1%	0,7	95,4 ; 98,2	1,38	0,7
	CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Y DROGAS	79,1%	2,1	74,8 ; 82,9	1,98	2,6
	PROBLEMAS DEL CARÁCTER O DE LA PERSONALIDAD	58,0%	2,4	53,3 ; 62,6	1,79	4,1
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS COMO TRASTORNOS MENTALES (LIMA NORTE)	NERVIOS EXCESIVOS O FOBIAS	68,8%	2,1	64,6 ; 72,7	2,35	3,0
	TRISTEZA EXCESIVA O DEPRESIÓN	66,6%	2,0	62,5 ; 70,4	2,17	3,0
	PSICOSIS O LOCURA	91,8%	1,2	89,2 ; 93,8	2,13	1,3
	CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Y DROGAS	63,2%	2,0	59,2 ; 67,1	2,08	3,2
	PROBLEMAS DEL CARÁCTER O DE LA PERSONALIDAD	45,7%	2,1	41,6 ; 49,9	2,13	4,6
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS COMO TRASTORNOS MENTALES (LIMA ESTE)	NERVIOS EXCESIVOS O FOBIAS	63,2%	1,6	60,0 ; 66,4	1,26	2,6
	TRISTEZA EXCESIVA O DEPRESIÓN	62,6%	1,7	59,2 ; 65,9	1,35	2,7
	PSICOSIS O LOCURA	82,0%	1,3	79,2 ; 84,5	1,29	1,6
	CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Y DROGAS	62,6%	1,8	59,1 ; 66,0	1,44	2,8
	PROBLEMAS DEL CARÁCTER O DE LA PERSONALIDAD	46,9%	1,8	43,4 ; 50,4	1,39	3,8
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS COMO TRASTORNOS MENTALES (LIMA SUR)	NERVIOS EXCESIVOS O FOBIAS	68,3%	1,7	64,7 ; 71,6	1,29	2,6
	TRISTEZA EXCESIVA O DEPRESIÓN	69,2%	1,8	65,6 ; 72,5	1,32	2,5
	PSICOSIS O LOCURA	86,7%	1,2	84,2 ; 88,9	1,11	1,4
	CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Y DROGAS	71,2%	1,8	67,6 ; 74,5	1,38	2,5
	PROBLEMAS DEL CARÁCTER O DE LA PERSONALIDAD	45,7%	1,8	42,1 ; 49,3	1,25	4,0
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS COMO TRASTORNOS MENTALES (CALLAO)	NERVIOS EXCESIVOS O FOBIAS	74,2%	2,7	68,4 ; 79,2	1,88	3,7
	TRISTEZA EXCESIVA O DEPRESIÓN	71,1%	2,7	65,5 ; 76,1	1,72	3,8
	PSICOSIS O LOCURA	88,7%	1,8	84,6 ; 91,9	1,60	2,1
	CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Y DROGAS	66,0%	2,5	61,0 ; 70,7	1,33	3,8
	PROBLEMAS DEL CARÁCTER O DE LA PERSONALIDAD	49,8%	3,1	43,7 ; 55,8	1,83	6,2
ANTE UNA PERSONA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL ¿CÓMO REACCIONA USTED? (TOTAL)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	47,8%	1,1	45,5 ; 50,0	2,33	2,4
	SE MUESTRA INDIFERENTE CON ELLA	3,1%	0,4	2,4 ; 3,9	1,93	11,7
	SE ALEJA DE ELLA	7,9%	0,6	6,8 ; 9,0	1,86	7,0
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	33,1%	1,0	31,1 ; 35,1	2,04	3,1
	LA RECHAZA	0,6%	0,1	0,4 ; 1,0	1,31	21,3
	OTRA	0,6%	0,1	0,4 ; 1,0	1,43	22,6
ANTE UNA PERSONA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL ¿CÓMO REACCIONA USTED? (LIMA CENTRO)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	66,6%	3,1	60,3 ; 72,4	3,27	4,6
	SE MUESTRA INDIFERENTE CON ELLA	2,1%	0,8	1,0 ; 4,3	2,35	38,2
	SE ALEJA DE ELLA	6,7%	1,4	4,5 ; 10,0	2,33	20,5
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	16,0%	2,2	12,1 ; 20,7	2,69	13,6
	LA RECHAZA	0,5%	0,3	0,2 ; 1,3	0,98	50,4
	OTRA	0,6%	0,4	0,2 ; 2,2	1,93	62,9
ANTE UNA PERSONA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL ¿CÓMO REACCIONA USTED? (LIMA NORTE)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	46,6%	2,5	41,8 ; 51,5	2,90	5,3
	SE MUESTRA INDIFERENTE CON ELLA	4,4%	0,9	2,9 ; 6,6	2,43	21,1
	SE ALEJA DE ELLA	10,4%	1,5	7,9 ; 13,7	2,75	14,1
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	30,2%	2,1	26,3 ; 34,4	2,38	6,8
	LA RECHAZA	0,5%	0,3	0,2 ; 1,8	2,52	63,3
	OTRA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,5	1,23	38,1
ANTE UNA PERSONA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL ¿CÓMO REACCIONA USTED? (LIMA ESTE)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	37,2%	1,8	33,8 ; 40,7	1,44	4,7
	SE MUESTRA INDIFERENTE CON ELLA	1,5%	0,4	0,9 ; 2,6	1,30	28,1
	SE ALEJA DE ELLA	6,1%	0,8	4,7 ; 7,8	1,16	12,8
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	44,8%	1,8	41,3 ; 48,4	1,47	4,1
	LA RECHAZA	1,1%	0,3	0,7 ; 2,0	1,02	28,5
	OTRA	0,2%	0,1	0,0 ; 0,7	0,91	71,1

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ANTE UNA PERSONA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL ¿CÓMO REACCIONA USTED? (LIMA SUR)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	40,6%	2,1	36,6 ; 44,8	1,68	5,2
	SE MUESTRA INDIFERENTE CON ELLA	2,7%	0,6	1,8 ; 4,1	1,04	20,1
	SE ALEJA DE ELLA	7,2%	0,8	5,8 ; 9,0	0,91	11,3
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	43,5%	2,2	39,1 ; 47,9	1,88	5,2
	LA RECHAZA	0,5%	0,2	0,2 ; 1,1	0,79	42,2
	OTRA	0,8%	0,4	0,3 ; 1,9	1,61	47,8
ANTE UNA PERSONA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL ¿CÓMO REACCIONA USTED? (CALLAO)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	58,0%	3,5	51,0 ; 64,8	2,46	6,1
	SE MUESTRA INDIFERENTE CON ELLA	5,5%	1,4	3,3 ; 9,1	1,91	26,3
	SE ALEJA DE ELLA	8,4%	1,4	6,0 ; 11,7	1,29	17,1
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	20,9%	2,2	16,9 ; 25,6	1,43	10,6
	LA RECHAZA	0,4%	0,3	0,1 ; 1,7	1,09	78,4
	OTRA	1,2%	0,5	0,5 ; 2,9	1,19	45,1
SI USTED TUVIERA (TIENE) UNO O MÁS MIEMBROS DE SU FAMILIA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿USTED...? (TOTAL)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	32,4%	1,1	30,3 ; 34,6	2,44	3,4
	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE CON ÉL O ELLA	0,2%	0,1	0,1 ; 0,4	1,27	42,0
	SE ALEJA DE ÉL O ELLA	0,8%	0,1	0,6 ; 1,1	1,15	17,9
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	65,1%	1,1	62,9 ; 67,2	2,33	1,7
	LA RECHAZARÍA	0,3%	0,1	0,2 ; 0,6	1,41	32,9
	LA OCULTARÍA	0,0%	0,0	0,0 ; 0,2	1,02	70,8
	OTRA	1,2%	0,2	0,9 ; 1,6	1,42	16,4
SI USTED TUVIERA (TIENE) UNO O MÁS MIEMBROS DE SU FAMILIA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿USTED...? (LIMA CENTRO)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	47,4%	2,9	41,7 ; 53,1	2,61	6,1
	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE CON ÉL O ELLA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	0,98	100,2
	SE ALEJA DE ÉL O ELLA	0,9%	0,4	0,3 ; 2,3	1,76	51,5
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	50,6%	2,9	44,9 ; 56,3	2,62	5,8
	LA RECHAZARÍA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	LA OCULTARÍA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,9	0,98	100,0
	OTRA	0,9%	0,4	0,3 ; 2,2	1,51	47,3
SI USTED TUVIERA (TIENE) UNO O MÁS MIEMBROS DE SU FAMILIA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿USTED...? (LIMA NORTE)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	27,1%	2,1	23,1 ; 31,5	2,76	7,9
	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE CON ÉL O ELLA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,1	1,73	75,6
	SE ALEJA DE ÉL O ELLA	0,6%	0,3	0,3 ; 1,4	1,27	41,1
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	70,0%	2,2	65,6 ; 74,1	2,66	3,1
	LA RECHAZARÍA	0,2%	0,2	0,0 ; 1,4	2,32	100,0
	LA OCULTARÍA	0,1%	0,1	0,0 ; 0,6	1,05	99,9
	OTRA	1,7%	0,5	1,0 ; 3,0	1,65	28,1
SI USTED TUVIERA (TIENE) UNO O MÁS MIEMBROS DE SU FAMILIA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿USTED...? (LIMA ESTE)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	32,1%	2,0	28,4 ; 36,2	1,98	6,2
	SE ALEJA DE ÉL O ELLA	0,9%	0,3	0,5 ; 1,5	0,83	29,8
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	66,1%	2,0	62,1 ; 69,9	1,94	3,0
	LA RECHAZARÍA	0,6%	0,3	0,2 ; 1,4	1,32	46,2
	LA OCULTARÍA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	OTRA	0,3%	0,2	0,1 ; 0,9	0,95	53,1
	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	27,9%	2,1	24,0 ; 32,1	1,96	7,4
SI USTED TUVIERA (TIENE) UNO O MÁS MIEMBROS DE SU FAMILIA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿USTED...? (LIMA SUR)	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE CON ÉL O ELLA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	0,91	53,4
	SE ALEJA DE ÉL O ELLA	0,8%	1,0	0,4 ; 2,3	0,87	42,3
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	69,9%	2,1	65,7 ; 73,8	1,85	2,9
	LA RECHAZARÍA	0,3%	0,2	0,1 ; 1,0	0,95	54,5
	LA OCULTARÍA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	OTRA	0,7%	0,3	0,3 ; 1,6	1,28	46,1
	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	31,1%	4,0	23,8 ; 39,4	3,57	12,9
SI USTED TUVIERA (TIENE) UNO O MÁS MIEMBROS DE SU FAMILIA CON UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿USTED...? (CALLAO)	SE ALEJA DE ÉL O ELLA	1,0%	0,4	0,4 ; 2,3	0,87	42,3
	LE OFRECE ALGUNA AYUDA	64,3%	3,8	56,6 ; 71,4	2,99	5,9
	LA RECHAZARÍA	0,3%	0,3	0,0 ; 1,9	1,31	99,7
	LA OCULTARÍA	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0
	OTRA	3,3%	0,9	1,9 ; 5,7	1,32	28,4

ADULTO	SUBCATEGORÍAS	PARÁMETRO ESTIMADO	ERROR ESTÁNDAR	INTERVALO DE CONFIANZA	DEFF	COEFICIENTE DE VARIACIÓN
SI USTED TUVIERA UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿CÓMO PIENSA QUE REACCIONARÍA SU COMUNIDAD...? (TOTAL)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	14,0%	0,7	12,7 ; 15,5	1,79	5,0
	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE	13,9%	0,7	12,5 ; 15,4	2,09	5,4
	SE ALEJARÍA DE USTED	6,4%	0,4	5,6 ; 7,4	1,43	6,8
	LE OFRECERÍA ALGUNA AYUDA	12,8%	0,7	11,6 ; 14,1	1,69	5,1
	Lo(A) RECHAZARÍA	10,0%	0,6	9,0 ; 11,2	1,50	5,5
	OTRO	0,6%	0,1	0,4 ; 0,9	1,30	22,1
SI USTED TUVIERA UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿CÓMO PIENSA QUE REACCIONARÍA SU COMUNIDAD...? (LIMA CENTRO)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	22,5%	2,2	18,5 ; 27,1	2,09	9,7
	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE	14,5%	1,9	11,2 ; 18,7	2,24	13,1
	SE ALEJARÍA DE USTED	5,4%	1,1	3,6 ; 8,4	1,83	20,5
	LE OFRECERÍA ALGUNA AYUDA	6,9%	1,3	4,7 ; 10,0	2,12	19,3
	Lo(A) RECHAZARÍA	10,2%	1,6	7,4 ; 13,7	2,09	15,5
	OTRO	0,4%	0,3	0,1 ; 1,8	1,84	75,2
SI USTED TUVIERA UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿CÓMO PIENSA QUE REACCIONARÍA SU COMUNIDAD...? (LIMA NORTE)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	11,1%	1,4	8,6 ; 14,2	2,42	12,8
	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE	16,6%	1,8	13,4 ; 20,4	2,65	10,6
	SE ALEJARÍA DE USTED	6,2%	0,9	4,6 ; 8,4	1,81	15,2
	LE OFRECERÍA ALGUNA AYUDA	14,6%	1,5	11,9 ; 17,9	2,25	10,5
	Lo(A) RECHAZARÍA	8,3%	1,1	6,4 ; 10,6	1,80	13,0
	OTRO	0,1%	0,1	0,0 ; 0,5	0,77	73,4
SI USTED TUVIERA UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿CÓMO PIENSA QUE REACCIONARÍA SU COMUNIDAD...? (LIMA ESTE)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	8,9%	1,0	7,1 ; 11,0	1,29	11,0
	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE	9,6%	1,1	7,6 ; 12,1	1,65	12,0
	SE ALEJARÍA DE USTED	7,0%	0,9	5,5 ; 9,0	1,33	12,7
	LE OFRECERÍA ALGUNA AYUDA	15,3%	1,2	13,1 ; 17,9	1,27	8,0
	Lo(A) RECHAZARÍA	10,4%	0,9	8,7 ; 12,4	1,01	9,0
	OTRO	0,4%	0,2	0,2 ; 0,9	0,78	41,2
SI USTED TUVIERA UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿CÓMO PIENSA QUE REACCIONARÍA SU COMUNIDAD...? (LIMA SUR)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	17,4%	1,6	14,5 ; 20,7	1,59	9,1
	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE	13,7%	1,4	11,2 ; 16,6	1,46	10,0
	SE ALEJARÍA DE USTED	7,4%	0,9	5,9 ; 9,3	0,97	11,5
	LE OFRECERÍA ALGUNA AYUDA	13,2%	1,4	10,7 ; 16,1	1,48	10,3
	Lo(A) RECHAZARÍA	9,3%	1,1	7,4 ; 11,6	1,22	11,4
	OTRO	1,6%	0,5	0,9 ; 2,8	1,35	30,6
SI USTED TUVIERA UNA ENFERMEDAD MENTAL, ¿CÓMO PIENSA QUE REACCIONARÍA SU COMUNIDAD...? (CALLAO)	LA ACEPTA COMO PERSONA CON UNA ENFERMEDAD	13,2%	2,0	9,7 ; 17,7	1,71	15,3
	SE MOSTRARÍA INDIFERENTE	16,1%	2,3	12,1 ; 21,0	1,83	14,1
	SE ALEJARÍA DE USTED	5,4%	1,1	3,6 ; 7,9	1,07	19,8
	LE OFRECERÍA ALGUNA AYUDA	11,4%	1,6	8,6 ; 14,9	1,20	14,0
	Lo(A) RECHAZARÍA	14,8%	2,0	11,3 ; 19,3	1,56	13,7
	OTRO	0,6%	0,4	0,1 ; 2,6	1,61	74,5



BIBLIOGRAFÍA



BIBLIOGRAFÍA

- ¹ Desjarlais R, Eisenberg L, Good B, Kleinman A. Salud Mental en el Mundo: problemas y prioridades en poblaciones de bajos ingresos. Washington: OPS-OMS; 1997. p. 1-31.
- ² Kessler RC, Foster CL, Saunders WB, Stang PE. Social Consequences of Psychiatric Disorders, I: Educational Attainment. *Am J Psychiatry* 1995; 152:1026-1032.
- ³ World Health Organization. Preventing suicide: a global imperative. Ginebra: WHO; 2014.
- ⁴ World Health Organization. Informe sobre la Salud en el Mundo 2001. Salud Mental: nuevos conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra: WHO; 2001.
- ⁵ Instituto Nacional de Salud Mental - Oficina de Epidemiología. Sala de situación de salud mental en 17 ciudades del Perú. Obtenido de <http://www.insm.gob.pe/oficinas/epidemiologia/sssm/sssm.html>.
- ⁶ Instituto Nacional de Salud Mental. Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Lima Metropolitana y Callao Replicación 2012. Informe General. *Anales de Salud Mental* 2013; XXIX (Supl 1): 1-392.
- ⁷ Murray CJ, Lopez AD. Global mortality, disability, and the contribution of risk factors: Global Burden of Disease Study. *Lancet* 1997; 349:1436-1442.
- ⁸ Murray CJ, Lopez AD. Alternative projections of mortality and disability by cause 1990-2020: Global Burden of Disease Study. *Lancet* 1997; 349:1498-1504.
- ⁹ Ustun TB, Sartorius N, eds. Mental Illness in General Health Care: An International Study. Chichester, England: Wiley Press; 1995:323-334.
- ¹⁰ Velásquez Valdivia, Aníbal. Octubre 2006. Estimación de la Carga de Enfermedad en el Perú. Promoviendo alianzas y estrategias, Lima: Abt Associates Inc 2006 Octubre. P. 50.
- ¹¹ Mezzich JE. Positive Health: Conceptual Place, Dimensions and Implications. *Psychopathology* 2005; 38:177-179.
- ¹² Kohn R, Levav I, Caldas de Almeida JM, Vicente B, Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Saxena S, Saraceno B. Los trastornos mentales en América Latina y el Caribe: asunto prioritario para la salud pública. *Rev Panam Salud Publica*. 2005;18(4/5):229-40.
- ¹³ Instituto Especializado de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi". Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Sierra Peruana 2003. Informe General. *Anales de Salud Mental* 2003; XIX (1-2). 1-216.
- ¹⁴ Instituto Especializado de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi". Estudio Epidemiológico en Salud Mental en la Selva Peruana 2004. *Anales de Salud Mental* 2005; XXI (1-2): 1-212.
- ¹⁵ Kohn R, Saxena S, Levav I, Saraceno B. The treatment gap in mental health care. *Bulletin of the World Health Organization*. 2004; 82:858-866.
- ¹⁶ WHO. Mental health systems in selected low- and middle-income countries: a WHO-AIMS cross-national analysis. Geneva, WHO, 2011.
- ¹⁷ Kessler RC, Merinkangas KR. The National Comorbidity Survey Replication (NCS-R): background and aims. *International Journal of Methods in Psychiatric Research* 2004; 13(2): 60-68.
- ¹⁸ Stillwell, Frank, Jordan Kirrily. Economic Inequality and (Un)happiness. *Social Alternatives*, 2007 Fourth Quarter, 26 (4): 16-21.
- ¹⁹ Instituto Nacional de Estadística e Informática. 11 de Julio Día Mundial de la Población. Lima: INEI. Publicación electrónica de: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1095/libro.pdf.
- ²⁰ Instituto Especializado de Salud Mental "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi". Estudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental 2002. Informe General. *Anales de Salud Mental* 2002; XVIII (1 y 2):1-197.
- ²¹ Instituto Nacional de Salud Mental. "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi". Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Fronteras 2005. Informe General. *Anales de Salud Mental* 2006; XXII (1-2): 1-227.
- ²² Instituto Nacional de Salud Mental. "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi". Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Costa Peruana 2006. Informe General. *Anales de Salud Mental* 2007; XXIII (1-2): 1-226.
- ²³ Instituto Nacional de Salud Mental. "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi". Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Lima Rural 2007. Informe General. *Anales de Salud Mental* 2008; XXIV (1-2):1-247.
- ²⁴ Instituto Nacional de Salud Mental. "Honorio Delgado-Hideyo Noguchi". Estudio Epidemiológico de Salud Mental en la Sierra Rural 2008. Informe General. *Anales de Salud Mental* 2009; XXV (1-2):1-318.
- ²⁵ Perales A. Salud mental en el Perú. Variables socioeconómicas, políticas y culturales. *Anales de Salud Mental* 1993; IX: 83-107.
- ²⁶ Kessler RC, McGonagle KA, Zhao S, Nelson CB, Hughes M, Eshleman S et al. Lifetime and 12-month prevalence of DSM-III-R psychiatric disorders in the United States: results from the National Comorbidity Survey. *Arch Gen Psychiatry* 1994; 51:8-19.


- 27 Murphy HB. Comparative Psychiatry. The International and Intercultural Distribution of Mental Illness. Berlin: Springer-Verlag, 1982.
- 28 Comité de la santé mentale du Québec. La Santé Mentale, de la biologie a la culture. Québec: Comité de la santé mentale du Québec, 1985.
- 29 Corin E, Bibeau G, Matin JC, Lapaplane R. Comprendre pour soigner autrement. Canada: Les presses de l'Université de Montréal. Montréal, 1990.
- 30 Organización Panamericana de La Salud. Salud de la Población: Conceptos y Estrategias para las políticas públicas saludables. Washington DC: OPS, 2000.
- 31 Breilh J. Epidemiología crítica, ciencia emancipadora e interculturalidad. Buenos Aires: Universidad Nacional de Lanús, 2003.
- 32 Moya J. Las otras muertes: 20 años de violencia en los Andes del Perú. Lima: IX Congreso Latinoamericano de Medicina Social (ALAMES), 2004. Ag 11-14.
- 33 Mariátegui J, Alva V, De León O. Epidemiología psiquiátrica de un distrito urbano de Lima. Un estudio de prevalencia en Lince. Revista de Neuropsiquiatría, 1969, Lima.
- 34 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third Edition (DSM-III). Washington D.C: American Psychiatric Press; 1980.
- 35 Minobe K, Perales A, Sogi C, Warthon D, Llanos R, Sato T. Prevalencia de vida de trastornos mentales en Independencia. Anales de Salud Mental 1990; VI: 9-20.
- 36 Perales A, Sogi C. Epidemiología psiquiátrica en el Perú. Anales de Salud Mental 1995; XI: 9-29.
- 37 Colareta JR. Prevalencia de enfermedades psiquiátricas en una comunidad rural. Tesis para optar el título de médico cirujano, 1993, Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- 38 World Health Organization. International Classification of Diseases and Health Related Problems, Tenth Revision (ICD-10). Geneva: OMS; 1992.
- 39 Desjarlais R, Eisenberg L, Good KA. Salud Mental en el Mundo. Problemas y Prioridades en Poblaciones de Bajos Ingresos: Mujeres, cap. (8): 283-328. Organización Panamericana de la Salud. 1997.
- 40 OMS. Neurociencia del Consumo y Dependencia de Sustancias Psicoactivas, Resumen, Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2003, Pág.5.
- 41 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA. II Encuesta Nacional sobre Prevención y Consumo de Drogas 2002. Perú 2003.
- 42 Instituto Especializado de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi". Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Ayacucho 2003. Informe general. Anales de Salud Mental 2004; XX (1-2):1-199.
- 43 Perales A, Sogi C, Salas RE. Salud Mental en Adolescentes del distrito de Magdalena, en Serie: Monografías de Investigación No.4. Lima 1996. Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado- Hideyo Noguchi".
- 44 Gómez-Vela M, Sabeh E. Calidad de Vida. Evolución del concepto y su influencia en la investigación y la práctica. Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de Salamanca. Disponible en: <http://campus.usal.es/inico/investigacion/invesinico/calidad.htm>. Acceso en junio 2003.
- 45 Lorente E, Ibáñez I, Moro M, y col. Índice de Calidad de Vida: estandarización y características psicométricas en una muestra española. Psiquiatría y Salud Integral. 2002; 2(2):45-50.
- 46 Bland RC. Psychiatry and the burden of mental illness. Can J Psychiatry 1998; 43(8): 801-10.
- 47 WPA/PTD; OPS, APAL. Programa Educativo de la WPA/PTD sobre trastornos depresivos. Visión de conjunto y aspectos fundamentales. Versión en español.
- 48 Jablensky A, Schwartz R, Tomov T. WHO collaborative study on impairments and disabilities associated with schizophrenic disorders. Acta Psychiatr Scand 1980; 62 (Suppl 285): 152-159.
- 49 Huamán J. Programa de Rehabilitación Integral en Salud Mental: Sub-programa de Rehabilitación psicosocial. Anales de Salud Mental 1996; XII: 271-284.
- 50 U.S. Department of Health and Human Services. The Fundamentals of Mental Health and Mental Illness. En Mental Health: A Report of the Surgeon General—Executive Summary. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Mental Health Services, National Institutes of Health, National Institute of Mental Health; 1999.
- 51 Lama A. Determinantes del Acceso a los Servicios de Salud en el Perú. INEI Programa MECOVI-PERU/ BID/BM/CEPAL. Lima: INEI; 2000. Disponible en: <http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub /Est/ Lib0387/indice.HTM>). Acceso el 12 de septiembre del 2005.
- 52 OPS. Hoja Resumen sobre Desigualdades en Salud Perú, División de Salud y Desarrollo Humano. Programa de Políticas Públicas y Salud. [Alianza para la Equidad en Salud en Perú Web site]. Feb 2002. Available at: <http://www.aes.org.pe/docs/resumenperu.pdf>. Acceso el 20 de Agosto, 2005.
- 53 Saavedra JE. Factores asociados al acceso a la atención en salud mental en Lima Metropolitana y Callao 2002. Tesis para optar el grado de magíster UPCH, 2006.

- 54 Desjarlais R, Eisenberg L, Good B, Kleinman A. Salud Mental en el Mundo: problemas y prioridades en poblaciones de bajos ingresos. Washington DC. OPS-OMS, 1997, pp 1-31.
- 55 Araya R, Rojas G, Fritsch R, Acuña J, Lewis G. Common mental disorders in Santiago, Chile. *Br J Psychiatry* 2001; 178:228-233.
- 56 Robichaud JB, Guay L., Colin C, Pothier M. Les liens entre la pauvreté et la santé mentale: de l'exclusion à l'équité. Montreal: Gaëtan Morin Editeur, 1994: 93-98.
- 57 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Informe Técnico No 002-Abril 2002. Principales resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHV) - IV Trimestre 2001. Lima; 2002. Disponible en: <http://www.inei.go.pe>.
- 58 Instituto Nacional de Estadística e Informática. Compendio estadístico 2011: Pobreza. Disponible en: <http://www.inei.gob.pe/Sisd/index.asp>.
- 59 Henderson AS. Life Experiences as Causes of Mental Disorders: The main hypotheses. En: *An Introduction to Social Psychiatry*. New York: Oxford Medical Publication;1988, pp. 69-105.
- 60 Bernal E. Estudio Psicopatológico en Brujos del Pueblo de Salas (Lambayeque). *Anales de Salud Mental* 1985; 1: 162-179.
- 61 Medina E. La Medicina Tradicional o Popular. En Gomberoff, L. (Eds.) *Revista de Psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Doctor José Horwitz Barak*, Santiago de Chile. 1986.
- 62 Glass B. El Poder de la Palabra en La Medicina Tradicional de la Costa Norte del Perú. En *Trabajos del II Congreso Internacional de Medicinas Tradicionales*. Lima Junio 1988.
- 63 Caycho A. Estudio sobre el curanderismo y los curanderos en el Perú. En Seguin, C.A. y Ríos, R. (Eds.): *Anales del Tercer Congreso Latinoamericano de Psiquiatría*, Lima.1969.
- 64 Tejada D, Sánchez F, Mella C. Religiosidad Popular y Psiquiatría. Editora Corripio C. por A. Santo Domingo, 1995.
- 65 Kessler RC, Mickelson KD, Williams DR. The prevalence, distribution, and mental health correlates of perceived discrimination in the United States. *J Health Soc Behav* 1999;40(3):208-30.
- 66 Mays VM, Cochran SD. Mental health correlates of perceived discrimination among lesbian, gay, and bisexual adults in the United States. *Am J Public Health* 2001;91(11):1869-76.
- 67 Williams DR, Williams-Morris R. Racism and mental health: the African American experience. *Ethn Health* 2000; 5(3-4):243-68.
- 68 Finch BK, Kolody B, Vega WA. Perceived discrimination and depression among Mexican-origin adults in California. *J Health Soc Behav* 2000;41(3):295-313.
- 69 Corrigan PW, Edwards AB, Green A, Diwan SL, Penn DL. Prejudice, social distance, and familiarity with mental illness. *Schizophr Bull* 2001;27(2):219-25.
- 70 Pinfold V; Huxley P; Thornicroft G; Farmer P; Toulmin H; Graham T. Reducing psychiatric stigma and discrimination Evaluating an educational intervention with the police force in England [In Process Citation]. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 2003 Jun;38(6):337-44.
- 71 López-Ibor Alino JJ. [Fight against schizophrenia stigma] [La lucha contra el estigma de la esquizofrenia.] *An R Acad Nac Med (Madr)* 2001;118(2):295-316; discussion 317 (ISSN: 0034-0634).
- 72 Ostman M; Kjellin L. Stigma by association: psychological factors in relatives of people with mental illness. *Br J Psychiatry* 2002;181:494-8 (ISSN: 0007-1250).
- 73 Angermeyer MC, Schulze B, Dietrich S. Courtesy stigma--a focus group study of relatives of schizophrenia patients. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol* 2003;38(10):593-602.
- 74 Jorge M Tamayo, 2001. ¿Qué es el Estigma? Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - Versión en HTML. <http://usuarios.lycos.es/igonzal/estigma>.
- 75 Mezzich JE. Positive Health: Conceptual Place, Dimensions and Implications. *Psychopathology* 2005; 39:177-179.
- 76 Magyary D. Positive mental health: a turn of the century perspective. *Issues in Mental Health Nursing* 2002, 23:331-349.
- 77 Mezzich JE, Üstün TB. Quantitative and Experimental Methods in Psychiatry: Epidemiology. En: Sadock BJ, Sadock VA (eds): *Comprehensive Textbook of Psychiatry*, 8th Edition. Baltimore, Williams & Wilkins, 2004.
- 78 Lehtinen V, Sohlman B, Kovess V. Level of positive mental health in the European Union: Results from the Eurobarometer 2002 survey *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health* 2005, 1:9 doi:10.1186/1745-0179-1-9. This article is available from: <http://www.cpementalhealth.com/content/1/1/9>.
- 79 Cloninger R. Implications of comorbidity for the classifications of mental disorders: The need for a psychobiology of coherent; in Maj M, Gaebel W, et al. (eds): *Psychiatric Diagnosis and Classification*. Chichester, Wiley, 2002.
- 80 Herrman H, Saxena S Moodie R (eds): *Promoting Mental Health: Concepts, Emerging Evidence, Practice*. Geneva, WHO, 2005.
- 81 Korkeila J. Measuring aspects of mental health. Helsinki: STAKES, 2000.

- 82 Fredrickson BL, Tugade MM, Waugh CE, Larkin GR. What Good Are Positive Emotions in Crises? A Prospective Study of Resilience and Emotions Following the Terrorist Attacks on the United States on September 11th, 2001. *J Pers Soc Psychol.* 2003 February ; 84(2): 365-376.
- 83 Kotliarenco MA, Cáceres I, Fontecilla. Estado de Arte en Resiliencia. OPS/OMS/CEANIM. Washington DC: OPS, 1997. Obtenido en: www.psicologia-positiva.com/resiliencia.html. Acceso el 14 feb 2006.
- 84 OMS. CIE 10 Trastornos mentales y del comportamiento. Descripciones clínicas y pautas para el diagnóstico. Ginebra: OMS. 1993.
- 85 American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual Fourth Edition. Text Revision. Washington: APA, 2000.
- 86 Zeithofer J, Schmeiser-Rieder A, Tribl G, Rosenberger A, Bolitschek J, Kapfhammer G, Saletu B, Katschnig H, Holzinger B, Popovic R, Kunze M. Sleep and quality of life in the Austrian population. *Acta Neurol Scand* 2000; 102: 249-257.
- 87 Leger D, Poursain B, Neubauer D, Uchiyama M. An international survey of sleeping problems in the general population. *Current Medical Research and Opinion* 2008; 24(1):307-317.
- 88 Kao C, Huang C, Wang M, Tsai P. Insomnia: prevalence and its impact on excessive daytime sleepiness and psychological well-being in the adult Taiwanese population. *Quality of life research: An international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation [serial on the Internet]*. (2008, Oct); 17(8): 1073-1080. Available from: MEDLINE.
- 89 Nugent A, Gleadhill I, McCrum E, Patterson C, Evans A, MacMahon J. Sleep complaints and risk factors for excessive daytime sleepiness in adult males in Northern Ireland. *Journal of sleep research [serial on the Internet]*. (2001, Mar); 10(1): 69-74. Available from: MEDLINE.
- 90 Crummy F, Cameron P, Swann P, Kossmann T, Naughton M. Prevalence of sleepiness in surviving drivers of motor vehicle collisions. *Internal Medicine Journal [serial on the Internet]*. (2008, Oct); 38(10): 769-775. Available from: MEDLINE.
- 91 Santos E, de Mello M, Pradella-Hallinan M, Luchesi L, Pires M, Tufik S. Sleep and sleepiness among Brazilian shift-working bus drivers. *Chronobiology International [serial on the Internet]*. (2004), [cited September 10, 2010]; 21(6): 881-888. Available from: MEDLINE.
- 92 Gureje O, Makanjuola VA, Kola L. Insomnia and role impairment in the community. Results from the Nigerian survey of mental health and wellbeing. *Soc Psychiatry. Psychiatr Epidemiol* 2007; 42:495-501.
- 93 Simon GE, Von Korff M. Prevalence, burden and treatment of insomnia in primary care. *Am J Psychiatry* 1997; 154:1417-1423.
- 94 Pedersen D, Gamarra J, Planas M, Errázuriz C. Violencia Política y salud en las comunidades alto andinas de Ayacucho, Perú. En: *La salud como derecho ciudadano: perspectivas y propuestas desde América Latina*. Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2003: 289-307.
- 95 Instituto Nacional de Salud Mental. Confiabilidad y Validez de los Cuestionarios de los Estudios Epidemiológicos de Salud Mental de Lima y de la Selva Peruana. *Anales de Salud Mental* 2009; Vol. XXV (Supl 1):1-259.
- 96 World Health Organization (1997). *Multiaxial Presentation of ICD-10 for Adults*. Cambridge, U.K.:Cambridge University Press.
- 97 WPA IGDA Workgroup,. IGDA.7. Standardized multi-axial diagnostic formulation. *British Journal of Psychiatry* 2003; 182 (supp. 45): s52-s54.
- 98 Mezzich JE, Ruipérez MA, Pérez C, Ion G, Liu J, Mamad S. The Spanish version of the quality of life index: presentation and validation. *J Nerv Ment Dis* 2000; 188:301-305.
- 99 Someya T, Uehara T, Kadowaki M, Sakado K, Reist C, Tang S, Takahashi S. Factor analysis of the EMBU Scale in a large sample of Japanese volunteers. *Acta Psychiatr Scand*, 1999;100:252-257.
- 100 Henderson AS. *An Introduction to Social Psychiatry*. By A. S. Henderson. Oxford Medical Publications, Oxford University Press: New York. 1988.
- 101 Lecrubier Y, Weiller E, Hergueta T, Amorim P, Bonora LI, Lépine JP, Sheehan D, Janavs J, Baker R, Sheehan KH, Knapp E, Sheehan M. Mini International Neuropsychiatric Interview. Versión en español 5.0.0. 2001; documento proporcionado por el autor.
- 102 Sheehan DV, Lecrubier Y, Sheehan KH, Amorim P, Janavs J, Weiller E, Hergueta T, Baker R, Dunbar GC. The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): The Development and Validation of a Structured Diagnostic Psychiatric Interview for DSM-IV and ICD-10. *J Clin Psychiatry* 1998; 59 Suppl. 20: 22-33.
- 103 Organización Mundial de la Salud. CIE-10. Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Trastornos Mentales y del Comportamiento. Criterios Diagnósticos de Investigación. Madrid: Meditor, 1993.
- 104 Rosenberg Self-Esteem Scale. En: http://chipts.ucla.edu/assessment/assessment_instruments. Acceso: marzo 2007.

- 105 Pequeña J. Relación entre la autoestima y el locus de control en estudiantes del primer semestre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tesis de Licenciatura en Psicología. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Psicología; 1999.
- 106 Martín-Albo J, Núñez JL, Navarro JG, Grijalvo F The Rosenberg Self-Esteem Scale: Translation and Validation in University Students The Spanish Journal of Psychology, vol. 10, núm. 2, 2007, pp. 458-467.
- 107 Castañeda AK. Autoestima, claridad de autoconcepto y salud mental en adolescentes de Lima Metropolitana. Tesis para optar el título de Licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica. Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2013. Obtenida de: <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5094>.
- 108 Schmitt DP, Allik J. Simultaneous Administration of the Rosenberg Self-Esteem Scale in 53 Nations: Exploring the Universal and Culture-Specific Features of Global Self-Esteem. J Pers Soc Psychol 2005; 89: 623-42.
- 109 Rojas-Barahona CA, Zegers B, Förster CE. La escala de autoestima de Rosenberg: Validación para Chile en una muestra de jóvenes adultos, adultos y adultos mayores. Rev Méd Chile 2009; 137: 791-800.
- 110 Satisfaction with life scale. En <http://escalas/diener/swls>. Obtenido en Abril 2007.
- 111 Pavot W, Diener E. Review of the Satisfaction with life scale. Psychological Assessment. 1993; 2: 164-172.
- 112 Cabañero J, Richart M, Cabrero G J, Orts M, Reig A, Tosal B. Fiabilidad y validez de la Escala de Satisfacción con la Vida de Diener en una muestra de mujeres embarazadas y puérperas. Psicothema 2004; 16 (3): 448-455.
- 113 Harrington R, Loffredo D. The relationships between life satisfaction, self-consciousness, and the Myers-Briggs Type Inventory Dimensions. Journal of Psychology 2001, 135: 439-450.
- 114 Atienza FL., Pons D, Balaguer I, García M. Propiedades psicométricas de la Escala de Satisfacción con la Vida en adolescentes. Psicothema 2000, 12: 314-319.
- 115 Ly G. Atribuciones causales de la satisfacción con la vida en un grupo de adultos de Lima. Tesis de Licenciatura en Psicología. Pontificia Universidad Católica del Perú. Facultad de Psicología. 2004.
- 116 The General self-efficacy Scale. En <http://userpage.fu-berlin.de/~health/>. Acceso: mayo 2007.
- 117 Alcalde M. 1998. Nivel de autoeficacia percibida y estilos de afrontamiento en estudiantes universitarios de Lima. Tesis de Maestría en Psicología. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- 118 Baessler J, Schwarzer R. Evaluación de la autoeficacia: Adaptación española de la escala de autoeficacia general. Ansiedad y estrés 1996; 2 (1): 1-8.
- 119 Cid H., Orellana Y, Barriga O. Validación de la escala de autoeficacia general en Chile. Rev Med Chile 2010; 138: 551-557.
- 120 Sanjuán P, Pérez A, Bermúdez J. Escala de autoeficacia general: datos psicométricos de la adaptación para la población española. Psicothema 2000; 12, Supl 2, 509-513.
- 121 Block J., Kremen A. IQ and Ego-resiliency: conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology. 1996; 70: 349-361.
- 122 Alessandri G, Vecchione M, Caprara G, Letzring TD. The Ego Resiliency Scale Revised A Crosscultural Study in Italy, Spain, and the United States. European Journal of Psychological Assessment 2012; Vol. 28(2):139-146.
- 123 Fredrickson B, Tugade M, Waugh C, Larkin G. What good are positive emotions in crises? A prospective study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on September 11th, 2001.
- 124 Al-Naser F, Sandman M. Evaluating resiliency patterns using the ER89: A case study from Kuwait. Social Behavior and Personality 2000; 28 (5): 505-514.
- 125 Buysee DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The Pittsburgh Sleep Quality Index: A New Instrument for Psychiatric Practice and Research. Psychiatry Research 1989; 28:193-213.
- 126 F. Escobar-Córdoba, J. Eslava-Schmalbach. Validación colombiana del índice de calidad de sueño de Pittsburgh. Rev Neurol 2005; 40: 150-5.
- 127 Rosales E, Egoavil M, La Cruz C, Rey de Castro J. Somnolencia y calidad del sueño en estudiantes de medicina de una universidad peruana. An Fac Med Lima. 2007; 68:150-158.
- 128 Rosales E, Egoavil M, La Cruz C, Rey de Castro J. Somnolencia y calidad del sueño en externos e internos de medicina de una universidad peruana empleando la Escala de Epworth y el cuestionario Pittsburgh. Póster presentado a la XV Reunión Anual de la Asociación Ibérica de Patología del Sueño. Vitoria-Gasteiz, España. Vigilia-Sueño. 2006;18:55.
- 129 Kuckzynski, J y Ortiz de Zevallos, (1990) Respuestas para los 90's, Editorial Apoyo, disponible en <http://www.ppk.pe/libros/respuestas-para-los-90-s>, consultado el 06 de noviembre 2012, siendo las 11:30 am.
- 130 The WHO World Mental Health Survey Consortium. Prevalence, Severity, and Unmet Need for Treatment of Mental Disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys. JAMA. 2004; 291:2581-2590.
- 131 López-Ibor Aliño, Juan J. & Valdés Miyar, Manuel (dir.) (2002). DSM-IV-TR. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Texto revisado. Barcelona: Masson.
- 132 Kessler RC, Rubinow DR, Holmes C, Abelson JM, Zhao S. The epidemiology of DSM-III-R bipolar I disorder in a general population survey. Psychol. Med. 1997 Sep;27(5):1079-89.

- ¹³³ Kohn R, Levav I, Caldas de Almeida JM, Vicente B, Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Saxena S, Sraceno B. Los trastornos mentales en América Latina y el Caribe: asunto prioritario para la salud pública. *Rev. Panam. Salud Pública / Pan Am J Public Health* 2005; 18(4/5):229-240.
- ¹³⁴ Teferra Beyero, Atalay Alem, Derege Kebede, Teshome Shibire, Menelik Desta, Negussie Deyess. Mental disorders among the Borana semi-nomadic community in Southern Ethiopia. *World Psychiatry* 2004; 3(2):110-114.
- ¹³⁵ Mohammad-Reza Mohammadi et al. An epidemiological survey of psychiatric disorders in Iran. *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health* 2005, 1:16.
- ¹³⁶ Salih Alhasnawi et al. The prevalence and correlates of DSM-IV disorders in the Iraq Mental Health Survey (IMHS). *World Psychiatry* 2009;8:97-109.
- ¹³⁷ Moyano García, Análisis de los Efectos Psicosociales de la Violencia Política en Tres Distritos del Departamento de Huancavelica con distintos niveles de afectación. Tesis UPC, 2009. Disponible en http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/429/Moyano_Garcia_Maria_Analisis_Efectos_Psicosociales.pdf?sequence=1).



**INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL
"HONORIO DELGADO-HIDEYO NOGUCHI"**