

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: MAÍZ

Fuente: Agencia CyTA

Para el período octubre-noviembre 2022, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas: para el mes de octubre entre normales a superiores en la región Andina y selva norte; mientras que, a lo largo del litoral inferior y dentro de lo normal. Para el mes de noviembre, entre normales a inferiores en el norte y centro de la costa y, entre normales a superiores en la sierra, a excepción de la sierra norte y centro occidental donde se presentarían entre normales a inferiores; y para el mes de diciembre, predominarían entre normales a superiores en la costa y selva norte; y entre normales a inferiores en la sierra, a excepción de la sierra norte y sur oriental donde dichas condiciones estarían entre normales a superiores. Por otro lado, se esperarían condiciones térmicas nocturnas entre normales a inferiores a lo largo de la costa y sierra sur occidental, y entre normales a superiores en el resto de la región Andina y selva norte para el mes de octubre; entre normales a inferiores en la costa y toda la sierra; además de, normales a en la selva norte durante el mes de noviembre; finalmente, en diciembre, entre normales a inferiores en la costa y sierra; mientras que, en la sierra centro y sur oriental entre normales a superiores a su variabilidad climática. Respecto a las precipitaciones, en la sierra, para el mes de octubre entre normales a superiores, a excepción de la sierra centro y sur occidental donde estarían entre normales a inferiores a lo esperado; para noviembre, predominarían acumulados por debajo de lo histórico en la costa, sierra y selva norte alta; sin embargo, se registraría exceso en la selva norte baja; para el mes de diciembre, entre normales a inferiores, a excepción de la costa sur, sierra norte oriental y sierra sur occidental con acumulados por encima y dentro de su climatología.

COSTA NORTE, CENTRAL Y SUR

En la franja costera, se presentaría un nivel de riesgo agroclimático entre bajo a medio durante el periodo octubre – diciembre; sin embargo, debido a que se prevé temperaturas diurnas y nocturnas inferiores a su promedio climático, se estimaría el retraso en el crecimiento vegetativo del maíz amarillo; asimismo, en algunos sectores próximos al litoral, es probable que las plantaciones extiendan su periodo vegetativo más de lo previsto, que aunado a las condiciones de nubosidad por las mañanas favorecerían la presencia de enfermedades fitopatógenas.

SIERRA NORTE

En la sierra norte, entre los meses de setiembre y noviembre se estima un nivel de riesgo agroclimático medio a moderado, debido principalmente a que se prevé precipitaciones por debajo de su normal; las cuales no serían favorables para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo de maíz amiláceo durante sus primeros estadios de crecimiento. Sin embargo, en algunas parcelas la presencia de temperaturas máximas y mínimas entre normales y superiores y precipitaciones normales serían condiciones favorables durante el crecimiento vegetativo del maíz amiláceo.

SIERRA CENTRAL

En la sierra central, entre los meses de octubre y diciembre se prevé un nivel de riesgo agroclimático medio, debido a la deficiencia de precipitaciones entre noviembre y diciembre, las cuales ocasionarían algunos problemas de estrés hídrico durante los primeros estadios de crecimiento del maíz amiláceo; sin embargo, las parcelas conducidas bajo riego podría favorecer las necesidades hídricas durante el crecimiento vegetativo de los maíces Blanco Urubamba y Cusqueado; asimismo, no se descartarían descensos bruscos de la temperatura mínima que podría afectar las primeras siembras, especialmente durante el mes de octubre.

SIERRA SUR

En la sierra sur, en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Apurímac y Cusco, entre octubre y diciembre, se presentarían niveles de riesgo agroclimático medio, debido a que se prevé precipitaciones acumuladas inferiores durante el mes de noviembre, las cuales podrían afectar las necesidades hídricas del maíz amiláceo en pleno crecimiento vegetativo; no se descartaría la presencia de heladas durante noviembre, incrementando significativamente los factores de riesgo.

SELVA NORTE

En la selva norte, se presentaría un nivel de riesgo agroclimático bajo, debido a que se prevé condiciones térmicas diurnas y nocturnas entre normales a superiores durante octubre a diciembre, y lluvias alrededor de sus normales, las cuales favorecerían el crecimiento vegetativo del maíz amarillo duro; sin embargo, podría haber periodos secos prolongados y olas de calor que afectarían al cultivo de maíz, retrasando su crecimiento y afectando el llenado de la mazorca.



**[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ](#)**




PERÚ

Ministerio
del Ambiente







TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Noviembre 2022