GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

DIRECCIÓN REGIONAL DE AYACUCHO

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

“PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y PLAN DE CONTROL DE INFECCIONES (PCI) – HRA 2022”.

Dr. MARIO O. PEREZ VELARDE.
DIRECTOR EJECUTIVO

Dra. SIRLEY M. APARICIO HUAMANI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA

Lic. Enf. SAINÉ ROSVELLY FLORES DÍAZ.
Lic. Enf. JULIO CESAR AYVAR GARAY
RESPONSABLES DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS.

AYACUCHO – 2022

- XII. Panorama mundial en el abordaje de la tuberculosis: metas alineadas con la Estrategia Fin de la Tuberculosis de la OMS** La Estrategia Fin de la Tuberculosis, adoptada en el 2014, conforme con los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), busca poner fin a la epidemia mundial de la tuberculosis. Esta estrategia hace énfasis en los hitos de reducir las muertes por la infección en un 95%, así como los nuevos casos en un 90% entre 2015 y 2035, y garantizar que ninguna familia tenga que afrontar costos catastróficos a causa de la tuberculosis. A nivel global, la tuberculosis representa una fuente de desesperanza para las poblaciones vulnerables y un desafío importante para los sistemas de salud; asimismo, causa enfermedad y muerte en millones de personas anualmente. En consonancia con las firmes intervenciones en salud pública, se han puesto en evidencia logros importantes para su control: de ser la séptima causa de muerte en el año 2000 pasó al décimo tercer lugar en el año 2019, con una reducción del 30% de la mortalidad. Sin embargo, se debe mencionar también que, en África, Asia Sudoriental y en países de ingresos bajos en el resto del mundo, la tuberculosis se mantiene entre las diez primeras causas de morbilidad y mortalidad. La Región de las Américas fue la primera del mundo en cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) relacionados con el control de la tuberculosis, tal como lo expresa la Organización Panamericana de la Salud en su Documento Técnico "Salud en las Américas, edición del 2017". Por otro lado, existe una lentitud en el cierre de brechas para la detección y notificación de casos nuevos de TB/TB MDR/RR/TB XDR y coinfección TB-VIH. Estos problemas surgen por la insuficiente capacidad de los laboratorios y la implementación lenta de nuevos métodos moleculares de diagnóstico.
- XIII. Escenario político-sanitario nacional** El país atraviesa una crisis sanitaria, política, social y económica sin precedentes a pesar de las reformas que se han intentado implementar con base en la regionalización y descentralización. Además, el sistema de salud se ha visto afectado por problemas financieros y las transiciones demográfica y epidemiológica; por otra parte, la falta de acceso a los servicios de salud y la violencia política afectan directamente a la situación de salud al tener este sistema una oferta de servicios limitada y no preparada para asumir esta responsabilidad. Circunstancias y estructura sanitaria que han mostrado, de manera evidente, su total vulnerabilidad frente a la pandemia de la COVID-19.
- XIV. Impacto de la pandemia de la COVID-19 en los avances de la lucha contra la Tuberculosis en el País**
Es demasiado pronto para juzgar el impacto de la pandemia de la covid-19 en los avances de la lucha contra la tb en el país; no obstante, aun sin tener mayor evidencia, se pueden encontrar diferentes situaciones y percepciones que ofrecen algunas interesantes lecciones aprendidas para el sistema de salud en un contexto de transición en salud, donde es posible encontrar más preguntas que respuestas. Como consecuencia, se produce el replanteamiento de los procesos para el control de la TB, los cuales, ante una situación de pandemia como esta, resultan ineficientes. Todo ello motiva a ingresar a una perspectiva multidimensional en busca de mejoras importantes en esos procesos
Entonces, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 —un desafío sanitario relevante para el control de la tuberculosis—, se evidencia una disminución en las actividades de salud pública para la prestación de servicios a los afectados

por tuberculosis, a pesar de todo el esfuerzo desplegado por la DPCTB y los coordinadores regionales a todo nivel de atención. Son indiscutibles la disminución de actividades preventivas, como el control de contactos e ingresos a terapia preventiva, la captación de sintomáticos respiratorios y el diagnóstico de nuevos casos; así como las dificultades para el seguimiento de los pacientes en tratamiento. Esta situación, producto de la desactivación de algunos servicios encargados de la atención de los afectados por tuberculosis, se agravó por la reasignación del talento humano y los recursos financieros para dar respuesta a la COVID-19; sumado a ello, comprometió el Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis (SIG TB), ante la demora de ingreso de información de los establecimientos de salud notificantes. Según el análisis preliminar de la información realizado por la DPCTB, se encontraron reducciones significativas en las notificaciones de casos de tuberculosis, con una caída importante de los indicadores, en comparación con el año 2019. En ese año el país reportó 32 970 casos de TB, alcanzando el 89% de la meta estimada por la OMS del 90% para el año 2020 (33 300 casos de TB). La DPCTB respondió rápidamente a la situación generada por la pandemia de la COVID-19 para no debilitar las medidas de intervención en el control de la TB. Sin embargo, a pesar de las estrategias implementadas en el 2020, se reportaron 24 296 casos de TB, por lo que solo se logró un 66% respecto a lo estimado por la OMS. La mayor concentración de los casos continuaba ubicándose en Lima y Callao —al igual que en el período pre COVID-19—, donde se notificó el 60% del total (14 567 casos), el 75.4% de TB-MDR (885 casos) y el 82.5% de TB-XDR (94 casos)

XV. INTRODUCCION

La Tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa producida por la bacteria o bacilo *Mycobacterium tuberculosis* que afecta al ser humano, produciendo una enfermedad crónica que compromete principalmente los pulmones, aunque puede afectar cualquier parte de otro órgano. Así mismo está considerada como una Enfermedad de Salud Pública

De acuerdo al padrón de sensibilidad, la tuberculosis puede ser sensible o resistente a medicamentos antituberculosis de primera o segunda línea y entre estas formas se hallan la multidrogoresistente (MDR), la extensamente resistente (XDR) y otras formas de drogoresistencia, para el año 2020 ha sido formulado siguiendo los Lineamientos Generales, promulgados por la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud, que dentro del marco diseña la Norma Técnica N° 104-MINSA/DGSP-V.01, con la finalidad de contribuir a disminuir la prevalencia de la Tuberculosis a través de un enfoque de atención integral, en el marco del aseguramiento universal en salud.

El Plan considera los tres niveles de medidas de control de la transmisión de la tuberculosis recomendada por el Ministerio de salud y organizaciones internacionales: **Medidas de Control Administrativo, Medidas de Control Ambiental y Medidas de Protección Respiratoria Personal.**

Se debe realizar Evaluación periódica de sus actividades y resultados esperados a fin de identificar las debilidades y fortalezas que pudieran evidenciar, en el marco de una mejora permanente.

XVI. Definiciones Operativas.

1. Caso probable de tuberculosis:

Persona que presenta síntomas o signos sugestivos de tuberculosis. Incluye a los sintomáticos respiratorios.

2. Caso de tuberculosis: Persona a quien se le diagnostica tuberculosis y a la que se debe administrar tratamiento antituberculosis.

3. Caso de tuberculosis según localización de la enfermedad:

a. Caso de tuberculosis pulmonar: Persona a quien se le diagnostica tuberculosis con compromiso del parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica (baciloscopia, cultivo o prueba molecular).

Tuberculosis pulmonar con frotis positivo (TBP FP): Caso de TB pulmonar con baciloscopia (frotis) de esputo positiva. P

Tuberculosis pulmonar con frotis negativo (TBP FN): Caso de TB pulmonar con dos o más baciloscopías de esputo negativas. Se clasifica en:

- **TB pulmonar frotis negativo y cultivo o prueba molecular positiva:** Caso de TB pulmonar con baciloscopia negativa y que cuenta con cultivo o prueba molecular positiva para *M. tuberculosis*.
- **TB pulmonar frotis y cultivo negativos:** Caso de TB pulmonar sin confirmación bacteriológica cuyo diagnóstico se basa en criterios clínicos, epidemiológicos y/o diagnóstico por imágenes.
- **Tuberculosis pulmonar sin frotis de esputo:** Caso de TB pulmonar en el que no ha sido posible lograr una muestra de esputo para el estudio bacteriológico.

b. Caso de Tuberculosis Extra - Pulmonar: Persona a quien se le diagnostica tuberculosis en órganos diferentes a los pulmones. El diagnóstico se basa en un cultivo, prueba molecular positiva, evidencia histopatológica y/o evidencia clínica de enfermedad extra-pulmonar activa. En presencia de compromiso tanto pulmonar como extra-pulmonar el caso se define como TB pulmonar. En los casos de TB miliar se definen como TB pulmonar. La afección pleural o ganglionar intra-torácica, sin anomalías radiográficas en parénquima pulmonar, constituye un caso de TB extra-pulmonar. Las definiciones operativas de caso de TB extra-pulmonar son:

- **TB extra-pulmonar con confirmación bacteriológica:** Caso en el que se demuestra la presencia de *M. tuberculosis* por bacteriología (baciloscopia, cultivo o pruebas moleculares) en el tejido o fluido extra-pulmonar.
- **TB extra-pulmonar con confirmación histopatológica:** Caso en el que se demuestra una reacción inflamatoria compatible con tuberculosis (granuloma específico) o la presencia de bacilos ácido-alcohol resistente (BAAR) en tejido o fluido extra-pulmonar mediante estudio histopatológico.
- **TB extra-pulmonar sin confirmación:** Caso en el que no se determina la presencia de *M. tuberculosis* en el tejido o fluido extra-pulmonar por bacteriología ni por estudios histopatológicos. El diagnóstico se basa en criterios epidemiológicos, clínicos y/o estudios de imágenes.

4. Caso de tuberculosis según sensibilidad a medicamentos anti-TB por pruebas convencionales

c. Caso de TB pansensible: Caso en el que se demuestra sensibilidad a todos los medicamentos de primera línea por pruebas de sensibilidad convencional.

Indicación para pacientes con TB sin infección por VIH/SIDA:

- Paciente con TB Pulmonar frotis positivo o negativo.
- Pacientes con TB Extrapulmonar, excepto compromiso miliar, SNC y Osteoarticular.
- Pacientes nuevos o antes tratados (recaídas y abandonos recuperados).

Indicación para pacientes con TB con infección por VIH/SIDA:

- Paciente VIH con TB pulmonar frotis positivo o negativo.
- Paciente VIH con TB Extra Pulmonar excepto compromiso miliar, SNC y osteoarticular.
- Pacientes VIH Nuevos o antes tratados (recaídas y abandonos recuperados)

Medicamentos de primera línea en dosis fijas combinadas (DFC):

Cuando exista disponibilidad de medicamentos de primera línea en DFC, utilizar en la medida que favorezca la adherencia al tratamiento antituberculosis, sus presentaciones posología y forma de administración se hallan en el anexo N° 22. Está indicado para el tratamiento de tuberculosis sensible al tratamiento en pacientes nuevos.

5. Esquema para TB resistente

La organización Mundial de la Salud – OMS clasifica los medicamentos antituberculosis en grupos según su eficacia, propiedades y evaluación clínica de su efectividad antituberculosis, como se detalla en la tabla 7.

La dosis de los medicamentos usados para el manejo de TB resistente en el país se presenta en la tabla 8.

Para la utilización de medicamentos no considerados en el PNUME, la Dirección general de Intervenciones estratégicas en salud Pública a través de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis (DPCTB) debe de tener o gestionar su autorización ante la Dirección General de medicamentos Insumos y Drogas DIGEMID de acuerdo a la norma técnica de salud para la utilización de medicamentos no considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales Vigentes.

Esquema Estandarizado. - es un esquema transitorio a utilizar en la PAT con factores de riesgo para TB MDR y en quien, por la severidad de su estado, no se puede esperar el resultado de una PS rápida o convencional para iniciar tratamiento. Esta indicado por el médico consultor.

Esquema Empírico. – Indicaciones:

- ❖ Pacientes con diagnóstico de TB resistente según PS rápida
- ❖ Paciente con diagnóstico de TB resistente según PS convencional solo a medicamentos a de primera línea.
- ❖ Paciente que es contacto domiciliario de un caso de TB. En este caso el esquema se basa en el tratamiento del caso índice. Es indicado por el médico consultor. De acuerdo al resultado de las pruebas rápidas a isoniacida y Rifampicina se establecen los esquemas empíricos definidos en la tala 9 de la presente norma técnica de salud.

Esquemas Acortados. - El uso del esquema acortado de tratamiento para tuberculosis resistente a Rifampicina (TB-RR) o TB-MDR, se debe comenzar a implementar gradualmente en el país.

Con el fin de reproducir las altas tasas de curación obtenidos en los estudios de regímenes acortados, se debe realizar el máximo esfuerzo para evitar adquisición de resistencia adicional, al seleccionar cuidadosamente a los PAT y asegurar el apoyo efectivo al paciente que le permita ser adherente al tratamiento. Es indicado por el médico consultor en coordinación con el responsable o coordinador de los servicios de prevención y control de la TB en DIRESA o con quien este delegue, y es remitido al CRER/CER para emisión de acta y posología definitiva.

Esquemas Individualizados: Indicación:

Paciente con Dx de TB resistente con resultado de una PS convencional para medicamentos de primera y segunda línea.

- ❖ **Caso de TB mono o polirresistente:** en caso de TB mono o poliessitante a medicamentos de primera línea los esquemas individualizados deben darse de manera diaria de lunes a sábado. Esta indicado por el médico consultor. Los esquemas de acuerdo al perfil de resistencia se presentan en la tabla 10.

- ❖ **Casos de TB MDR.** - Los esquemas individualizados para TB MDR son elaborados por el médico consultor y revisados posteriormente por el Comité regional de Evaluación de Retratamientos – CRER/ Comité de Evaluación de Retratamientos CER.

El esquema Individualizado para el paciente con TB MDR debe elaborarse considerando los siguientes principios.

- Incluir por lo menos 4 medicamentos antituberculosis de segunda línea a los que son sensibles o nunca fueron administrados en el paciente. Dentro de ellos debe indicarse una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea.
- Debe Incluir Pirazinamida por su potencial beneficio clínico.
- Usar Etambutol cuando se demuestre que la cepa es sensible.
- La historia de Exposición a medicamentos antituberculosis: Evaluación detallada de los medicamentos utilizados, dosificaciones recibidas, historial de adherencia, usos de terapia directamente observada en boca, otros.
- Los resultados de la PS a medicamentos de primera y segunda línea disponibles.
- El historial de contactos y sus perfiles de sensibilidad a medicamentos.
- Los antecedentes de Reacciones Adversas a Medicamentos – RAM, abandono o tratamiento irregular.

- ❖ **Casos de TB XDR**

Los esquemas para TB XDR son elaborados por el Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos – CNER y se prescriben de acuerdo a resultado de la prueba de sensibilidad para medicamentos de primera segunda línea o rápida molecular de segunda línea en los siguientes casos:

- En casos XDR
- En casos MDR con resistencia a fluoroquinolona (FQ)
- En casos MDR con resistencia a inyectable de segunda línea (ISL)

El esquema de tratamiento de TB XDR se debe diseñar considerando:

- Un núcleo básico que debe incluir 3 medicamentos a los que el paciente no se haya expuesto nunca, que incluyan: Linezolid, Bedaquiline, Delamanid, Thioridazina, Clofazmina o Carbapenem (Meropenem e Imipenen/Cilastatina).

Se debe utilizar uno de los núcleos básicos:

- Núcleo Básico Via Oral: Linezolid – Bedaquiline o Delamanid, Clofazamina.
- Núcleo Básico Via Endovenoso: Linezolid, Carbapenem – Thioridazina.

6. Caso de tuberculosis infantil: Menor de 15 años con diagnóstico de TB pulmonar o extra-pulmonar en el que se inicia tratamiento anti-tuberculosis; pueden ser:

a. TB infantil confirmada: Definida por un estudio bacteriológico positivo para M. tuberculosis (baciloscopía, cultivo o prueba molecular positiva) o una muestra de tejido histológico compatible con TB.

b. TB infantil probable: Definida como la presencia de 3 ó más de los siguientes criterios: 1) síntomas como fiebre, tos y pérdida de peso; 2) exposición a un caso con TB infecciosa activa; 3) prueba de tuberculina o PPD positiva; 4) hallazgos en radiografía de tórax compatibles con TB activa; 5) evidencia por otros exámenes de apoyo al diagnóstico, en asociación con síntomas y signos.

7. Conversión y reversión bacteriológica:

a. Conversión: Se considera cuando se tienen dos cultivos negativos consecutivos con intervalo de 30 días, después de tener un cultivo positivo.

b. Reversión: Se considera cuando luego de una conversión bacteriológica inicial, vuelve a presentar dos cultivos positivos consecutivos tomados con un intervalo de 30 días.

8. Condición de ingreso según antecedente de tratamiento:

a. Caso nuevo: Paciente con diagnóstico de tuberculosis que nunca ha recibido tratamiento anti-tuberculosis o que lo ha recibido por menos de 30 días consecutivos ó 25 dosis continuas.

b. Caso antes tratado: Paciente con diagnóstico de tuberculosis con antecedente de haber recibido tratamiento antituberculosis por 30 días o más. Se clasifican en: **Recaída:** Paciente que presenta otro episodio de TB diagnosticado después de haber sido dado de alta como curado o como tratamiento terminado.

Abandono recuperado: Paciente que no concurrió a recibir tratamiento por más de 30 días consecutivos, es dado de alta como abandono y es captado nuevamente por el establecimiento de salud (EESS) para reiniciar tratamiento desde la primera dosis.

Fracaso: Paciente que ingresa a un nuevo tratamiento luego de haber sido declarado como fracaso terapéutico de un esquema con medicamentos de primera o segunda línea.

9. Condición de egreso de pacientes con TB pulmonar en tratamiento con esquemas para TB sensible:

a. Curado: Paciente con confirmación bacteriológica al inicio, que concluye el esquema de tratamiento y cuenta con baciloscopia de esputo negativa en el último mes de tratamiento.

b. Tratamiento completo:

- Paciente con confirmación bacteriológica al inicio, que concluye el esquema tratamiento con buena evolución y en quien no fue posible realizar la baciloscopia de esputo en el último mes de tratamiento.
- Paciente sin confirmación bacteriológica al inicio de tratamiento que concluye esquema de tratamiento con buena evolución.

c. Fracaso: Paciente con baciloscopia o cultivo de esputo positivo a partir del cuarto mes de tratamiento.

d. Fallecido: Paciente que fallece por cualquier razón durante el tratamiento de la tuberculosis.

e. Abandono: Paciente que inicia tratamiento y lo descontinúa por 30 días consecutivos o más. Incluye al paciente que toma tratamiento por menos de 30 días y lo descontinúa.

f. No evaluado: Paciente al que no se le ha asignado la condición de egreso. Incluye los casos transferidos a otro EESS en los que se desconoce su condición de egreso.

g. Éxito de tratamiento: Resultado de la suma de los pacientes con la condición de egreso "curado" y "tratamiento completo".

10. Condición de egreso de pacientes con TB pulmonar en tratamiento con esquemas para TB MDR y TB XDR

a. Curado: Paciente que concluye el esquema de tratamiento y cuenta con 10 cultivos mensuales negativos consecutivos en los últimos 12 meses del tratamiento programado para casos de TB MDR y TB XDR.

b. Tratamiento completo: Paciente que completó el tratamiento programado sin evidencia de fracaso, pero que no implica que cumple el criterio de curado.

c. Fracaso: Paciente que no logra conversión bacteriológica al sexto mes de tratamiento o en quien se produce reversión bacteriológica después del sexto mes. También se considera como fracaso cuando se demuestra la ampliación de la resistencia, a una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea.

d. Fallecido: Paciente que fallece por cualquier razón durante el tratamiento de la tuberculosis.

e. Abandono: Paciente que inicia tratamiento y los discontinúa por 30 días consecutivos o más. Incluye al paciente que toma tratamiento por menos de 30 días y lo discontinúa.

F. No evaluado: Paciente al que no se le ha asignado la condición de egreso. Incluye los casos transferidos a otro EESS en los que se desconoce su condición de egreso.

g. Éxito de tratamiento: Resultado de la suma de los pacientes con la condición de egreso "curado" y "tratamiento completo"

11. Control de infecciones de Tuberculosis: Conjunto de medidas destinadas a prevenir la transmisión de la tuberculosis dentro de los establecimientos de salud, la comunidad y la vivienda del afectado por TB. Las medidas son de tres tipos: administrativas, de control ambiental y de protección respiratoria.

Estudio de contactos

a. Caso índice: Es la persona que ha sido diagnosticada de TB.

b. Contacto: Persona que tiene o ha tenido exposición con un caso índice diagnosticado de tuberculosis en los tres meses previos al diagnóstico. Los contactos pueden ser: o Personas que comparten o compartieron el mismo domicilio con el caso índice con TB. o Personas que no comparten el domicilio del caso índice, pero que frecuentaron el mismo espacio: vecinos, parejas, compañeros de estudio o trabajo, entre otros.

c. Contacto censado: Es el contacto registrado en la tarjeta de control de asistencia y administración de medicamentos.

d. Contacto examinado: Es el contacto censado que ha sido estudiado mediante alguno de los siguientes procedimientos para descartar tuberculosis: examen clínico, rayos X, prueba de tuberculina (PPD), y si es sintomático respiratorio: baciloscopías y cultivos de esputo.

e. Contacto controlado: Es el contacto que ha cumplido con todos los controles programados; para los casos de contacto de TB sensible se consideran 3 controles y en los casos de TB resistente se consideran 6 controles.

12. Derivación y Transferencia:

a. Derivación: Proceso por el cual un paciente diagnosticado de TB en un EESS y que reside en otra jurisdicción, es referido al EESS más cercano a su domicilio para continuar su tratamiento. La notificación del caso es realizada por el EESS que recibe al paciente.

b. Transferencia: Proceso por el cual un paciente diagnosticado de TB en el EESS de su jurisdicción, solicita ser trasladado a otro EESS. La notificación del caso es realizada por el EESS que transfirió al paciente.

13. Irregularidad al tratamiento: No ingesta de 3 dosis programadas continuas o alternadas durante la primera fase del tratamiento o de 5 dosis continuas o alternas durante todo el tratamiento de esquemas para TB sensible.

14. Médico consultor: Médico que brinda atención a pacientes referidos por los médicos tratantes del primer nivel de atención con entrenamiento en el manejo de tuberculosis sensible y resistente a medicamentos anti-TB, de las reacciones adversas a medicamentos y complicaciones.

15. Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos Estratégicos: Son aquellos utilizados para las intervenciones sanitarias que, por especificidad, características del mercado y costos son suministrados por el Ministerio de Salud.

16. Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Soporte: Son aquellos Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos no estratégicos y que son adquiridos por las unidades ejecutoras.

17. Prueba de sensibilidad (PS) a medicamentos anti tuberculosis: Son ensayos in vitro que sirven para detectar la resistencia a medicamentos antituberculosis. Se denominan PS directas cuando se realizan a partir de las muestras clínicas (por ejemplo, esputo); y PS indirectas cuando requieren cultivo para aislar la Micobacteria.

a. PS convencionales indirectas en medio sólido: Método de proporciones en medio Lowenstein — Jensen o en agar en placa.

d. PS convencionales en medio líquido: Sistemas automatizados en medio líquido en tubos MGIT (Mycobacteria Growth Indicator Tube).

c. PS rápidas fenotípicas directas: Prueba de sensibilidad a medicamentos mediante observación microscópica, MODS (Microscopic Observation Drug Susceptibility) y la prueba de nitrato reductasa o prueba de Griess.

d. PS rápidas moleculares: Pruebas que analizan el ADN de la Micobacteria para identificar el complejo M. tuberculosis y detectar mutaciones asociadas a resistencia a rifampicina, isoniacida y medicamentos de segunda línea.

18. Seguimiento diagnóstico: Procedimiento para completar el estudio bacteriológico en casos probables de TB pulmonar que cuentan con 2 baciloscopías de esputo negativas, mediante 2 cultivos y baciloscopías de esputo semanales.

19. Unidad especializada en tuberculosis (UNET): Ambiente o área de atención de los hospitales donde se brinda atención especializada a los afectados de tuberculosis que cumple con las condiciones de control de infecciones y bioseguridad.

20. Sintomático Respiratorio (SR): Persona que presenta tos y flema por 15 días o más. 5.1.22 SR Esperado (SRE): Número de SR que se espera identificar en un periodo determinado en un establecimiento de salud. Se espera identificar 5 SR por cada 100 atenciones prestadas en el establecimiento de salud en mayores de 15 años.

21. SR Identificado (SRI): Es el SR debidamente registrado en el Libro de Registro de SR.

22. SR Examinado (SREx): Es el SRI en el que se ha obtenido al menos un resultado de baciloscopía de diagnóstico.

23. SR Examinado con baciloscopía positiva: Es el SREx con resultado de baciloscopía positiva. 5.1.26 Tuberculosis latente: Estado en el que se documenta infección por M. tuberculosis a través de la prueba de tuberculina o PPD, sin evidencia de enfermedad activa

XVII. ACCIONES PLANES Y ESTRATEGIAS:

- **Actividades preventivas.** - Las actividades preventivas a nivel nacional que desarrolla la estrategia sanitaria de prevención y control de la tuberculosis se enmarcan básicamente en tres categorías:

- **Captación de sintomáticos respiratorios.** Se enfoca en la búsqueda de nuevos casos en las áreas de atención al paciente (emergencia, hospitalización y consultorios), por ser de elevado riesgo de transmisión. A nivel nacional, se identifican en promedio 20 000 sintomáticos respiratorios frotis positivo.
- **Control de contactos.** Actividad fundamental en el control de la transmisión de la TB, por ser la población más vulnerable a contagiarse debido al contacto cercano

con los casos índices. La meta propuesta para el indicador de cobertura de contactos examinados es de 90%.

- **Administración de terapia preventiva con isoniacida (TPI)**, enfocada en contactos menores de 5 años, contactos con comorbilidades (PVVS, diabetes, cáncer, adultos mayores, etc.).
- **Detección/Diagnóstico** Hasta el año 2016, la realización del diagnóstico tuvo como base pruebas rápidas, como la prueba MODS (Microscopic Observation Drug Susceptibility), y la adquisición de insumos estaba centralizada en el Instituto Nacional de Salud. El desabastecimiento de insumos para esta prueba Memoria DPCTB 2016-2020 dio como resultado la descentralización de la compra de estos en las regiones que realizaban este procedimiento. En razón de lo anterior, se recomendó la importancia de asegurar y agilizar los procedimientos para la compra centralizada de insumos de PSR a laboratorios a nivel nacional, con el fin de ofrecer el acceso oportuno al tratamiento antituberculosis según la sensibilidad de la cepa que la PAT presente.
Nota Conceptual de TB para el proyecto "Mejorar la respuesta nacional contra la tuberculosis en grupos prioritarios (PPL, TB-DR, TB-VIH) y fortalecer el sistema comunitario
Igualmente, la financiación permitió implementar los planes de control de infecciones para TB (PCI-TB), los cuales enfatizan, por orden de prioridad, la detección de sintomáticos respiratorios (SR), el control ambiental y la protección respiratoria.
- **Tratamiento** Mejorar la prestación de los servicios de salud para la atención integral y oportuna de las personas con TB sensible y resistente, al igual que la adherencia al tratamiento. Se implementó el manejo programático con fármacos del 5to grupo según la clasificación de la OMS. Se incluyó bedaquilina en el arsenal terapéutico para el manejo de TB Pre XDR y XDR, con atención domiciliaria. Este nuevo esquema con bedaquilina permitió a las PAT pre XDR y XDR iniciar precozmente el tratamiento antituberculosis, ya que antes de su inclusión en el esquema, los pacientes con TB pre XDR/XDR requerían como condición para iniciar el tratamiento estar hospitalizados. Esto generaba un nudo crítico por no disponer del número suficiente de camas para este tipo de pacientes (baja rotación con 4-5 meses promedio de estancia hospitalaria), y había una lista de espera de 40 PAT para ser hospitalizados en las Unidades Especializadas en TB (UNET) e iniciar el tratamiento EV. Simultáneamente, se programaron reuniones semanales del Comité Nacional de Evaluación de Retratamientos (CNER) en consideración al mayor número de casos a evaluar. Estas dos medidas permitieron desbalsar la lista de PAT en espera brindando tratamiento domiciliario vía oral, lo que mejoró el acceso al tratamiento sin deterioro del paciente y sin riesgo de transmisión de cepas de TB extremadamente resistente en la comunidad.

XVIII. Finalidad

Promover con acciones planes y estrategias la intervención y tratamiento oportuno en la prestación de servicios de la salud a los pacientes afectados con tuberculosis, contactos, población vulnerable y población en general mediante el cumplimiento de la Normatividad Vigente y garantizar las buenas prácticas, mejorar la calidad de atención concluyendo con el bienestar del paciente afectado con tuberculosis y sus contactos.

XIX. Objetivos:

Objetivo General:

Sensibilizar los planes, acciones y estrategias al personal de salud, personal administrativo y población en general sobre la Tuberculosis, definiciones, formas de contagio, medidas de prevención, tratamiento gratuito, recuperación y reinserción a la sociedad.

Objetivos Específicos:

- Promover y ejecutar el plan operativo anual POA durante las atenciones intrahospitalarias.
- Promover el plan de control de Infecciones intrahospitalarias.
- Atención oportuna mediante comité de evaluación y retratamiento regional CRER
- fortalecer capacidades, actitudes y prácticas preventivas a los responsables de la estrategia PCT de las redes de salud, asimismo a los jefes de áreas críticas del hospital regional de Ayacucho.
- Involucrar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud para un mejor manejo del programa en la ejecución del cargo otorgado.
- Informar prácticas preventivas de contagio y promoción de hábitos saludables a la población en general.
- Reforzar el monitoreo los resultados de los pacientes y la comunicación inmediata al PCT HRA
- Monitorizar la implementación de las recomendaciones emitidas por los servicios.

V. Ámbito de aplicación:

El Plan de Operativo Anual POA Y El Plan Control De Infecciones PCI será implementado y ejecutado para la atención de pacientes afectados con tuberculosis es de aplicación obligatoria en el Hospital Regional De Ayacucho

VI. Base Legal:

La Estrategia Sanitaria Nacional del Programa de Control de Tuberculosis, debido a su importancia se encuentra dentro de un marco legal en el que se considera:

- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud
- Ley N° 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado en Salud.
- Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas Usuarias de los Servicios de Salud, y que modifica los Art. 15, 23 y 29 y el segundo párrafo del Art.37 de la Ley N°26842, Ley General de Salud.
- D.S. N° 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.
- D.S. N° 023-2002-SA, que aprueba el Reglamento Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus Modificatorias.
- D.S. N° 008-2010-SA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29344, Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud.
- Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, que aprueba las Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del MINSA.
- Resolución Ministerial N° 540-2011/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de salud para la utilización de medicamentos no considerados en el "Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales".
- Resolución Ministerial N° 525-2012/MINSA, que reestructura la organización y dependencia funcional de las Estrategias Sanitarias Nacionales.
- Resolución Ministerial N° 545-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 047-MINSA/DGE-V.01 "Notificación de Brotes, Epidemias y Otros Eventos de Importancia para la Salud Pública".
- Resolución Ministerial N° 599-2012/MINSA, que aprueba el "Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud"

- Resolución Ministerial N° 607-2012/MINSA, que aprueba la Norma Técnica N° 097-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto/a con Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana"
- Resolución Ministerial N° 948-2012/MINSA, que sustituye los anexos 1,2 y 3 de la Directiva Sanitaria N° 046-MINSA/DGE-V.01, que establece la Notificación de Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, aprobada con Resolución Ministerial N° 506-2012/MINSA.
- Resolución Ministerial N° 179-2013/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 053-MINSA/DGE-V.01 "Directiva sanitaria para la Notificación de Casos en la Vigilancia Epidemiológica de la Tuberculosis".
- Ley N° 30287 Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú.
- Resolución Ministerial N° 752-2018/MINSA, que aprueba la modificación de los subliterales A.1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9.

XX. PRESUPUESTO:

- El presupuesto será asumido por El Programa presupuestal 0016.

XXI. FINALIDAD

- EVALUACION A TODO SINTOMATICO RESPIRATORIO, DIAGNOSTICO PRECOZ Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE LA TUBERCULOSIS EN LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS HRA.

XXII. LUGAR Y FECHA

- Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis del Hospital Regional de Ayacucho dirigido a toda la población de la región Ayacucho - 2022

SITUACION ACTUAL DE LA TUBERCULOSIS EN EL PERU Y REGION

COVID-19 y el impacto en la Tuberculosis en el mundo La tuberculosis es causada por el Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, esta enfermedad es curable y prevenible. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, tanto el virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Estas enfermedades comparten determinantes bio-sociales casi idénticos como la pobreza, el hacinamiento, la diabetes, la contaminación y algunas similitudes clínicas; pero la COVID-19 se ha propagado de manera aterradora, y el 1 de abril de 2020 superó a la tuberculosis como la enfermedad infecciosa que mata a mayor número personas por día. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que para el 2019, un total de 1,4 millones de personas murieron por tuberculosis y que 208,000 tuvieron VIH; además estima que 10 millones de personas de todo el mundo contrajeron esta enfermedad y que aproximadamente 206,030 presentaron tuberculosis multidrogoresistente. La OMS, señala además que antes de la pandemia de COVID-19 muchos países estaban consiguiendo sólidos progresos en la lucha contra la tuberculosis, lo que se tradujo en reducción de la incidencia en 9% entre 2015 y 2019, y 14% de disminución de las defunciones en el mismo período. Saunders y Evans, en su artículo COVID-19 tuberculosis y pobreza: prevenir una tormenta perfecta; presentan un interesante esquema de los mecanismos por los cuales se espera que la pandemia de COVID-19 empeore la pandemia de la tuberculosis figura 1.

FIGURA 1 Mecanismos por los cuales se espera que la pandemia de COVID-19 empeore la pandemia de tuberculosis (TB)(7).

Como se puede observar en la figura 1, la prestación de la atención biomédica en los servicios de salud (vacunación, detección de sintomáticos respiratorios, disminución en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de casos y contactos) se ha visto interrumpida; así como la entrega de suministros para la atención, hay menor apoyo nutricional y de salud mental, reducción en el control de las reacciones adversas a medicamentos y comorbilidades, como el VIH, la diabetes y el cáncer. Esto aunado a determinantes sociales como la pobreza, la reducción de los ingresos familiares, la carencia de saneamiento básico, el predominio del hacinamiento en ciudades densamente pobladas, donde las cuarentenas obligan a las familias permanecer más tiempo en sus domicilios; generan un entorno familiar de mayor exposición al contagio; todo esto aunado a un quiebre en la seguridad alimentaria de las familias, son factores que contribuirán al incremento de casos de tuberculosis en los próximos años.

INTERVENCIONES PARA CERRAR LA BRECHA DIAGNOSTICA DE CASOS DE TB

Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																											
SUB PRODUCTO: DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR (4396402)	META	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
TAREAS	RESULTADO	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAREA N° 1: Casos de Tuberculosis Extrapulmonar	Persona Diagnosticada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TAREA N° 1: Consignar casos de TB Extrapulmonar con confirmación Bacteriológica (baciloscoopia, cultivo o pruebas moleculares)	Persona Diagnosticada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TAREA N° 2: Consignar casos de TB Extrapulmonar con confirmación Histopatológica: reacción inflamatoria (granuloma específico o la presencia de Bacilos Ácido-Alcohol Resistente (BAAR))	Persona Diagnosticada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
TAREA N° 3: Consignar casos de TB Extrapulmonar sin confirmación, el Diagnóstico se basa en criterios epidemiológicos, clínicos y/o estudios de imágenes	Persona Diagnosticada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

04. PRODUCTO: 3000816 PACIENTES CON CO-MORBILIDAD CON DESPIAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																											
SUB PRODUCTO: Despiaje y Diagnóstico de TB y VIH(SIDA) (4397301)	META	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
TAREAS	Unidad de Medida	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAREA N° 1: Intervenciones realizadas para Dx de VIH en personas afectadas por Tuberculosis	Persona Atendida	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																											
SUB PRODUCTO: Despiaje y Diagnóstico de TB y EPOC (4397305)	META	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
TAREAS	Unidad de Medida	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAREA N° 1: Procedimientos destinados al despiaje y Dx de asma en personas afectadas de Tuberculosis mayor a 18 años	Persona Atendida	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																											
SUB PRODUCTO: Despiaje y Diagnóstico de TB y Diabetes Mellitus (DM) (4397402)	META	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
TAREAS	Unidad de Medida	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAREA N° 1: Intervenciones realizadas para diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM) en las personas afectadas por Tuberculosis	Persona Atendida	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																											
SUB PRODUCTO: Despiaje y Diagnóstico Para Pacientes con TB e Insuficiencia Renal (DM) (4397503)	META	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
TAREAS	Unidad de Medida	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAREA N° 1: Intervenciones realizadas para diagnóstico de TB e Insuficiencia Renal en Personas afectadas por TB	Persona Atendida	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

05. PRODUCTO: 3000872 PERSONA QUE ACCIENE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS, Y SUS COMPLICACIONES

Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																											
SUB PRODUCTO: Atención Curativa Esquema TB Sensible (Sin Infección por VIH(SIDA) (4398501)	META	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
TAREAS	Unidad de Medida	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAREA N° 1: Intervenciones que contribuyen a la recuperación de la persona afectada por Tuberculosis, nunca tratados y antes tratados y aquellos que cuentan con una prueba de sensibilidad (PS) sensible a isoniazida y rifampicina (PS rápida) incluye las formas pulmonares, extrapulmonares que no comprometen sistema nervioso central y esquelético.	Persona Tratada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																											
SUB PRODUCTO: Atención Curativa de Drogas de Segunda Línea TB Resistente (4398504)	META	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
TAREAS	Unidad de Medida	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAREA N° 1: Intervenciones que contribuyen a la recuperación de la persona afectada por Tuberculosis, nunca tratados y antes tratados y aquellos que cuentan con una prueba de sensibilidad (PS) sensible a isoniazida y rifampicina (PS rápida) incluye las formas pulmonares, extrapulmonares que no comprometen sistema nervioso central y esquelético.	Persona Tratada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Actividad	C R O N O G R A M A																											
	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE					
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAREA N° 1: Conjunto de intervenciones que contribuyen a la recuperación de la persona afectada por Tuberculosis que va recibir drogas de segunda línea, independientemente del resultado de prueba de sensibilidad que indica resistencia a isoniacina y Rifampicina simultánea.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Persona Tratada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SUB PRODUCTO: Atención Curativa esquema TB Sensible (Extrapulmonar con Compromiso SNC/ostearticular) (4398509)																												
TAREAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Unidad de Medida	META																											
TAREA N° 1: Intervenciones que contribuyen a la recuperación de la Persona Afectada por Tuberculosis Extrapulmonar que comprometen al SNC y/o Sistema osteoarticular.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Persona Tratada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SUB PRODUCTO: Atención Curativa esquema TB Sensible (TB Y Coinfección VIH -SIDA) (4398510)																												
TAREAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Unidad de Medida	META																											
TAREA N° 1: Intervenciones que contribuyen a la recuperación de la persona afectada por Tuberculosis en personas viviendo con VIH SIDA nunca tratados y antes tratados que cuente con una prueba de sensibilidad (PS) sensible a Isoniacida y rifampicina (PS rápida)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Persona Tratada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SUB PRODUCTO: Atención de Reacciones Adversas a fármacos Antituberculosos 4398505																												
TAREAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Unidad de Medida	META																											
TAREA N° 1: Notificación de Reacciones Adversas a Fármacos Antituberculosos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Persona Tratada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SUB PRODUCTO: Atención de Complicaciones que requieren Hospitalización de pacientes en tratamiento 4398506																												
TAREAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Unidad de Medida	META																											
TAREA N° 1: Atención de Complicaciones que requieren Hospitalización de pacientes en tratamiento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Persona Tratada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
07 PRODUCTO: 3000691 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD																												
TAREAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Unidad de Medida	META																											
TAREA N° 1: Minimizar los riesgos de Transmisión de Tuberculosis para la protección del personal de Salud, paciente y familia.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Personal Protegido	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TAREA N° 2: Medidas de Control de Infecciones: medidas de Control Administrativo, Ambiental y de Protección Respiratoria.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Personal Protegido	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10 PRODUCTO: 3043972 PERSONA QUE ACCIENE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGORESISTENTE (XDR)																												
TAREAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Unidad de Medida	META																											
TAREA N° 1: Atención Curativa con Drogas de Segunda Línea XDR (4397201)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unidad de Medida	META																											
TAREA N° 1: Atención curativa de los PAT PRE XDR en Establecimientos de Salud Vista Alegre (Red Huamanga) y Hospital Regional Ayacucho.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Persona Tratada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
SUB PRODUCTO: Seguimiento de los PAT XDR y PRE XDR en Establecimientos de Salud.																												
TAREAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Unidad de Medida	META																											
TAREA N° 1: Seguimiento de los PAT PRE XDR en Establecimientos de Salud Vista Alegre (Red Huamanga) y Hospital Regional Ayacucho.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Persona Tratada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11 PRODUCTO: 3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS																												
TAREAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Unidad de Medida	META																											
TAREA N° 1: Seguimiento de los PAT PRE XDR en Establecimientos de Salud Vista Alegre (Red Huamanga) y Hospital Regional Ayacucho.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Persona Tratada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																															
SUB PRODUCTO: Atención Curativa de TB y Diabetes Mellitus (4397401)		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE									
TAREAS		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAREA N° 1: intervenciones que contribuyen a la recuperación de la Persona Diagnosticada con Tuberculosis y Diabetes Mellitus	Persona Tratada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
META		12																															
Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																															
SUB PRODUCTO: Atención de TB e Insuficiencia Renal (4397403)		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE									
TAREAS		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
TAREA N° 1: intervenciones que contribuyan a la recuperación de la persona afectada por Tuberculosis e Insuficiencia Renal Crónica en servicios de salud dependiendo del grado.	Persona Tratada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
META		12																															
Actividad		C. R. O. N. O. G. R. A. M. A.																															
SUB PRODUCTO: Atención Curativa de Asma/EPOC (4397404)		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE									
TAREAS		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
TAREA N° 1: intervenciones que Contribuyan a la recuperación de las personas mayores de 18 años con Asma/EPOC Moderado, Severo	Persona Tratada	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
META		12

SALA SITUACIONAL A NIVEL NACIONAL

TASA DE MORIBILIDAD E INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS. NACIONAL

TBPFP= TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS POSITIVO

FUENTE: HASTA 2017 INFORME OPERACIONAL MANUAL, 2018 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE LA TUBERCULOSIS (SIGTB)

PORCENTAJE DE DETECCIÓN DE SRI. NACIONAL

ATC= ATENCIONES SRI= SINTOMATICO RESPIRATORIO IDENTIFICADO

FUENTE: HASTA 2017 INFORME OPERACIONAL MANUAL, 2018 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE LA TUBERCULOSIS (SIGTB)

NÚMERO DE CASOS DE TUBERCULOSIS. NACIONAL

TBFP= TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS POSITIVO

FUENTE: HASTA 2017 INFORME OPERACIONAL MANUAL, 2018 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE LA TUBERCULOSIS (SIGTB)

PORCENTAJE DE CONTACTOS CENSADOS. NACIONAL

FUENTE: HASTA 2017 INFORME OPERACIONAL MANUAL, 2018 SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DE LA TUBERCULOSIS (SIGTB)

SITUACION ACTUAL DE LA TUBERCULOSIS EN LA REGION AYACUCHO

PERÚ: TUBERCULOSIS 2020*.

- Población: 32'625,948 hab.
- Densidad poblacional: 25.3 hab. x km²
- 25 Regiones geográficas
- **Morbilidad de casos de TB: 24,296**
- Casos nuevos de TB: 21,192
- **Casos nuevos de TBP FP: 12,409**
- Casos TB-MDR: 1,174
- Casos TB-XDR: 54
- 60% (14,567) de casos de TB, 75.4% (885) de TB-MDR y 53.7 % (29) TB-XDR notificados en Lima y Callao.
- Doce regiones priorizadas: Ucayali, Madre de Dios, Callao, Lima, Loreto, Tacna, Ica, Moquegua, Tumbes, La Libertad, Huánuco, Ancash

Grafico N° 1: Tasas de morbilidad, casos nuevos y Frotis Positivo Perú años 2015 al 2020

En relación a la Tasa de Morbilidad del año 2017 al 2020 como país, se evidencia una disminución de 18.7 x 100000 hab. así mismo la Tasa de Incidencia evidencia una disminución de 16.4 x 100000 Hab. y la Tasa de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo una disminución de 8.3 x 100000 Hab.

TASA DE MORBILIDAD E INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS. MINSA

TBP FP= TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS POSITIVO

FUENTE: HASTA 2017 INFORME OPERACIONAL MANUAL, 2018 SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL DE LA TUBERCULOSIS (SIGTB)

Fuente: SIGTB MINSA

De lo observado podemos decir que para el año 2021 tenemos 06 **distritos en Muy Alto Riesgo** siendo: distrito de Llochegua (08 casos), Canayre (06 casos), Santa Rosa (10 casos) Samugari (14 casos), Otocha (03 casos) y Soras (01 caso) y **03 distritos de Alto Riesgo**: Sivia (08 casos), Chumpi (02 casos) y Pullo (04 casos).

Tabla N° 1: Casos de Tuberculosis por distritos DIRESA Ayacucho año 2021

PROVINCIA	DISTRITO	NRO DE CASOS	POBLACION	TASA TBP FP	RIESGO
HUANTA	LLOCHEGUA	8	10223	78.25	MUY ALTO
HUANTA	CANAYRE	6	4478	133.99	MUY ALTO
LA MAR	SANTA ROSA	10	12237	81.72	MUY ALTO
LA MAR	SAMUGARI	14	11942	117.23	MUY ALTO
LUCANAS	OTOCHA	3	2845	105.45	MUY ALTO
SUCRE	SORAS	1	944	105.93	MUY ALTO
HUANTA	SIVIA	8	13303	60.14	ALTO
PARINACOCI	CHUMPI	2	3869	51.69	ALTO
PARINACOCI	PULLO	4	7331	54.56	ALTO
HUAMANGA	CARMEN ALT	5	17674	28.29	MEDIANO
HUANTA	NINGUNO	1	2262	44.21	MEDIANO
LA MAR	ANCO	3	9841	30.48	MEDIANO
LA MAR	AYNA	5	11140	44.88	MEDIANO
LA MAR	ANCHIHUAY	1	3621	27.62	MEDIANO
PARINACOCI	CORACORA	3	8838	33.94	MEDIANO
VICTOR FAJA	CANARIA	1	3276	30.53	MEDIANO
HUAMANGA	AYACUCHO	14	87961	15.92	BAJO
HUAMANGA	OCROS	1	5316	18.81	BAJO
HUAMANGA	QUINUA	1	4996	20.02	BAJO
HUAMANGA	SAN JUAN BA	5	43074	11.61	BAJO
HUAMANGA	TAMBILLO	1	7445	13.43	BAJO
HUAMANGA	JESUS NAZAR	2	16628	12.03	BAJO
HUAMANGA	ANDRES AVE	6	28926	20.74	BAJO
CANGALLO	CANGALLO	1	4725	21.16	BAJO
CANGALLO	LOS MOROCI	1	7538	13.27	BAJO
HUANTA	HUANTA	7	32219	21.73	BAJO
HUANTA	SANTILLANA	1	5410	18.48	BAJO
HUANTA	UCHURACCA	1	5636	17.74	BAJO
LA MAR	SAN MIGUEL	2	9588	20.86	BAJO
LA MAR	TAMBO	1	8393	11.91	BAJO

Fuente: SIGTB MINSA -20-01-2022

Grafico N° 2: casos notificados de: morbilidad, casos nuevos y Frotis Positivo DIRESA Ayacucho años 2015 al 2021.

De lo observado podemos decir que en relación a los casos notificados de **Morbilidad del año 2020 al 2021**, se evidencia un incremento de 48 casos, de igual manera en relación a la **Incidencia** se evidencia un incremento de 46 casos y en relación a **Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo** se incrementó a 84 casos.

Fuente: SIGTB MINSA-20-01-2022

Gráfico N° 3: porcentaje de Detección de Sintomático Respiratorio región Ayacucho años 2015 al 2021

De lo observado podemos decir que en relación al porcentaje de Detección de Sintomático Respiratorio Identificado del año 2015 al 2021 hubo un incremento de 0.08% no llegando al óptimo que es el 5% como DIRESA.

Fuente: SIGTB MINSA-20-01-2022

Tabla N° 2: Localización de Tuberculosis DIRESA Ayacucho enero a diciembre 2021

De enero a diciembre se notificaron 182 casos siendo 148 casos de Tuberculosis Pulmonar y 34 casos de Tb Extra pulmonar.

En relación a los casos de Tuberculosis Pulmonar la Red San Francisco notifico 66 casos (42.6%), seguida de la Red centro Ayacucho notificando 04 casos (2.7%),

Teniendo en cuenta los casos de Tuberculosis Extrapulmonar la Red Huamanga notifico 21 casos (61.8%) y las Redes de salud Centro Ayacucho y San Miguel no notificaron casos.

Localización	Extrapulmonar		Pulmonar		Total general	
	N°	%	N°	%	N°	%
AYACUCHO CENTRO	0	0.0	4	2.7	4	2.2
CORACORA	2	5.9	15	10.1	17	9.3
HUAMANGA	21	61.8	44	29.7	65	35.7
HUANTA	1	2.9	12	8.1	13	7.1
LUCANAS	1	2.9	3	2.0	4	2.2
HOSPITAL REGIONAL AYACUCHO	7	20.6	2	1.4	9	4.9
SAN FRANCISCO	2	5.9	63	42.6	65	35.7
SAN MIGUEL	0	0.0	5	3.4	5	2.7
Total general	34	18.7	148	81.3	182	100.0

Fuente: SIGTB MINSA-20-01-2022

Localización Tuberculosis	Extrapulmonar	%	Pulmonar	%	Total general	%
AYACUCHO CENTRO	1	3.1	3	3.5	4	3.4
CORACORA	0	0.0	4	4.7	4	3.4
HUAMANGA	17	53.1	26	30.6	43	36.8
HUANTA	2	6.3	19	22.4	21	17.9
ICA-PALPA-NAZCA	0	0.0	1	1.2	1	0.9
LUCANAS	0	0.0	4	4.7	4	3.4
NO PERTENECE A NINGUNA RED	1	3.1	1	1.2	2	1.7
SAN FRANCISCO	6	18.8	24	28.2	30	25.6
SAN MIGUEL	5	15.6	3	3.5	8	6.8
Total general	32	100	85	100	117	100

Fuente: SIGTB MINSa-21-01-2021

Gráfico N° 4: porcentaje de Co infección TB/ VIH -SIDA DIRESA - Ayacucho año 2019
En relación a la co infección evidenciamos que el departamento de Ayacucho tiene 1.7% de Co Infección TB/VIH-SIDA, ubicándose dentro de los estándares aceptables comparando con la nacional.

Gráfico N° 5: porcentaje de Co infección TB / Diabetes Mellitus DIRESA - Ayacucho enero a diciembre 2019

En relación a la confección evidenciamos que el departamento de Ayacucho tiene 5.5% de Co Infección TB/VIH-SIDA, ubicándose dentro de los estándares aceptables comparando con la nacional.

PORCENTAJE DE COMORBILIDAD TB / DM POR REGIONES DE SALUD. PERÚ. 2019.

Fuente: Año 2019 - SIGTB

4 - 2

Fuente: SIGTB Minsa-21-01-2021

Gráfico N° 6: tendencia de casos aprobados por sospecha o confirmación de MDR y N° de XDR por PS. PERU 1996 - 2019

TENDENCIA DE CASOS APROBADOS POR SOSPECHA O CONFIRMACION DE MDR Y N° DE XDR POR PS. PERÚ. 1996 - 2019

Fuente: Sistema N°E/SIGTB-DICTE/DOES/TRANS/PERU 2019.2019 informacion SIGTB

4 - 1

Gráfico N° 7: Tuberculosis Resistente por Redes de Salud 2021*

De lo observado podemos decir que la DIRESA - Ayacucho a la fecha cuenta con un total de 16 casos notificados, evidenciando que la Red San Francisco notifico 08 casos (50.0%) de drogoresistencia y Red Huamanga 06 casos (37.5%), Red de Salud Centro Ayacucho notifico 01 caso (6.3%) y Lucanas 01 caso (6.3%).

Fuente: SIGTB MINSA-20-01-2022

HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO

INDICADORES EPIDEMIOLOGICOS

Gráfico N° 1: Tasas de morbilidad, casos nuevos y TB Frotis Positivo Hospital Regional de Ayacucho años 2015 al 2021.

FUENTE: Libro de Seguimiento de pacientes con TB sensible y TB resistente. SIGTB

Grafico N° 2: Tasa de Mortalidad por tuberculosis, mide la mortalidad que se debe a la tuberculosis en la población general

Fuente: Certificados de Defunción, Historias clínicas de Tuberculosis.

INDICADORES OPERACIONAL: Detección.

Grafico N° 3: Proporción de Sintomático Respiratorio Identificados entre las atenciones en mayores de 15 años mide la intensidad de búsqueda de SR con respecto a las atenciones en mayores de 15 años; y proporción de Sintomático Respiratorio Examinados SRE entre Sintomático Respiratorio Identificados SRI que evalúa la capacidad del personal de salud para realizar el examen para diagnóstico de TB entre los SRI. Correspondiente desde 2015 al 2021

Fuente: Libro de registro de sintomático respiratorio, reporte de área de procesamiento de datos, SIGTB

Grafico N° 4: Proporción de Sintomático Respiratorio Identificados entre las atenciones en mayores de 15 años mide la intensidad de búsqueda de SR con respecto a las atenciones en mayores de 15 años; correspondiente al año 2020.

Fuente: Libro De Registro De Sintomatico Respiratorio, Informe Operacional Mensual año 2021, SIGTB

Grafico N° 5: Proporción de Sintomático Respiratorio Examinados entre Sintomáticos Respiratorios Identificados mide la intensidad de búsqueda de Sintomáticos Respiratorios Examinados con respecto a los Sintomáticos Respiratorios Identificados; correspondiente al año 2021.

Fuente: Libro De Registro De Sintomatico Respiratorio, Informe Operacional Mensual año 2020, SIGTB

Grafico N° 6: Proporción de Sintomático Respiratorio Examinados BK+ entre Sintomáticos Respiratorios Examinados mide la intensidad de búsqueda de Sintomáticos Respiratorios Examinados BK+ con respecto a los Sintomáticos Respiratorios Examinados; correspondiente al año 2021.

Fuente: Libro de registro de sintomático respiratorio, SIGTB

INDICADORES OPERACIONALES: Diagnóstico de TB Sensible

Grafico N° 7: Proporción de casos nuevos mide la proporción de casos nuevos entre el total de casos reportados. Del Hospital Regional De Ayacucho del año 2015 al 2021 Evidenciando que en relación al año 2021 se presentaron 11 casos nuevos

Fuente: Libro de Seguimiento de pacientes con tratamiento a medicamentos de primera Línea y segunda Línea, Porcentaje de Búsqueda de Sintomático Respiratorio Hospital Regional de Ayacucho años 2015 al 2021

Grafico N° 8: Cuadro donde se evidencia el número de casos según localización de Tuberculosis, Hospital Regional de Ayacucho del 2015 al 2021.

Fuente: Libro De Registro De Sintomatico Respiratorio, Informe Operacional Mensual año 2021, SIGTB

XIII. Fuentes de Información para la Valoración de Información:

10. Norma Técnica N° 104-MINSA/DGSP-V.01:
11. Resolución Ministerial N° 252-2018 MINSA
12. Ley N° 30287 Ley de Prevención y Control de la Tuberculosis en el Perú.
13. Norma Técnica N° 022 Manejo de Historia Clínica.
14. Historias Clínicas Especializadas, recetas médicas, solicitud de exámenes auxiliares, formatos de atención.
15. Sistema De Información Gerencial SIGTB
16. Libro de registro de pacientes diagnóstico de tuberculosis con drogas de primera línea
17. Plan Operativo Institucional.
18. Plan de Control de Infecciones.

XIV. Presupuesto:

Las actividades a desarrollarse en el Presente plan, serán ejecutados con el Programa Presupuestal de Tuberculosis CP_PP_0016 del Hospital Regional de Salud Ayacucho.

XV. Resultados Esperados

- Fortalecer la captación de sintomáticos respiratorios durante las actividades programadas por el día mundial de la lucha contra la tuberculosis y pacientes atendidos hospitalizados en emergencia por consultorio externo en cumplimiento de la normatividad vigente y Convenio MINSA Gobierno Regional.
- Hacer cumplimiento a programación Plan De Control De Infecciones Estrategia Sanitaria Regional De Prevención Y Control De Tuberculosis año 2021
- Realizar los exámenes de contactos censados y examinados al 100%.
- Iniciar TPI previa evaluación médica en menores de 5 años al 100%.
- Estudio de Control de contactos de caso índice e identificación temprana de tuberculosis latente y/o caso de tuberculosis confirmada
- Cumplir con la programación del plan de monitoreo (batería de análisis) de pacientes afectados con tuberculosis según NT N°104 y la Resolución Ministerial N°752_2018/MINSA

Nuevo registro exp.:
Folios:

- conformación y trabajo de equipo multidisciplinario de los casos de pacientes afectados con tuberculosis pulmonar y extra pulmonar en el Hospital Regional De Ayacucho: Médico Neumólogo consultor, medico infectólogo, médico neurólogo, medico gastroenterólogo, médico Ginecólogo, médico oftalmólogo, médico Endocrinólogo, profesional de Enfermería responsable de PCT, profesional tecnólogo Médico, profesional biólogo, profesional Psicólogo, profesional en Trabajo Social, profesional nutricionista, profesional obstetra y otros.
- Establecer y aplicar Flujos De atención e intervención A Pacientes Afectados Con Tuberculosis (Población Civil Y Trabajadores De La Institución) Provenientes De Consultas Externas, Emergencia Y Hospitalización.
- Evitar los abandonos en pacientes TB Sensible, Drogoresistente, MDR, Pre XDR y XDR.
- Practicar la Estrategia de capacitación permanente en salud, mediante la reflexión de la práctica diaria, para el desarrollo del potencial humano en salud.
- Establecer la generación de una conciencia y cultura ética y de calidad para lograr comportamientos responsables en el personal que trabaja en los establecimientos de salud.

Es todo cuanto informo y solicito a Ud. Agradeciéndole anticipadamente por su atención al presente.

Atentamente,

C.c.
Arch.PCT

[Handwritten signature]

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN
Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
Lic. Enf. Samé R. Flores Díaz
CEP 62210
RESPONSABLE