



Foto N° 32

Especie	<i>Patagioenas maculosa</i>	
Descripción	De tamaño grande, color pálido, partes superiores escamosas y banda blanca en las alas (Schulenberg et al., 2002)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Bastante común en el sur de los Andes entre los 2500 – 4100 m, localmente por debajo de los 1200 en el lado oeste de los Andes (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 33

Especie	<i>Phrygilus punensis</i>	
Descripción	Capucha y alas de color gris azulado, dorso y vientre amarillo oscuro.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Común y de amplia distribución en los Andes entre los 2800 y 4700 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 34

Especie	<i>Turdus chiguanco</i>	
Descripción	De color marrón grisáceo con patas y pico anaranjados (Aronson, 2002)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	LC	LC
	-	-
Endemismo y distribución	Una especie común en los Andes. Se le encuentra en el lado occidental hasta los 1600 m y en el lado oriental entre los 2400 y 4300 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 35

Especie	<i>Catamenia inornata</i>	
Descripción	Macho de color gris, hembra de color marrón. Ambos con rayas oscuras en la espalda, subcaudales rojizas y pico pequeño de forma triangular (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Especie poco común a bastante común en los Andes desde los 2600 hasta los 4400 m. Se le encuentra en matorrales, áreas agrícolas y bosques abiertos como los de <i>Polylepis</i> y pastos (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 36

Especie	<i>Geranoaetus melanoleucus morfo oscuro</i>	
Descripción	Cola blanca con banda terminal negra. Adultos poseen plumajes muy variables (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución	Aguilucho muy común y ampliamente distribuido desde la costa hasta los Andes desde el nivel del mar hasta los 4600 m. Raro en el lado oriental donde se le encuentra por debajo de los 2000 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 37

Especie	<i>Oreotrochilus melanogaster</i>	
Descripción	Macho fácil de reconocer por el contraste entre el verde iridiscente y el pecho y vientre negro (Schulenberg et al., 2007).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución	Endémica. Bastante común en la puna central de Perú entre los 3500 y 4800 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 38

Especie	<i>Spinus magellanicus</i>	
Descripción	Macho con cabeza negra, espalda verdosa, alas negras con manchas amarillas y rabadilla y partes inferiores de color amarillo. Las hembras (foto) no tienen capucha negra (Aronson, 2002).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	De distribución amplia, desde el nivel del mar hasta los 4200 m en el lado occidental de los Andes, valles intermontanos. Raro debajo de los 2000 m en el lado oriental (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 39

Especie	<i>Zonotrichia capensis</i>	
Descripción	De color marrón con manchas negras en la espalda. Tiene nuca anaranjada y collar negro. Cabeza gris con líneas negras y una pequeña cresta (Aronson, 2002).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Común y ampliamente distribuido desde la costa a los Andes, desde el nivel del mar hasta los 4500 m. En el río Mayo y los valles del Huallaga central se le encuentra por debajo de los 350 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 40

Especie	<i>Catamenia inornata</i>	
Descripción	Macho de color gris, hembra de color marrón. Ambos con rayas oscuras en la espalda, subcaudales rojizas y pico pequeño de forma triangular (Aronson, 2022)..	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Especie poco común a bastante común en los Andes desde los 2600 hasta los 4400 m. Se le encuentra en matorrales, áreas agrícolas y bosques abiertos como los de <i>Polylepis</i> y pastos (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 41

Especie	<i>Spinus magellanicus</i>	
Descripción	Macho (foto) con cabeza negra, espalda verdosa, alas negras con manchas amarillas y rabadilla y partes inferiores de color amarillo. Las hembras no tienen capucha negra (Aronson, 2002).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	IUCN
	Cites	Cites
Endemismo y distribución	De distribución amplia, desde el nivel del mar hasta los 4200 m en el lado occidental de los Andes, valles intermontanos. Raro debajo de los 2000 m en el lado oriental (Schulenberg et al., 2007)	
Usos		



Foto N° 42

Especie	<i>Geocerthia serrana</i>	
Descripción	Cuerpo de color terroso y pico relativamente recto, las partes inferiores fuertemente rayadas y color canela que se extiende en las alas (Schulenberg et al., 2007).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Endémica. Bastante común en áreas montanas áridas entre los 3000 a los 4600 m. Muestra preferencia por sitios con gran densidad de matorrales (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	

MASTOFAUNA TEMPORADA HÚMEDA



Foto N° 01

Especie	<i>Vicugna vicugna</i> "Vicuña" Familia Camelidae	
Descripción	Individuos adultos y juveniles	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	I, II
Endemismo y distribución	Se encuentran distribuidas en los Andes de Perú, Argentina, Bolivia y norte de Chile, Asimismo, en el Perú, en las provincias altas de Costa y Sierra, desde Cajamarca hasta Tacna (IUCN, 2018).	
Usos	Se aprovecha su fibra para la elaboración de prendas de vestir, así también son víctimas de la caza furtiva.	



Foto N° 02

Especie	<i>Akodon juninensis</i> "Ratón campestre de Junín" Familia Cricetidae	
Descripción	Individuo adulto capturado	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Ha sido reportado solo para los departamentos de Ancash, Junín y Lima. Se distribuye en las laderas orientales y occidentales de los Andes del centro del Perú, sobre los 2700 msnm (Musser & Carleton 2005).	
Usos	Funciona como parte de la dieta de gran cantidad de carnívoros, aves y serpientes.	



Foto N° 03-

Espece	<i>Calomys sorellus</i> “ratón vespertino rojizo” Familia Cricetidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Endémico de Perú. Su distribución está limitada en gran medida a la vegetación de la puna, por encima de los 2500m.	
Usos	Funciona como parte de la dieta de gran cantidad de carnívoros, aves y serpientes.	



Foto N° 04

Especie	<i>Lycalopex culpaeus</i> "Zorro, Zorro colorado" Familia Canidae	
Descripción	Feca de Zorro	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución	Ampliamente distribuido, habita en zonas de páramos y bosque andino entre los 2,000 y 3,700 msnm (JORGENSEN <i>et al.</i> , 2006)	
Usos	Cazado para usar su piel como adorno, así como, por ser considerado plaga para el ganado.	



Foto N° 05

Especie	<i>Phyllotis xanthopygus</i> “ratón orejón de ancas amarillentas” Familia Cricetidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es el mamífero que presenta mayor rango de distribución de su género, desde el centro del Perú hasta el extremo sur de Sudamérica continental (Patton <i>et al.</i> , 2015).	
Usos	Funciona como parte de la dieta de gran cantidad de carnívoros, aves y serpientes.	



Foto N° 06

Especie	<i>Hylaeamys perenensis</i> "Hylaeamys amazónico occidental"	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	De bosques húmedos de tierras bajas y baja montaña, desde el este de Colombia hacia el sur a través de Ecuador y Perú hasta el noreste de Bolivia, extendiéndose hasta el oeste de Brasil (Patton <i>et al.</i> , 2015).	
Usos	Funciona como parte de la dieta de gran cantidad de carnívoros, aves y serpientes.	



Foto N° 07

Especie	<i>Conepatus chinga</i> “zorrino, añas” Familia Mephitidae	
Descripción	Excavado de un individuo de Zorrino	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Especie con el mayor rango de distribución en el Neotrópico (Van Gelder 1968; Nowak 1991), desde el nivel del mar hasta las llanuras altiplánicas de la Cordillera de los Andes (Eisenberg y Redford, 1999; Wilson y Mittermeier, 2009).	
Usos	Cazado por ser considerado plaga para el cultivo, así como para usar su piel como adorno.	



Foto N° 08

Especie	<i>Akodon aerosus</i> "ratón campestre cobrizo" Familia Cricetidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Se distribuye en los bosques montanos, a lo largo de las laderas orientales de los Andes, desde el sur de Ecuador, pasando por Perú hasta el centro de Bolivia (Patton y Smith 1992a,b; S. Anderson 1997).	
Usos	Funciona como parte de la dieta de gran cantidad de carnívoros, aves y serpientes.	



Foto N° 09

Especie	<i>Cuniculus paca</i> "majaz, picuro, zamaño" Familia Cuniculidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	III
Endemismo y distribución	Se encuentra en los bosques bajos del neotrópico desde el sur-este de México hacia el sur, cruzando América Central hasta los países sudamericanos (Emmons y Feer, 1999). Habita en un rango altitudinal desde los 0 hasta 2000m (Cuervo Díaz et al. 1986).	
Usos	Es cazado para el aprovechamiento de su carne.	



Foto N° 10

Especie	<i>Platyrrhinus albericoi</i> “murciélago de nariz ancha de alberico” Familia Phyllostomidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Endémicos del neotrópico (Velazco et al., 2018). Su distribución abarca desde el norte de Venezuela, oeste de Colombia y Ecuador, este de Perú hasta el norte de Bolivia (Gardner, 2007).	
Usos	Como especie clave, para la conservación y regeneración del bosque por su rol de dispersor de semillas ya que posee dieta frugívora.	



Foto N° 11

Especie	<i>Carollia perspicillata</i> "murciélago frutero común" Familia Phyllostomidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Se encuentra desde Colombia hacia el este a través del norte de Sudamérica, y hacia el sur en Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil, Perú hasta el norte de Argentina (Gardner, 2007).	
Usos	Como especie clave, para la conservación y regeneración del bosque por su rol de dispersor de semillas, por su dieta frugívora.	



Foto N° 12

Especie	<i>Carollia brevicauda</i> "murciélago frutero colicorto" Familia Phyllostomidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	En Sudamérica, se encuentra a partir de Colombia hacia el este a través de las Guayanas (Genoways y Williams, 1979b) y hacia el sur a través de Ecuador, Perú y el este de Bolivia hasta el sureste de Brasil (McLellan y Koopman, 2007; Sampaio et al., 2016).	
Usos	Como especie clave, para la conservación y regeneración del bosque por su rol de dispersor de semillas, por su dieta frugívora.	



Foto N° 13

Espece	<i>Nasua nasua</i> “coatí de cola anillada, mishasho” Familia Procyonidae	
Descripción	Individuo juvenil	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Ampliamente distribuido en América del Sur, desde Colombia y Venezuela en el norte hasta Uruguay y el norte de Argentina en el sur (Gompper y Decker, 1998)	
Usos	En la industria del café son valorados por el especial tratamiento que sucede en los granos de café al pasar por su tracto digestivo. Puede ser adoptado como mascota, cuando son hallados a temprana edad.	



Foto N° 14

Espece	<i>Glossophaga soricina</i> “murciélago longirostro de Pallas” Familia Phyllostomidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Habita desde México hasta el norte de Argentina, ha sido reportada en casi todos los países de Sudamérica y Centroamérica exceptuando Uruguay (Griffiths y Gardner, 2007).	
Usos	Funciona como polinizador, debido a su dieta nectarívora.	



Foto N° 15

Especie	<i>Eptesicus andinus</i> "murciélago café andino" Familia Vespertilionidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	NE
	Cites	-
Endemismo y distribución	Habita el altiplano de Bolivia hacia el norte en las zonas altas de los Andes de Perú, Ecuador y Colombia, hasta el noroeste de Venezuela (Molinari y Aguirre, 2016).	
Usos	Controlador de insectos, ya que posee dieta principalmente insectívora.	



Foto N° 16

Especie	<i>Sturnira magna</i> "murciélago de hombros amarillos grandes" Familia Phyllostomidae	
Descripción	Individuo adulto	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	NT
	Cites	-
Endemismo y distribución	Desde México hasta el norte de Argentina, incluidas algunas islas del Caribe (Velazco y Patterson, 2013). Está presente en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y el occidente de Brasil (Gardner, 2007).	
Usos	Son dispersadores de semillas eficientes mutualizan con plantas del género Piper y Solanum.	

MASTOFAUNA TEMPORADA SECA



Foto N° 01

Especie	<i>Akodon aerosus</i>	
Descripción	Es una especie nocturna, de hábitos terrestres y solitarios. Se le encuentra en zonas abiertas con abundante vegetación herbácea, en bosques primarios, secundarios, bordes de bosque o bosques de galería. Se alimenta de material vegetal e insectos.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Esta especie se distribuyen en los países de Bolivia, Ecuador y Perú, tiene un rango altitudinal comprendido entre los 1200 hasta los 2400 msnm.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 02

Especie	<i>Neacomys cf. spinosus</i>	
Descripción	Es una de las especies de mayor tamaño del género, tiene hábitos nocturnos, se le puede encontrar tanto en selva tropical, como en bosque de medio monte de las laderas andinas, alcanza un rango altitudinal de hasta los 2000 msnm. Se alimenta principalmente de insectos.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Especie endémica para el Perú, se distribuyen principalmente en el norte del Perú.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 03

Especie	<i>Hylaeamys perenensis</i>	
Descripción	Es una especie exclusivamente terrestre y solitaria, son de hábitos nocturnos, se desplaza en el bosque rodeando troncos caídos o caminando sobre ellos, se le encuentra en bosques primarios, secundarios, y bosques de galería. Se alimenta principalmente de frutos, semillas e insectos.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Se distribuye en los países de Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Perú. Tiene un rango altitudinal comprendido entre los 65 y 1000 msnm.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 04

Especie	<i>Akodon juninensis</i>	
Descripción	Esta especie habita en pastos densos, pastos finos y bien drenados y bosques dispersos. Es de hábitos nocturnos.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Especie endémica para el Perú, se distribuye en los departamentos de Lima, Ancash, Junín, Huancavelica y Ayacucho. Tiene un rango altitudinal comprendido entre los 2700 hasta los 3800 msnm.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 05

Especie	<i>Calomys miurus</i>	
Descripción	Es una especie de tamaño mediano, tiene una dieta insectívora y herbívora.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	-
	CITES	-
Endemismo y distribución	Especie endémica para el Perú, se distribuye en los departamentos de Lima y Junín y por el sur en el departamento de Arequipa. Tiene un rango altitudinal comprendido por hasta los 3300 msnm.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 06

Especie	<i>Carollia perspicillata</i>	
Descripción	Es una especie que habita en bosque de piemontano, bosque húmedo tropical amazónico, matorral seco de la costa, encontrándose en costa, Amazonía y estribaciones de los andes. Se alimenta de frutos.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Especie con una amplia distribución, desde México, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Las Guyanas, Trinidad y Tobago.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 07

Especie	<i>Anoura aequatoris</i>	
Descripción	Es una especie que habita en boques montanos de la región andina, bosques primarios con alta humedad y bosques secundarios. Esta especie es nectarívora.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Esta especie se distribuye en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Tiene un rango altitudinal desde los 600 hasta los 1500 msnm.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 08

Especie	<i>Glossophaga soricina</i>	
Descripción	Esta especie habita principalmente en bosques húmedos, bosques tropicales amazónicos, se le registra también en la costa, Amazonía y estribaciones de los andes. Es una especie nectarívora y frugívora.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Es una especie de amplia distribución que habita desde México hasta el norte de Argentina. Tiene un rango altitudinal comprendido hasta por sobre los 1600 msnm.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 09

Especie	<i>Sturnira oporaphilum</i>	
Descripción	Esta especie se registra principalmente en bosques húmedos tropicales y bosques de piemontano. Tienen una dieta frugívora.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Esta especie se distribuye en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina. Tiene un rango altitudinal comprendido desde los 830 hasta los 2950 msnm.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 10

Especie	<i>Sturnira tildae</i>	
Descripción	Es una especie de tamaño mediano, habita en bosques húmedos y bosque de piemontano. Se alimenta principalmente de frutas.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Se distribuye en Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Brasil, Ecuador, Perú y el norte de Bolivia. Tiene un rango altitudinal comprendido desde los 180 hasta los 1200 msnm.	
Usos	No se registran usos en la zona.	



Foto N° 11

Especie	<i>Carollia brevicauda</i>	
Descripción	Esta especie habita en bosques húmedos, matorrales secos de la costa y bosque piemontano. Se refugia en árboles huecos, cuevas, grietas, incluyendo casas abandonadas. Tiene una alimentación frugívora.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 004-2014-MINAGRI)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	CITES	-
Endemismo y distribución	Se distribuye en Panamá, Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil. Tiene un rango altitudinal comprendido hasta los 2300 msnm.	
Usos	No se registran usos en la zona.	