



Foto N° 129

Especie	<i>Trifolium repens L.</i>	
Descripción	-	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	-
	Cites	-
Endemismo y distribución	Nativa	
Usos	-	



Foto N° 130

Especie	<i>Trifolium sp</i>	
Descripción	-	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	-
	Cites	-
Endemismo y distribución	Nativa	
Usos	-	



Foto N° 131

Especie	<i>Urtica urens L.</i>	
Descripción	-	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	-
	Cites	-
Endemismo y distribución	Nativa	
Usos	-	




Foto N° 132

Especie	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	
Descripción	-	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	-
	Cites	-
Endemismo y distribución	Nativa	
Usos	-	



Foto N° 133

Especie	<i>Xanthosoma sp.</i>	
Descripción	-	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	-
	Cites	-
Endemismo y distribución	Nativa	
Usos	-	



Foto N° 134

Especie	<i>Zea mays L.</i>	
Descripción	-	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Nativa	
Usos	-	

AVIFAUNA TEMPORADA HÚMEDA



Foto N° 01

Especie	<i>Zonotrichia capensis</i>	
Descripción	Ave granívora	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)		
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	
Endemismo y distribución	local	
Usos		



Foto N° 02

Especie	<i>Colonia colonus</i>	
Descripción	Tirano de cola larga es negro con una rabadilla y una corona blancas o grisácea y blanca.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Común principalmente en la vertiente este de los Andes hasta los 2300 m. También se encuentra en rangos tan bajos como 350 m en parte de las tierras bajas amazónicas.	
Usos		



Foto N° 03

Especie	<i>Psarocolius angustifrons</i>	
Descripción	Se alimenta en bandadas sueltas en casi cualquier tipo de bosque, y también en tierras agrícolas.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Extendida en la Amazonía, donde se sabe que se extiende hasta 2000 m	
Usos		



Foto N° 04

Especie	<i>Coereba flaveola</i>	
Descripción	El Bananaquit tiene partes superiores grises y partes inferiores amarillas. Se alimenta de frutos e insectos.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	El Bananaquit es común y está muy extendido en el noroeste de Perú y la cuenca del Marañón, Amazonia y la vertiente este de los Andes hacia el sur.	
Usos		




Foto N° 05

Especie	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	
Descripción	Es la golondrina más común y extendida, que se alimenta en casi todos los espacios abiertos pero evita los bosques continuos y los pastizales de la puna.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es común en áreas urbanas y hábitats abiertos desde el nivel del mar hasta los 4200 m en ambas vertientes de los Andes	
Usos		



Foto N° 06

Especie	<i>Synallaxis gujanensis</i>	
Descripción	Se alimenta en el sotobosque de bosques secundarios relativamente jóvenes y en los bordes de los bosques.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es común y está muy extendido en la Amazonía, alcanzando elevaciones de hasta 1300 m a lo largo de la vertiente este de los Andes	
Usos		



Foto N° 07

Especie	<i>Ortalis guttata</i>	
Descripción	La Chachalaca moteada, crácido	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Distribuida en la Amazonía y el piedemonte de los Andes, donde se ha registrado en elevaciones de hasta 1700 m.	
Usos		



Foto N° 08

Especie	<i>Stilpnia cyanicollis</i>	
Descripción	Se alimenta en el dosel del bosque montano húmedo y en los bordes del bosque, a menudo en compañía de bandadas de especies mixtas.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es común en los bosques montanos de la vertiente este de los Andes en elevaciones que oscilan entre los 800 y los 2200 m.	
Usos		



Foto N° 09

Especie	<i>Ramphocelus carbo</i>	
Descripción	Se alimenta en hábitats semiabiertos, bordes de bosques, matorrales y vegetación secundaria.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es común y está muy extendida en la Amazonía, donde se sabe que se extiende hasta 1700 m a lo largo de las estribaciones de los Andes.	
Usos		



Foto N° 10

Especie	<i>Aulacorhynchus albivitta</i>	
Descripción	El tucancito esmeralda es todo verde con las coberteras inferiores de la cola de color castaño y la punta de la cola de color castaño.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Generalmente raro o poco común en los bosques montanos de la vertiente este de los Andes, donde se encuentra en elevaciones entre 1200 y 2500 m.	
Usos		



Foto N° 11

Especie	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	
Descripción	Parece preferir los ríos, pero también busca alimento en una variedad de otros hábitats.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Se extiende en la Amazonía donde se sabe que se llega hasta 1.200 m a lo largo de las estribaciones de los Andes.	
Usos		



Foto N° 12

Especie	<i>Pionus menstruus</i>	
Descripción	El loro cabeciazul tiene la cabeza y la parte superior del pecho de color azul brillante.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	El Loro de cabeza azul es común en Amazonia. También se distribuye en elevaciones de hasta 1500 m a lo largo de las estribaciones de los Andes.	
Usos		



Foto N° 13

Especie	<i>Sporophila nigricollis</i>	
Descripción	Se alimenta en los arbustos de los bordes de los bosques, campos agrícolas en barbecho y setos.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución		
Usos	Común en la vertiente este de los Andes, la cuenca del Marañón y el extremo noroeste de Perú en Tumbes, en elevaciones que oscilan entre los 600 y los 2600 m.	



Foto N° 14

Especie	<i>Galbula cyanescens</i>	
Descripción	Se posan en ramas horizontales en hábitats de borde de bosque donde esperan a que pasen insectos que atrapan al volar.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es bastante común en la Amazonía, pero se sabe que se extiende hasta 1200 m a lo largo de las estribaciones de los Andes.	
Usos		



Foto N° 15

Especie	<i>Phaethornis guy</i>	
Descripción	Es el único ermitaño con partes superiores de color verde iridiscente y partes inferiores de color gris azulado.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es poco común en la ladera este de los Andes en elevaciones que oscilan entre 500-1800 m.	
Usos		



Foto N° 16

Especie	<i>Myiothlypis fulvicauda</i>	
Descripción	Chipe pequeño del suelo que se encuentra frecuentemente cerca del agua, especialmente de arroyos en el bosque.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución		
Usos		



Foto N° 17

Especie	<i>Buteo albigula</i>	
Descripción	El gavilán de garganta blanca tiene la corona oscura y el cuello y el resto de las partes superiores de color rojizo a marrón oscuro.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es raro o poco común en la ladera este de los Andes, donde generalmente oscila entre 1500 y 3700 m. También es raro en el bosque húmedo montano del noroeste de Perú.	
Usos		



Foto N° 18

Especie	<i>Colibri coruscans</i>	
Descripción	El Sparkling Violetear es de color verde "chispeante" con lados violetas llamativos en las mejillas y los mechones de las orejas. Tiene una mancha azul en el vientre.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	es el más común y extendido de todos los violetas. Ocurre en la vertiente oeste y este de los Andes dentro de un amplio rango de elevación que incluye 400 - 4500 m.	
Usos		



Foto N° 19

Especie	<i>Catamenia inornata</i>	
Descripción	El semillero de color liso se alimenta en matorrales montanos secos y semihúmedos y otros hábitats semiabiertos.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es bastante común en las laderas oeste y este de los Andes en elevaciones que oscilan entre 2600 y 4400 m. También se distribuye en los valles interandinos.	
Usos		



Foto N° 20

Especie	<i>Systellura longirostris</i>	
Descripción		
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Es poco común en el oeste, los valles interandinos y las laderas este de los Andes en elevaciones que oscilan entre 1950-4400 m.	
Usos		

AVIFAUNA TEMPORADA SECA




Foto N° 01

Especie	<i>Colonia colonus</i>	
Descripción	De color negro, con corona y rabadilla blancas. Tiene dos plumas alargadas en la cola que pueden alcanzar la misma longitud del cuerpo (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Se distribuye en los bordes de bosque y en claros del pie de los Andes hasta los 2300 m. Es una especie local en la Amazonía, especialmente en el sur en áreas con topografía accidentada (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 02

Especie	<i>Ramphocelus carbo</i>	
Descripción	Macho de color casi rojo negro con la base del pico blanco brillante (foto). Juveniles y hembras de color marrón rojizo (Aronson, 2022)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Especie común y ampliamente distribuido en el bosque secundario y bordes de bosque en toda la Amazonía entre los 500 – 1800 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 03

Especie	<i>Todirostrum cinereum</i>	
Descripción	Espalda verde, alas negras con franjas amarillas y partes inferiores amarillas. Frente, corona y antifaz negro, garganta y cejas amarillas, y el pico plano y ancho (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Bastante común en el bosque seco y bosque secundario del noroeste hasta los 1200 m. Es bastante común en el lado oriental de la cordillera entre los 600 y 2000 m en el borde del bosque húmedo y en el bosque secundario y también en el en el bosque seco del valle del Marañón y el Huallaga (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 04

Especie	<i>Psarocolius angustifrons</i>	
Descripción	De color marrón, con tonos cálidos en rabadilla y subcaudales. Pico de color crema y cola amarilla (Aronson, 2022). Machos de mayor tamaño que las hembras.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Una de las oropéndolas más comunes y de amplia distribución en la Amazonía y en el lado oriental de los Andes hasta los 2000 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 05

Especie	<i>Tyrannus melancholicus</i>	
Descripción	De tamaño grande. Cabeza de color gris con antifaz negro poco marcado. Cola larga de forma ahorquillada (Aronson, 2022)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Una de las especies más extendidas, comunes y conspicuas de Perú, excepto en las regiones altoandinas y el suroeste (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 06

Especie	<i>Cissopis leverianus</i>	
Descripción	De cola larga y ojos amarillos, cuerpo de color blanco y negro con iridiscencia azul en la cabeza, pecho y espalda (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Bastante común en la parte media y lo alto del borde de bosque en el borde secundario y en los bordes del monte ribereño hasta los 1600 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 07

Especie	<i>Dryobates dignus</i>	
Descripción	De espalda y alas de color verde amarillento. Tiene antifaz negro, con una fuerte línea blanca encima y otra abajo, y barras negras en su pecho amarillo. Macho con corona y nuca rojas (foto) en hembras es de color negro (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Poco común. Habita en el estrato medio y alto a lo largo del bosque montano en el lado oriental de los Andes entre los 1500 y 2100 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 08

Especie	<i>Galbula cyanescens</i>	
Descripción	De color verde esmeralda brillante, vientre y parte inferior de la cola de color canela. Pico largo y erguido (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Común y ampliamente distribuido en el sur del Marañón y el Amazonas (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 09

Especie	<i>Chionomesa lactea</i>	
Descripción	De espalda y cabeza verde, garganta de color morado o azul y una línea vertical blanca en el vientre (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución	Bastante común y las tierras bajas y pie de monte en el centro y sur hasta al menos los 1400 m. Se le observa en bordes de bosque, monte ribereño y bosque secundario (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 10

Especie	<i>Phylloscartes parkeri</i>	
Descripción	Verde en dorso y amarillo en partes inferiores. Cejas anaranjadas y corona gris, con una línea negra detrás del ojo y otra en la mejilla (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Bastante común a lo largo del lado oriental de los Andes, y sus bordes, entre los 650 y 1550 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 11

Especie	<i>Coereba flaveola</i>	
Descripción	Amarillo por debajo y marrón grisáceo por encima, con grandes cejas blancas que contrastan con su cabeza negra. Pico curvo (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Común en el noroeste y en el valle del Marañón hasta los 1600 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 12

Especie	<i>Sayornis nigricans</i>	
Descripción	De color mayormente negro, silueta redondeada con cola larga. Vientre blanco y franjas blancas en las plumas de las alas (Aronson, 2022)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Especie común a lo largo de cuerpos de agua y ríos rápidos y con orillas rocosas en los Andes y pie de montaña (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 13

Especie	<i>Ortalis guttata</i>	
Descripción	Pava de tamaño mediano. De vocalización ruidosa (Aronson, 2007)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Bastante común y ampliamente distribuida en el este hasta los 1700 m. Habita los bordes del monte ribereño y ha colonizado el bosque secundario y el borde de bosque (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 14

Especie	<i>Psarocolius angustifrons</i>	
Descripción	De color marrón, con tonos cálidos en rabadilla y subcaudales. Pico de color crema y cola amarilla (Aronson, 2022). Machos de mayor tamaño que las hembras.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	
	Cites	
Endemismo y distribución	Una de las oropéndolas más comunes y de amplia distribución en la Amazonía y en el lado oriental de los Andes hasta los 2000 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 15

Especie	<i>Ortalis guttata</i>	
Descripción	Pava de tamaño mediano. De vocalización ruidosa (Aronson, 2022)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	IUCN
	Cites	Cites
Endemismo y distribución	Bastante común y ampliamente distribuida en el este hasta los 1700 m. Habita los bordes del monte ribereño y ha colonizado el bosque secundario y el borde de bosque (Schulenberg et al., 2007)	
Usos		



Foto N° 16

Especie	<i>Nonnula ruficapilla</i>	
Descripción	Marrón en el dorso, corona castaña, nuca, cara y flancos grises, con la garganta y el pecho anaranjados (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Raro a poco común, pero de distribución amplia hasta los 1250. A menudo se le encuentra en varzea y monte ribereño; también en bosque secundario, áreas de montaña e incluso bosques semiáridos (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 17

Especie	<i>Basileuterus chrysogaster</i>	
Descripción	Plumaje verdoso en el dorso y amarillo en pecho y vientre. Corona negra dividida por una raya anaranjada en el centro (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Poco común en el sotobosque del bosque montano húmedo a lo largo del lado oriental de los Andes entre los 300 y 2000 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 18

Especie	<i>Elanoides furficatus</i>	
Descripción	Inconfundible por su larga ahorquillada y coloración inferior blanca y negra (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución		
Usos	-	



Foto N° 19

Especie	<i>Piaya cayana</i>	
Descripción	De tamaño grande, color canela, con el vientre gris y el pico amarillo. Cola negra, larga, con puntos blancos (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	La <i>Piaya</i> más común y ampliamente distribuida. Se le encuentra en bosque húmedo y semihúmedo en todo el este de Perú hasta los 2800 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 20

Especie	<i>Sayornis nigricans</i>	
Descripción	De color mayormente negro, silueta redondeada con cola larga. Vientre blanco y franjas blancas en las plumas de las alas (Aronson, 2022)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Especie común a lo largo de cuerpos de agua y ríos rápidos y con orillas rocosas en los Andes y pie de montaña (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 21

Especie	<i>Ictinia plumbea</i>	
Descripción	De color plumizo, un poco más oscuro en las alas, con rayas blancas en la cola (la cual es de forma triangular) y color rojizo en la punta de las alas (Aronson, 2022)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución	Bastante común y de amplia distribución en la Amazonía hasta los 1500 m. Se le encuentra en el bosque húmedo y los bordes de bosque (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 22

Especie	<i>Cinclus leucocephalus</i>	
Descripción	Especie de hábitos acuáticos. Cuerpo de color marrón con corona y garganta blancas y antifaz oscuro (Aronson, 2022)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Se le encuentra a lo largo de ríos y corrientes de agua que se mueven con rapidez en bosques y áreas abiertas entre los 1500 a 3100 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 23

Especie	<i>Cyanocorax yncas</i>	
Descripción	Dorso verde, nuca de color blanca, amarillo en pecho y vientre. Cabeza y cuello negros, color azul en las mejillas y pequeño penacho azul en la base del pico (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Bastante común y ampliamente distribuida a lo largo del bosque montano en el lado oriental de los Andes y en los bordes de bosque entre los 1100 y 2400 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 24

Especie	<i>Turdus chiguanco</i>	
Descripción	De color marrón grisáceo con patas y pico anaranjados (Aronson, 2002). Foto Ricardo Carrillo	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Una especie común en los Andes. Se le encuentra en el lado occidental hasta los 1600 m y en el lado oriental entre los 2400 y 4300 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 25

Especie	<i>Geranoaetus polyosoma</i>	
Descripción	Cola blanca con banda terminal negra. Adultos poseen plumajes muy variables (Aronson, 2022). Foto Ricardo Carrillo.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución	Aguilucho muy común y ampliamente distribuido desde la costa hasta los Andes desde el nivel del mar hasta los 4600 m. Raro en el lado oriental donde se le encuentra por debajo de los 2000 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 25

Especie	<i>Geranoaetus polyosoma</i>	
Descripción	Cola blanca con banda terminal negra. Adultos poseen plumajes muy variables (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución	Aguilucho muy común y ampliamente distribuido desde la costa hasta los Andes desde el nivel del mar hasta los 4600 m. Raro en el lado oriental donde se le encuentra por debajo de los 2000 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 26

Especie	<i>Falco sparverius</i>	
Descripción	Cola de color canela y patrón facial con líneas negras en la cara. De color gris azulado en las alas en machos, hembras de color canela oscuro (Schulenberg et al., 2007).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución	El halcón más pequeño y más visto en Perú. Común desde la costa a los andes hasta los 4700 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 7

Especie	<i>Diglossa brunneiventris</i>	
Descripción	Cola blanca con banda terminal negra. Adultos poseen plumajes muy variables (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	II
Endemismo y distribución	Aguilucho muy común y ampliamente distribuido desde la costa hasta los Andes desde el nivel del mar hasta los 4600 m. Raro en el lado oriental donde se le encuentra por debajo de los 2000 m (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 28

Especie	<i>Phrygilus punensis</i>	
Descripción	Capucha y alas de color gris azulado, dorso y vientre amarillo oscuro.	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Común y de amplia distribución en los Andes entre los 2800 y 4700 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 29

Especie	<i>Muscisaxicola rufivertex</i>	
Descripción	De color gris pálido, fácil de reconocer por parche de color canela oscuro (Schulenberg et al., 2007)	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Residente en los Andes entre los 2700 y 4200 m. Se encuentra en sitios con pastos cortos y rocosos, a menudo en áreas secas (Schulenberg et al., 2007)	
Usos	-	



Foto N° 30

Especie	<i>Troglodytes aedon</i>	
Descripción	De color marrón con partes inferiores de color crema. Cola larga y delgadas líneas negras en las alas (Aronson, 2022).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Muy común y ampliamente distribuido a lo largo de todo el Perú hasta los 4600 m (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	



Foto N° 31

Especie	<i>Muscisaxicola rufivertex</i>	
Descripción	De color gris pálido, fácil de reconocer por parche de color canela oscuro (Schulenberg et al., 2007).	
Categorías de Conservación Nacional (D.S. 043-2006-AG)	-	
Categorías de amenaza internacional	IUCN	LC
	Cites	-
Endemismo y distribución	Residente en los Andes entre los 2700 y 4200 m. Se encuentra en sitios con pastos cortos y rocosos, a menudo en áreas secas (Schulenberg et al., 2007).	
Usos	-	