

POBLACIÓN	INDICACIONES	F.F.	COMPARADOR	INDICACIÓN INFORME ETS	DIGEMID L.C.	FECHA DIGEMID	PDF	IETSI	FECHA IETSI	PDF	RENETSA	FECHA RENETSA	PDF
Pacientes adultos con infección urinaria complicada causada por enterobacterias gram-negativas productoras de carbapenemasas	Ceftazidima-avibactam	Amp	Colistina	Pacientes adultos con infección urinaria complicada causada por enterobacterias gram-negativas productoras de carbapenemasas	NO EVALUADO			APROBADO	01-Nov-22		NO EVALUADO		
Pacientes adultos con bacteriemia debido a infección de herida operatoria por enterobacterias productoras de carbapenemasas	Ceftazidima-avibactam	Amp	Mejor antibiotico disponible	Pacientes adultos con bacteriemia debido a infección de herida operatoria por enterobacterias productoras de carbapenemasas	NO EVALUADO			APROBADO	10-Jul-23		NO EVALUADO		
Pacientes adultos con mucormicosis e intolerancia o contraindicación a amfotericina B deoxicolato	Amfotericina B liposomal	Amp	Mejor terapia de soporte	Pacientes adultos con mucormicosis e intolerancia o contraindicación a amfotericina B deoxicolato	NO EVALUADO			APROBADO	14-Oct-22		NO EVALUADO		
Pacientes adultos con aspergilosis invasiva y con falla o intolerancia a voriconazol oral y posaconazol oral	Isavuconazol	Amp	Itraconazol oral	Pacientes adultos con aspergilosis invasiva y con falla o intolerancia a voriconazol oral y posaconazol oral	NO EVALUADO			NO APROBADO	13-Oct-20		NO EVALUADO		
Pacientes con dolor neuropático crónico severo, refractario o intolerante a tratamiento convencional físico y farmacológico	Tapentadol liberación prolongada	Comprimidos	Terapia de soporte (bloqueo neurológico)	Pacientes con dolor neuropático crónico severo, refractario o intolerante a tratamiento convencional físico y farmacológico	NO EVALUADO			APROBADO	06-Jun-18		NO EVALUADO		
Paciente pediátricos con prurito severo secundario a colestasis crónica P refractarios a antihistamínicos, estimulantes de enzimas hepáticas y tratamiento tópico	Colestiramina	Concentrado para solución para perfusión	Placebo	Paciente pediátricos con prurito severo secundario a colestasis crónica P refractarios a antihistamínicos, estimulantes de enzimas hepáticas y tratamiento tópico	NO EVALUADO			APROBADO	14-Feb-18		NO EVALUADO		
Pacientes de 0-18 años con resección ileal por cualquier causa.	Colestiramina	Concentrado para solución para perfusión	Placebo, colestipol, colesevelam	Pacientes de 0-18 años con resección ileal por cualquier causa.	NO APROBADO	14/01/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Dolor crónico oncológico moderado a severo que no toleran otro tratamiento analgésico por vía oral, vía endovenosa o vía subcutánea	Buprenorfina parche transdérmico	Parche	Placebo Oxicodona Morfina Tramadol Petidina	Dolor crónico oncológico moderado a severo que no toleran otro tratamiento analgésico por vía oral, vía endovenosa o vía subcutánea	NO EVALUADO			APROBADO	31-Dec-16		NO EVALUADO		
Adultos con candidemia o candidiasis invasiva no neutropénicos con respuesta inadecuada o reacciona adversa a fluconazol.	Anidulafungina	Polvo liofilizado para solución inyectable	Caspofungina	Adultos con candidemia o candidiasis invasiva no neutropénicos con respuesta inadecuada o reacciona adversa a fluconazol.	NO EVALUADO			APROBADO	28-Oct-16		NO EVALUADO		
Pacientes pediátricos con mucormicosis y tratamiento previo con amfotericina B	Posaconazol	Amp	Amfotericina B	Pacientes pediátricos con mucormicosis y tratamiento previo con amfotericina B	NO EVALUADO			APROBADO	24-Oct-16		NO EVALUADO		
Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR)	Linezolid	Amp	Esquemas sin linezolid	Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR)	NO EVALUADO			APROBADO	03-Feb-16		NO EVALUADO		
Hepatitis crónica por virus hepatitis C que han recibido terapia dual con peginterferon alfa y ribavirina	Telaprevir	Tableta	Regimen sin Telaprevir	Hepatitis crónica por virus hepatitis C que han recibido terapia dual con peginterferon alfa y ribavirina	NO EVALUADO			APROBADO	19-Jan-16		NO EVALUADO		
Pacientes adultos con hipertensión pulmonar y falla aguda del ventrículo derecho en el período perioperatorio y posoperatorio de cirugía cardiovascular	Óxido nítrico	Comprimidos	Mejor terapia de soporte o Placebo	Pacientes adultos con hipertensión pulmonar y falla aguda del ventrículo derecho en el período perioperatorio y posoperatorio de cirugía cardiovascular	NO EVALUADO			APROBADO	26-Oct-22		NO EVALUADO		
Pacientes con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional II a III con fracaso al sildenafil en monoterapia y con contraindicación al uso del bosentán	Macitentan	Tableta	Sildenafil	Pacientes con hipertensión arterial pulmonar de clase funcional II a III con fracaso al sildenafil en monoterapia y con contraindicación al uso del bosentán	NO EVALUADO			APROBADO	30-Sep-22		NO EVALUADO		
Pacientes varones con insuficiencia cardiaca crónica con fracción de eyección reducida, clase funcional II-IV NYHA y recibiendo terapia médica óptima y que presentan ginecomastia con mastodinia debido al uso de espironolactona	Eplerenona	Tableta	Espironolactona	Pacientes varones con insuficiencia cardiaca crónica con fracción de eyección reducida, clase funcional II-IV NYHA y recibiendo terapia médica óptima y que presentan ginecomastia con mastodinia debido al uso de espironolactona	NO EVALUADO			APROBADO	05-Jan-22		NO EVALUADO		
Pacientes mayores de 18 años con fibrosis quística	Dornasa alfa, diaria	Amp	Solución salina hipertónica (SSH) o dornasa alfa en administración interdiaria	Pacientes mayores de 18 años con fibrosis quística	NO EVALUADO			NO EVALUADO			NO APROBADO	16/11/2022	

Personas con TB/VIH adultos (personas que reciben esquema para TB sensible) sin tratamiento antirretroviral previo	Dolutegravir 100 mg/día	Tableta	Dolutegravir 50 mg/día	Personas con TB/VIH adultos (personas que reciben esquema para TB sensible) sin tratamiento antirretroviral previo	NO APROBADO	31/12/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Pacientes con cáncer de mama con depresión moderada a severa	Desvenlafaxina+tamoxifeno	Comprimidos	Tamoxifeno y otro antidepresivo	Pacientes con cáncer de mama con depresión moderada a severa	APROBADA	07/02/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Síndrome de intestino corto dependientes de nutrición parenteral	teduglutida	Concentrado para solución para perfusión	Placebo, cuidado estandar	síndrome de intestino corto dependientes de nutrición parenteral	NO APROBADO	14/01/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Pacientes pediátricos (0-18 años) con diagnóstico de encefalitis autoinmune	Inmunoglobulina humana	frasco	Corticosteroides	Pacientes pediátricos (0-18 años) con diagnóstico de encefalitis autoinmune	NO APROBADO	14/08/2022		NO EVALUADO			NO EVALUADO		
Pacientes con diagnóstico de Hemofilia A	Emicizumab	vial	Complejo Protrombitico activado o Factor VII recombinante	Pacientes con diagnostico de Hemoflia A, con presencia de anticuerpos inhibidores del Factor VIII, que fracasaron o no eran candidatos a la terapia con inmunoterapia con Factor VIII	NO EVALUADO			APROBADO	04/07/2023		NO EVALUADO		
Pacientes adultos críticos sépticos sometidos a cirugías que requieran sustitución de pérdida de fluidos extracelulares	Solución isotónica balanceada	frasco	Solución salina L-HES	Pacientes adultos críticos sépticos sometidos a cirugías que requieran sustitución de pérdida de fluidos extracelulares	NO EVALUADO			NO APROBADO	04/07/2023		NO EVALUADO		
Pacientes hospitalizados con desnutrición leve o moderada	Suplemento nutricional oral hiperproteico e hipercalórico	frasco	Suplemento nutricional oral normoproteico y normocalorico	Pacientes hospitalizados con desnutrición leve o moderada	NO EVALUADO			NO APROBADO	27/09/2023		NO EVALUADO		
Pacientes pediátricos* con diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico ligado a X**, portador de deformidades óseas severas***, con el esqueleto en crecimiento	Burosumab	frasco	Mejor terapia de soporte	Pacientes pediátricos* con diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico ligado a X**, portador de deformidades óseas severas***, con el esqueleto en crecimiento y no respondedor al tratamiento con calcitriol y suplementos de fosfato	NO EVALUADO			NO APROBADO	22/09/2023		NO EVALUADO		
Anemia aplásica severa adquirida, sin donante HLA idéntico, candidato a terapia inmunosupresora (globulina antitimocítica y ciclosporina)	Eltrombopag	tableta	Terapia inmunosupresora en primera linea de tratamiento	Anemia aplásica severa adquirida, sin donante HLA idéntico, candidato a terapia inmunosupresora (globulina antitimocítica y ciclosporina)	NO EVALUADO			NO APROBADO	13/09/2023		NO EVALUADO		
pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes de corticoides	Fotoféresis extracorpórea con metoxaleno	vial	Micofenolato, rituximab	pacientes que recibieron trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas y desarrollan enfermedad de injerto contra huésped (EICH) crónica, refractarios o dependientes de corticoides	NO EVALUADO			NO EVALUADO			APROBADO	21/08/2023	