DIRIS LIMA NORTE

FICHA INFORMATIVA DE FARMACOVIGILANCIA

ISONIAZIDA



Base de datos regional de farmacovigilancia

Se revisó la base de datos del CRRFvyTv de DIRIS Lima Norte (Vigiflow) en 2024 se tienen 238 reportes de los cuales 23 SRAM fueron por ISONIAZIDA las cuales fueron leves a moderadas, ninguna fue grave.

COMO PACIENTE O USUARIO SE TE INVITA A NOTIFICAR LA SRAM ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

Medios disponibles para notificar el E Reporting
https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/ereporting/

INFORMACION RESUMIDA DE SEGURIDAD DE ISONIAZIDA

Indicaciones

Es un medicamento antituberculoso que ayuda a prevenir y tratar la TBC.

Contraindicaciones

- Insuficiencia hepática Grave.
- Neuropatía periférica severa.
- Embarazo (a menos que sea estrictamente necesario).

Advertencias y precauciones

*Riesgo: convulsiones en caso de sobredosis o con predisposición.

*Vigilar la función hepática y transaminasas, especialmente en concomitancia con rifampicina y pirazinamida.

*Neuropatía periférica: Exámenes neurológicos regulares.
*Insuficiencia renal: Ajustar la dosis si es necesario.

Reacciones adversas

Neuropatía Periférica

Hepatotoxicidad

Náuseas y vómitos

Dolor muscular y articular.

Fatiga y Debilidad.

Elevación Transaminasas.

Crisis convulsivas

Fuente:
https://www.digemid.minsa.gob.pe/Archivos/FichasTecnicas/EspecialidadesFarmaceuticas/2019/EE01013_FT_V01.pdf
https://www.digemid.minsa.gob.pe/Archivos/FichasTecnicas/EspecialidadesFarmaceuticas/2022/EN00051_FT_V01.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/008678s028lbl.pdf

DIRIS LIMA NORTE

FICHA INFORMATIVA DE FARMACOVIGILANCIA

INFORMACION RESUMIDA DE SEGURIDAD DE SULFATO FERROSO

Indicaciones

Es un suplemento de hierro que se usa para tratar y prevenir la anemia ferropénica.

Contraindicaciones

*Hipersensibilidad al sulfato ferroso.
*Anemia no ferropénica
*Hemocromatosis y hemosiderosis: Condiciones que ya presentan acumulación excesiva de hierro en el cuerpo.
*Sobrecarga de hierro: Situaciones donde hay un exceso de hierro en el cuerpo.
*Anemia aplásica, hemolítica y sideroblástica: Tipos de anemia que no son causados por deficiencia de hierro.
*Pancreatitis y cirrosis hepática: Condiciones que pueden empeorar con el uso de sulfato ferroso.

Advertencias y precauciones

*Niños: No administrar a niños menores de 28 kg.
*Ancianos: Mayor riesgo de lesiones esofágicas y bronquiales si no se administra adecuadamente.
*Pacientes con enfermedades crónicas: Pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes o hipertensión pueden tener un mayor riesgo de melanosis gastrointestinal.
*Interacciones:
Evitar tomarlo junto con antiácidos, tetraciclinas, fluoroquinolonas y otros medicamentos que pueden afectar su absorción.

Reacciones adversas

•**Gastrointestinales:** náusea, estreñimiento diarrea, dolor abdominal, heces oscuras y sabor metálico.

•**Dentales**: decoloración temporal de los dientes si se toma en forma líquida.

•**Alérgicas**: erupción cutánea, hinchazón de la cara, lengua, labios o garganta, y dificultad para respirar.

Base de datos regional de farmacovigilancia

Se revisó la base de datos del CRRFvyTv de DIRIS Lima Norte (Vigiflow) en 2024 se tienen 238 reportes de los cuales 10 SRAM fueron por SULFATO FERROSO las cuales fueron leves a moderadas, ninguna fue grave.

COMO PACIENTE O USUARIO SE TE INVITA A NOTIFICAR LA SRAM ESCANEANDO EL CÓDIGO QR

Medios disponibles para notificar el E Reporting
https://www.digemid.minsa.gob.pe/webDigemid/ereporting/

Fuente:
https://www.digemid.minsa.gob.pe/Archivos/FichasTecnicas/EspecialidadesFarmaceuticas/2019/EN00460_FT_V01.pdf
https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5670414-429-2024-minsa