



Perú:
**Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar 2024**
Nacional y Departamental

Dirección General

Gaspar Humberto Morán Flores

Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Peter José Abad Altamirano

Subjefe de Estadística

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Dirección y Supervisión

José Gabriel García Godos Jara

Director Nacional de Censos y Encuestas

Nancy Hidalgo Calle

Directora

Dirección Nacional de Censos y Encuestas

Jefe de Proyecto

Karen Romero Jares

Colaboración especial

Arturo Arias Chumpitaz

Balvina Merino Saldaña

Elvis Manayay Guillermo

Jhon de la Cerna Villavicencio

Renzo Bezada Davalos

Eduardo Romero Bolognesi

Procesamiento de datos

Carlos Pure Jurado

Concepción Borda Quispe

Diana Paico Diaz

Jeferson Fernandez Guillen

Jorge Santamaria Vidaurre

Manuel Cochachin Melgarejo

William Risco Guevara

Edición, análisis y/o revisión

Karen Romero Jares

Cecil Munguia Garcia

Bruno Galloso Aviles

Jeferson Fernandez Guillen

Jorge Santamaria Vidaurre

Juan Torres Pizarro

Juan de Dios Sandoval Rivera

Luz Piscocoya Jurupe

Manuel Cochachin Melgarejo

Rosa Chacate Gonzales

Rosa Huarcaya Ruiz

William Risco Guevara

Elaboración de Mapas temáticos

Lourdes Huertas Rosales

Diagramación

Gladys Alvarez Moreno

Guido Trujillo Valdiviezo

Diseño de Carátula:

Freddy Ccopa Paucar

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Av. General Garzón N° 658, Jesús María, Lima 11, Perú

Teléfonos: (01) 743-4949 Anexos: 9242 y 9588

Web: www.gob.pe/inei

Mayo 2025

Presentación

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES es una de las investigaciones estadísticas más importantes que ejecuta de manera continua el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Sus principales resultados se presentan en el Documento **“Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2024 - Nacional y Departamental”**, que se pone a disposición de autoridades del gobierno, entidades públicas, centros de investigación, universidades y público en general.

El presente informe fue elaborado con la información recopilada en el Cuestionario del Hogar y Cuestionario Individual de la ENDES, dicha encuesta se aplicó durante los meses de enero a diciembre del 2024. El número de viviendas seleccionada fue 36 760 de las cuales 35 601 fueron entrevistadas. En estas viviendas, se encontraron un total de 37 117 mujeres elegibles de 12 a 49 años de edad, de las cuales se obtuvo un total de 34 252 entrevistas completas. La muestra seleccionada representa la totalidad de la población del país. Es importante resaltar que el análisis del presente documento, está basado principalmente en la población de mujeres de 15 a 49 años de edad, no obstante, en algunos indicadores principales se ha incluido a las mujeres de 12 a 14 años de edad.

El presente documento contiene doce capítulos y tres apéndices. En cada capítulo se presentan gráficos de los indicadores principales con sus respectivos análisis descriptivos. Se trata así, de las características de las viviendas y de la población, el nivel de fecundidad, la situación de la salud reproductiva y preferencias de fecundidad, asimismo la atención durante el embarazo, parto y postparto. También, destacan aspectos relacionados con las inmunizaciones de niños, cuya metodología del cálculo- de los indicadores de vacunas- está actualizada según lo plasmado en el Esquema Nacional de Vacunación vigente (RM N°719-2018/MINSA, que aprueba la NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP). En el noveno capítulo, se analiza aspectos relacionados a la lactancia, nutrición de niñas, niños y nutrición de mujeres, en este capítulo se destacan aspectos relacionados con la anemia de niños y mujeres, cuya metodología del cálculo- de los indicadores de vacunas- está actualizada según lo plasmado en la Directriz de la OMS (2024), y adoptada en la Resolución Ministerial N° 251- 2024/MINSA con la NTS N° 213 /MINSA-DGIESP-2024 Norma Técnica de Salud: Prevención y Control de la Anemia por Deficiencia de Hierro en el Niño y la Niña, Adolescentes, Mujeres en Edad Fértil, Gestantes y Puérperas, así como el Desarrollo Infantil Temprano (DIT). Igualmente se analiza el conocimiento de las mujeres en edad fértil sobre el VIH/SIDA y de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). El penúltimo capítulo aborda los episodios de violencia familiar contra las mujeres, niñas y niños. El último capítulo muestra los indicadores contemplados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los Apéndices A, B, y C, se refieren respectivamente al diseño y cobertura de la muestra; errores de muestreo y calidad de la información.

Hacemos hincapié que la forma de cálculo de todos los indicadores presentados por la ENDES fue validada, en reuniones de trabajo, por el sector pertinente.

Al final del Informe, se incluye en forma magnética un Anexo Estadístico con todos los cuadros o tablas que siempre han conformado el cuerpo del Informe principal de la ENDES, que comprenden cruces por nivel de educación, quintil de riqueza, departamento, entre otros.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática ratifica su especial agradecimiento a los hogares peruanos, por brindar la información y su importante colaboración durante el desarrollo de la entrevista. Asimismo, a las instituciones involucradas, especialmente al Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) y a la Policía Nacional del Perú (PNP), por su apoyo para la ejecución de la investigación. Al trabajo desplegado por las entrevistadoras, supervisoras y personal de la encuesta, que, sin duda, ha sido fundamental en la obtención de datos de calidad.

Lima, Mayo 2025

Gaspar Humberto Morán Flores

Jefe

Instituto Nacional de Estadística e Informática

Contenido

	Pág.
PRESENTACIÓN	3 ..
LISTA DE GRÁFICOS	11
LISTA DE MAPAS	21
PRINCIPALES INDICADORES	25
RESUMEN EJECUTIVO	35
 CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y LA POBLACIÓN	 57
1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS Y LOS HOGARES	59
Servicios básicos en las viviendas	59
Servicios de electricidad	59
Fuente de agua para beber	60
Servicio sanitario	61
Material del piso	63
Hacinamiento	64
Disponibilidad de bienes de consumo duradero	65
Bienes de consumo duradero	65
1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN.....	66
Población por ámbito de residencia	66
Composición de población total por sexo, edad	67
Orfandad en menores de 15 años de edad según edad y región natural	67
Condición de residencia familiar de menores de 15 años de edad	68
Nivel de educación	69
Mediana de los años de estudio	69
Asistencia escolar por edad	70
 CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES	 73
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	75
Distribución por grupos de edad.....	75
Indicadores de etnicidad	76
2.2 NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS ENTREVISTADAS	76
Mediana de años de estudio	77

2.3	RAZÓN PRINCIPAL PARA NO CONTINUAR ESTUDIANDO – MUJERES DE 24 AÑOS DE EDAD O MENOS	77
	Razones para dejar de estudiar según área de residencia	77
2.4	ACCESO A LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE LAS MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD.....	81
2.5	CARACTERÍSTICAS LABORALES DE LAS ENTREVISTADAS	82
	Empleo y tipo de ocupación de las mujeres entrevistadas.....	82
	Etnicidad.....	83
	Grupo de ocupaciones por área de residencia.....	84
	Tipo de empleador y formas de remuneración	85
2.6	COBERTURA DE SEGUROS DE SALUD	86
	Cobertura de seguros de salud según ámbito de residencia.....	86

CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD

3.1	NIVELES, TENDENCIAS Y DIFERENCIALES DE LA FECUNDIDAD.....	93
	Evolución de fecundidad	94
	Niveles de fecundidad.....	94
	Etnicidad	96
	Tasas específicas de fecundidad.....	99
3.2	INTERVALOS ENTRE NACIMIENTOS	99
	Etnicidad	100
3.3	EDAD DE LA MADRE AL NACIMIENTO DEL PRIMER HIJO	101
	Edad al primer nacimiento.....	101
	Etnicidad	101
3.4	FECUNDIDAD DE ADOLESCENTES	102
	Embarazo y maternidad de adolescentes de 15 a 19 años de edad.....	102
	Embarazo y maternidad de adolescentes de 12 a 17 años de edad.....	103

CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....

4.1	PREVALENCIA DEL USO DE MÉTODOS	107
	Uso actual de métodos anticonceptivos modernos y/o Tradicionales	107
	Métodos modernos específicos.....	110
	Uso de Métodos tradicionales específicos	110
	Uso actual de métodos anticonceptivos definitivos y/o temporales	115
4.2	MUJERES USUARIAS DE ESTERILIZACIÓN.....	116
4.3	FUENTE DE SUMINISTRO	117
4.4	DISCONTINUACIÓN DEL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	118
	Tasas de discontinuación del uso de anticonceptivos durante el primer año.....	118
	Diálogo de planificación familiar entre parejas	119

CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD

5.1	ESTADO CONYUGAL ACTUAL.....	123
	Estado conyugal actual de las mujeres de 15 a 49 años de edad, según característica seleccionada.....	123

	Etnicidad	125
	Lengua materna	125
5.2	EDAD A LA PRIMERA UNIÓN CONYUGAL	126
	Edad mediana a la primera unión, según ámbito geográfico	126
	Etnicidad	129
5.3	EDAD A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL	130
	Edad mediana a la primera relación sexual en mujeres de 25 a 49 años de edad	130
	Etnicidad	133
	Uso del condón en mujeres de 12 a 24 años de edad en su primera relación sexual	133
	Primera relación sexual en mujeres de 12 a 24 años de edad según edad de la persona con quien tuvo su primera relación sexual	134
5.4	INFERTILIDAD POSTPARTO	134
	Amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad postparto	135

CAPÍTULO 6: PREFERENCIAS DE LA FECUNDIDAD 137

6.1	EL DESEO DE TENER MÁS HIJOS	139
	Preferencia de fecundidad, según área de residencia	140
	Deseo de tener más hijos, según área de residencia	140
	Etnicidad	141
6.2	LA NECESIDAD INSATISFECHA Y LA DEMANDA DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	142
	La necesidad insatisfecha de planificación familiar	142
	Necesidad insatisfecha para limitar	142
	Necesidad insatisfecha para espaciar	142
	La demanda total de planificación familiar	142
	Necesidad insatisfecha y demanda total de planificación familiar	143
	Etnicidad	145
6.3	PLANIFICACIÓN DE LA FECUNDIDAD	146
	Planificación de la fecundidad, según orden de nacimiento	146
6.4	TASA DE FECUNDIDAD DESEADA Y OBSERVADA	147

CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA 153

7.1	ATENCIÓN PRENATAL	155
	Número de atenciones prenatales	158
	Meses de embarazo a la primera atención prenatal	159
	Actividades de la atención prenatal	160
	Vacunación antitetánica durante la gestación	160
7.2	ATENCIÓN DEL PARTO	164
	Persona que participó en el parto	164
7.3	PARTO INSTITUCIONAL	167
7.4	NACIMIENTO POR CESÁREA	168
7.5	CUIDADO POSTNATAL DE LAS MADRES	173
	Momento del primer control postnatal	173
	Persona que realizó la atención postnatal	177

Momento del control postnatal para el nacimiento más reciente de los cinco años precedentes a la encuesta, que no ocurrió en un establecimiento de salud.....	177
Persona que realizó el primer control postnatal para el nacimiento más reciente que no ocurrió en un establecimiento de salud	178
Barreras en el acceso a servicios de salud	179

CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL 181

8.1 PESO AL NACER.....	183
8.2 VACUNACIÓN DE NIÑOS	187
Vacunación en niños menores de 12 meses de edad.....	187
Vacunación en niños menores de 24 meses de edad	188
Vacunas básicas completas para menores de 36 meses	195
8.3 INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA).....	196
Búsqueda de tratamiento.....	198
8.4 ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA).....	199
Administración de líquidos y sólidos durante la diarrea	200
Conocimiento sobre Sales de Rehidratación Oral (SRO).....	205
Eliminación de las deposiciones de los niños.....	205

CAPÍTULO 9: LACTANCIA, NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT) DE NIÑOS Y NUTRICIÓN DE MUJERES 207

9.1 INICIACIÓN DE LA LACTANCIA Y ALIMENTACIÓN SUPLEMENTARIA.....	209
9.2 LACTANCIA MATERNA EN NIÑOS MENORES DE SEIS MESES DE EDAD	211
Lactancia de los niños menores de seis meses de edad.....	211
9.3 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	212
Alimentos ricos en vitamina “A” y hierro.....	215
9.4 INGESTA DE MICRONUTRIENTES.....	215
Niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro	215
Etnicidad y consumo de hierro en los últimos 7 días	216
9.5 ANEMIA EN NIÑOS Y MUJERES.....	219
Métodos	220
ANEMIA SEGÚN RM 363-2022-MINSA.....	220
Anemia en niños de 6 a 59 meses de edad.....	220
Anemia en niños de 6 a 35 meses de edad.....	221
Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad	222
Etnicidad y anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad.....	228
ANEMIA SEGÚN NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024/ RM 251-2024-MINSA.....	231
Anemia en niños de 6 a 59 meses de edad.....	231
Anemia en niños de 6 a 35 meses de edad.....	232
Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad	237
9.6 NUTRICIÓN DE NIÑOS.....	238
Uso del patrón de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud.....	241

Desnutrición crónica	241
Desnutrición crónica en niños menores de cinco años de edad	241
9.7 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN NIÑOS	245
9.8 NUTRICION DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL	248
Estatura de las mujeres en edad fértil	249
Estatura promedio de las mujeres en edad fértil	249
Peso y masa corporal de las mujeres	250
Estado nutricional de las mujeres en edad fértil según índice de masa corporal (IMC)	250

CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DE VIH E ITS251

10.1 CONOCIMIENTO DE VIH/SIDA Y FORMAS DE EVITAR	253
Etnicidad	257
10.2 CONOCIMIENTO DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL VIH	257
Etnicidad	258
10.3 CONOCIMIENTO DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS).....	259
Conocimiento de las ITS	259
Etnicidad	263
10.4 USO DEL CONDÓN EN LA ÚLTIMA RELACIÓN	263
Uso de condón según tipo de compañero.....	263

CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS265

11.1 VIOLENCIA FAMILIAR Y FORMAS.....	267
Violencia ejercida alguna vez	267
Etnicidad y violencia Psicológica y/o verbal	271
Violencia física y/o sexual ejercida contra la mujer en los últimos 12 meses	272
Resultados de la violencia física	277
Violencia física ejercida por el esposo o compañero, bajo los efectos de licor/drogas o ambas	277
11.2 SOLICITUD DE AYUDA Y DENUNCIA DEL MALTRATO	278
Búsqueda de ayuda en personas cercanas.....	278
Búsqueda de ayuda en alguna institución.....	281
Razones por las cuales no buscaron ayuda cuando fueron maltratadas Físicamente	281
11.3 VIOLENCIA EJERCIDA CONTRA NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD.....	282
Personas que corrigen en el hogar	283
Principales formas que utilizan el padre y la madre para corregir a sus hijos de 1 a 5 años de edad	283

CAPÍTULO 12: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE285

12.1 NUTRICIÓN DE NIÑOS.....	287
Desnutrición crónica	287
12.2 ATENCIÓN DEL PARTO	290
Mortalidad materna	290
Partos con asistencia de personal de salud calificado	290

12.3 PREVALENCIA DE USO ACTUAL DE ANTICONCEPTIVOS 294

 Uso actual de métodos anticonceptivos modernos 294

 Fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad..... 295

12.4 VIOLENCIA FÍSICA Y/O SEXUAL 296

 Mujeres que han sufrido violencia física y sexual..... 297

12.5 CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO 297

 Personas con trastornos por consumo de alcohol 298

 Personas que fuman diariamente cigarrillos 299

APÉNDICE A 301

APÉNDICE B 315

APÉNDICE C 359

ANEXO 369

LISTA DE CUADROS 369

Lista de Gráficos

Pág.

CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y LA POBLACIÓN57

Gráfico 1.1	Disponibilidad de luz eléctrica	60
Gráfico 1.2	Disponibilidad de luz eléctrica, según área de residencia	60
Gráfico 1.3	Fuente de agua para beber por red pública	61
Gráfico 1.4	Fuente de agua para beber por red pública 1/, según área de residencia	61
Gráfico 1.5	Viviendas con servicio sanitario 1/, conectado a red pública.....	62
Gráfico 1.6	Viviendas con servicio sanitario 1/, según área de residencia.....	62
Gráfico 1.7	Acceso a servicio sanitario de las viviendas, según área de residencia.....	63
Gráfico 1.8	Material predominante del piso de las viviendas.....	63
Gráfico 1.9	Material predominante del piso de las viviendas, según área de residencia	64
Gráfico 1.10	Hogares hacinados, según ámbito geográfico.....	64
Gráfico 1.11	Bienes de consumo duradero del hogar	65
Gráfico 1.12	Bienes de consumo duradero del hogar, según área de residencia	66
Gráfico 1.13	Distribución de la población, según ámbito geográfico	66
Gráfico 1.14	Composición de la población por sexo, según grupo de edad	67
Gráfico 1.15	Orfandad en menores de 15 años de edad, según edad	68
Gráfico 1.16	Orfandad en menores de 15 años de edad, según región natural.....	68
Gráfico 1.17	Mediana de años de educación de la población de 6 años y más, según sexo	69
Gráfico 1.18	Mediana de años de educación de la población de 6 años y más, por sexo, según área de residencia	70
Gráfico 1.19	Asistencia escolar de la población de 6 a 24 años de edad por sexo, según área de residencia.....	70

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES.....73

Gráfico 2.1	Distribución de las mujeres en edad fértil de 12 a 49 años de edad, según grupos de edad.....	75
Gráfico 2.2	Distribución de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según Autoidentificación étnica y lengua materna.....	76
Gráfico 2.3	Mediana de años de educación de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia	77
Gráfico 2.4	Razón principal de las mujeres de 12 a 24 años de edad para no continuar estudiando, según área de residencia.....	78
Gráfico 2.5	Razón principal de las mujeres de 15 a 24 años de edad para no continuar estudiando, según área de residencia.....	78

Gráfico 2.6	Acceso de las mujeres de 15 a 24 años de edad a los medios masivos de comunicación.....	81
Gráfico 2.7	Acceso de las mujeres de 15 a 24 años de edad a los medios masivos de comunicación, según área de residencia.....	82
Gráfico 2.8	Condición de trabajo en los últimos 12 meses de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad. Según área de residencia y región natural	83
Gráfico 2.9	Condición de trabajo en los últimos 12 meses de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, Según autoidentificación étnica y lengua materna	84
Gráfico 2.10	Grupo de ocupación de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad	84
Gráfico 2.11	Grupo de ocupación de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	85
Gráfico 2.12	Tipos de empleador y formas de remuneraciones de las mujeres de 15 a 49 años de edad que trabajan, según tipo de ocupación agrícola y no agrícola.....	86
Gráfico 2.13	Cobertura de seguros de salud de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	87

CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD.....91

Gráfico 3.1	Tasa global de fecundidad.....	95
Gráfico 3.2	Tasa global de fecundidad, según área de residencia	95
Gráfico 3.3	Tasa global de fecundidad, según región natural.....	96
Gráfico 3.4	Tasa global de fecundidad, según autoidentificación étnica y lengua materna.....	96
Gráfico 3.5	Tasas específicas de fecundidad, según área de residencia	99
Gráfico 3.6	Intervalo entre nacimientos de orden dos o más en los cinco años anteriores a la encuesta, según número de meses desde el nacimiento anterior	100
Gráfico 3.7	Mediana del Intervalo entre nacimientos de orden dos o más en los cinco años anteriores a la encuesta, según autoidentificación étnica y lengua materna	100
Gráfico 3.8	Mediana de edad al primer nacimiento entre mujeres de 25 - 49 años, según nivel de educación y región natural	101
Gráfico 3.9	Mediana de edad al primer nacimiento entre mujeres de 25 - 49 años, según autoidentificación étnica y lengua materna.....	102
Gráfico 3.10	Adolescentes de 15 a 19 años de edad que son madres o que están embarazadas por primera vez, según característica seleccionada.....	103
Gráfico 3.11	Adolescentes de 12 a 17 años de edad que son madres o que están embarazadas por primera vez	103

CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....105

Gráfico 4.1	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan algún método de planificación familiar.....	108
Gráfico 4.2	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan algún método de planificación familiar, según área de residencia	108

Gráfico 4.3	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan algún método moderno de planificación familiar, según área de residencia.....	109
Gráfico 4.4	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan algún método tradicional de planificación familiar, según área de residencia.....	109
Gráfico 4.5	Métodos modernos más usados por las mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas	110
Gráfico 4.6	Métodos tradicionales más usados por las mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas y conocimientos del periodo fértil	110
Gráfico 4.7	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan cualquier método de planificación familiar, según Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar – NTS N°124-2016-MINSA-V.01	115
Gráfico 4.8	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan cualquier método de planificación familiar, según área de residencia, según Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar - NTS N°124-2016-MINSA-V.01	116
Gráfico 4.9	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas que usan algún método temporal de planificación familiar, según área de residencia, según Norma Técnica de Salud de Planificación Familiar - NTS N°124-2016-MINSA-V.01	116
Gráfico 4.10	Mujeres de 15 a 49 años de edad esterilizadas, según grupos de edad al momento de la esterilización	117
Gráfico 4.11	Fuente de suministro de métodos modernos de las usuarias actuales (mujeres de 15 a 49 años de edad.....)	117
Gráfico 4.12	Tasa de discontinuación de métodos anticonceptivos dentro de los 12 meses después de comenzar a usarlo, según motivo de discontinuación	118
Gráfico 4.13	Mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas, por frecuencia de diálogo sobre planificación familiar (PF) con el esposo o compañero durante el último año	119

CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD.....121

Gráfico 5.1	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad.....	123
Gráfico 5.2	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia	124
Gráfico 5.3	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según región natural.....	124
Gráfico 5.4	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según autoidentificación étnica	125
Gráfico 5.5	Estado conyugal de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad según lengua materna.....	125
Gráfico 5.6	Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 25 – 49 años de edad	126
Gráfico 5.7	Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 25 – 49 años de edad, según ámbito geográfico.....	129
Gráfico 5.8	Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 25 – 49 años de edad, según autoidentificación étnica y lengua materna.....	129

Gráfico 5.9	Edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25-49 años de edad.....	130
Gráfico 5.10	Edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25-49 años de edad, según ámbito geográfico	130
Gráfico 5.11	Edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25-49 años de edad, según autoidentificación étnica y lengua materna	133
Gráfico 5.12	Mujeres de 12 a 24 años de edad que usaron condón en su primera relación sexual, según ámbito geográfico	133
Gráfico 5.13	Mujeres de 12 a 24 años de edad por edad de la persona con quien tuvo su primera relación sexual, según característica seleccionada	134
Gráfico 5.14	Amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad post parto	135
Gráfico 5.15	Mediana y promedio en meses de la amenorrea, abstinencia e insusceptibilidad postparto.....	135

CAPÍTULO 6: PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD137

Gráfico 6.1	Preferencias de fecundidad en mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas.....	139
Gráfico 6.2	Preferencia de fecundidad de mujeres en 15 a 49 años de edad actualmente unidas, según área de residencia.....	140
Gráfico 6.3	Deseo de tener más hijos en mujeres de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	140
Gráfico 6.4	Preferencia de fecundidad en mujeres de 15 a 49 años de edad actualmente unidas, según autoidentificación étnica y lengua materna	141
Gráfico 6.5	Componentes de la necesidad insatisfecha de planificación familiar.....	143
Gráfico 6.6	Mujeres de 15 a 49 años de edad con necesidad insatisfecha de planificación familiar.....	143
Gráfico 6.7	Mujeres de 15 a 49 años de edad con necesidad insatisfecha de planificación familiar, según área de residencia.....	144
Gráfico 6.8	Necesidad insatisfecha de planificación familiar, según región natural	144
Gráfico 6.9	Necesidad insatisfecha de planificación familiar, según área de residencia.....	144
Gráfico 6.10	Necesidad insatisfecha de planificación familiar, según autoidentificación étnica y lengua materna	145
Gráfico 6.11	Planificación de la fecundidad, según orden de nacimiento	146
Gráfico 6.12	Fecundidad observada y deseada, según ámbito geográfico.....	147

CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA.....153

Gráfico 7.1	Atención prenatal por un profesional de salud calificado (Medico, Obstetra y enfermera).....	156
Gráfico 7.2	Atención prenatal por un profesional de salud calificado (Medico, Obstetra y enfermera), según área de residencia.....	156
Gráfico 7.3	Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron nacimientos en los cinco años anteriores a la encuesta por atención prenatal de profesional de salud calificado.....	157
Gráfico 7.4	Mujeres de 15 a 49 años de edad por atención prenatal de profesional de salud calificado, según área de residencia.....	157
Gráfico 7.5	Mujeres de 15 a 49 años de edad por atención prenatal de profesional de salud calificado, según región natural	158

Gráfico 7.6	Número de atenciones prenatales para el último nacimiento de los últimos cinco años que precedieron a la encuesta	158
Gráfico 7.7	Número de atenciones prenatales para el último nacimiento de los últimos cinco años que precedieron a la encuesta, según área de residencia.....	159
Gráfico 7.8	Meses de embarazo a la primera atención para el último nacimiento de los últimos cinco años anteriores a la encuesta, según área de residencia.....	159
Gráfico 7.9	Actividades de la atención prenatal de las madres para el último nacido vivo, en los últimos cinco años	160
Gráfico 7.10	Mujeres de 15 a 49 años de edad que recibieron vacunas contra el tétano neonatal en los últimos cinco años que precedieron a la encuesta.....	163
Gráfico 7.11	Mujeres de 15 a 49 años de edad que recibieron vacunas contra el tétano neonatal en los últimos cinco años que precedieron a la encuesta, según ámbito geográfico.....	163
Gráfico 7.12	Parto de menores de cinco años de edad por persona que participó en la atención.....	164
Gráfico 7.13	Parto institucional.....	167
Gráfico 7.14	Parto institucional, según área de residencia.....	167
Gráfico 7.15	Nacimientos por cesárea 1/.....	168
Gráfico 7.16	Nacimientos por cesárea 1/, según área de residencia.....	168
Gráfico 7.17	Mujeres de 15 a 49 años de edad por momento del primer control postnatal para el nacimiento más reciente de los cinco años que precedieron a la encuesta.....	173
Gráfico 7.18	Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron su primer control postnatal antes de las cuatro horas, según ámbito geográfico	174
Gráfico 7.19	Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron su primer control postnatal antes de las cuatro horas, según orden de nacimiento y quintil de riqueza.....	174
Gráfico 7.20	Persona que realizó el primer control postnatal después del nacimiento más reciente de los cinco años que precedieron a la encuesta.....	177
Gráfico 7.21	Momento del primer control postnatal para el nacimiento más reciente que no nació en un establecimiento de salud en los cinco años que precedieron a la encuesta	177
Gráfico 7.22	Mujeres de 15 a 49 años de edad por momento del primer control postnatal (antes de las cuatro horas) para el nacimiento más reciente que no nació en un establecimiento de salud, según ámbito geográfico	178
Gráfico 7.23	Persona que realizó el primer control postnatal a la madre (mujeres 15 a 49 años de edad) después del nacimiento más reciente que no ocurrió en un establecimiento de salud.....	178
Gráfico 7.24	Problemas de acceso a los servicios de salud cuando las mujeres de 15 a 49 años de edad están enfermas, según motivos específicos.....	179

CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL.....181

Gráfico 8.1	Peso al nacer de nacidos vivos en los cinco años que precedieron a la encuesta.....	183
Gráfico 8.2	Peso al nacer de nacidos vivos en los cinco años que precedieron a la encuesta, según ámbito geográfico	184
Gráfico 8.3	Tamaño al nacer nacidos vivos en los cinco años que precedieron a la encuesta.....	184

Gráfico 8.4	Niños menores de 12 meses con vacunas de acuerdo a su edad, según tipo de vacuna recibida, según esquema de vacunación Directiva sanitaria NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP	187
Gráfico 8.5	Niños menores de 24 meses con vacunas de acuerdo a su edad, según tipo de vacuna recibida, según esquema de vacunación, Directiva sanitaria NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP	188
Gráfico 8.6	Niños menores de 36 meses con vacunas de acuerdo a su edad, según tipo de vacuna recibida, según esquema de vacunación, Directiva sanitaria NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP	195
Gráfico 8.7	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños menores de cinco años de edad.....	196
Gráfico 8.8	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños menores de cinco años de edad, según área de residencia.....	197
Gráfico 8.9	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños menores de cinco años de edad, según edad en meses	197
Gráfico 8.10	Niños menores de cinco años de edad con síntomas de IRA que buscaron tratamiento de un proveedor de salud, según edad en meses.....	198
Gráfico 8.11	Niños menores de cinco años de edad con síntomas de IRA que recibieron antibióticos, según ámbito geográfico	198
Gráfico 8.12	Prevalencia de diarrea en niños menores de cinco años de edad.....	199
Gráfico 8.13	Prevalencia de diarrea en niños menores de cinco años de edad, según área de residencia.....	199
Gráfico 8.14	Prevalencia de diarrea en niños menores de cinco años de edad, según sexo y edad en meses	200
Gráfico 8.15	Administración de líquidos y sólidos en niños menores de cinco años de edad que tuvieron diarrea.....	200
Gráfico 8.16	conocimiento de sales de rehidratación oral (SRO) de madres con nacimientos en los últimos cinco años.....	205
Gráfico 8.17	Formas de eliminación de las deposiciones del hijo menor cinco años de edad	205

CAPÍTULO 9: LACTANCIA, NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT) DE NIÑOS Y NUTRICIÓN DE MUJERES207

Gráfico 9.1	Lactancia materna inicial y alimentación suplementaria de niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.....	210
Gráfico 9.2	Lactancia materna inicial y alimentación suplementaria de niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta, según área de residencia.....	210
Gráfico 9.3	Niños menores de seis meses de edad con lactancia materna.....	211
Gráfico 9.4	Niños menores de seis meses de edad con lactancia materna, según área de residencia	211
Gráfico 9.5	Niños menores de seis meses de edad con lactancia materna, según característica seleccionada.....	212
Gráfico 9.6	Niños menores de 6 a 35 meses de edad que consumieron alimentos ricos en vitamina A y hierro durante las últimas 24 horas, según edad en meses.....	215
Gráfico 9.7	Niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días	216
Gráfico 9.8	Niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días, según área de residencia.....	216

Gráfico 9.9	Niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos 7 días, según autoidentificación étnica y lengua materna.....	219
Gráfico 9.10	Anemia en niños de 6 a 59 meses de edad.....	221
Gráfico 9.11	Anemia en niños de 6 a 59 meses de edad, según área de residencia.....	221
Gráfico 9.12	Anemia en niños de 6 a 35 meses de edad.....	222
Gráfico 9.13	Anemia en niños de 6 a 35 meses de edad, según área de residencia.....	222
Gráfico 9.14	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad.....	227
Gráfico 9.15	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	227
Gráfico 9.16	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según característica seleccionada.....	228
Gráfico 9.17	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según autoidentificación étnica y lengua materna.....	228
Gráfico 9.18	Anemia en niños de 6 a 59 meses de edad.....	231
Gráfico 9.19	Anemia en niños de 6 a 59 meses de edad, según área de residencia.....	232
Gráfico 9.20	Anemia en niños de 6 a 35 meses de edad.....	232
Gráfico 9.21	Anemia en niños de 6 a 35 meses de edad. Según área de residencia.....	327
Gráfico 9.22	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad.....	237
Gráfico 9.23	Anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	238
Gráfico 9.24	Niños menores de cinco años de edad con Desnutrición Crónica (Patrón OMS).....	241
Gráfico 9.25	Niños menores de cinco años de edad con Desnutrición Crónica (Patrón OMS) según área de residencia.....	242
Gráfico 9.26	Niños menores de cinco años de edad con Desnutrición Crónica (Patrón OMS), según característica seleccionada.....	245
Gráfico 9.27	Niños entre 9 y 12 meses de edad que tiene una adecuada interacción madre hijo como precursora del apego seguro, según característica seleccionada.....	246
Gráfico 9.28	Madres de niños entre 9 y 12 meses de edad que responde de manera inmediata y adecuada al llanto de su hijo, según característica seleccionada.....	246
Gráfico 9.29	Niños entre 9 a 12 meses de edad con comunicación verbal efectiva a nivel comprensivo y expresivo apropiada para su edad, según característica seleccionada.....	247
Gráfico 9.30	Madres de niños entre 9 y 18 meses de edad que verbalizan las acciones que realiza con su hijo mientras las desarrolla, según característica seleccionada.....	247
Gráfico 9.31	Niños de 9 a 18 meses de edad que camina por propia iniciativa sin necesidad de detenerse para lograr el equilibrio, según características seleccionada.....	248
Gráfico 9.32	Talla promedio de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según área de residencia.....	249
Gráfico 9.33	Estado nutricional de las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad, según índice de masa corporal – IMC, 2024.....	250

CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DE VIH E ITS251

Gráfico 10.1	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de formas específicas para evitar el VIH, según área de residencia.....	254
--------------	--	-----

Gráfico 10.2	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de formas específicas para evitar el VIH, según autoidentificación étnica y lengua materna	257
Gráfico 10.3	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de la transmisión del VIH de la madre al Hijo, según área de residencia.....	258
Gráfico 10.4	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de la transmisión del VIH de la madre al hijo, según autoidentificación étnica y lengua materna	259
Gráfico 10.5	Mujeres de 15 a 49 años de edad que conocen de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y sus síntomas	260
Gráfico 10.6	Mujeres de 15 a 49 años de edad que conocen de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y sus síntomas, según área de residencia.....	260
Gráfico 10.7	Mujeres de 15 a 49 años de edad por conocimiento de formas específicas para evitar el VIH, según autoidentificación étnica y lengua materna	263
Gráfico 10.8	Uso del condón en los últimos 12 meses por tipo de compañero, según característica seleccionada.....	264

CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS265

Gráfico 11.1	Violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según formas de violencia	268
Gráfico 11.2	Violencia contra la mujer de 15 a 49 años de edad, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según área de residencia.....	271
Gráfico 11.3	Violencia psicológica y/o verbal, ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según autoidentificación étnica y lengua materna	271
Gráfico 11.4	Violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o compañero en los últimos 12 meses	272
Gráfico 11.5	Violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o compañero en los últimos 12 meses, según características seleccionadas	272
Gráfico 11.6	Resultado de la violencia física	277
Gráfico 11.7	Violencia física ejercida por el esposo o compañero bajo los efectos del licor/drogas o ambas, según característica seleccionada.....	278
Gráfico 11.8	Búsqueda de ayuda en personas cercanas cuando fueron maltratadas físicamente.....	278
Gráfico 11.9	Búsqueda de ayuda en alguna institución cuando fueron maltratadas físicamente	281
Gráfico 11.10	Razones para no buscar ayuda cuando fueron maltratadas físicamente.....	282
Gráfico 11.11	Personas que corrigen a los niños de 1 a 5 años de edad en el hogar	283
Gráfico 11.12	Principales formas que utilizan el padre y la madre cuando corrigen a sus hijos de 1 a 5 años de edad.....	284

CAPÍTULO 12: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE285

Gráfico 12.1	Desnutrición crónica entre los niños menores de 5 años de edad, según sexo	288
Gráfico 12.2	Desnutrición crónica entre los niños menores de 5 años, según área de residencia	288
Gráfico 12.3	Desnutrición crónica entre los niños menores de 5 años de edad, según nivel de educación de la madre.....	289

Gráfico 12.4	Índice de mortalidad materna	290
Gráfico 12.5	Partos con asistencia de personal de salud calificado, según área de residencia.....	291
Gráfico 12.6	Partos con asistencia de personal de salud calificado, según región natural.....	292
Gráfico 12.7	Partos con asistencia de personal de salud calificado, según nivel de educación.....	293
Gráfico 12.8	Mujeres de 15 a 49 años de edad que practican la planificación familiar con métodos modernos, según área de residencia	294
Gráfico 12.9	Mujeres de 15 a 49 años de edad que practican la planificación familiar con métodos modernos, según nivel de educación.....	295
Gráfico 12.10	Tasa de fecundidad 1/ adolescente de 15 a 19 años de edad, según área de residencia.....	296
Gráfico 12.11	Mujeres de 15 a 49 años de edad que han sufrido violencia física y sexual, infligida por el esposo o conviviente en los últimos 12 meses anteriores a la encuesta, según área de residencia	297
Gráfico 12.12	Personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses, según sexo.....	298
Gráfico 12.13	Personas de 15 y más años de edad con trastorno por consumo de alcohol en los últimos 12 meses, según región natural	298
Gráfico 12.14	Personas de 15 y más años de edad que fuman diariamente cigarrillos, según sexo.....	299
Gráfico 12.15	Personas de 15 y más años de edad que fuman diariamente cigarrillos, según región natural.....	299

Lista de Mapas

Pág.

CAPÍTULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES Y LA POBLACIÓN57

Mapa 1.1	Mediana de años completos de educación de la población femenina y masculina de seis y más años de edad, según departamento	71
----------	--	----

CAPÍTULO 2: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS MUJERES.....73

Mapa 2.1	Mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad) con nivel de educación superior, según departamento	79
Mapa 2.2	Cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS) en mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad), según departamento	89

CAPÍTULO 3: FECUNDIDAD.....91

Mapa 3.1	Tasa global de fecundidad, según departamento	97
----------	---	----

CAPÍTULO 4: PLANIFICACIÓN FAMILIAR.....105

Mapa 4.1	Uso actual de métodos anticonceptivos modernos entre las mujeres (de 15 a 49 años de edad) actualmente unidas, según departamento.....	111
Mapa 4.2	Uso actual de métodos anticonceptivos Tradicionales entre las mujeres (de 15 a 49 años de edad) actualmente unidas, según departamento.....	113

CAPÍTULO 5: OTROS DETERMINANTES DE LA FECUNDIDAD121

Mapa 5.1	Edad mediana a la primera unión entre las mujeres de 25-49 años de edad, según departamento	127
Mapa 5.2	Edad mediana a la primera relación sexual entre las mujeres de 25-49 años de edad, según departamento	131

CAPÍTULO 6: PREFERENCIAS DE FECUNDIDAD 137

Mapa 6.1	Fecundidad deseada para los tres años anteriores a la encuesta, según departamento	149
Mapa 6.2	Fecundidad observada para Los tres años anteriores a la encuesta según departamento	151

CAPÍTULO 7: SALUD MATERNA 153

Mapa 7.1	Gestantes que recibieron 6 o más controles prenatales, según departamento	161
Mapa 7.2	Mujeres (de 15 a 49 años de edad) que recibieron dos o más inyecciones contra el tétano durante el último embarazo, según departamento.....	165
Mapa 7.3	Parto Institucional, según departamento.....	169
Mapa 7.4	Nacimientos por cesárea, según departamento	171
Mapa 7.5	Partos atendidos por profesional de salud calificado, según departamento.....	175

CAPÍTULO 8: SALUD INFANTIL 181

Mapa 8.1	Nacimiento con bajo peso al nacer (<2.5kg), según departamento	185
Mapa 8.2	Niños menores de 12 meses de edad con todas sus vacunas de acuerdo a su edad, según departamento (según esquema de vacunación N°141-MINSA/2018/DGIESP).....	189
Mapa 8.3	Niños menores de 24 meses con todas sus vacunas de acuerdo a su edad según departamento (según esquema de vacunación NTSN°141-MINSA/2018/DGIESP)	191
Mapa 8.4	Niños menores de 36 meses con todas sus vacunas de acuerdo a su edad según departamento (según esquema de vacunación NTSN°141-MINSA/2018/DGIESP)	193
Mapa 8.5	Prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA) en niños menores de cinco años de edad, según departamento.....	201
Mapa 8.6	Prevalencia de diarrea en niños menores de cinco años de edad, según departamento.....	203

CAPÍTULO 9: LACTANCIA, NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT) DE NIÑOS Y NUTRICION DE MUJERES 207

Mapa 9.1	Niños menores de seis meses de edad con lactancia materna, según departamento	213
Mapa 9.2	Niños de 6 a 35 meses de edad que consumieron suplemento de hierro en los últimos siete días, según departamento	217
Mapa 9.3	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad, según departamento	223
Mapa 9.4	Prevalencia de anemia en mujeres de 6 a 59 meses de edad, según departamento, RM 363-2022-MINSA.....	225
Mapa 9.5	Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según departamento, RM 363-2022—MINSA	229

Mapa 9.6	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 59 meses de edad, según departamento, NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA.....	233
Mapa 9.7	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad, según departamento, NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA.....	235
Mapa 9.8	Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad, según departamento, NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024/ RM 251-2024-MINSA.....	239
Mapa 9.9	Niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS) según departamento	243

CAPÍTULO 10: CONOCIMIENTO DEL VIH E ITS251

Mapa 10.1	Mujeres (de 15 a 49 años de edad) por conocimiento de 2 formas específicas para evitar el VIH, según departamento	255
Mapa 10.2	Mujeres (de 15 a 49 años de edad) que no conocen las infecciones de transmisión sexual (ITS), según departamento	261

CAPÍTULO 11: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑOS265

Mapa 11.1	Violencia familiar contra la mujer de 15 a 49 años de edad ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según departamento	269
Mapa 11.2	Violencia psicológica y/o verbal (mujeres de 15 a 49 años de edad) ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según departamento.....	273
Mapa 11.3	Violencia física y/o sexual (mujeres de 15 a 49 años de edad) ejercida alguna vez por el esposo o compañero, según departamento	275
Mapa 11.4	Violencia familiar contra la mujer de 15 a 49 años de edad ejercida en los últimos 12 meses por el esposo o compañero, según departamento.....	279

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2024

INDICADOR	Año															Diferencia		Test de diferencia de medias	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 / 2023	2024 / 2023	2024 / 2023
POBLACIÓN DE LA MUESTRA																			
Mujeres de 15 a 49 años de edad	24 213	22 946	22 517	23 888	22 919	24 872	35 766	33 135	33 168	34 875	33 366	32 059	33 086	32 161	32 050	30 777	-	-	-
Área urbana	18 050	16 924	16 802	17 866	17 644	19 366	28 380	26 353	26 736	28 680	27 564	25 658	26 982	26 307	26 204	25 430	-	-	-
Área rural	6 162	6 022	5 715	6 022	5 276	5 506	7 386	6 782	6 432	6 195	5 802	6 401	6 104	5 854	5 846	5 347	-	-	-
Niños nacidos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta																			
Área urbana	5 994	5 447	5 506	5 773	5 585	6 315	9 620	8 906	8 334	7 917	7 198	7 170	7 237	6 954	6 531	5 749	-	-	-
Área rural	3 311	3 037	2 920	3 031	2 597	2 666	3 492	3 295	2 978	2 772	2 548	2 321	2 367	2 348	2 232	2 066	-	-	-
Sobrevivientes menores de cinco años de edad																			
Área urbana	5 880	5 370	5 439	5 679	5 484	6 230	8 317	8 785	8 180	7 818	7 115	7 067	7 109	6 819	6 427	5 689	-	-	-
Área rural	3 208	2 961	2 837	2 972	2 541	2 595	3 204	3 235	2 907	2 710	2 497	2 280	2 319	2 292	2 187	2 022	-	-	-
Niños vivos de 12 a 23 meses de edad																			
Niños vivos de 24 a 35 meses de edad	1 691	1 678	1 831	1 778	1 580	1 692	2 474	2 552	2 275	2 137	1 948	2 042	1 840	1 847	1 673	1 571	-	-	-

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2024

INDICADOR	Año																Diferencia	Test de diferencia de medias
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA VIVIENDA Y DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)																	
Viviendas con luz eléctrica	82,4	85,2	87,4	89,2	91,2	91,4	92,9	93,8	95,2	95,3	95,7	96,1	96,1	96,2	96,1	96,2	96,2	0,1
	96,1	96,8	97,6	98,2	98,3	98,1	98,2	98,6	98,9	98,7	99,2	98,7	98,6	98,8	98,8	98,9	98,8	-0,1
	54,3	60,3	64,6	69,6	72,9	74,2	77,6	80,1	83,5	83,6	83,9	87,2	87,5	87,2	86,4	86,9	86,9	0,5
Viviendas con agua potable ^{1/}	77,2	76,5	77,1	78,9	79,9	81,7	81,3	80,3	80,4	80,3	80,5	82,8	79,1	77,9	75,8	76,2	76,2	0,4
	85,5	82,5	82,6	85,0	84,3	86,5	85,4	83,8	83,2	81,9	82,7	84,8	80,2	79,0	76,1	76,2	76,2	0,1
	60,1	63,7	64,7	65,7	68,7	69,0	69,6	70,4	71,1	74,5	73,0	75,9	75,6	74,0	74,7	75,9	75,9	1,2
Viviendas con servicio de desagüe ^{2/}	55,7	56,3	58,4	59,3	64,6	66,1	66,9	68,3	71,3	72,1	73,0	73,8	70,6	71,8	72,1	73,3	73,3	1,2
	77,9	77,2	79,0	81,0	83,6	84,8	84,6	85,7	87,2	87,3	88,2	87,9	84,7	85,8	85,9	86,7	86,7	0,8
	9,8	11,1	12,5	12,7	16,0	17,7	15,5	17,8	20,0	20,5	21,4	25,5	20,7	22,5	23,5	25,2	25,2	1,7
Mujeres en edad fértil con secundaria o más	74,0	73,7	75,2	75,2	77,3	79,2	79,0	81,0	82,0	82,5	84,1	84,9	84,6	85,1	85,9	86,9	86,9	-
	85,2	84,8	86,2	85,3	86,3	88,1	87,0	88,9	89,3	89,2	90,5	91,1	90,2	90,6	91,1	91,8	91,8	-
	41,6	42,8	42,5	45,2	47,1	47,7	48,0	49,9	52,0	51,9	53,9	60,0	60,0	60,5	62,4	63,5	63,5	-
Mujeres en edad fértil con algún seguro de salud	51,0	56,9	59,5	57,0	62,8	68,6	73,0	74,9	74,7	73,6	72,5	76,7	78,7	83,7	87,3	90,6	90,6	3,3
	47,0	51,4	53,7	53,2	58,8	65,1	70,0	72,2	72,2	70,9	69,5	73,9	76,4	81,8	85,8	89,5	89,5	3,7
	62,7	72,1	76,3	68,4	76,1	80,7	84,4	85,3	85,2	86,2	86,5	88,0	88,9	92,3	94,2	95,7	95,7	1,5
Mujeres en edad fértil con Seguro Integral de Salud (SIS)	27,4	33,6	33,8	31,5	35,9	40,6	44,5	46,7	45,5	44,5	43,9	51,1	55,4	60,6	64,0	66,9	66,9	2,9
	17,1	21,6	21,2	21,1	25,9	31,0	35,9	38,4	37,6	37,1	36,2	43,4	49,1	54,7	58,4	61,9	61,9	3,5
	57,8	67,2	70,8	62,5	69,4	74,2	77,8	79,0	78,2	78,8	80,1	82,2	83,3	87,2	89,0	90,3	90,3	1,3

Continúa...

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2024

INDICADOR	Año																	Diferencia	Test de diferencia de medias
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ																			
	11	9	8	9	11	(10,0) b/	10	-	10	10	-	8	10	11	10	7	-		
	20	17	16	17	16	17	15	-	15	15	-	13	15	17	16	13	-		
	26	23	21	21	21	20	18	-	18	19	-	16	18	20	20	17	-		
	16	13	14	16	17	15	13	-	14	16	-	11	12	14	14	13	-		
ATENCIÓN MATERNA																			
Porcentaje de últimos nacimientos cuyas madres recibieron: ^{4/}																			
Atención prenatal de un profesional de salud calificado (médico, obstétriz y enfermera) durante el embarazo	94,3	94,7	95,4	96,0	95,9	96,9	97,0	97,6	97,5	98,1	98,2	98,1	98,3	97,8	98,1	97,9	-0,2		
Área urbana	97,9	98,1	98,9	98,9	98,9	98,8	99,0	99,0	99,2	99,4	99,4	99,4	99,3	99,1	99,1	99,2	0,1		
Área rural	87,1	87,9	88,1	90,0	88,9	91,9	91,3	93,2	92,5	94,1	94,7	93,9	95,0	94,0	95,0	94,0	-1,0		
Parto institucional	81,3	83,7	84,3	86,0	88,0	89,2	90,7	91,9	93,0	92,7	92,4	94,3	93,2	93,3	93,3	93,5	0,2		
Área urbana	93,1	94,8	94,8	95,2	96,3	96,0	96,7	97,3	97,7	97,4	96,3	97,6	96,9	97,1	97,1	97,8	0,7		
Área rural	57,6	62,0	62,6	67,3	68,6	72,0	73,2	76,0	79,1	78,8	80,8	83,9	81,1	81,3	81,9	81,1	-0,8		
Atención del parto en un establecimiento de salud	82,0	84,4	85,1	86,8	88,6	89,5	91,0	92,2	93,2	93,0	92,6	94,6	93,3	93,4	93,6	93,7	0,1		
Área urbana	93,4	95,1	95,2	95,7	96,8	96,2	96,8	97,4	97,7	97,5	96,4	97,6	97,0	97,2	97,4	97,9	0,5		
Área rural	59,0	63,7	64,2	68,6	69,8	72,6	74,2	76,8	79,9	79,4	81,3	84,7	81,4	81,6	82,2	81,5	-0,7		
Atención de parto por un profesional de salud calificado (médico, obstétriz y enfermera)	82,5	83,8	85,0	86,7	89,1	90,0	91,6	92,4	93,6	93,7	94,4	95,7	94,9	94,6	94,8	94,3	-0,5		
Área urbana	94,4	95,0	96,0	95,7	97,3	97,1	97,7	98,2	98,4	98,5	98,6	99,0	98,9	98,6	98,6	98,6	0,0		
Área rural	61,0	63,7	64,4	69,6	71,3	73,1	75,0	76,9	80,0	79,8	82,4	85,6	82,5	82,8	83,8	82,5	-1,3		
Nacimientos por cesárea	21,4	20,4	22,9	25,3	26,5	28,6	31,6	31,6	34,2	34,5	34,7	36,3	36,3	36,6	37,8	38,2	0,4		
Área urbana	29,1	27,1	30,7	32,9	33,5	35,6	38,5	38,4	40,8	41,0	40,9	41,9	42,0	42,5	43,6	44,4	0,8		
Área rural	7,5	8,4	8,2	10,8	11,5	12,0	12,9	13,2	15,7	15,7	17,1	18,7	19,0	19,3	21,0	21,0	0,0		

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2024

INDICADOR	Año														Diferencia	Test de diferencia de medias	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			2023
VACUNACIÓN																	
Segun Esquema de Vacunación NTS N°141-MINSA/2018(DGIESP)																	
Porcentaje de niños menores de 36 meses de edad con tarjeta de vacunación																	
Área urbana																	
Área rural																	
Porcentaje de niños menores de 36 meses de edad que han recibido vacuna: ⁷¹																	
Tuberculosis (BCG)																	
Área urbana																	
Área rural																	
Difteria, pertussis o tos ferina y tétano (DPT, las tres dosis)																	
Área urbana																	
Área rural																	
Polio (las tres dosis)																	
Área urbana																	
Área rural																	
Antisarampionosa (las dos dosis)																	
Área urbana																	
Área rural																	
Todas las vacunas ⁸¹																	
Área urbana ⁸¹																	
Área rural ⁸¹																	

2024 / 2023	2024 / 2023	2024 / 2023
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2024

INDICADOR	Año																Diferencia	Test de diferencia de medias	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES EN MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD																			
	Porcentaje de niños con diarrea 9/	14,0	14,9	13,9	12,3	10,9	12,1	12,0	11,5	11,0	10,7	11,5	8,2	9,4	11,7	12,8	11,9	-0,9	**
	Área urbana 9/	14,0	15,2	13,3	12,0	10,6	11,7	11,4	11,4	10,6	10,3	11,1	8,0	9,0	11,2	12,3	11,2	-1,1	**
	Área rural 9/	13,9	14,3	15,0	12,8	11,5	12,9	13,6	11,8	12,2	12,1	12,5	8,9	10,6	13,1	14,3	13,8	-0,5	
	Porcentaje de niños con diarrea tratados con sobres de rehidratación oral SRO	32,0	32,2	29,8	30,9	29,5	28,2	32,0	34,6	32,5	33,5	33,6	22,4	31,7	32,3	36,1	34,5	-	-
	Área urbana	38,9	36,6	36,3	35,2	33,8	31,6	36,7	38,3	37,2	37,1	38,4	23,8	35,2	35,1	39,7	38,0	-	-
	Área rural	19,2	23,5	18,7	23,2	20,9	20,7	21,9	24,9	20,8	24,8	21,5	18,5	22,4	25,1	27,1	26,6	-	-
Porcentaje de niños enfermos con IRA	16,0	17,1	16,4	13,9	13,3	16,8	15,1	15,9	14,6	14,4	14,5	4,0	5,5	13,8	14,9	12,4	-2,5	***	
Área urbana	14,3	17,2	15,9	12,9	13,6	16,2	14,6	15,6	14,3	13,8	14,2	3,7	4,9	13,3	14,5	12,0	-2,5	***	
Área rural	19,1	17,0	17,6	15,7	12,7	18,3	16,5	16,9	15,4	16,2	15,5	5,1	7,2	15,3	16,2	13,4	-2,8	***	
NUTRICIÓN EN LA NIÑEZ (Porcentaje)																			
	Niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón OMS)	23,8	23,2	19,5	18,1	17,5	14,6	14,4	13,1	12,9	12,2	12,2	12,1	11,5	11,7	11,5	12,1	0,6	
	Área urbana	14,2	14,1	10,1	10,5	10,3	8,3	9,2	7,9	8,2	7,3	7,6	7,2	6,8	7,1	8,1	8,5	0,4	
	Área rural	40,3	38,8	37,0	31,9	32,3	28,8	27,7	26,5	25,3	25,7	24,5	24,8	24,4	23,9	20,3	20,9	0,6	
	Niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica (Patrón NCHS)	18,3	17,9	15,2	13,5	13,1	10,7	10,2	9,3	9,1	8,8	8,7	-	6,9	7,7	7,9	8,6	0,7	
	Área urbana	9,9	10,1	7,4	7,3	7,1	5,8	6,1	5,3	5,4	4,9	5,0	-	3,9	4,4	5,3	5,7	0,4	
	Área rural	32,8	31,3	30,0	24,6	25,3	21,9	20,5	19,5	19,2	19,4	18,3	-	15,2	16,6	14,4	15,4	1,0	
Anemia (RM 363-2022-MINSA)																			
Niños menores de 6 a 35 meses de edad con anemia	50,4	50,3	41,6	44,5	46,4	46,8	43,5	43,6	43,6	43,5	40,1	40,0	38,8	42,4	43,1	43,7	0,6		
	Área urbana	46,8	46,6	37,5	39,9	43,8	42,3	40,5	39,9	40,0	40,9	36,7	36,7	35,3	39,0	40,2	40,2	0,0	
	Área rural	56,7	56,6	49,6	53,0	51,7	57,5	51,1	53,4	53,3	50,9	49,0	48,4	48,7	51,5	50,3	51,9	1,6	

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2024

INDICADOR	Año																	Diferencia	Test de diferencia de medias
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Niños menores de 6 a 59 meses de edad con anemia Área urbana Área rural	37,2	37,7	30,7	32,9	34,0	35,6	32,6	33,3	34,1	32,8	29,5	29,0	28,4	33,6	33,4	33,7	0,3		
	33,2	33,0	26,5	28,6	31,1	31,7	29,8	30,1	30,7	30,2	26,4	26,4	25,2	30,3	30,5	30,2	-0,3		
	44,1	45,7	38,6	40,7	39,8	44,4	39,7	41,4	43,0	39,6	37,9	35,7	37,5	42,4	40,9	42,3	1,4		
Anemia (NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA)																			
Niños menores de 6 a 35 meses de edad con anemia 10/ Área urbana Área rural	-	40,9	33,5	36,3	37,3	37,2	34,5	35,0	34,4	35,4	31,4	30,4	28,4	33,5	34,6	35,3	0,7		
	-	36,9	29,9	31,2	34,1	32,3	31,6	31,0	30,5	32,6	28,1	27,1	24,4	29,9	31,5	31,2	-0,2		
	-	47,7	40,4	46,1	43,8	48,7	41,9	45,6	44,6	42,9	40,3	39,0	39,9	43,1	42,5	44,7	2,2		
Niños menores de 6 a 59 meses de edad con anemia 10/ Área urbana Área rural	-	32,8	25,7	28,6	29,1	30,9	28,1	29,1	29,4	29,0	25,4	24,6	23,4	29,2	29,6	29,8	0,2		
	-	28,3	21,9	24,0	26,2	26,6	25,3	25,7	25,9	26,3	22,1	21,7	19,8	25,8	26,5	25,8	-0,7		
	-	40,4	32,6	37,0	35,2	40,4	35,0	38,1	38,9	36,3	34,1	32,1	33,6	38,3	37,6	39,2	1,7		
Niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de hierro en los últimos siete días Área urbana Área rural	11,9	14,8	13,6	14,9	17,6	16,4	19,8	19,3	19,8	21,7	23,3	19,1	24,2	22,8	22,0	23,3	-	-	
	10,4	12,8	11,6	13,3	15,2	15,0	18,1	18,6	19,2	20,7	22,6	17,7	23,4	21,5	21,1	22,4	-	-	
	14,6	18,6	17,5	18,0	22,7	19,9	24,3	21,2	21,7	24,8	25,3	23,3	26,7	26,9	24,9	26,0	-	-	
Niños menores de cinco años de edad que recibió suplementos de vitamina "A" los últimos seis meses Área urbana Área rural	5,8	9,1	3,9	3,1	3,7	5,7	6,0	3,3	3,2	7,7	6,6	3,4	5,5	7,3	4,2	7,2	-	-	
	3,4	4,3	1,7	1,8	1,9	3,7	3,9	2,1	2,1	4,9	4,3	2,4	3,5	5,3	2,8	5,0	-	-	
	10,2	17,7	8,1	5,6	7,6	10,6	11,5	6,7	6,5	16,1	13,4	6,8	11,9	13,5	8,3	13,4	-	-	
Niños nacidos con bajo peso al hacer (menos de 2,5 kg.) Área urbana Área rural	6,4	7,2	6,5	7,4	7,3	6,0	7,1	7,0	7,3	7,3	6,5	6,6	6,7	6,7	7,4	7,3	-0,1		
	6,3	6,7	6,0	6,7	7,1	5,4	7,2	6,7	6,9	7,1	5,8	6,2	6,4	6,2	7,4	6,9	-0,5		
	6,5	8,2	7,3	8,8	7,7	7,4	6,9	8,1	8,7	8,3	8,6	8,2	7,7	8,2	7,5	8,5	1,0		
Niños menores de seis meses de edad con lactancia materna Niños menores de cuatro meses de edad amamantados	68,5	68,3	70,6	67,6	72,3	68,4	65,2	69,8	64,2	66,4	65,6	68,4	64,0	65,9	69,3	67,4	-1,9		
	99,3	97,9	99,3	98,8	97,4	98,8	98,0	98,4	97,8	97,9	98,2	98,0	97,9	98,3	98,0	98,6	-	-	
	20,8	21,2	20,4	20,1	20,7	21,2	20,4	20,7	21,0	20,6	21,0	20,7	22,4	20,5	21,6	22,3	-	-	
Duración mediana de la lactancia (en meses) 11/																			

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2024


INDICADOR	Año																Diferencia	Test de diferencia de medias
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024 / 2023	2024 / 2023
NUTRICIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL (Porcentaje)																		
Mujeres que tomó hierro por 90 días o más durante el embarazo																		
Área urbana																		
Área rural																		
Anemia (RM 363-2022-MINSA)																		
Mujeres con anemia																		
Área urbana																		
Área rural																		
Anemia (NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA)																		
Mujeres con anemia 12/																		
Área urbana																		
Área rural																		
Madres con talla menor de 145 cms.																		
Área urbana																		
Área rural																		

Continúa...

PRINCIPALES INDICADORES 2009 - 2024

INDICADOR	Año															Diferencia	Test de diferencia de medias
																2024 / 2023	2024 / 2023
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
VIOLENCIA FAMILIAR A MUJERES ALGUNA VEZ UNIDAS (Porcentaje)																	
Experimentaron violencia psicológica y/o verbal alguna vez por el esposo o compañero	73,0	72,1	70,0	70,6	67,5	69,4	67,4	64,2	61,5	58,9	52,8	50,1 a/	50,8	51,9	49,3	48,4	-0,9
	73,2	71,6	69,9	70,5	67,5	69,9	67,8	64,4	61,7	59,2	53,7	50,6 a/	51,5	52,5	49,8	49,2	-0,6
	72,6	73,2	70,3	70,8	67,5	68,1	66,1	63,8	60,8	58,2	49,4	48,0 a/	48,5	49,6	47,8	45,4	-2,4
Experimentaron violencia física alguna vez por el esposo o compañero	38,2	37,7	38,0	36,4	35,7	32,3	32,0	31,7	30,6	30,7	29,5	27,1 a/	26,7	27,8	27,2	25,5	-1,7
	38,7	38,5	38,9	37,3	36,4	32,8	32,7	32,6	31,3	31,1	29,7	27,5 a/	26,2	28,2	27,4	25,5	-1,9
	36,9	35,8	36,0	34,2	33,9	30,9	29,9	28,9	28,4	29,4	29,1	25,7 a/	28,6	26,3	26,6	25,3	-1,3
Experimentaron violencia sexual alguna vez por el esposo o compañero	8,8	8,6	9,3	8,7	8,4	7,9	7,9	6,6	6,5	6,8	7,1	6,0 a/	5,9	6,7	6,5	5,6	-0,9
	8,6	8,6	9,4	8,6	8,4	7,7	7,7	6,4	6,2	6,8	6,9	6,0 a/	5,5	6,8	6,5	5,5	-1,0
	9,1	8,6	9,1	9,0	8,5	8,5	8,4	7,4	7,4	7,2	7,6	6,0 a/	7,2	6,5	6,2	6,0	-0,2
Experimentaron violencia física y/o sexual en los últimos 12 meses por el esposo o compañero	14,2	13,9	13,6	12,9	12,1	12,8	11,7	10,8	10,6	10,9	10,0	8,8 a/	7,6	8,6	8,3	7,5	-0,8
Fueron agredidas alguna vez bajo los efectos del alcohol por el esposo o compañero	57,1	55,6	55,3	56,7	55,4	50,8	52,9	49,1	50,5	52,0	50,9	48,5 a/	48,6	50,4	49,9	48,2	-
	53,7	51,0	52,4	54,0	53,2	47,6	51,5	46,9	48,0	49,8	50,3	46,2 a/	47,0	48,9	50,2	46,1	-
	64,3	66,4	62,4	63,3	61,8	59,8	57,5	56,7	59,6	60,2	53,0	58,0 a/	53,5	55,9	48,9	56,0	-
Mujeres de 15-49 años de edad que fueron maltratadas por otras personas	20,3	18,1	16,3	16,0	15,1	17,3	16,1	16,0	13,9	14,7	15,7	17,0 a/	14,7	15,5	13,9	14,2	0,3
	23,0	20,3	18,1	18,0	16,6	19,0	17,7	17,7	14,9	16,0	17,0	18,2 a/	15,8	16,8	15,0	15,4	0,4
	13,4	12,6	11,7	10,7	10,6	11,8	10,4	10,1	10,1	9,4	10,1	11,1 a/	10,4	10,0	9,5	9,2	-0,3

Nota:
Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa (p < 0,10) ** Diferencia altamente significativa (p < 0,05) *** Diferencia muy altamente significativa (p < 0,01).
Comprende entrevistas realizadas a mujeres entre las edades de 15 a 49 años.
1/ Comprende agua potable dentro, fuera de la vivienda y pilóngrifo público.
2/ Servicio con desague comprende el servicio higiénico conectado a red pública dentro y fuera de la vivienda.
3/ Tomando como base los nacimientos ocurridos durante los tres años anteriores a la encuesta.
4/ Defunciones por cada 1 000 nacidos vivos para el período de cinco años precedente a la encuesta, 2009-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024.
5/ Es la suma del número de mortinatos y muertes neonatales temprana dividida por los embarazos de siete o más meses de duración, para el período de cinco años antes de la encuesta, 2009-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024.
6/ Tomando como base los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años anteriores a la encuesta.
7/ Información obtenida del carnet de vacunación y de la información proporcionada por la madre.
8/ "Todas las vacunas" comprende: una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente, tres dosis de la vacuna antipoliomielítica, dos dosis de rotavirus, tres dosis de sarampión paperas y rubéola (SPR), una dosis de refuerzo de DPT y una dosis de refuerzo de Polio.
9/ Niños menores de cinco años de edad cuyas madres declararon que aquellos tuvieron diarrea durante las dos semanas anteriores a la encuesta.
10/ NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024, RM 251-2024-MINSA con la NTS 213-MINSA-DGIESP-2024. El MINSA adopta la actualización de la OMS en la fórmula de ajuste por altitud y punto de corte para niños de 6 a 23 meses.
11/ Calculado por el método de Prevalencia/ Incidencia.
12/ NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024, RM 251-2024-MINSA con la NTS 213-MINSA-DGIESP-2024. El MINSA adopta la actualización de la OMS en la fórmula de ajuste por altitud.
a/ Resultados obtenidos de entrevista presencial.
b/ Comprende a estimadores con coeficiente de variación mayor a 15,0% considerados como referenciales.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar



Resumen Ejecutivo


RESUMEN EJECUTIVO

1. Características de las Viviendas y la Población

Características de las viviendas

Los diferenciales en el nivel de satisfacción de las necesidades básicas de salud, educación y vivienda tienen relación con el nivel de bienestar económico y social de la población. Así, según la ENDES, en el año 2024 los servicios básicos de la vivienda todavía no están disponibles para toda la población. Los menos beneficiados son los hogares de las viviendas rurales, sin embargo, estos servicios han presentado un mayor incremento porcentual que los hogares de las viviendas urbanas, en el periodo analizado.


El 96,2% tuvo acceso a este servicio. Según área de residencia el 98,8% de las viviendas del área urbana contaban con este servicio; en el área rural, un 86,9% disponía de luz eléctrica. En comparación con el año anterior, no se aprecian diferencias significativas.



Cuadro base: Cuadro 1.1.1 del Informe principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Por otro lado, según la ENDES 2024, el 76,2% de las viviendas se provee de agua por red pública (dentro o fuera de la vivienda, pilón/grifo público). En el área urbana, este servicio cubre al 76,2%; mientras que en el área rural al 75,9%. En comparación al año anterior, no se aprecia diferencias significativas.

PERÚ: FUENTE DE AGUA PARA BEBER POR RED PÚBLICA^{1/}, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023 Y 2024
(Porcentaje)




Nota:
Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).
1/ Comprende Red Pública dentro de la vivienda, Red Pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio y Pilón/grifo público.
Cuadro base: Cuadro 1.1.1 del Informe principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Respecto al servicio sanitario, el 73,4% de las viviendas tienen servicio higiénico conectado a red pública (incluye dentro y/o fuera de la vivienda). Según área de residencia, la proporción de viviendas en el área urbana, que tenían servicio higiénico conectado a red pública fue considerablemente mayor que en el área rural (86,7% y 25,2%, respectivamente).

El mayor porcentaje de viviendas sin servicio higiénico se presentó en el área rural (13,4%).

PERÚ: ACCESO A SERVICIO SANITARIO DE LAS VIVIENDAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2024
(Distribución Porcentual)




Nota:
Los porcentajes no necesariamente suman los subtotales o el 100,0% debido al redondeo.
1/ Incluye: Red pública dentro y fuera de la vivienda
2/ Incluye: Letrina exclusiva y letrina común
3/ Incluye: No hay servicio y otro (río, acequia o canal)
Cuadro base: Cuadro 1.1 del Informe principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Edad de la Población

Según la ENDES 2024, el 26,1% de la población, tiene menos de 15 años, el 63,8% se encuentra entre los 15 y 64 años y un 10,1% cuenta con 65 y más años de edad. En comparación con el año 2023, el porcentaje de la población de 65 y más años de edad, no muestra diferencias significativas.

PERÚ: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, 2023 Y 2024
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 1.7 del Informe principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

2. Niveles de educación de las mujeres en edad fértil

El nivel educativo de las mujeres de 15 a 49 años; en el año 2024, fue de 86,9% tenía educación secundaria o superior (47,2% y 39,7%, respectivamente). En comparación con el año anterior no se aprecian grandes diferencias.

PERÚ: NIVEL DE EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, 2023 Y 2024
(Distribución Porcentual)



Nota:


Los porcentajes no necesariamente suman el 100% debido al redondeo.

Cuadro base: Cuadro 2.3 del Informe principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar

3. Fecundidad


Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 1,8 hijos por mujer para el periodo 2024. Según área de residencia, el área rural muestra una tasa global de fecundidad más alta (2,9 hijos) que el área urbana (1,5 hijos).



Nota:
Mujeres de 15 a 49 años de edad.
1/ Tasa Global de Fecundidad (TGF): Promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres durante toda su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad obtenidas en la Encuesta se mantuviesen invariables en el tiempo.
Cuadro base: Cuadro 3.3 del Informe principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Fecundidad Adolescente

Del total de adolescentes de 15 a 19 años de edad, el 8,4% ya estuvo alguna vez embarazada; es decir que ya son madres o que están embarazadas por primera vez; según área de residencia, el porcentaje de adolescentes alguna vez embarazadas del área rural (18,3%) fue considerablemente mayor respecto del área urbana (6,1%).




1/ Comprende adolescentes de 15 a 19 años de edad que ya son madres o que están embarazadas por primera vez.
Cuadro base: Cuadro 3.14 del Informe principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

4. Uso Actual de Métodos de Planificación Familiar

En el año 2024, según la ENDES, el 77,5% de las mujeres actualmente unidas estaban usando algún método anticonceptivo a la fecha de la encuesta. En el área urbana fue 77,0% y en la rural 79,5%.

PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ACTUALMENTE UNIDAS QUE USAN CUALQUIER MÉTODO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023 Y 2024
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 4.4 del Informe principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Uso de Métodos Modernos

El 58,1% de mujeres actualmente unidas estaba usando métodos modernos en el 2024. La proporción de usuarias de este método fue mayor en el área urbana que en el área rural (59,1% frente a 54,7%). El uso de estos métodos ha tendido al incremento en el área urbana.

PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, ACTUALMENTE UNIDAS QUE USAN MÉTODOS MODERNOS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023 Y 2024
(Porcentaje)



Nota:

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Cuadro base: Cuadro 4.4 del Informe principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


5. Otros determinantes de la fecundidad

Estado conyugal actual

La formación de uniones legales o consensuales constituye un indicador de la exposición al riesgo de embarazo, por lo que tiene implicancia en la fecundidad.

En el año 2024, el 52,4% de las mujeres entrevistadas se encontraba en unión conyugal; 15,6% estaba casada y 36,8% en situación de convivencia. Al comparar estos datos con el 2023, la tendencia disminuye principalmente en las mujeres casadas.

PERÚ: ESTADO CONYUGAL ACTUAL DE LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS EN EDAD, 2023 Y 2024
(Distribución Porcentual)




1/ Comprende mujeres separadas, viudas y divorciadas.
Cuadro base: Cuadro 5.1 del Informe principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Edad a la primera unión conyugal

La edad a la primera unión tiene un efecto importante en la fecundidad, porque cuanto más joven forma pareja la mujer, mayor será su tiempo de exposición al riesgo de embarazo y mayor el potencial reproductivo a lo largo de su vida.

La edad mediana a la primera unión en las mujeres de 25 a 49 años fue 22,1 años. Existen diferencias según el área de residencia, en el área urbana fue más tarde (22,9 años) que las residentes en el área rural (19,4 años); según región natural, las mujeres residentes en la selva inician su unión conyugal a una edad más temprana (19,5 años).

PERÚ: EDAD MEDIANA A LA PRIMERA UNIÓN DE LAS MUJERES DE 25 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2023 Y 2024



Cuadro base: Cuadro 5.9 del Informe principal de la ENDES 2024.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Edad a la primera relación sexual

La primera relación sexual ocurre antes que la unión conyugal. El inicio temprano tiene mucha importancia principalmente para las adolescentes porque se convierte en un riesgo potencial para embarazos no deseados, abortos y contagio de enfermedades de transmisión sexual.

Según la ENDES 2024, la edad mediana a la primera relación sexual de las mujeres de 25 a 49 fue 18,3 años. La primera relación sexual fue más temprana en el área rural (17,5 años) que en el área urbana (18,5 años). Según región natural, las mujeres residentes en la selva inician su actividad sexual a una edad más temprana (16,9 años).

PERÚ: EDAD MEDIANA A LA PRIMERA RELACIÓN SEXUAL DE LAS MUJERES DE 25 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2023 Y 2024



Cuadro base: Cuadro 5.12 del Informe principal de la ENDES 2024.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

6. Salud Materna e Infantil

Atención prenatal

En el embarazo del último nacimiento, el 97,9% de las mujeres de 15 a 49 años de edad, tuvo algún control prenatal por personal de salud calificado (médico, obstetra y enfermera). Al comparar con el año anterior, no se observa diferencia significativa. Según persona que proporcionó la atención prenatal, el 86,0% recibió atención por parte de la o el obstetra, el 30,3% por parte de médico y por enfermera el 7,1%.


PERÚ: NACIMIENTOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PRENATAL DE UN PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO^{1/}, SEGÚN PERSONA QUE PROPORCIONÓ LA ATENCIÓN PRENATAL, 2023 Y 2024 (Porcentaje)



Nota:
Se refiere a Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta.
1/ Profesional de salud calificado: incluye médico, obstetra, enfermera.
2/Técnico en enfermería/Promotor de salud, Comadrona/Partera, otro.
Cuadro base: Cuadro 8.2 del informe Principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Según área de residencia, fue mayor la atención recibida por un profesional de la salud calificado en área urbana (99,2%) en comparación con la recibida en área rural que fue 94,0%. En comparación con año el anterior, el área rural tuvo una disminución.

PERÚ: NACIMIENTOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PRENATAL DE UN PROFESIONAL DE SALUD CALIFICADO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023 Y 2024
(Porcentaje)



Nota:


Se refiere a Mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta.

Cuadro base: Cuadro 8.2.2 del informe Principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

El control temprano, durante el primer trimestre de gestación, es muy importante en el cuidado de la salud de la madre y el niño, al respecto el 80,9% de gestantes recibió control de su embarazo en los tres primeros meses de gestación. Según área de residencia, fue mayor en 5,5 puntos porcentuales en el área urbana en relación al área rural (82,3% y 76,8%, respectivamente).

PERÚ: MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON SU PRIMERA ATENCIÓN PRENATAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN PARA EL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023 Y 2024
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 8.3 del informe Principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Parto Institucional


Según la ENDES 2024, la proporción de partos institucionales fue 93,5%. Según área de residencia, se observa una diferencia de 16,7 puntos porcentuales entre el área urbana y rural (97,8% frente a 81,1%, respectivamente). En comparación con el año anterior, se mantiene la misma tendencia.



Nota:
La estimación se refiere al último nacimiento de la mujer de 15 a 49 años de edad, en el período de 0-59 meses que precedieron la encuesta, incluyéndose los nacimientos en el mes de la entrevista.
1/ El parto institucional se refiere a los partos ocurridos en establecimientos de salud y que fueron atendidos por profesional de salud calificado.
Cuadro base: Cuadro 8.9.1 del informe Principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Control Postnatal

El 81,3% de mujeres tuvo un primer control postnatal dentro de las primeras cuatro horas después del parto. Según área de residencia, en el área urbana, el 82,2% de las mujeres tuvieron un control antes de las cuatro horas postparto; mientras que en el área rural fue el 78,7%.




Cuadro base: Cuadro 8.13 del informe Principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

7. Salud Infantil

Bajo peso al nacer

Entre los niños que fueron pesados al nacer, un 7,3% pesó menos de 2,5 Kg. Por área de residencia la prevalencia de bajo peso al nacer no se aprecian mayores diferencias.

PERÚ: BAJO PESO AL NACER DE NIÑOS NACIDOS VIVOS EN LOS CINCO AÑOS QUE PRECEDIERON A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023 Y 2024
(Porcentaje)



Nota:

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Información basada en la tarjeta de salud o por información de la madre (mujeres de 15 a 49 años de edad).

Cuadro base: Cuadro 9.2 del informe Principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.


VACUNACIÓN EN NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD

Según Esquema de Vacunación NTS N°141-MINSA/2018/DGIESP

En el año 2024, el porcentaje de niños menores de 36 meses de edad con todas las vacunas completas para su edad alcanzó un 65,0%. En comparación al año 2023 se observa una tendencia al incremento.

Considerando la tercera dosis, más del 85,0% de niños menores de 36 meses fueron protegidos con la Pentavalente el 85,1% y con la Polio el 87,1%. El 88,8% de niños recibieron la vacuna Antisarampionosa.

PERÚ: NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE EDAD CON VACUNAS DE ACUERDO A SU EDAD,
SEGÚN TIPO DE VACUNA RECIBIDA, 2023 Y 2024
(Según Esquema de Vacunación N°141-MINSA/2018/DGIESP)
(Porcentaje)



1/ "Todas las vacunas" comprende: una dosis de BCG, tres dosis de Pentavalente y tres dosis de la vacuna Anti poliomielítica, dos dosis de Rotavirus, tres dosis de Neumococo, dos dosis de Sarampión paperas y rubeola (SPR), una dosis de refuerzo de DPT y una dosis de refuerzo de Polio, una dosis contra el Sarampión.


Cuadro base: Cuadro 9.10 del Informe principal de la ENDES 2024

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Infección Respiratoria Aguda (IRA)

En el año 2024, el porcentaje de niños con Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) durante las dos semanas precedentes a la encuesta fue de 12,4%, porcentaje que disminuyó, en comparación con el año anterior que fue de 14,9%. Según área de residencia, la prevalencia fue mayor en el área rural (13,4%) en comparación con el área urbana (12,0%).

PERÚ: PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, DURANTE LAS DOS SEMANAS QUE PRECEDIERON LA ENCUESTA, 2023 Y 2024
(Porcentaje)



Nota:


Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).
Cuadro 9.12 del Informe principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)

En el 2024, la prevalencia de diarrea entre niños menores de cinco años de edad alcanzó 11,9%, no se observa diferencia significativa con respecto al 2023. Fue mayor en el área rural en comparación con el área urbana (13,8% y 11,2%, respectivamente).

PERÚ: PREVALENCIA DE DIARREA EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD DURANTE LAS DOS SEMANAS QUE PRECEDIERON LA ENCUESTA, 2023 Y 2024
(Porcentaje)




Nota:

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).
Cuadro base: Cuadro 9.16 del Informe principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

8. Anemia en niños


Según la ENDES, al 43,7% de niños de 6 a 35 meses de edad residentes en Perú, se les detectó anemia en el año 2024; según área de residencia, la anemia fue más frecuente entre niños residentes en el área rural (51,9%) que en el área urbana (40,2%).



Cuadro base: Cuadro 10.14.3 del Informe principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Anemia en mujeres

El 24,6% de las mujeres de 15 a 49 años de edad padecía de algún tipo de anemia; según área de residencia, ambas áreas presentaron el mismo porcentaje (24,6 %).




Nota:
Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).
Cuadro base: Cuadro 10.16 del Informe principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

9. Anemia según NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA

Anemia en niños

Según la ENDES, al 35,3% de niños de 6 a 35 meses de edad residentes en Perú, se les detectó anemia en el año 2024; según área de residencia, la anemia fue más frecuente entre niños residentes en el área rural (44,7%) que en el área urbana (31,2%).



NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024, RM 251-2024-MINSA con la NTS 213-MINSA-DGIESP-2024. El MINSA adopta la actualización de la OMS en la fórmula de ajuste por altitud y punto de corte para niños de 6 a 23 meses.


Cuadro base: Cuadro 10.33 del Informe principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Anemia en mujeres

El 26,0% de las mujeres de 15 a 49 años de edad padecía de algún tipo de anemia; según área de residencia, el porcentaje fue ligeramente mayor en el área rural (26,3%) que en el área urbana (25,9%).

PERÚ: PREVALENCIA DE ANEMIA EN MUJERES DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2023 Y 2024
NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA
 (Porcentaje)



Nota:

NUEVA DIRECTRIZ OMS 2024, RM 251-2024-MINSA con la NTS 213-MINSA-DGIESP-2024.

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).

Cuadro base: Cuadro 10.39 del Informe principal de la ENDES 2024.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

10. Desnutrición crónica

La desnutrición crónica es un indicador del desarrollo del país y su disminución muestra la mejora de la capacidad física, intelectual, emocional y social de los niños. Se determina al comparar la talla del niño con la esperada para su edad y sexo.

De acuerdo con el patrón de la OMS, en el año 2024 la desnutrición crónica afectó al 12,1% de niños menores de cinco años de edad; sin variación significativa si se compara con el año anterior (11,5%).

Según área de residencia, la desnutrición crónica afectó en mayor proporción a niños del área rural (20,9%), es decir, 12,4 puntos porcentuales más que en el área urbana (8,5%).




Cuadro base: Cuadro 10.18.1 del Informe principal de la ENDES 2024.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

11. Formas específicas de evitar el contagio del VIH

En el año 2024, el 4,9% de mujeres entrevistadas manifestó que desconocía alguna forma de prevención de las dos consideradas de importancia programática para evitar el VIH.

Sobre el conocimiento de las formas específicas para evitar el VIH, el 82,7% de entrevistadas se refirió al uso del condón, y el 86,6% de las mujeres respondió “limitar el número de parejas sexuales o mutua fidelidad”.

PERÚ: MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN FORMAS ESPECÍFICAS DE EVITAR EL CONTAGIO, 2023 Y 2024
(Porcentaje)



Nota:

Test de diferencias de medias: * Diferencia significativa ($p < 0.10$) ** Diferencia altamente significativa ($p < 0.05$) *** Diferencia muy altamente significativa ($p < 0.01$).


Cuadro base: Cuadro 11.2 del Informe principal de la ENDES 2023.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

Formas de transmisión del VIH de madre a hijo

Entre las mujeres que identifican las formas de transmisión del VIH de madre a hijo, un 62,0% mencionó que puede ocurrir durante el embarazo o parto; un 23,6% refirió que puede darse con la lactancia. Si se compara con el año anterior, se observa una ligera disminución en ambas formas de transmisión del VIH de madre a hijo.

PERÚ: MUJERES EN EDAD FÉRTIL DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD, SEGÚN FORMAS DE TRANSMISIÓN DEL VIH DE MADRE A HIJO, 2023 Y 2024
(Porcentaje)




Cuadro base: Cuadro 11.4 del Informe principal de la ENDES 2024.


Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

12. Violencia contra Mujeres y Niños

El 52,0% de las mujeres alguna vez unidas sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero. Entre las formas de violencia, la psicológica y/o verbal fue mayor (48,4%), la violencia física alcanzó el 25,5% y la violencia sexual el 5,6%. En comparación con el año anterior, la violencia física y sexual no se observa mayores diferencias.




En los últimos 12 meses, el 7,5% de las mujeres sufrieron violencia física y/o sexual ejercida por el esposo o compañero, respuesta que no tiene diferencias significativas respecto al año 2023 (8,3%). Entre estas formas de violencia, destaca la violencia física (7,0%). La violencia sexual es menos declarada (1,7%).



Violencia a niños

Entre las formas para corregir a sus hijos de 1 a 5 años de edad, tanto el padre como la madre, según la respuesta de las entrevistadas, tienen mayor propensión a usar la reprimenda verbal (57,5% y 59,3%, respectivamente); le sigue, hablar con él o ella y explicar su conducta; 51,7% en el padre y 50,7% en la madre.

PERÚ: PRINCIPALES FORMAS QUE UTILIZAN EL PADRE Y LA MADRE CUANDO CORRIGEN A SUS HIJOS DE 1 A 5 AÑOS DE EDAD, 2024
(Porcentaje)



Nota:

Mujeres de 15 a 49 años de edad que han sido seleccionadas para la encuesta.

Cuadro base: Cuadro 12.20 y cuadro 12.21 del Informe principal de la ENDES 2024.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

