

REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS

REGIÓN SELVA

Del 27 de mayo al 02 junio del 2025

**Subdirección de Predicción Agrometeorológica-SPA
Dirección de Agrometeorología-DAM**

Presentación

El Senamhi brinda a productores, tomadores de decisiones, planificadores, medios de comunicación y a la población en general, una síntesis útil y oportuna del monitoreo de cultivos a través del "Reporte agrometeorológico de impactos" a nivel nacional. El Senamhi actualiza esta información semanalmente.

TOMAR EN CUENTA

TIEMPO:

Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

FENOLOGÍA:

Son los diferentes estados de crecimiento y desarrollo de un cultivo. La fenología es importante para la planificación y manejo de prácticas como el manejo de riego, poda, fertilización, control fitosanitario, entre otras.

CLIMA:

Refleja las mismas condiciones atmosféricas instantáneas en meses, años y décadas.

ANOMALÍA MENSUAL:

Es la diferencia entre un valor promedio mensual y su respectiva normal climática normal promediada en 30 años.




SUSCRIBETE AL "REPORTE AGROMETEOROLÓGICO DE IMPACTOS":

ingresa al siguiente link para mas información : https://docs.google.com/forms/d/1Cs8_P0a_cKBemFKnLUr2I-wfwzmjF8lxd_BAE4g4mqQ/edit ó escanea el código "QR"

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

LORETO

En el ámbito de la estación Maniti, las temperaturas diurnas de 30.4 °C y nocturnas de 24.2 °C, junto con precipitaciones acumuladas de 119.2 mm, favorecieron las plantaciones de cacao de la variedad CCN-51, que continuaron su proceso de maduración, mostrando un buen desarrollo.




Estación Maniti, cultivo de cacao en maduración

MANITÍ																										
MONITOREO DEL CULTIVO DE CACAO																										
ESTACIÓN MANITÍ: FASES FENOLÓGICAS DE CACAO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMÁTICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO					
		FASES	INICIO	FINAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta		
MANITI (Cultivo de cacao, variedad CCN-51, Fecha de siembra: 15-06-2023)	Localidad de Santa Cecilia (Río Maniti, altitud 125msnm)	Reposo vegetativo																			18.0	21.0	32.0	35.0		
		Botón Floral																			18.0	21.0	32.0	35.0		
		Floración																			18.0	21.0	32.0	35.0		
		Fructificación																			18.0	21.0	32.0	35.0		
		Maduración	15/4/25															30.4	24.2	119.2	27.3	18.0	21.0	32.0	35.0	

CACAO

LORETO

En el ámbito de la Estación Mazán, las plantaciones de Pijuayo continuaron en inflorescencia con estado bueno. Durante el periodo las condiciones ambientales continuaron favorables con temperaturas máximas y mínimas entre (30.4°C y 24.3°C) con precipitaciones de 90.5 mm, que promovieron el avance y desarrollo del cultivo con normalidad.




Estación Mazán, cultivo de pijuayo en inflorescencia

MAZAN																									
MONITOREO DEL CULTIVO DE PIJUAYO																									
ESTACIÓN MAZAN: FASES FENOLÓGICAS DEL PIJUAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med.	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
MAZAN (Cultivo de pijuayo, variedad rojo, Fecha de siembra: 05-01-2016)	Localidad de Mazán (rio Mazán. Altitud 103 msnm)	Reposo vegetativo	01/01/25	08/04/25													29.60	23.70	173.60	26.70	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Espata	09/04/25	04/05/25													31.70	24.40	31.5	28.10	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Inflorescencia	05/05/25														30.4	24.3	90.5	27.4	14.0	24.0	28.0	35.0	
		Floración																			14.0	24.0	28.0	35.0	
		Fructificación																			14.0	24.0	28.0	35.0	
		Maduración																			14.0	24.0	28.0	35.0	

PIJUAYO

LORETO

En la estación San Roque, se registró temperaturas máximas y mínimas promedio entre 31.2°C y 23.1°C (entre sus normales) con lluvias (66.4 mm). Condiciones climáticas que continuaron favorables para el cultivo de plátano var. Bellaco que se encontró en fructificación con estado bueno.



Estación San Roque, cultivo de plátano


SAN ROQUE
MONITOREO DEL CULTIVO DE PLÁTANO
ESTACIÓN SAN ROQUE: FASES FENOLÓGICAS DEL PLÁTANO

ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA																CONDICIONES CLIMATICAS				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES FENOLÓGICAS	INICIO	FINAL	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	T° Max.	T° Min.	Pp.	T°Med	Tc baja	Top-	Top+	Tc alta	
SAN ROQUE (Cultivo de plátano, variedad bellaco. Fecha de siembra: 15-05-2023)	Estación Experimental San Roque-INIA (Altitud 98msnm)	Retoño	22/05/23	30/09/23													31.5	22.9	154.9	27.2	15.0	20.0	32.0	35.0	
		Crecimiento vegetativo	01/10/23	28/01/24														32.2	23.1	113.2	27.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Inflorescencia	29/01/24															34.0	23.4	0.1	28.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Floración																35.2	24.2	17.5	29.7	15.0	20.0	32.0	35.0
		Fructificación	16/09/24															31.2	23.1	66.4	27.2	15.0	20.0	32.0	35.0
		Maduración																				15.0	20.0	32.0	35.0

PLÁTANO

SAN MARTÍN

En la estación Pacayzapa, las condiciones climáticas se mantuvieron favorables para las plantaciones de café variedad Catimor, las cuales continuaron en maduración con estado bueno. Este desarrollo ha sido favorecido por las temperaturas máximas entre 34°C y 26.8°C; mínima 20°C y 16.8°C. Además de escasas lluvias propias de la temporada. Sin embargo, se mantiene una alta incidencia de roya y ojo de pollo en variedades susceptibles; en otras zonas aledañas y de baja altitud continúan realizando la continuidad de cosechas.




Estación de Pacayzapa, cultivo de café

MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO

MONITOREO CAFÉ ZONA ALTO MAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				EQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TMA	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Talta	
Pacayzapa (Cultivo de café, variedad catimor, sembrado el 20/01/2022)	Alto Mayo (altitud de la estación 830 m, zona baja)	REPOSO VEGETATIVO																			10.0	18.0	22.0	30.0	
		HINCHAZÓN DE YEMAS	1/07/2024	7/08/2024														31.3	24.4	17.4	7.7	10.0	18.0	22.0	30.0
		BOTÓN FLORAL	8/08/2024	15/08/2024														31.6	24.5	17.4	24.5	10.0	18.0	22.0	30.0
		FLORACIÓN	16/08/2024	9/09/2024														33.1	25.1	17.0	2.4	10.0	18.0	22.0	30.0
		FRUCTIFICACIÓN	10/09/2024	5/01/2025														30.7	25.3	19.8	21.7	10.0	18.0	22.0	30.0
		MADURACIÓN	6/01/25														30.5	44.8	59.0	17.0	10.0	18.0	22.0	30.0	

SAN MARTÍN

En la zona de Pachiza, las condiciones climáticas fueron favorables para las plantaciones de cacao de la variedad CCN-51, las cuales se encontraron en maduración con un estado bueno. Durante la semana, las temperaturas oscilaron entre 36°C y 30°C en la máxima y 21°C y 19°C en la mínima, aunadas de lluvias 188.8 (sobre sus normales para su temporada), condiciones que favorecieron el desarrollo de granos. Adicionalmente, se continua con las cosechas selectivas.



Estación de Pachiza, cultivo de cacao en maduración

MONITOREO CACAO ZONA HUALLAGA CENTRAL


ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO			
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	TcBaja	Top-	Topt	Top+
Pachiza	Huallaga Central	REPOSO VEGETATIVO															35.7	27.9	20.1	40.8	15.0	23.0	25.0	32.0
		BOTÓN FLORAL	14/01/2025	23/01/2025													36.1	28.1	20.0	47.8	15.0	23.0	25.0	32.0
		FLORACIÓN	24/01/2025	2/02/2025													35.5	27.9	20.2	51.2	15.0	23.0	25.0	32.0
		FRUCTIFICACIÓN	3/02/2025	02/02/2025													35.5	27.8	20.0	45.0	15.0	23.0	25.0	32.0
		MADURACIÓN	03/05/2025														33.5	26.8	20.1	92.0	15.0	23.0	25.0	32.0



CACAO

SAN MARTÍN

En la estación Moyobamba (Alto Mayo), el cultivo de arroz, variedad Valor, sembrado el 12 de abril mediante trasplante, presenta estado bueno y continuo en la fase de elongación de tallo. Las condiciones climáticas registran temperaturas máximas de 31.6°C y 24.2°C, mínimas de 21.2°C y 17.8 °C; así como precipitaciones, aunadas de riegos complementarios contribuyeron al adecuado desarrollo del cultivo.




Cultivo de arroz en elongación de tallo en Moyobamba

MONITOREO ARROZ VALLE DEL ALTO MAYO																									
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbaja	Top-	Top+	Tcalta	
Moyobamba	Alto Mayo (zna productor a, altitud 860 m, clima templado)	EMERGENCIA																			10.0	20.0	35.0	45.0	
		PLÁNTULA	12/04/2025	30/04/2025														29.0	24.7	20.4	73.2	16.0	25.0	28.0	35.0
		MACOLLAJE	1/05/2025	23/05/2025														28.9	24.3	19.6	1.1	16.0	25.0	28.0	35.0
		ELONGACIÓN DEL TALLO	24/05/2025															28.5	24.2	19.8	22.1	16.0	25.0	28.0	35.0
		INICIO DE PANOJA																				12.0	30.0	31.0	45.0
		DESARROLLO DE PANOJA																				16.0	25.0	31.0	33.0
		FLORACIÓN																				15.0	20.0	25.0	30.0
		MADURACIÓN LECHOSA																				22.0	30.0	33.0	35.0
		MADURACIÓN PASTOSA																				22.0	30.0	33.0	35.0
		MADURACIÓN CÓRNEA																				22.0	30.0	33.0	35.0

ARROZ

SAN MARTÍN

En la estación La Unión, el cultivo de maíz amarillo duro, variedad Atlas 777, sembrado el 25 de marzo bajo condiciones de secano, continua en la fase de maduración lechosa con un estado regular. Esto se debe a escasa ocurrencia de lluvias que generan un escaso crecimiento vegetativo y reproductivo, además temperaturas máximas entre cálidas a normales 36.8°C a 27.4°C y mínimas de 23.4°C a 19.8°C.



Estación de La Unión, cultivo de maíz

MONITOREO MAÍZ AMARILLO DURO VALLE DEL BIAVO																										
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA															CLIMA				REQUERIMIENTO TÉRMICO				REQUERIMIENTO AGUA	
		FASES	INICIO	FINAL	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	TMAX	TMED	TMIN	PP	Tcbajas	Top-	Top+	Talta	PP POR ETAPA	
La Unión (Valle del Biavo) Maíz atlas 777 siembra 25/03/2025	Huallaga Central	EMERGENCIA	25/03/2025	31/03/2025																		10.0	18.0	21.0	35.0	25 mm
		APARICIÓN DE HOJAS	1/04/2025	6/05/2025														34.5	28.8	23.0	11.2	10.0	20.0	33.0	35.0	115 mm
		PANOJA	7/05/2025	16/05/2025														33.1	27.7	22.3	7.8	10.0	25.0	33.0	35.0	23 mm
		ESPIGA	17/05/2025	25/05/2025														34.3	27.9	21.4	4.9	10.0	25.0	33.0	35.0	14 mm
		MADURACIÓN LECHOSA	26/05/2025															33.3	27.9	22.5	3.5	10.0	25.0	33.0	35.0	34 mm
		MADURACIÓN PASTOSA																					10.0	25.0	33.0	35.0
		MADURACIÓN CÓRNEA																				10.0	25.0	33.0	35.0	





MAIZ

JUNÍN

En la estación de Pichanaki, las plantaciones de cacao de la variedad CCN-51 continuaron en fase de fructificación, mostrando un buen estado general. Este comportamiento se atribuye a temperaturas máximas y mínimas dentro de los rangos óptimos para el cultivo, registrándose 32 °C en la máxima y 20.8 °C en la mínima, además de precipitaciones que favorecieron el desarrollo de las mazorcas. En contraste, en los cafetales de la variedad Catuay, estas mismas condiciones han acelerado el proceso de fructificación, manteniéndose también en buen estado.



Cultivo de café en fructificación



Cultivo de cacao en fructificación

MONITOREO CAFÉ VAR. CATUAY - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2025-2026																
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic	TMAX	TMIN	TMEDIA	PP
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	HICHAZON DE YEMAS											31.4	21.5	26.5	381.1
		BOTON FLORAL											31.9	20.5	26.2	17.6
		FLORACION											30.7	21.4	26.0	22.4
		FRUCTIFICACION											32.0	20.8	26.4	39.7

MONITOREO CACAO VAR CCN 51 - ZONA DE PRODUCCION SELVA CENTRAL - 2024-2025															
ESTACIÓN	ZONA	FENOLOGÍA	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dic			
PICHANAKI	SELVA CENTRAL	BOTON FLORAL													
		FLORACION													
		FRUCTIFICACION													