




DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD



# BOLETIN EPIDEMIOLOGICO 2026

SEM:03  
(18 AL 24 DE ENERO )



**DIRECCION REGIONAL DE MOQUEGUA**

M.C. JUAN LUIS HERRERA CHEJO

DIRECTOR DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD MOQUEGUA

**UNIDAD FUNCIONAL DE EPIDEMIOLOGIA**

LIC. CARMEN FARFAN OBANDO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE EPIDEMIOLOGIA

**ÁREA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Lic. OLENKA ALMONTE FLORES

Lic. SUSAN ROQUE IBAÑEZ

Lic. LIZ COAQUIRA SALAS

Lic. LISBETH CHIPANA MAMANI

**RESPONSABLE DE NOTIFICACION Y DISEÑO**

Tec. PEDRO JOSE MAMANI TOLEDO

**CONTENIDO**

- 1.- NOTIFICACION COLECTIVA E INDIVIDUAL
- 2.- TRASMISIBLES.
- 3.- NO TRASMISIBLES.
- 4.- OTROS

# EDITORIAL

## LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE PERSISTE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

En América Latina y el Caribe, la violencia sigue siendo una grave amenaza para la vida, la salud y el bienestar de millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, advierten la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF en una nueva publicación conjunta, *Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: Nuevos datos y soluciones*.

La consecuencia más grave de la violencia es la muerte de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entre 2015 y 2022, 53.318 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de homicidio en la región. Los datos más recientes disponibles, centrados en adolescentes de 15 a 17 años, muestran tendencias contrastantes por sexo. Entre 2021 y 2022, la tasa de homicidios entre adolescentes varones disminuyó de 17,63 a 10,68 muertes por cada 100.000 en América Latina y el Caribe, aunque aún se mantiene en niveles altos. En el mismo periodo, la tasa entre adolescentes mujeres se duplicó, al pasar de 2,13 a 5,1 muertes por cada 100.000.

Los homicidios ocurren en un contexto de aumento de la violencia armada en algunas zonas de la región, asociada al crimen organizado, el fácil acceso a armas de fuego, las desigualdades sociales y normas de género nocivas, que exponen de manera creciente a los y las adolescentes a situaciones de violencia letal. Las diferentes formas de violencia están interconectadas y, en muchos casos, se intensifican con el tiempo. El informe destaca cómo la violencia está presente desde edades muy tempranas. En la región, 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años son objeto de algún tipo de disciplina violenta en el hogar, mientras una de cada cuatro adolescentes de 13 a 17 años experimenta acoso escolar. Casi una de cada cinco mujeres en América Latina y el Caribe reporta haber sufrido violencia sexual antes de los 18 años. Cada vez más, la violencia se manifiesta en entornos digitales, aunque los datos disponibles siguen siendo limitados.

“Cada día, millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe viven expuestos a la violencia en el hogar, en la escuela y en las comunidades con presencia de pandillas. Múltiples lugares y situaciones en la región presentan riesgos y peligros reales para niños o niñas”, señaló **Roberto Benes, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe**. “Sabemos cómo poner fin a la violencia. En América Latina y el Caribe, se requieren políticas públicas sólidas y sostenidas que prevengan y respondan a la violencia en todas sus formas para que cada niño y niña pueda crecer en un entorno seguro”.

“La violencia tiene un impacto profundo y duradero en la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes, y vulnera su derecho a crecer en entornos seguros, en el hogar, la escuela y la comunidad”, afirmó el doctor **Jarbas Barbosa, director de la OPS**. “Los servicios de salud cumplen un rol clave en la prevención y la respuesta: cuando el personal de salud identifica de forma temprana a las personas y grupos en riesgo y brinda apoyo oportuno y de calidad, puede marcar una diferencia real para los sobrevivientes, sus familias y comunidades”.

### REFERENCIA:

Ene 26. La violencia contra niñas, niños y adolescentes persiste en América Latina y el Caribe [Internet]. Paho.org. [citado el 28 de enero de 2026]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/26-1-2026-violencia-contra-ninas-ninos-adolescentes-persiste-america-latina-caribe>

## PRINCIPALES ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

### 1. Notificación Colectiva Semanal De IRAS-EDAS 2026

La Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas incluye el monitoreo sistemático y continuo de la ocurrencia, distribución y factores asociados dentro de una población. Teniendo como objetivo detectar de manera temprana brotes de estas infecciones, identificar tendencias epidemiológicas y evaluar el impacto de las estrategias de prevención y control.

Dentro de la vigilancia Incluye la recopilación de datos sobre los episodios de IRA en el primer y segundo nivel de atención, así como el seguimiento de patrones de transmisión, la identificación de agentes patógenos responsables (virus, bacterias) y la evaluación de factores de riesgo. Permitiendo tomar decisiones informadas sobre políticas de salud pública, mejorar la respuesta ante epidemias y minimizar el impacto en la salud de la población.

El 4 de diciembre del 2025, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) alerto sobre una posible actividad temprana o más intensa de virus respiratorios durante la temporada 2025-26, en comparación a lo registrado en años anteriores. En ese contexto, y de acuerdo con el comportamiento observado a la fecha, la OPS/OMS recomienda a los Estados Miembros a mantenerse vigilantes para ajustar los planes de preparación y organización de los servicios de salud ante la posible ocurrencia de brotes concomitantes de influenza estacional y virus sincitial respiratorio que puedan ocasionar una sobrecarga en el sistema de atención de salud.

#### 1.1. Antecedentes

Considerando el inicio de la temporada de mayor circulación de influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomienda a los Estados Miembros ajustar los planes de preparación y organización de los servicios de salud para una eventual sobrecarga en el sistema sanitario. La OPS/OMS recomienda reforzar la vigilancia de la influenza, el virus sincitial respiratorio (VSR) y el SARS-CoV-2, adoptar las medidas necesarias de prevención y control frente a las infecciones por virus respiratorios, implementar medidas que garanticen el diagnóstico precoz y un manejo clínico adecuado, especialmente entre la población de alto riesgo de presentar enfermedad grave, garantizar la vacunación frente a virus respiratorios, asegurando una alta cobertura de vacunación en grupos de alto riesgo y realizar la adecuada previsión y organización de los servicios de salud, para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas de control y prevención de infecciones, el suministro adecuado de antivirales y equipos de protección personal, así como una adecuada comunicación de riesgo a la población y profesionales de salud.

En el Perú, la circulación de los virus respiratorios se produce durante todo el año, pudiendo ocurrir períodos de actividad viral más de una vez. Esto sugiere un mecanismo complejo para los patrones estacionales observados, debido al cambio climático, el fenómeno del niño y sus consecuencias, así como, la diversidad de regiones presentes en nuestro territorio.

#### 1.2. Situación actual:


En los últimos tres años, la región Moquegua ha reportado los siguientes episodios de Infecciones Respiratorias Agudas en menores de 5 años: en el año 2022 se registraron 13,671 episodios; en 2023, 17,812 episodios; y en 2024, 14,166 episodios. En el año 2025 se tuvo 13269 episodios. Para el año 2026 en la **Semana Epidemiológica S.E. 03 sea notificado 149 episodios.**

#### 1.3. Casos De IRAS De La Región Salud Moquegua

Durante la **semana epidemiológica N°03 del año 2026**, se registraron **149** episodios de Infecciones Respiratorias Agudas (**IRAS**) en la Región de Moquegua, lo cual representa un ligero aumento de episodios en comparación a la **S.E. 02** en el año **2026 con 142** episodios reportados la semana anterior.


El reporte por provincias, distribuido de la siguiente manera: Provincia de Mariscal Nieto **65** episodios, Provincia de Ilo con **65** episodios y Provincia General Sánchez Cerro con **19** episodios de IRAS. Tiene un ligero aumento en la incidencia de casos podría estar relacionado con diversos factores, siendo uno de los principales el cambio climático, que está alterando los patrones estacionales y favoreciendo condiciones ambientales propensas para la propagación de enfermedades respiratorias. En particular, las variaciones de temperatura, las lluvias intensas y la humedad pueden aumentar la vulnerabilidad de la población a infecciones respiratorias, especialmente en grupos más susceptibles como niños y adultos mayores.

**Gráfico 01: Comparativo de Iras en menores de 5 años Región Moquegua 2024-2026**




Fuente: Noti web UFE

**Gráfico 02: Casos de IRAS en menores de 5 años según grupo de Edad**



Fuente: Noti web UFE

**Gráfico 03: Canal Endémico Región Moquegua**




FUENTE: Notiweb UFE

En la **Semana Epidemiológica N° 03**, se reportaron **149** episodios de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), lo que refleja que hay un ligero aumento de episodios en comparación con la **SE. 02**, que registró **142** episodios. A pesar de esta variación, la situación se mantiene dentro de los parámetros de Zona de Éxito, siendo este comportamiento probablemente influenciado por las condiciones climáticas asociadas a la temporada de bajas temperaturas en la región.


### 1.4. PROVINCIA MARISCAL NIETO

**Grafico 04: Casos de IRAS en menores de 5 años según grupo de Edad de la Provincia Mariscal Nieto**



FUENTE: Noti web UFE

**Gráfico 05: Canal Endémico Iras menores de 5 años Provincia Mariscal Nieto**




FUENTE: Noti web UFE

En el año 2026, Semana Epidemiológica (SE) N.º 03 en la provincia de Mariscal Nieto se notificaron **65 episodios** de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), lo que representa un ligero aumento de episodios en comparación a la **S.E. N° 02 con 58** episodios registrados. Esta cifra sugiere una tendencia estable en la incidencia de IRAs. No obstante, el número de casos se mantiene dentro del rango esperado, considerando registros de semanas previas lo que evidencia una circulación persistente de agentes etiológicos respiratorios en la comunidad. Es necesario continuar con la vigilancia activa para detectar posibles repuntes y fortalecer las acciones de prevención y control. Los establecimientos de salud con mayor número de notificaciones fueron el Hospital II Moquegua con **19 episodios** y seguido el Hospital Regional Moquegua con **15 episodios**; posicionándose como los principales centros de detección y notificación durante este periodo. A pesar de la variabilidad semanal, los niveles actuales de incidencia se mantienen dentro de lo esperado para la temporada, por lo que la provincia se encuentra en una zona de “**Éxito**”, donde la situación permanece bajo control. Sin embargo, se recomienda mantener una vigilancia activa y oportuna, con el fin de monitorear posibles cambios en la tendencia de los casos y evitar incrementos que pudieran comprometer la capacidad de respuesta del sistema de salud.


### 1.5. PROVINCIA ILO

**Grafico 06: Casos de IRAS en menores de 5 años según grupo de Edad Provincia de Ilo**



FUENTE: Notiweb UFE

**Gráfico 07: Canal Endémico Iras menores de 5 años Provincia Provincia Ilo**



FUENTE: Notiweb UFE

En la provincia de Ilo, durante la Semana Epidemiológica (SE) 03, se notificaron 65 episodios de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), lo que representa una ligera disminución en comparación en la **S.E. 02 con 73** episodios reportados. En la presente semana,

los establecimientos con el mayor número de casos fueron el Hospital SPCC Ilo **18** episodios, Hospital II Ilo con **17** episodios El patrón epidemiológico observado sugiere que la provincia podría estar experimentando un ciclo intermitente de alta incidencia, con picos de transmisión en momentos específicos, lo cual podría estar relacionado con el cambio de estación. Al encontrarse en una zona considerada de "Éxito", este comportamiento resalta la necesidad de continuar a cabo con la evaluación exhaustiva de las posibles causas subyacentes, incluyendo factores estacionales, epidemiológicos o comportamentales, con el fin de implementar medidas de control adecuadas y oportunas que mitiguen el impacto de estas infecciones.


### 1.6. PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO

Grafico 08: Casos de IRAS en menores de 5 años según grupo de Edad Provincia Sanches Cerro



FUENTE: Notiweb UFE


Gráfico 09: Canal Endémico Iras menores de 5 años Provincia Sanchez Cerro



FUENTE: Notiweb UFE

En la provincia de General Sánchez Cerro, durante la Semana Epidemiológica (SE) 03 se notificaron **19** episodios de IRAS, lo que representa un ligero aumento en el año **2026** con a la S.E. N°03 con 11 episodios registrados. Los establecimientos con el mayor número de episodios en la presente semana fueron el C. S Ichuña con 04 episodios y seguida con C.S. Omate con 03. Este patrón de fluctuación en los episodios resalta la importancia de un monitoreo continuo y de una respuesta rápida ante posibles aumentos en la incidencia, considerando las variaciones estacionales y la capacidad de los establecimientos para manejar la carga de casos. Sin embargo, a pesar del número de episodios registrados como provincia se encuentra en **zona de Seguridad**, sin alcanzar los umbrales críticos que indicaría un brote epidémico masivo. Este patrón resalta la necesidad de realizar una evaluación más detallada de las posibles causas subyacentes, como factores estacionales, epidemiológicos o de comportamiento social, para implementar medidas de control adecuadas y oportunas.

Grafico N° 10: Tasa de Razón de episodios de Infecciones Respiratorias Agudas en <5 años de la Región Moquegua, 2022-2026



FUENTE: Notiweb UFE

Para el año **2026** se notificó **418 episodios** en la **S.E. 03**, la región de Moquegua ha notificado un total de 149 episodios de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños menores de 5 años, lo que representa una tasa de incidencia **de 33.13** episodios por cada 1,000


niños en este grupo etario. Al comparar con el mismo periodo del año 2025, cuando se reportaron 13269 episodios, se observa una disminución absoluta de 897 episodios, lo que representa una reducción en la incidencia de IRA en la población infantil menor de 5

años. Esta tendencia descendente podría estar relacionada con intervenciones preventivas, cambios en factores ambientales o comportamientos de la población, y amerita un análisis más profundo para confirmar su sostenibilidad y causas subyacentes.

## 2. SITUACIÓN DE LAS NEUMONÍAS


### 2.1. Situación de las neumonías < 5 años Region Moquegua

Gráfico 11: Casos de Neumonías en menores de 5 años según grupo de Edad 5 años Region Moquegua



FUENTE: Notiweb - UFE

Gráfico 12: Canal Endémico de Neumonías menores de 5 años Region Moquegua



FUENTE: Notiweb-UFE


Durante la **Semana Epidemiológica (SE) 03** en el año 2026, se reportó 00 episodios. En la S.E. **02** se reportó 02 caso. Teniéndose en total el acumulado de 03 episodios de neumonía en menores de 5 años en lo que va del año.

Actualmente, la región se encuentra en la **zona de Alarma** dentro del canal endémico, lo que indica un incremento en los menores de 5 años.

Es esencial que se realice un seguimiento continuo de los casos y que se refuercen las estrategias de prevención y control, tales como la promoción de la vacunación, mejora en las condiciones de higiene y el acceso oportuno a atención médica. Además, se debe intensificar la vigilancia epidemiológica para detectar posibles brotes y minimizar la transmisión de neumonía en este grupo de alto riesgo.


### 2.2. Situación de las neumonías > a 60 año

Gráfico 13: Neumonías en Mayores de 60 años según grupo de Edad Region Moquegua



FUENTE: Notiweb - UFE

Gráfico 14: Canal Endémico Neumonías Mayores 60 años Region Moquegua



FUENTE: Notiweb - UFE

Durante la **Semana Epidemiológica N° 03** del año **2026**, se notificaron **06** episodios de neumonía en adultos mayores en la Región Moquegua, distribuidos de la siguiente manera: Hospital Regional Moquegua 03 episodios, lo que resalta la importancia de continuar fortaleciendo las acciones preventivas y de promoción de la salud en todos los establecimientos de salud, con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones graves en esta población vulnerable.

Actualmente, la provincia se encuentra en **zona de Alarma** a nivel regional, lo que representa un incremento en la incidencia de neumonía en adultos mayores en comparación con semanas epidemiológicas previas, como la SE 27, SE 29, SE 31, SE 33 y SE 35,

en las cuales se reportaron hasta 12 casos. En el año 2025. Ante este contexto, es fundamental que las autoridades de salud pública, en coordinación con los servicios de salud y la comunidad, continúen implementando intervenciones eficaces y oportunas de control y prevención. La vigilancia epidemiológica activa, junto con el fortalecimiento de estrategias como la inmunización contra neumococo e influenza, así como la promoción de estilos de vida saludables, son medidas clave para mitigar el impacto de esta enfermedad en los adultos mayores y reducir la morbilidad y mortalidad asociadas a las infecciones respiratorias en este grupo de alto riesgo.

### 2.3. Fallecidos por neumonía menores de 5 años

Durante la semana epidemiológica N° 03 del año 2026, no se han notificado casos de fallecidos por neumonía, lo que indica una situación alentadora en términos de mortalidad asociada a esta enfermedad respiratoria. Un análisis retrospectivo revela un panorama variado en años anteriores:

En el año 2024, 2023, 2022, 2021 y 2020 no se notificaron casos de mortalidad.

- En el año 2017, se notificaron cuatro casos de fallecimientos en Moquegua, tres de ellos relacionados con neumonía y uno causado por una complicación de Pertussis.
- En el año 2016, se registró un caso de mortalidad por neumonía en San Cristóbal.
- No hubo mortalidad por neumonía en los años 2015 y 2014.
- En el año 2013, se reportaron dos casos de fallecidos por neumonía en la provincia de Ilo.
- En el año 2012, se notificaron dos casos de fallecidos por neumonía, uno en el distrito de Cuchumbaya y otro en el distrito de Ilo y en el año 2011, se registraron dos casos de fallecidos por neumonía, uno en el distrito de Cuchumbaya y otro en el distrito de Ilo.

Este análisis histórico muestra una tendencia variable en la mortalidad por neumonía en la región, con años con reportes de fallecimientos y otros años sin casos registrados. La información detallada sobre la mortalidad por neumonía y otras enfermedades respiratorias proporciona una visión más completa de la situación epidemiológica en la Región, lo que puede ser útil para la planificación de políticas de salud y la implementación de medidas preventivas.

### 2.4. Fallecidos por neumonía 60 años

Hasta la fecha correspondiente a la Semana Epidemiológica N°03 se notificados 01 muerto por neumonía en adultos mayores de 60 años, notificados por el Hospital Regional Moquegua 01 para el año 2026. En año 2025 se tuvo un total de 61 casos, Es importante destacar que este patrón de mortalidad debe ser monitoreado de cerca para identificar posibles factores de riesgo asociados y evaluar la efectividad de las intervenciones preventivas y de tratamiento en esta población vulnerable.

### 3. Notificación Colectiva Semanal de EDAS

#### 3.1. Antecedentes

Las enfermedades diarreicas son la tercera causa de muerte en niños menores de 5 años: cada año mueren 443 832. La diarrea puede durar varios días y dejar el cuerpo sin el agua y las sales que necesita para vivir. En el pasado, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran, en la mayoría de casos, las principales causas de muerte por diarrea. En la actualidad es probable que otras causas, como las infecciones bacterianas septicémicas, sean responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con la diarrea.


En el mundo hay 780 millones de personas que carecen de acceso a suministros mejorados de agua potable y 2 500 millones de personas que no cuentan con servicios de saneamiento mejorado. La diarrea causada por infecciones es frecuente en los países en desarrollo.

#### 3.2. Situación Actual

En los últimos tres años, la región Moquegua ha reportado los siguientes episodios de Enfermedades Diarreicas Agudas en la población total: en el año 2022 se registraron 6,594 episodios; en 2023, 11,957 episodios; y en 2024, 12,025 episodios; es importante señalar que, durante la SE 39 del 2024, se produjo un brote de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), lo que generó un incremento en los episodios de EDA. En el año 2025, se tuvo 11313 episodio. Para el **año 2026** en la Semana Epidemiológica N°03 sea notificado **646 episodios**.

#### 3.3. Casos de EDAS de la Región Salud Moquegua

Gráfico 15: Casos de EDAS Totales Region Moquegua




FUENTE: Notiweb - UFE

Gráfico 16: Casos de EDAS según Grupo de Edad Región Moquegua



FUENTE: Notiweb - UFE



Durante la Semana Epidemiológica (SE) 03 del año 2026, se notificaron 199 episodios de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en la región Moquegua, para la S.E. N°02 se notificó 211 episodios. El año 2025 en la SE 53 se notificaron 218 episodios. Esta estabilidad sugiere una posible circulación persistente de agentes etiológicos asociados a las EDAs, especialmente en contextos donde las condiciones sanitarias o climáticas favorecen su transmisión. Desde una perspectiva epidemiológica, esta tendencia debe ser monitoreada cuidadosamente para identificar posibles brotes focalizados, especialmente si se observa una concentración de casos en determinados grupos etarios, localidades o establecimientos de salud.


La distribución de los casos por provincia fue la siguiente: Provincia Mariscal Nieto: **74 episodios**, Provincia de Ilo: **86 episodios** y Provincia General Sánchez Cerro: **39 episodios**.

Esta distribución evidencia que la provincia de Ilo concentra la mayor carga de casos de EDAs, por lo que resulta prioritario focalizar acciones de vigilancia, promoción de la salud y control en esta jurisdicción. Asimismo, se recomienda fortalecer el monitoreo en las provincias restantes para evitar posibles brotes.

Sin embargo, a pesar del número de episodios registrados como región se encuentra en **Zona de Éxito**, sin alcanzar los umbrales críticos que indicaría un brote epidémico masivo.


### 3.4. PROVINCIA MARISCAL NIETO

Gráfico 18: Casos de Edas Totales según grupo de Edad Provincia Mariscal Nieto



FUENTE: Notiweb-UFE

Gráfico 19: Canal Endémico de Edas Totales Provincia Mariscal Nieto




FUENTE: Notiweb-UFE

En la **Provincia de Mariscal Nieto**, durante la Semana Epidemiológica (SE) 03, se notificaron **74 episodios** de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), lo que representa una ligera disminución **29 episodios** en comparación. El año **2026** reportados en la SE. 02 con 103 episodios. Los establecimientos con el mayor número de casos notificados fueron: el Hospital Regional Moquegua con 32 episodios y el Hospital SPCC-Cuajone con 16 episodios. A pesar de la ligera variación, los valores registrados en la SE 02 se mantienen dentro de los rangos observados en los picos anteriores, lo que indica que no se está presentando un brote masivo. La provincia se encuentra en **zona de Seguridad**. Sin embargo, es importante continuar con el monitoreo de la evolución de la incidencia para detectar cualquier posible incremento inesperado y garantizar la implementación oportuna de medidas de control y prevención, con el fin de consolidar los avances y evitar fluctuaciones significativas que puedan afectar la salud pública.


### 3.5. PROVINCIA DE ILO

Gráfico 20: Casos de Edas según grupo de Edad Provincia Ilo



FUENTE: Notiweb - UFE

Gráfico 21: Canal Endémico de EDAS según grupo de Edad Provincia Ilo




FUENTE: Notiweb - UFE

En la **Provincia de Ilo**, durante la Semana Epidemiológica N° 03, se notificaron **86 episodios** de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS), lo que representa un ligero aumento en comparación a la S.E. N° 02 con **75 episodios** reportados. Los establecimientos con mayor número de casos fueron Hospital II Ilo con 36 episodios y el Hospital SPCC Ilo con 15 episodios. A pesar de la disminución observado esta semana, es importante destacar que el pico más alto del año se registró en la SE 21, con 123 episodios en 2025, lo que evidencia una disminución general en la tendencia desde ese punto. No obstante, el reciente incremento podría estar relacionado con factores climáticos, así como con condiciones que favorecen la transmisión, tales como variaciones en las prácticas de higiene, el acceso a agua segura y el saneamiento básico, además de posibles cambios en los

comportamientos de riesgo de la población. Actualmente, la provincia de Ilo se encuentra en **Zona de Seguridad**, lo que implica la necesidad de reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control, especialmente en los grupos vulnerables como niños menores de cinco años y adultos mayores.


### 3.6. PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO

**Grafico 22: Casos de EDAS según grupo de Edad Provincia Sanchez Cerro**



FUENTE: Notiweb - UFE

**Gráfico 23: Canal Endémico de EDAS Totales Provincia Sanchez Cerro**




FUENTE: Notiweb - UFE

En la **Provincia de General Sánchez Cerro**, durante la **Semana Epidemiológica N° 03** en el año 2026, se notificaron 39 episodios de la enfermedad, manteniéndose sin variación en comparación con la S.E. N°02 con 33 episodios notificados. Los establecimientos con mayor número de casos fueron el C.S. Omate con 07 episodios y seguido de C.S. Ichuña con 04 episodios. Según los umbrales establecidos en la vigilancia epidemiológica, la provincia se encuentra actualmente en **Zona de Epidemia**, lo que evidencia una situación de riesgo sanitario que requiere acciones inmediatas y sostenidas. Ante este escenario, se recomienda implementar las siguientes acciones: Fortalecer la vigilancia epidemiológica activa para detectar y responder oportunamente a nuevos casos, capacitar al personal de salud en el abordaje clínico, notificación oportuna y manejo adecuado de pacientes con EDAs, priorizando la rehidratación oral, Intensificar la educación comunitaria enfocada en la promoción de prácticas seguras de higiene, como el lavado correcto de manos y la desinfección del agua para consumo.

### 3.7. FALLECIDOS POR EDAS

La semana epidemiológica **N°03** del año 2026 no se notifica fallecidos por EDAS. Para el año 2022 y 2023 no se han reportado casos fallecidos por EDAS. Sin embargo, en el año 2022, se notificó 01 caso de fallecido en menores de 5 años este evento se presentó en la semana 31 y en mayores de 60 años 00 casos. Del año 2010 al 2022 no se notificó mortalidad por EDA.

**Grafico N° 24: Tasa de Razón de episodios Enfermedades Diarreicas Agudas en la población general de la Región Moquegua, 2022-2026**



FUENTE: Notiweb - UFE

Para el año 2026 se notificó 646 episodios en la **S.E. 03**, con 199 episodios de EDAS de la región Moquegua ha reportado un total de 646 episodios de EDAS lo que corresponde a una tasa de incidencia de 03 episodios por cada 10000 habitantes. Para el año 2025 en la Semana Epidemiológica (**SE**) 53, la región de Moquegua ha reportado un total de **11313** episodios de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), lo que corresponde a una tasa de incidencia de **562** casos por cada 10,000 habitantes. Al comparar esta cifra con los **12025** episodios registrados en el mismo período del año anterior (SE 53 de 2024), se observa una disminución en la incidencia de EDA en la población general. Es relevante señalar que durante la SE 36 de 2024, se produjo un brote de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), lo cual generó un aumento temporal en los episodios de EDA en la región. Este brote puntual debe ser considerado al interpretar los datos de 2024, ya que su impacto contribuyó a un incremento notable en los casos reportados durante esa semana.

## 4. Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles

### 4.1. Antecedentes

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), La vacunación contra el sarampión evitó más de 60 millones de muertes entre 2000 y 2023. A pesar de contar con una vacuna segura y de costo efectivo, se estima que en 2023 hubo 107 500 fallecimientos por sarampión en todo el mundo, la mayoría de ellos en niños menores de cinco años que no estaban vacunados o no habían recibido el esquema completo de vacunación

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y control de Enfermedades, hasta la SE N°51 se han reportado los siguientes casos de Sarampión a nivel mundial: EE. UU 2144 casos y 03 defunciones, México 6213 casos 24 defunciones, Brasil 37 casos, Uruguay 13 casos

### 4.2. Situación Actual

Para el año 2026 se notificaron en la **SE N°03** se descartaron 02 casos de Tos ferina, se confirmó 01 caso de Varicela sin complicaciones.

En los últimos dos años, la región de Moquegua ha reportado diversos casos de enfermedades inmunoprevenibles. A continuación, se detallan los casos notificados: El año 2025: Se descartaron 7 casos de Sarampión, 2 de rubeola, 13 casos de Síndrome de Rubéola congénita, 46 caso de Tos ferina. Confirmándose por laboratorio 37 casos de Tos Ferina y 42 casos de Varicela a nivel regional.

El año 2024: Se notificaron cuatro casos sospechosos de sarampión. Las muestras fueron recolectadas de manera oportuna y, tras los análisis, todos fueron descartados.

**Tabla N° 25: Notificación de casos de Enfermedades inmunoprevenibles de la región Moquegua, Semana Epidemiológica N°01 del año 2026.**

ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA	CONF.	PROB.	DESC.	TOTAL
<b>Sarampión</b>	0	0	0	0
<b>Rubéola</b>	0	0	0	0
<b>Síndrome de Rubéola Congénita</b>	0	0	0	0
<b>Parálisis flácida aguda(PFA)</b>	0	0	0	0
<b>Tos Ferina</b>	0	0	2	2
<b>Difteria</b>	0	0	0	0
<b>Tetanos</b>	0	0	0	0
<b>Varicela Sin complicaciones</b>	1	0	0	1
<b>Varicela Con complicaciones</b>	0	0	0	0

FUENTE: Notiweb

Se presenta la distribución de los casos de enfermedades inmunoprevenibles bajo vigilancia epidemiológica. Esta vigilancia comprende patologías como sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tos ferina, las cuales son de notificación obligatoria debido a su relevancia en salud pública. La información analizada evidencia que los casos sospechosos de estas enfermedades han sido oportunamente investigados y descartados, lo que refleja el adecuado cumplimiento de los protocolos nacionales de vigilancia y control establecidos por el Ministerio de Salud.

En este contexto, la vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunoprevenibles se mantiene activa y continua, abarcando actividades de recolección sistemática de datos, investigación de casos sospechosos y confirmados, identificación de grupos de riesgo, análisis de tendencias e implementación de medidas preventivas y de control. Estas acciones son fundamentales para garantizar la detección oportuna de brotes o incrementos inusuales en la incidencia

En este contexto, la vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunoprevenibles se mantiene activa y continua, abarcando actividades de recolección sistemática de datos, investigación de casos sospechosos y confirmados, identificación de grupos de riesgo, análisis de tendencias e implementación de medidas preventivas y de control. Estas acciones son fundamentales para garantizar la detección oportuna de brotes o incrementos inusuales en la incidencia, contribuyendo a la protección de la salud de la población y al mantenimiento de la eliminación de estas enfermedades en el país.

## 5. Situación Epidemiológica de Dengue Departamento De Moquegua

### 5.1. Antecedentes

Hasta la semana epidemiológica (SE) 50 del año 2025, se reportan en la Región de las Américas un total de 4,362,955 casos sospechosos de dengue (incidencia acumulada de 429 casos por 100,000 hab.). Esta cifra representa una disminución de 67% en comparación con el mismo periodo del 2024 y 9% con respecto al promedio de los últimos 5 años. El gráfico1 muestra la tendencia de los casos sospechosos de dengue a la SE 50


En el Perú, hasta la Semana Epidemiológica (SE) N.º 53, se notificaron 39 211 casos y 56 defunciones, evidenciándose una mayor afectación en la población femenina, que concentró el 51,69 % de los casos. Desde el punto de vista de la distribución, la mayor carga de enfermedad se registró en la región San Martín, con 12 262 casos, seguida de Loreto, que reportó 6 879 casos y 9 defunciones, Cajamarca con 6 347 casos y 3 defunciones, lo que refleja una concentración de casos en regiones de la Amazonía y sierra norte del país

### 5.2. Situación Actual

La tendencia de los casos reportados de dengue en los últimos cinco años, incluyendo casos confirmados y probables, muestra lo siguiente: En 2023, se notificaron 09 casos probables y 12 casos confirmados de dengue importados. En 2024, el acumulado regional fue de 23 casos notificados, de los cuales 12 correspondieron a casos confirmados importados. En 2025, se reportaron 12 casos notificados, de los cuales 03 fueron casos confirmados importados provenientes de los departamentos de Loreto, Madre de Dios y Ucayali.

Estos datos reflejan que la región continúa presentando casos importados de dengue, sin evidencia de transmisión autóctona, lo que resalta la necesidad de mantener vigilancia epidemiológica activa y medidas preventivas orientadas al control del vector y la detección temprana de casos

**Gráfico N° 26: Casos de Dengue en la región Moquegua durante los años 2022 – 2026. SE N° 03**



Fuente: Notiweb

Durante la Semana Epidemiológica (SE) 03 no se notificaron casos de dengue; sin embargo, se vienen desarrollando de manera continua actividades preventivas de vigilancia epidemiológica, como la vigilancia sindrómica febril, a nivel de toda la región, con el objetivo de fortalecer la detección oportuna de casos sospechosos y prevenir la transmisión de la enfermedad.

## 6. CONCLUSIONES

- Para el año 2025, en la región Moquegua se han notificado 11 casos y tres (03) casos confirmados de dengue importados. No se han identificado casos autóctonos, por lo que la región se encuentra clasificada en el Escenario I: área geográfica sin presencia del vector, con o sin condiciones para su desarrollo, con o sin casos importados, pero sin transmisión autóctona de dengue u otras arbovirosis.
- El dengue constituye un problema de salud pública de carácter multifactorial, cuya prevención y control demandan un enfoque epidemiológico integral, interdisciplinario y transectorial, que involucre acciones coordinadas entre los sectores salud, ambiente, educación y gobiernos locales.
- Es fundamental prevenir el silencio epidemiológico, ya que este reduce la percepción de riesgo en la población y limita la detección oportuna de casos. En este contexto, aun considerando fortalecer la educación sanitaria orientada a la eliminación de criaderos del vector.

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE CHAGAS DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


### 1. ANTECEDENTES:

La enfermedad de Chagas es una afección parasitaria, sistémica, crónica, transmitida por vectores y causada por el protozoario *Trypanosoma cruzi*, con una firme vinculación con aspectos socioeconómico-culturales deficitarios, considerándose una enfermedad desatendida. Es una patología endémica en 21 países de las Américas, aunque las migraciones de personas infectadas pueden llevarla a países no endémicos de América y el Mundo. En Perú, se encuentra en zonas cálidas como la selva de Loreto, Ucayali, San Martín, Piura, Cajamarca, Ica y Arequipa. Moquegua logró interrumpir la transmisión vectorial de la milenaria enfermedad de Chagas que afectaba a 8 distritos de esta región y ponía en riesgo a 93 mil pobladores, informó el ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubilluz, quien desde ese lugar entregó junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS)/OPS la certificación de este resultado sanitario.

### 2. SITUACION ACTUAL

La tendencia de los casos reportados de Chagas en los últimos años. En el año 2025 se notificó 01 casos confirmados crónico de Chagas. Para el cierre de este año 2025 se tiene 24 casos notificados y descartados. En el año 2024 se tiene 05 casos confirmados, de los cuales 02 pertenecen a una transmisión congénita y el otro caso notificado por el hospital Essalud II Moquegua, corresponde a un joven de 32 años, siendo un caso de Chagas crónico. No se presentó casos en la **S.E.03**

**Gráfico N°27: Casos de Chagas en la región Moquegua, durante los años 2022-2026. SE N°03**



### 3. Conclusión:

- La búsqueda activa de casos constituye una estrategia epidemiológica fundamental para la detección oportuna de la enfermedad de Chagas, especialmente en poblaciones y áreas de riesgo, permitiendo identificar casos no diagnosticados y reducir la subnotificación.
- La región mantiene vigilancia epidemiológica continua para la detección de casos de enfermedad de Chagas, complementada con la vigilancia entomológica del vector, como componentes esenciales para la prevención, control y reducción del riesgo de transmisión.

## 7. Situación Epidemiológica de Tuberculosis


### 7.1. Antecedentes

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad infecciosa causada por el *Mycobacterium tuberculosis*, que afecta principalmente los pulmones, aunque puede involucrar otros órganos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la TBC es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, especialmente en poblaciones vulnerables. En el Perú, la TBC representa un problema prioritario de salud pública, con mayor prevalencia en áreas urbanas y poblaciones de bajos recursos. Las estrategias nacionales se alinean con el objetivo de la OMS de reducir la incidencia y la mortalidad por TBC a través de la vigilancia activa, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

### 7.2. Situación Actual

En la semana epidemiológica N°03 del año 2026 tenemos 0 casos reportados a la actualidad, que corresponde a 0.00 x cada 120000 hab. El análisis de los casos e incidencia de tuberculosis (TBC) en la región Moquegua revela una tendencia variable durante el periodo 2020-2025. Entre 2020 y 2022, se registra una disminución sostenida en los casos reportados, de 121 a 100, con una incidencia que se reduce de 62.78 a 51.34 por cada 120,000 habitantes. Sin embargo, este descenso debe interpretarse con cautela, ya que corresponde al periodo de la pandemia de COVID-19, durante el cual la priorización del diagnóstico de esta enfermedad pudo haber generado un subregistro de casos de TBC, al asociarse muchas afecciones respiratorias exclusivamente con el COVID-19.


**Gráfico N° 28: Casos reportados e incidencia de tuberculosis de 2020 al 2026, de la Región Moquegua.**



Fuente: SiEpi-TB U. F. Epidemiología Moquegua

En 2023, se observa un incremento significativo, alcanzando 191 casos y una incidencia de 95.18, posiblemente reflejando el restablecimiento de los servicios diagnósticos y una mayor búsqueda activa de casos. En contraste, los datos de 2025, hasta la semana epidemiológica 53 se reportan 187 casos y una incidencia de 92.86. Aunque los datos evidenciaron un incremento, por ello es importante continuar evaluando y tener vigilancia más activa para asegurar que se mantengan los logros alcanzados y se evite cualquier subregistro en los meses siguientes.

Gráfico N° 29: Incidencia de tuberculosis por curso de vida de 2023 al 2026, de la Región Moquegua



Fuente: SiEpi-TB U. F. Epidemiología Moquegua

La incidencia por curso de vida muestra una tendencia decreciente en todos los grupos etarios entre 2023 y 2025. En 2023, los adultos mayores presentaron la mayor incidencia (20.18), seguidos por jóvenes (13.18) y adultos (8.96). En 2024, se observó una reducción en casi todos los grupos, destacando la disminución en jóvenes (7.94) y adultos mayores (12.55). En 2025, la incidencia muestra incremento en comparación con años anteriores. Se observa una incidencia en **adultos mayores (18.28)**, seguido de curso de vida **joven (10.56)**, **adultos (8.59)** y **adolescente (6.83)**, mientras que en niños se han registrado (0.66).

### 7.3. Conclusiones

1. La vigilancia epidemiológica de la tuberculosis en la región Moquegua muestra una reducción en la incidencia durante el período 2020-2021, aunque estos datos deben interpretarse con cautela debido a posibles subregistros ocasionados por la pandemia de COVID-19.
2. En 2023, el aumento en los casos reportados sugiere un restablecimiento de los servicios diagnósticos y una mejora en la detección activa de casos.
3. Los datos preliminares de 2025 indican una disminución de la incidencia en comparación con años anteriores, pero es necesario continuar con la vigilancia para confirmar esta tendencia.
4. La disminución de la incidencia por curso de vida en todos los grupos etarios podría estar relacionada con estrategias de prevención y control efectivas. Sin embargo, es fundamental mantener el monitoreo para evitar posibles rebotes.

### 7.4. Recomendaciones

1. Fortalecer la vigilancia epidemiológica activa en todos los grupos etarios, especialmente en adultos mayores y jóvenes, quienes han presentado mayores incidencias en años anteriores.
2. Mantener y reforzar las estrategias de detección precoz y tratamiento oportuno para garantizar la reducción sostenida de la tuberculosis en la región.
3. Implementar campañas de sensibilización sobre la importancia del diagnóstico temprano y la adherencia al tratamiento, con énfasis en poblaciones vulnerables.
4. Evaluar periódicamente los factores determinantes de la incidencia de tuberculosis para ajustar las estrategias de intervención según las necesidades detectadas.
5. Continuar con la recopilación y análisis de datos en tiempo real para evitar posibles subregistros y mejorar la toma de decisiones en salud pública.

## 8. Situación Epidemiológica de VIH/SIDA

### 8.1. Antecedentes

El VIH/SIDA continúa siendo una preocupación significativa de salud pública a nivel mundial. Según ONUSIDA, en 2022, aproximadamente 39 millones de personas vivían con VIH, con 1.3 millones de nuevas infecciones y 630,000 muertes relacionadas con el SIDA. A pesar de los avances en el tratamiento antirretroviral, persisten desafíos como el estigma, la discriminación y las desigualdades en el acceso a servicios de salud.


En Perú, hasta 2022, se registraron más de 97,000 casos de VIH, de los cuales alrededor del 30% correspondían a pacientes que ya habían desarrollado SIDA. Lima Metropolitana y Callao concentran el 65% de los casos, seguidas por regiones como Loreto, Ucayali y La Libertad. La principal vía de transmisión es sexual (97%), con un incremento notable en la población joven de 15 a 24 años. La cobertura de tratamiento antirretroviral alcanza al 85% de las personas diagnosticadas, pero aún existen desafíos en la identificación temprana y seguimiento de casos.

En 2023, la Dirección Regional de Salud Moquegua informó un incremento de 46 nuevos casos de VIH, con 27 casos en Ilo y 19 en Moquegua. Este aumento es alarmante para la región. Anteriormente, entre 2018 y 2019, se registraron 48 y 50 casos, con una mayor concentración en la provincia de Ilo, representando el 80% de los casos en la región.

### 8.2. Situación Actual

El monitoreo y control del VIH/SIDA en Moquegua se realizan mediante estrategias de vigilancia activa, enfocadas en la identificación temprana y el acceso oportuno a tratamientos.


**Gráfico N°30: Casos de VIH e incidencia de 2021 al 2025\*, de la Región Moquegua.**



Fuente: NotiVIH - U. F. Epidemiología Moquegua

El análisis de los casos de VIH en la región muestra un incremento sostenido entre 2021 y 2024, pasando de 37 casos en 2021 y 2022 a 46 en 2023 y 49 en 2024, con una incidencia que aumentó de 18.94 a 23.62 por cada 120,000 habitantes. Este incremento puede estar relacionado con una mejora en la detección y diagnóstico de la enfermedad, así como con posibles cambios en los factores de riesgo dentro de la población. Sin embargo, en el año 2025 indican una incidencia de 36.75. Es importante interpretar esta cifra con cautela, ya que el año en mención vino con un incremento de actividades correspondientes a la promoción contra el VIH.

**Gráfico N° 31: Casos de infección por VIH notificados según sexo y razón hombre/mujer 2021 al 2026, de la Región Moquegua.**




**Fuente: NotiVIH - U. F. Epidemiología Moquegua**

El análisis de los casos de infección por VIH notificados entre 2021 y 2025 muestra que los hombres presentan consistentemente un mayor número de casos en comparación con las mujeres. Entre 2021 y 2024, la razón hombre/mujer se mantiene en torno a 15%, lo que indica que por cada caso en mujeres hay 15 en hombres. Aunque se observan ligeras variaciones en los valores absolutos, la tendencia general sugiere una afectación predominante en la población masculina.

Para el año 2025, se tiene el reporte de 74 casos. Para el año 2026 no se tiene ningún caso notificado. Se recomienda un monitoreo continuo para evaluar si esta tendencia se mantiene a lo largo del año y analizar las estrategias de prevención y diagnóstico implementadas en la población.

**Gráfico N° 32: Tipo de transmisión sexual en varones de 15 años a más por VIH de 2021 al 2025\*, de la Región Moquegua**



**Fuente: NotiVIH - U. F. Epidemiología Moquegua**

El gráfico de distribución de los casos de infección por VIH en varones de 15 años a más, según tipo de transmisión sexual entre 2021 y 2025, muestra que la mayoría de los casos se atribuyen a transmisión heterosexual (60.0%), seguida de transmisión homosexual (40.0 %). No se registran casos en la categoría bisexual ni en la de transmisión no determinada, lo que indica una clara concentración de los casos en los dos primeros grupos. Estos datos resaltan la importancia de fortalecer la educación sexual, el acceso a métodos de protección y la promoción del diagnóstico temprano en todos los grupos poblacionales, con énfasis en aquellos con mayor incidencia.

### 8.3. Conclusiones

1. El VIH/SIDA sigue siendo una problemática de salud pública relevante en Moquegua, con un incremento notable de casos en 2025 con 74 casos.
2. La concentración de casos en la provincia de Ilo sugiere la necesidad de intervenciones focalizadas en esta área.
3. Es fundamental fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana para controlar la propagación del virus.


### 8.4. Recomendaciones

1. Fortalecer la educación preventiva: Implementar campañas dirigidas a jóvenes, incluyendo información sobre relaciones sexuales seguras y promoción del uso de preservativos.
2. Ampliar el acceso a pruebas rápidas: Incrementar la cobertura en zonas rurales y poblaciones de difícil acceso para garantizar la detección temprana.
3. Mejorar la adherencia al tratamiento: Crear programas de apoyo comunitario y psicológico para pacientes con VIH, promoviendo el cumplimiento del tratamiento.
4. Reducir el estigma: Trabajar con líderes comunitarios y educativos para promover una visión inclusiva y sin discriminación hacia las personas que viven con VIH.

## 9. SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA EN VIOLENCIA FAMILIAR

A nivel de la región Moquegua, la notificación de casos de violencia familiar ha presentado variaciones interanuales. Se evidencia un mayor número de notificaciones en el año 2024, lo cual se atribuye al fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica. Para el período 2025, se notificaron 351 casos a nivel regional; sin embargo, este descenso en la notificación se explica por limitaciones operativas del sistema de vigilancia, principalmente la ausencia de un responsable de epidemiología en el Hospital de Ilo. Asimismo, en la RIS Ilo se produjo la renuncia del personal responsable, y a nivel de la Red Moquegua, a la fecha, aún no se cuenta con un responsable de epidemiología, constituyéndose estos factores en las principales limitantes para una adecuada notificación de casos.


**Gráfico N° 33 Casos de Violencia Familiar por años. Región Moquegua 2022 – 2026 \* SE. 03**



Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica UFE/ REGION MOQUEGUA

Para el año 2026 no se notificó casos. Durante el año 2025, los casos registrados de violencia familiar cerraron en un total de 351 casos, evidenciándose una disminución de 135 casos en comparación con el año anterior. Esta reducción se atribuye principalmente a que, durante dicho periodo, la Red Moquegua no contó con personal de epidemiología, lo que limitó la captación y consolidación de la información.

**Gráfico N° 34 casos notificados de Violencia Familiar, según tipo de violencia, región Moquegua 2022 – 2026 \* hasta la SE. 03**




Fuente: vigilancia epidemiología violencia familiar/UFE

En relación con los casos notificados durante el periodo evaluado, se evidencia que la violencia psicológica fue el tipo de violencia predominante; asimismo, en numerosos casos se registró la ocurrencia simultánea de violencia física y psicológica. Respecto a la violencia sexual, se reportaron casos en los tres distritos, siendo el distrito de Ilo el que concentró el mayor número de notificaciones. De igual forma, los casos de abandono fueron notificados principalmente por la provincia de Ilo, observándose mayor frecuencia en los grupos etarios comprendidos entre los 3 meses y los 29 años.

## 10. SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN ACCIDENTES DE TRANSITO

Los accidentes de tránsito causan 1,19 millones de muertes al año, afectan principalmente a usuarios vulnerables y son la principal causa de muerte en jóvenes de 5 a 29 años. La mayoría ocurre en países de ingresos bajos y medios y genera un alto impacto económico (3 % del PIB). A nivel nacional, según la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito (Aviactran) se estimó que 2 985 personas fallecieron por accidentes de tránsito entre enero y octubre de 2025 por causas como exceso de velocidad, imprudencia y deficiencias en infraestructura vial.


**Gráfico N° 35 Número de casos notificados por accidentes de tránsito, Región Moquegua de los 2022 - 2026 hasta la S.E. 03**



Fuente: Notiweb

Durante el año 2026, se viene fortaleciendo la vigilancia epidemiológica de los accidentes de tránsito mediante la articulación interinstitucional con el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y la Unidad Funcional de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres. Hasta la semana epidemiológica (SE) N.º 03 del mes de enero, se han notificado un total de 37 casos de accidentes de tránsito, lo que permite contar con información oportuna para el análisis de la magnitud del evento, la identificación de tendencias.


**Gráfico N° 36 Lesiones por accidente de tránsito según Lesiones por accidente de tránsito según el transcurso del día, región Moquegua 2026\* SE. 03**



Fuente: notiweb

Durante la semana **epidemiológica N° 03** del presente año, los casos de accidentes de tránsito notificados se concentran principalmente en el horario de la tarde, seguido por el horario de la mañana, lo que evidencia una mayor ocurrencia de eventos durante los periodos de mayor flujo vehicular y actividad laboral.

**Gráfico N° 37 Lesiones por accidente de tránsito según condición de egreso, Región Moquegua 2026 hasta SE. 03**



Fuente: Notiweb/emergencias y desastres


Hasta la semana epidemiológica **N° 03** del presente año, la totalidad de los casos notificados de accidentes de tránsito fueron dados de alta, sin registrarse fallecimientos ni secuelas graves en el periodo evaluado. No obstante, durante el año 2025 se presentó un caso grave de alto impacto social, correspondiente a una mujer joven, madre de dos hijos menores, quien fue atropellada en el centro poblado de Chen Chen y que, a la fecha, permanece en estado vegetativo. Este evento evidencia la

severidad potencial de los accidentes de tránsito y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, respuesta oportuna y seguimiento de casos graves.

## 11. SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN DIABETES

A nivel global, la prevalencia de diabetes en adultos (20-79 años) es del 11,1 %, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 9 adultos viviendo con diabetes mellitus. Más del 90 % de estos casos corresponde a diabetes tipo 2. Las proyecciones indican que para 2050 podría haber alrededor de 853 millones de adultos con diabetes si continúan las tendencias actuales de crecimiento.


**Gráfico N ° 38 Casos nuevos o incidentes de Diabetes por año en la Región Moquegua, 2022–2026\* SE.03**



Fuente: sistema de vigilancia en diabetes/Notiweb

Durante el año 2025 se notificaron 100 casos nuevos en la región; sin embargo, esta cifra podría encontrarse subestimada debido a la presencia de subregistro. Esta situación se asocia principalmente a la ausencia de responsables de epidemiología en el hospital de la provincia de Ilo, así como en la Red de Salud Moquegua. Ante esta limitante operativa, la vigilancia epidemiológica se realizó mediante coordinación directa con los establecimientos de salud, lo que permitió mantener la notificación de casos, aunque con restricciones en la oportunidad y exhaustividad de la información. Para la semana epidemiológica 3 se viene notificando un caso nuevo.


**Gráfico N °39 Casos prevalentes de diabetes por año en la región Moquegua, 2022–2026\* S.E. 03**



Fuente: Sistema de vigilancia en diabetes/Notiweb

En relación con los casos prevalentes, hasta el mes de diciembre del año 2025 se notificaron 130 casos a nivel regional. No obstante, esta cifra podría no reflejar la magnitud real del evento, debido a limitaciones en el sistema de vigilancia epidemiológica, asociadas principalmente a la ausencia de responsables de vigilancia epidemiológica en el Hospital de Ilo y en la Red de Salud Moquegua. Se prevé que estas dificultades operativas sean superadas durante el presente año, lo que permitirá fortalecer la vigilancia epidemiológica y contar con un registro oportuno, continuo y de mayor calidad para la adecuada toma de decisiones en salud pública. Para el presente año aún no se registran casos prevalentes.

#### Gráfico N ° 40 Número de casos notificados según curso de vida, Región Moquegua año 2025.



Fuente: Sistema de vigilancia en diabetes/Notiweb

Durante el año 2025, del total de casos notificados, se evidencia que el mayor número de casos corresponde a los cursos de vida adulto y adulto mayor, lo que indica una mayor afectación en estos grupos etarios y resalta la necesidad de fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control dirigidas a esta población.



# MOQUEGUA

2026