



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SENASA
PERU

MANEJO SANITARIO EN CUYES

MVZ. Oyuky Verónica Sánchez Raico

Analista Intermedio en Sanidad Animal

SENASA La Libertad – C.T.D. Santiago de Chuco.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SENASA
PERU

INDICE

1. SALMONELOSIS
2. LINFADENITIS
3. NEUMONIA
4. ENDOPARASITOS
5. ECTOPARASITOS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SENASA
PERU



Salmonelosis

Trasmisión – prevención y control

01

01

Cómo es la Salmonelosis

Salmonelosis

- ✓ Enfermedad altamente contagiosa.
- ✓ Alta morbilidad y mortalidad del 100%
- ✓ Está relacionada con eventos de estrés
- ✓ Deficiencias nutricionales
- ✓ Medio ambiente
- ✓ Variaciones de temperatura y humedad
- ✓ Presencia de roedores y animales silvestres que contaminan alimento e instalaciones





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SENASA
PERU

01

Trasmisión

Salmonelosis

Vía: Oral – Fecal.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SENASA
PERU



01

Prevención y Control

Salmonelosis

- Eliminar a la población afectada.
- Desinfecciones periódicas
- Cuarentena de los animales que se va a ingresar
- Incinerar o enterrar los animales que se mueren.
- Realizar la vacunación.
- Aplicación de vitaminas, probióticos, etc





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SENASA
PERU

Linfadenitis

Trasmisión – signos clínicos

02

02

Cómo afecta la Linfadenitis

Linfadenitis

- Inflamación de los ganglios linfáticos cervicales o inguinales (en forma de abscesos).



02

Transmisión

Linfadenitis

- Es transmitida a nivel percutáneo por heridas, mordeduras, abrasiones en la cavidad bucal y/o conjuntiva; incrementa la susceptibilidad la ingestión de alimento muy fibroso.



02

Signos clínicos

Linfadenitis

- ✓ Fiebre, anorexia, tortícolis (desviación de la cabeza) debido a otitis media o interna.
- ✓ Los cuyes adultos usual mente tienen enfermedades crónicas caracterizadas por aumento de tamaño de los linfonódulos cervicales, generando así abscesos.
- ✓ La bronconeumonía con disnea, flujo en ojos y nariz, y abortos, son otros síntomas secundarios que se presentan.



02

Prevención y control**Linfadenitis**

- ✓ Se debe evitar el empleo de materiales abrasivos en los alimentos o en las camas de los animales.
- ✓ No cortar o drenar los abscesos, dado que los microorganismos que provienen de ellos infectarán a otros animales en la poza.
- ✓ Sacrificar y eliminar los animales que presenten absceso.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SENASA
PERU

Neumonía

Trasmisión
signos clínicos
prevención

03

03

Cómo afecta la neumonía

Neumonía

- ✓ Produce alta mortalidad.
- ✓ Se presenta cuando existen cambios bruscos de temperatura.
- ✓ Normalmente los animales mal alimentados y débiles son los primeros en enfermarse.



03

Transmisión

Neumonía

Se produce horizontalmente, a través de aire, vía aerosol o por el consumo de alimento contaminado, pero principalmente por contacto con animales enfermos y sus secreciones



03

Signos clínicos

Neumonía

- ✓ Normalmente producen muerte súbita sin signos clínicos
- ✓ Fiebre
- ✓ mucosas cianóticas
- ✓ Decaimiento.
- ✓ Dificultad respiratoria



03

Prevención y Control

Neumonía

- ✓ Correcto diseño de las instalaciones
- ✓ Registrar temperatura dentro del galpón
- ✓ Cuarentena



04 | Endoparásitos

DISTOMATOSIS HEPATICA

Fasciola Hepática



COCCIDIOSIS

El agente causal es la *Eimeria caviae*, que invade la pared intestinal y ciego



04 | Ectoparásitos

PIOJOS



PULGAS



ACAROS





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

SENASA
— **PERU**

Gracias

Contacto

MVZ. Oyuky Verónica Sánchez Raico

sanchezraicoveronica@gmail.com

Teléfono: 971095817