



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este



Sala Situacional Vigilancia Epidemiológica de ETI-OVR/IRAG

SE 01 - 2026

Oficina de Epidemiología - DIRIS Lima Este.

Lic. Enf. Denisse Cynthia Lobatón Ronco.
Vigilancia Epidemiológica de ETI/OVR/IRAG.
DIRIS Lima Este.



MINSA
DIRIS LIMA ESTE

**¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!**



PERÚ

Ministerio
de Salud


Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este

MINSA
DIRIS LIMA ESTE


¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!

JURISDICCIÓN DE LA DIRIS LIMA ESTE


DISTRITOS





RIS



PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA DIRIS LIMA ESTE POR GRUPO ETARÉO Y SEXO, 2026




POBLACIÓN PADRÓN NOMINAL – INEI 2026 SEGÚN SEXO




¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!

Casos confirmados de virus respiratorios según vigilancia epidemiológica, DIRIS Lima Este – S.E. 01-2026*




En la S.E. 01-2026, la DIRIS Lima Este notificó 6 casos confirmados de virus respiratorios, con predominio de Influenza A (H3N2) (50,0%), seguida de Influenza A no subtipificada (33,3%) e Influenza B (16,7%), evidenciando la circulación activa de Influenza A, con casos aún pendientes de tipificación virológica.

Distribución distrital de casos confirmados de virus respiratorios en la DIRIS Lima Este, S.E. 01-2026*




Durante la S.E. 01-2026, se confirmaron 6 casos de influenza con una distribución focalizada en El Agustino (3), Lurigancho (2) y Chaclacayo (1). La caracterización laboratorial identifica casos de Influenza A (H3N2) e Influenza B; sin embargo, los demás casos de Influenza A (2) aún se encuentran pendientes de tipificación.

Distribución de casos confirmados de virus respiratorios por grupo etario en la DIRIS Lima Este, S.E. 01-2026*




Durante la S.E 01-2026, la vigilancia virológica en la DIRIS Lima Este identificó 6 casos de influenza, con mayor afectación en adultos de 30 a 59 años (50%), asociados principalmente a influenza A, incluyendo el subtipo A(H3N2), así como casos de influenza A aún pendientes de tipificación; el resto de casos se presentó de forma aislada en niños, jóvenes y adultos mayores, lo que refleja una mayor afectación en la población económicamente activa.

Casos confirmados de virus respiratorios por sexo y tipo viral en la DIRIS Lima Este, S.E. 01-2026*




En la S.E 01-2026, la DIRIS Lima Este notificó 6 casos confirmados de influenza, todos en población masculina, con predominio de influenza A, principalmente del subtipo A(H3N2), además de casos de influenza A pendientes de tipificación y un caso de influenza B, evidenciando una circulación activa y focalizada del virus.

Síntomas más frecuentes en casos confirmados de virus respiratorios, DIRIS Lima Este – S.E. 01-2026*



En la S.E 01-2026, los 6 casos confirmados de virus respiratorios notificados en la DIRIS Lima Este, presentaron predominantemente tos y fiebre (100%; 6 casos), seguidos de dificultad respiratoria y dolor de garganta (83,3%; 5 casos), configurando un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda

Virus respiratorios más frecuentes en casos hospitalizados, DIRIS Lima Este – S.E. 01-2026*



Durante la S.E 01-2026, del total de 6 casos confirmados de influenza en la DIRIS Lima Este, 4 requirieron hospitalización, todos asociados a influenza A, correspondiendo 2 casos al subtipo A(H3N2) y 2 a influenza A pendientes de tipificación, lo que evidencia la relevancia clínica de este virus y la necesidad de completar la caracterización virológica para una adecuada evaluación del riesgo.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este

MINSA
DIRIS LIMA ESTE

¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!

Conclusiones

- ❖ Durante la S.E 01-2026, la vigilancia epidemiológica en la DIRIS Lima Este, evidenció la circulación activa de virus respiratorios, confirmándose 6 casos de influenza, con predominio de influenza A, especialmente del subtipo A(H3N2), además de casos de influenza A pendientes de tipificación y un caso de influenza B.
- ❖ La totalidad de los casos correspondió al sexo masculino, lo que sugiere una mayor exposición o riesgo en este grupo poblacional, posiblemente asociado a factores ocupacionales, sociales o de movilidad.
- ❖ El análisis por grupo etario mostró mayor afectación en adultos de 30 a 59 años, población económicamente activa, evidenciando un patrón de transmisión vinculado a actividades laborales y comunitarias.
- ❖ La presentación clínica se caracterizó predominantemente por tos y fiebre en el 100% de los casos, seguidas de dificultad respiratoria y dolor de garganta, compatibles con cuadros de infección respiratoria aguda, con riesgo de progresión a formas graves.
- ❖ Del total de casos confirmados, cuatro requirieron hospitalización, todos asociados a influenza A, lo que confirma su mayor impacto clínico y la necesidad de vigilancia estrecha ante la circulación de subtipos con potencial de severidad.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este

MINSA
DIRIS LIMA ESTE

¡EL PERÚ A TODA
MÁQUINA!

Recomendaciones

- ❖ Fortalecer la vigilancia centinela de ETI/OVR/IRAG en los establecimientos de salud designados de la DIRIS Lima Este, asegurando la notificación oportuna de los casos.
- ❖ Consolidar la vigilancia virológica, priorizando la tipificación de los casos de influenza A pendientes, con el fin de mejorar la evaluación del riesgo epidemiológico y orientar adecuadamente las medidas de respuesta sanitaria.
- ❖ Intensificar el seguimiento clínico de casos confirmados y contactos, durante al menos 7 días, con énfasis en la detección temprana de signos de alarma y la referencia oportuna de casos con evolución desfavorable.
- ❖ Reforzar la vigilancia de IRAG en establecimientos hospitalarios, garantizando una adecuada clasificación clínica, manejo oportuno y registro completo de los casos hospitalizados.
- ❖ Promover y reforzar las medidas preventivas, especialmente en población adulta y masculina, incluyendo higiene respiratoria, uso de mascarilla ante síntomas y búsqueda temprana de atención de salud.
- ❖ Impulsar la vacunación contra influenza, priorizando grupos de riesgo y personal de salud, como estrategia clave para reducir la transmisión y la ocurrencia de formas graves.

¡Gracias!

